

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4127 Molinia serotina
Synonymes DIPLACHNE SEROTINA Link ; FESTUCA SEROTINA L.
- Plante vivace de 30 cm à 1 mètre, glabre, à souche épaisse, dure, noueuse, un peu rampante - tiges dressées, raides, feuillées jusqu'à la panicule, à noeuds nombreux - feuilles courtes, planes, raides, rudes, les caulinaires étalées - panicule courte, dressée, très étalée à la floraison, lâche, peu fournie, violacée, à rameaux solitaires, nus à la base, pubérulents - épillets oblongs, à 3-6 fleurs espacées et caduques, à axe velu sous les fleurs - glumes très inégales, à 1-3 nervures - glumelle carénée, terminée par une courte arête, à 5 nervures - caryopse en fuseau.
Écologie Côteaux rocailloux du Midi et du Sud-Est, jusque dans la Savoie, l'Ain, l'Ardèche, l'Aveyron.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale.
Floraison Août-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : rose Floraison : de août à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale


Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Molinie tardive	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cleistogène tardif	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Cléistogénès tardif	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Diplachné tardive		Peu usité et à éviter	
cat	Diplacne			
ita	Paléo tardivo			
deu	Steifhalm			

Statuts


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Kengia serotina subsp. serotina

Basionyme : Festuca serotina L. [1759, Syst. Nat., éd. 10, 2 : 876]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Kengia	86634
Espèce	Kengia serotina	75198
Sous-Espèce	Kengia serotina subsp. serotina	36869

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Kengia serotina subsp. serotina* et code **0255** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 27645