



Lons (64)

Mercredi 12 avril 2017



Onagre rose
Oenothera rosea

Sortie « inventaire » dans le secteur du Lanot de Castet


Cette deuxième sortie dans les landes du château a pour but de poursuivre l'inventaire de la flore dans le cadre d'un projet de préservation et d'aménagement de cette zone, projet porté par l'association « GEOB » (Groupe d'étude ornithologique du Béarn).

Nous sommes descendus dans le lit de Lacabette pour poursuivre notre exploration et avons tenté de visiter d'autres milieux que ceux qui avaient été parcourus au mois de mars.

Participants : Joceline Chappert-Boissière, Clémentine Guichard, Marc Kaster, Justine Leneveu, François Masonnave, Didier Lassale, Edwige Pauthier, Marie-France Petibon, Dany Roussel.

Itinéraire suivi signalé en jaune sur la carte (en rouge, itinéraire du mois de mars) :

Parking près du rond-point de la voie nord-sud.



un joli pré invitant à la sieste sous les fleurs de lin. Nous traversons ensuite une magnifique chênaie (158) avant d'emprunter le chemin Barraqué pour retourner aux voitures.

Le matin, arrêt à 10 mètres des voitures, sur un talus récemment tondu !
Chemin vers le nord puis vers l'ouest jusqu'à une petite zone humide que nous épluchons en attendant le reste de la troupe (point des dents de chien que nous n'avons même pas pensé à retrouver !).

Nous longeons le champ avant d'emprunter un passage à travers les barbelés pour descendre dans le lit du ruisseau. Là, émerveillement ! Complet dépaysement car nous avons une flore géante qui crée une ambiance asiatique (platane, palmiers et bambous)

Après avoir batifolé à la vitesse de 50 m/h sur les plages de galets, nos estomacs nous dictent le chemin du retour. L'un de nous, plus motivé ou moins affamé, décide de poursuivre l'exploration du ravin. En route, nous rencontrons des jacinthes d'Espagne (155).

L'après-midi, nous décidons d'explorer la saulaie, milieu mystérieux avec ses troncs très serrés mais somme toute très pauvre puis, nous gagnons à travers champs (labourés) un bois pentu (157) jonché de bogues de châtaignes qui débouche dans

Voici la liste des 173 espèces observées les 8 mars et/ou 12 avril 2017. Nous la complèterons le 17 mai prochain.

<i>Acer campestre</i> L., 1753	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq., 1775
<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	<i>Crepis vesicaria</i> subsp. <i>taraxacifolia</i> (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914
<i>Achillea millefolium</i> L., 1753	<i>Crocosmia x crocosmiiflora</i> (Lemoine) N.E.Br., 1932
<i>Agrimonia eupatoria</i> L., 1753	<i>Crocus nudiflorus</i> Sm., 1798
<i>Ajuga reptans</i> L., 1753	<i>Cruciata laevipes</i> Opiz, 1852
<i>Alliaria petiolata</i> (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., 1768
<i>Anemone nemorosa</i> L., 1753	<i>Dactylis glomerata</i> L., 1753
<i>Aneura pinguis</i> (L.) Dumort.	<i>Daucus carota</i> L., 1753
<i>Angelica sylvestris</i> L., 1753	<i>Dioscorea communis</i> (L.) Caddick & Wilkin, 2002
<i>Anisantha sterilis</i> (L.) Nevski, 1934	<i>Dryopteris affinis</i> subsp. <i>affinis</i> (Lowe) Fraser-Jenk., 1979
<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959
<i>Aquilegia vulgaris</i> L., 1753	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848
<i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842	<i>Equisetum arvense</i> L., 1753
<i>Arum italicum</i> Mill., 1768	<i>Equisetum telmateia</i> Ehrh., 1783
<i>Asphodelus albus</i> Mill., 1768	<i>Erica vagans</i> L., 1770
<i>Asplenium scolopendrium</i> L., 1753	<i>Ervilia hirsuta</i> (L.) Opiz, 1852
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	<i>Erythronium dens-canis</i> L., 1753
<i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv.	<i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753
<i>Bellis perennis</i> L., 1753	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L., 1753
<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth, 1794	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753
<i>Bromus racemosus</i> L., 1762	<i>Euphorbia peplus</i> L., 1753
<i>Buddleja davidii</i> Franch., 1887	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik., 1792	<i>Ficaria verna</i> Huds., 1762
<i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753
<i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753
<i>Cardamine pratensis</i> L., 1753	<i>Galium aparine</i> L., 1753
<i>Carex brizoides</i> L., 1755	<i>Geranium dissectum</i> L., 1755
<i>Carex divulsa</i> Stokes, 1787	<i>Geranium phaeum</i> L., 1753
<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753
<i>Carex pendula</i> Huds., 1762	<i>Geum urbanum</i> L., 1753
<i>Carex remota</i> L., 1755	<i>Glechoma hederacea</i> L., 1753
<i>Carex sylvatica</i> Huds., 1762	<i>Hedera helix</i> L., 1753
<i>Carex umbrosa</i> Host, 1801	<i>Helleborus viridis</i> L., 1753
<i>Castanea sativa</i> Mill., 1768	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	<i>Humulus lupulus</i> L., 1753
<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill., 1799	
<i>Ceratochloa cathartica</i> (Vahl) Herter, 1940	
<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i> L., 1753	
<i>Circaeaa lutetiana</i> L., 1753	
<i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772	
<i>Conocephalum conicum</i> (L.) Dumort.	
<i>Cortaderia selloana</i> (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn., 1900	
<i>Corylus avellana</i> L., 1753	
<i>Crataegus germanica</i> (L.) Kuntze, 1891	

<i>Lathyrus linifolius</i> subsp. <i>montanus</i> (Bernh.) Bässler	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753
<i>Laurus nobilis</i> L., 1753	<i>Salix caprea</i> L., 1753
<i>Ligustrum vulgare</i> L., 1753	<i>Sambucus nigra</i> L., 1753
<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>usatissimum</i> L., 1753	<i>Scrophularia alpestris</i> J.Gay ex Benth., 1846
<i>Lonicera periclymenum</i> L., 1753	<i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811
<i>Lophocolea bidentata</i> (L.) Dumort., 1835	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke, 1869
<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd., 1809	<i>Solanum dulcamara</i> L., 1753
<i>Lysimachia nemorum</i> L., 1753	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842
<i>Malva moschata</i> L., 1753	<i>Stellaria graminea</i> L., 1753
<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	<i>Stellaria holostea</i> L., 1753
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh., 1792	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill., 1789
<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	<i>Symphytum tuberosum</i> L., 1753
<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv., 1811	<i>Taraxacum officinale</i> F.H.Wigg., 1780
<i>Oenothera rosea</i> L'Hér. ex Aiton, 1789	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753
<i>Oxalis acetosella</i> L., 1753	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) Schimp.
<i>Oxalis corniculata</i> L., 1753	<i>Tilia europaea</i> L., 1753
<i>Plagiochila asplenoides</i> (L. emend. Taylor) Dumort.	<i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H.Wendl., 1862
<i>Plagiommium undulatum</i> (Hedw.) T.J.Kop.	<i>Tractema lilio-hyacinthus</i> (L.) Speta, 1998
<i>Plantago lanceolata</i> L., 1753	<i>Trifolium campestre</i> Schreb., 1804
<i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., 1770	<i>Trifolium pratense</i> L., 1753
<i>Poa annua</i> L., 1753	<i>Trifolium repens</i> L., 1753
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All., 1785	<i>Ulex minor</i> Roth, 1797
<i>Polypodium cambricum</i> subsp. <i>cambricum</i> L., 1753	<i>Ulmus minor</i> Mill., 1768
<i>Polypodium interjectum</i> Shivas, 1961	<i>Urtica dioica</i> L., 1753
<i>Polystichum setiferum</i> (Forssk.) T.Moore ex Woyn., 1913	<i>Valerianella locusta</i> f. <i>carinata</i> (Loisel.) Devesa, J.López & R.Gonzalo, 2005
<i>Potentilla indica</i> (Andrews) Th.Wolf, 1904	<i>Verbena officinalis</i> L., 1753
<i>Potentilla reptans</i> L., 1753	<i>Veronica arvensis</i> L., 1753
<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke, 1856	<i>Veronica chamaedrys</i> L., 1753
<i>Poterium sanguisorba</i> L., 1753	<i>Veronica montana</i> L., 1755
<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	<i>Veronica persica</i> Poir., 1808
<i>Prunus laurocerasus</i> L., 1753	<i>Veronica serpyllifolia</i> subsp. <i>serpyllifolia</i> L., 1753
<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	<i>Viburnum opulus</i> L., 1753
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	<i>Vicia faba</i> L., 1753
<i>Pulmonaria affinis</i> Jord., 1854	<i>Vicia segetalis</i> Thuill., 1799
<i>Quercus robur</i> L., 1753	<i>Vinca minor</i> L., 1753
<i>Ranunculus acris</i> L., 1753	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Bureau, 1857
<i>Ranunculus flammula</i> L., 1753	<i>Viola riviniana</i> Rchb., 1823
<i>Ranunculus repens</i> L., 1753	<i>Viscum album</i> L., 1753
<i>Ranunculus tuberosus</i> Lapeyr., 1813	
<i>Reynoutria japonica</i> Houtt., 1777	
<i>Robinia pseudoacacia</i> L., 1753	
<i>Rosa canina</i> L., 1753	
<i>Rubus fruticosus</i> L., 1753	
<i>Rumex acetosa</i> L., 1753	
<i>Rumex obtusifolius</i> L., 1753	