

Tableau II — ROSMARINETO-LITHOSPERMETUM

	Bas-Languedoc						Vallée de l'Aude		Provence occidentale		
	ericetosum	linetosum	helianthemetosum	pinetosum	schoenetosum	dolomiticum	atractyletosum	staehelinetosum	sideritetosum	coronilletosum	juniperetosum
<i>Sous-associations du Rosmarineto-Lithospermetum</i>	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
Nombre de relevés	30	13	24	15	15	10	5	19	6	8	13
Caractéristiques de l'Association :											
Lithospermum fruticosum L.	26 ¹⁻¹	11 ¹⁻¹	18 ¹	7 ⁺	7 ¹⁻¹	1 ⁺	2 ⁺⁻¹	1 ¹	.	8 ¹	.
Erica multiflora L.	28 ²⁻³	8 ⁺	2 ⁺	13 ²⁻³	9 ¹⁻²	9 ³	.	.	.	2 ⁺	.
Sideritis scordoides L.	8 ⁺	5 ⁺	2 ⁺	.	6 ⁺	.	4 ⁺	8 ⁺⁻¹	.	.	.
Fumana thymifolia (L.) Verl. ssp. laevis (Cav.)	10 ¹	1 ⁺	.	.	.	.	.	3 ¹⁻²	.	.	.
Thymelaea sanamunda All.	.	5 ⁺	.	.	.	.	2 ⁺	1 ⁺	1 ⁺	.	.
Caractéristiques de l'Alliance (Rosmarino-Ericion) :											
Rosmarinus officinalis L.	29 ²⁻³	13 ³	21 ³	15 ¹⁻²	14 ²	10 ³	.	16 ²⁻³	1 ⁺	8 ³	13 ¹⁻²
Stachelina dubia L.	27 ¹	9 ⁺	17 ⁺⁻¹	10 ⁺⁻¹	9 ⁺	8 ⁺⁻¹	5 ²⁻³	19 ²	5 ²⁻³	8 ⁺	1 ⁺
Coris monspeliensis L.	30 ⁺⁻¹	11 ⁺⁻¹	19 ¹	5 ⁺	14 ⁺⁻¹	10 ⁺	5 ⁺	8 ¹	5 ⁺	7 ⁺	1 ⁺
Pinus halepensis Mill.	13 ⁺	2 ⁺	12 ⁺	15 ²⁻⁴	6 ⁺	1 ⁺	4 ⁺⁻¹	6 ⁺	2 ⁺	8 ⁺⁻¹	8 ⁺
Stipa juncea L.	19 ¹	6 ⁺	7 ⁺	2 ⁺⁻¹	7 ⁺	9 ⁺⁻¹	.	1 ⁺	.	4 ¹	13 ¹⁻²
Genista pilosa L. ssp. Jordani Shuttl.	19 ¹	7 ¹	2	10 ⁺	9 ¹	4 ⁺	.	.	.	1 ⁺	.
Globularia alypum L.	.	.	2 ⁺⁻¹	.	.	5 ⁺⁻¹	2 ⁺⁻³	.	.	6 ⁺⁻¹	7 ⁺
tg. As. Coronilla minima L. ssp. australis G. et G.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7 ⁺	1 ⁺
tg. As. Helianthemum marifolium (Cav.) DC.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 ⁺	.
tg. As. Helianthemum laevipes (L.) Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2 ⁺
Caractéristiques de l'Ordre (Rosmarinetalia) :											
Fumana ericoides (Cav.) Pau	29 ¹	12 ¹	24 ¹⁻²	9 ⁺	15 ¹	10 ¹	5 ¹	14 ¹	6 ¹	8 ⁺	6 ⁺
Lavandula latifolia (L.) Vill.	26 ⁺	13 ⁺	22 ²⁻²	11 ⁺⁻¹	13 ⁺⁻¹	8 ⁺	5 ¹⁻²	16 ¹	6 ¹	4 ⁺	6 ⁺
Avena bromoides Gouan	22 ⁺	7 ⁺	10 ⁺⁻¹	8 ⁺	2 ⁺	2 ⁺	2 ⁺	12 ⁺⁻¹	6 ⁺	3 ⁺	4 ⁺
Centaurea conifera L.	14 ⁺	4 ⁺	15 ⁺	7 ⁺	3 ⁺	2 ⁺	5 ⁺⁻¹	4 ⁺	3 ⁺	2 ⁺	.
Euphorbia nicaeensis All.	21 ⁺	11 ⁺	7 ⁺	4 ⁺	8 ⁺	2 ⁺	.	2 ⁺	1 ⁺	.	.
Leontodon Villarsii Loisel.	10 ⁺	8 ⁺	9 ⁺	3 ⁺	9 ⁺	.	.	.	.	.	.
Helianthemum italicum Pers.	2 ⁺⁻¹	2 ⁺	15 ⁺⁻¹	.	1 ⁺	1 ⁺	.	.	.	.	.
tg. Al. Aphyllanthes monspeliensis L.	30 ¹	13 ¹	22 ¹⁻²	12 ⁺⁻¹	15 ¹	10 ¹	5 ¹	17 ⁺⁻¹	4 ¹⁻²	7 ¹	1 ⁺
tg. Al. Globularia Linnaei Rouy (G. vulgaris L.)	24 ¹	10 ¹	6 ¹	3 ⁺	13 ¹⁻¹	3 ⁺⁻¹	.	.	.	.	.
tg. Al. Potentilla verna L. var. australis Wolf	12 ⁺	6 ⁺	6 ⁺	3 ⁺	8 ⁺	.	2 ⁺	2 ⁺	3 ⁺	.	.
tg. Al. Catananche coerulea L.	12 ⁺	4 ⁺	5 ⁺	5 ⁺	2 ⁺	.	2 ⁺	.	.	.	.
tg. Al. Linum campanulatum L.	7 ⁺	6 ⁺⁻¹	1 ⁺	.	1 ⁺	.	.	.	.	5 ⁺	.
tg. As. Linum salsoides Lmk.	4 ⁺	2 ⁺	4 ⁺⁻¹	.	1 ⁺	.	.	.	.	3 ⁺	.
tg. As. Thymus serpyllum L. ssp. angustifolius Pers.	3 ⁺	2 ⁺	1 ²	2 ⁺	10 ⁺	.	.	.	.	.	.
tg. Al. Chrysanthemum graminifolium L. ssp. controversum (Br.-Bl.)	3 ⁺	1 ⁺	1 ⁺	4 ⁺⁻¹	2 ⁺	.	.	.	.	.	.
tg. As. Carduncellus monspeliensis All.	6 ⁺	2 ⁺	2 ⁺	.	1 ¹	.	.	.	.	.	.
tg. Al. Lotus corniculatus (L.) var. villosus Lor. et Barr.	.	.	1 ⁺	.	2 ⁺	2 ⁺	.	4 ⁺	1 ⁺	.	.
tg. As. Astragalus monspessulanus L.	1 ⁺	.	3 ⁺	.	.	.	.	4 ⁺⁻¹	.	.	.
tg. Al. Linum tenuifolium L.	2 ⁺	.	.	1 ⁺	.	.	.	.	.	.	.
tg. Al. Campanula glomerata L. ssp. monspeliensis Br.-Bl. et Tom.	.	1 ⁺	.	1 ⁺	.	1 ⁺	.	.	.	.	.
tg. As. Astragalus incanus L.	.	.	1 ⁺	.	.	.	.	.	.	.	.
Caractéristiques de la Classe (Ononido-Rosmarinetea) :											
Carex humilis Leyss.	27 ¹	11 ¹⁻²	15 ¹	14 ¹⁻²	11 ⁺	4 ⁺	1 ²	.	.	4 ¹	.
Koeleria vallesiana (Sut.) Gaud.	14 ⁺	9 ⁺	12 ⁺	.	15 ⁺	.	.	.	2 ⁺	7 ⁺	1 ⁺
Asperula cynanchica L.	21 ⁺	7 ⁺	11 ⁺	3 ⁺	4 ⁺	1 ⁺	2 ⁺	10 ⁺⁻¹	2 ⁺	1 ⁺	.
Thesium divaricatum Jan.	16 ⁺	7 ⁺	6 ⁺	.	.	.	.	9 ⁺⁻¹	1 ⁺	.	.
Coronilla minima L. (le type)	7 ⁺	5 ⁺	7 ⁺	2 ⁺	2 ⁺⁻¹	.	3 ⁺	7 ⁺⁻¹	1 ²	.	.
Helianthemum canum Baumg.	7 ¹	8 ⁺⁻¹	.	.	4 ¹	2 ⁺⁻¹	.	.	.	.	.
Trinia glauca Dumort.	2 ⁺	3 ⁺	3 ⁺	.	8 ⁺	1 ⁺	1 ¹	1 ¹	.	.	.
Helianthemum apenninum (L.) Lmk. et DC.	.	.	4 ⁺	.	1 ⁺	1 ⁺	.	3 ¹⁻²	4 ⁺⁻¹	.	.
Seseli montanum L.	4 ⁺	.	2 ⁺⁻¹	1 ⁺	.	1 ⁺	3 ⁺	2 ⁺	2 ⁺	.	.
Globularia Willkommii Nym.	4 ⁺	1 ⁺	2 ⁺⁻¹	7 ⁺⁻¹	.	1 ⁺	.	.	.	.	.
Teucrium montanum L.	4 ⁺	1 ⁺	.	.	.	1 ⁺	.	.	.	.	.
Fumana vulgaris Spach	1 ⁺	1 ¹	.	.	1 ⁺	.	.	.	.	.	.
Linum narbonense L.	.	.	.	.	.	.	1 ⁺	.	3 ⁺	.	.
tg. O. Leontodon crispus Vill.	1 ⁺	3 ⁺	4 ⁺	.	.	.	.	.	.	.	.
tg. O. Inula montana L.	1 ⁺	1 ⁺	1 ⁺	.	.	.	.	.	.	.	.
tg. As. Stipa pennata L. ssp. mediterranea (Trin. et Rupr.) A. et G.	1 ⁺	.	.	.	4 ⁺	.	.	.	.	1 ⁺	.
tg. Al. Teucrium aureum Schreb.	.	.	.	.	.	3 ⁺	.	.	.	.	.
Compagnes de haute présence :											
Thymus vulgaris L.	22 ⁺	12 ¹⁻¹	24 ¹	14 ⁺⁻¹	6 ⁺	10 ⁺	5 ⁺⁻¹	18 ¹	4 ¹	7 ⁺	13 ⁺⁻¹
Brachypodium ramosum (L.) Roem. et S.	24 ⁺⁻¹	12 ⁺⁻¹	22 ¹	14 ¹⁻²	8 ⁺	7 ⁺	5 ¹⁻²	17 ¹⁻²	5 ²	7 ⁺	9 ⁺
Genista scorpius (L.) DC.	30 ⁺⁻¹	13 ⁺⁻¹	22 ¹	12 ⁺	11 ⁺	9 ⁺	5 ⁺⁻¹	15 ¹	3 ¹⁻²	.	.
Juniperus oxycedrus L.	25 ⁺⁻¹	8 ⁺	14 ⁺	15 ¹	9 ⁺	6 ⁺	2 ⁺⁻¹	10 ⁺⁻¹	.	8 ⁺	.
Festuca ovina L. ssp. duriuscula Koch	23 ⁺⁻¹	11 ⁺⁻¹	17 ⁺	7 ⁺	13 ⁺⁻¹	5 ⁺⁻¹	3 ⁺⁻¹	7 ⁺	3 ⁺	3 ⁺	6 ⁺
Teucrium polium L.	26 ⁺	12 ⁺	19 ⁺	10 ⁺	10 ⁺	4 ⁺	5 ⁺	5 ⁺	5 ⁺⁻¹	3 ⁺	6 ⁺
Quercus coccifera L.	27 ⁺	9 ⁺	19 ⁺	14 ¹	6 ⁺	2 ⁺	3 ⁺	9 ⁺	3 ⁺	6 ⁺	.
Ononis minutissima L.	16 ⁺	5 ⁺	15 ⁺	10 ⁺	15 ⁺	5 ⁺	5 ⁺	17 ⁺⁻¹	6 ⁺	3 ⁺	.
Carex Halleriana Asso	13 ⁺	6 ⁺	11 ⁺	9 ⁺	3 ⁺⁻¹	5 ⁺	5 ⁺	9 ⁺	2 ⁺⁻¹	7 ⁺	.
Helichrysum stoechas (L.) DC.	18 ⁺	4 ⁺	14 ⁺	.	7 ⁺	.	5 ⁺	14 ⁺⁻¹	5 ⁺	.	.
Argyrolobium Linnaeanum Walp. (1)	20 ⁺	5 ⁺	20 ⁺	7 ⁺	5 ⁺	1 ⁺	4 ⁺	6 ⁺	.	.	.
Bupleurum rigidum L.	23 ⁺	6 ⁺	18 ⁺	11 ⁺	4 ⁺	.	4 ⁺⁻¹	.	.	.	.
Ulex parviflorus Pourr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5 ²	.

(1) Cytisus argenteus L.