

HYBRIDA

R. CALVIFOLIUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. SEMICALVIFOLIUS* Sud. *I. c.* — Differt a *R. calvifolio*: foliis discoloribus, floribus roseis, sterilibus.

GALLIA: Tarn, La Sarrade.

b. — (T. XLI) — *R. rotundatus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861, *nomen*); *Genev. Mon. p. 206* (1880) *ex pte.*

Validus; *turio* (6) glaber, faciebus planis vel leviter concavis; *folia* (7) ampla, grosse serrata; *foliolum* terminale orbiculare, subemarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia* elongata, foliosa, pilosohirsuta, aculeis reclinatis vel falcatis armata; *pedunculi* (8) ascendentis, eglandulosi; *sepala* pilosa, inermia; *flores* albi (9); *germina* glabra.

GALLIA: Marne, bois de Mersy ! (Levent); Cher, Rhin-du-Bois (sec. Genevier); BELGIA: Koekebreck, Boenduel (T. Durand).

26 — (T. XLII) — *R. ELONGATISPINUS* Sud. *Rub. Pyr. pp. 38, 99* (1899).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 57 !

Validus; *turio* (1) angulatus, faciebus leviter canaliculatis, pilosus, glaucescens, glandulis sessilibus numerosis obsitus; *aculei* crebri, validi, subæquales, recti, e basi abrupte dilatata; *folia* (2) supra subglabra, subtus viridia, parce pilosa, dentibus inæqualibus, profundis, acutis; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, basi rotundatum vel subemarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima manifeste petiolulata; *petiolus* pubescens, aculeis reclinatis vel subfalcatis armatus; *stipulae* sparsim glandulosæ; *ramus florifer* rectus, obsolete angulatus, pilis adpressis, aculeis crebris, validis, elongatis, reclinatis armatus; *folia* 3-nata, acriter dentata, foliolis acuminatis; *inflorescentia* (3) grandis, valde elongata, apicem versus longe aphylla, parum et breviter pilosa, glandulis nullis vel rarissimis, aculeis validis, crebris, elongatis, rectis vel reclinatis armata; *pedunculi* medi valde patentes, pluriflori, pedicellis brevibus; *sepala* tomentosa, breviter pilosa, parce aculeata, glandulis sessilibus obsita, post anthesin reflexa (6); *petala* (4, 5) obovata, integra, rosea; *stamina* rosea stylis rubentes longe superantia; *germina* glabrescentia. *Pollen* parum admixtum (7); *receptaculum* glabrescens. — Julius-augustus.

GALLIA: In Pyrenæis, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, Aulus, Ax, Foix, Arreau, Luchon, etc.

OBS. — Le *R. elongatispinus*, d'abord rapproché du *R. Questieri* L. et M., est bien distinct de ce dernier par ses turions velus, ses aiguillons forts et denses, presque droits sur le rameau, sa dentelure moins grosse, plus régulière et plus vive, ses folioles plus larges, plus longuement petiolulées, son inflorescence plus armée, à pédoncules très étalés, ses étamines très longues, d'un rose ordinairement vif, et son pollen plus parfait.

HYBRIDA

R. ELONGATISPINUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. Pyr. p. 39* (1899); *R. DECLINATUS* Sud. *I. c.* — A *R. elongatispino* recedit: foliis discoloribus, inflorescentia multiflora, staminibus brevioribus, floribus sterilibus.

GALLIA: In Pyrenæis, Arreau, Aulus.

b. — *R. belophorus* M. et Lef. *Vers. n° 45* (1859); *R. macrophyllus* Sbsp. *belophorus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 50.* Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 11 !

Habitus *R. elongatispini* sed: foliolum caul. terminale basi cordatum, sensim et longe acuminatum, flores albi, drupeolæ minus numerosæ. Differt a *R. macrophyllum* W. N. inflorescentiæ aculeis validis, elongatis.

GALLIA: Oise, forêt de Retz, laie du Poirier d'Oignon (Lefèvre), laie d'Emeville (Questier).

HYBRIDÆ

R. BELOPHORUS × ULMIFOLIUS Sud. *Diagn. p. 7* (1906); *R. ORTHACANTHOPHORUS* Sud. *I. c.* — Aculei validi *R. belophorum* revocant, sed turiones pruinosi, foliolum terminale cuspidatum, brevius, dentes tenuiores, frons subdiscolor.

GALLIA: Valois, laie de Clèves, Arganson (Questier).

R. BELOPHORUS × GENICULATUS Sud. in hb. *Mus. Paris*; *R. ORTHACANTHOIDES* Gandg. *Rub. nouv. p. 126* (1884); *R. orthacanthus* M. et Lef. *Vers. n° 39* (1859), non Vimm.; *R. belophorus × cuspidifer* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 79.* — Aculei recti, elongati *R. belophorum* revocant, sed folia subtus cinerea vel albo-tomentosa, foliola angustiora. Folia subtus molliter pubescentia ut in *R. geniculato* Kalt. Sterilis.

GALLIA: Oise, bois de Lévignen (Lefèvre, Questier).

R. BELOPHORUS × SCHLECHTENDALII?; *R. oxyacanthus* Lef. et M. *Vers. n° 67* (1859). — Turio valde pilosus; aculei crebri, recti; folia subtus viridia; foliolum terminale ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; rami floriferi aculei elongati, reclinati; inflorescentia multiflora, laxa, foliosa, valde armata, glandulis raris vel nullis; sepala aculeata, reflexa; petala staminaque rosea. Sterilis. — *R. eglantulus* M. et L. satis similis.

GALLIA: Oise, bois de Tillet (Lefèvre, Questier).

27 — (T. XLIII) — *R. FAGICOLA* de Martr.-D. *Fl. Tarn p. 219* (1864); Sud. *Rev. Rub. Hb. Tarn p. 83*; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 48.*

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 58; Baenitz *Hb. eur.* n° 9948; Sud. *Bat. eur.* n° 237.

Turio (1) arcuato-procumbens, angulatus, faciebus leviter canaliculatis, pilosus, glandulis sessilibus, crebris obsitus; aculei valde numerosi, validi, æquales, e basi distincte dilatata, recti vel reclinati; *folia* (2, 3) 5-nata, coriacea, ampla, pallide viridia, supra glabrescentia, subtus parce pilosa, argute et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, basi cordatum, tenuiter acuminatum, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, pubescens, aculeis creberimis, falcatis vel uncinatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis subsessilibus; *ramus florifer* subrectus, angulatus, pilosus, aculeis crebris, brevibus, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia; *inflorescentia* (4) ampla, aphylla vel inferne foliosa, laxe pilosa, aculeis crebris, reclinatis vel falcatis armata; *bractæ* glandulis tenuibus et brevibus obsitæ; *pedunculi* medi elongati, patuli vel patulo-ascendentis, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia, breviter pilosa, aculeata, glandulis sessilibus munita, post anthesin reflexa (7); *petala* ovata (5, 6), integra, alba vel pallide rosea; *stamina* alba vel pallide rosea, stylis vulgo virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* admixtum (8). — Julius-augustus.

β. *PALLIDULUS* Sud. *Rub. tarn.* (1909). — Folia subtus pallida et valde pubescentia; *stamina* stylique rubra. Hybrida?

GALLIA: Tarn, Lacaune, Anglés, Alban, Sidobre, Montagne-Noire; Aveyron. — β. Tarn, Cantermerlé, prope Fabas.

OBS. — Ses turions poilus, ses aiguillons très denses, sa dentelure fine, ses larges folioles, son inflorescence large et non feuillée, ses pétales entiers, ses styles pâles, le distinguent nettement du *R. Questieri* L. et M., qui croit parfois dans les mêmes lieux. Très abondant dans toute la région montagneuse du Tarn.

HYBRIDÆ

R. FAGICOLA × TARNENSIS Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. VIRIDIFORMIS* Sud. *l. c.* — *Turio glaber*; *folia subtus viridia*; *inflorescentia ampla*; *flores lète rosei*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Mazamet.

R. FAGICOLA × ULMIFOLIUS Sud. *l. c.* (1909); *R. RUPIVAGUS* Sud. *l. c.* — A *R. fagicola* de Martr. differt foliis subdiscoloribus, foliolis angustis, rachide tomentosa, floribus lète roseis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Durfort.

R. FAGICOLA × ARDUENNENSIS vicarius Sud. *l. c.* (1909); *R. VICARIIFORMIS* Sud. *l. c.* — A *R. fagicola* dignoscitur; *turione glabrescenti*, *foliis discoloribus*, *dentibus latioribus*, *floribus albis*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Vabre.

R. FAGICOLA × RADULA oreus Sud. *l. c.* (1909); *R. GRANITICARUM* Sud. *l. c.* — Differt a *R. fagicola*: *turione glanduloso*, *foliis superis subtus cinereo-tomentosa*, *inflorescentia magna*, *multiflora*, *floribus albis*, *sterilibus*.

GALLIA : *Tarn*, forêt de l'Aiguille, route de Revel aux Cammazes.

R. FAGICOLA × ex appendiculatis? Sud. *l. c.* (1909); *R. DEFORMIS* Sud. *l. c.* — *Turio heteracanthus*; *folia subtus cinereo-pubescentia*; *foliolum terminale ovatum*, *cordatum*, *acuminatum*; *rachis hirsuta*, *parce glandulosa*, *aculeis flavescentibus munita*; *sepala reflexa*; *flores albi*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Lacrouzette, route de Burlats.

R. FAGICOLA × OMALUS (e grege) Sud. *l. c.* (1909); *R. CALVISPINUS* Sud. *l. c.* — A *R. fagicola* recedit: *inflorescentia multiflora*, *sparsim glandulosa*; *sepalis valde aculeatis*, *floribus sterilibus*.

GALLIA : *Tarn*, Alban.

R. FAGICOLA × SCHLEICHERI (e grege) Sud. *l. c.* (1909); *R. TENUIPES* Sud. *l. c.* — *Turio angulatus*, *heteracanthus*; *folia 3-nata*; *inflorescentia laxa*, *glandulis brevibus munita*; *sepala erecta*, *flores albi*, *steriles*.

GALLIA : *Tarn*, Lacabarède, Arfons, Lacrouzette.

b. — (T. XLIII) — *R. tolosanus* Sud. *Diagn. p. 7* (1905); *Flor. toul. p. 72*.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 301!

A *R. fagicola* de Martr.-D. distinguuntur: *turione glandulis stipitatis sparsis munito*; *foliis grosse serratis*, *subtus pubescentibus*; *foliolo terminali* (9) *basi minus dilatato*; *inflorescentia densa*, *parce glandulosa*, *sepalis vulgo inermibus*, *petalis majoribus* (10). *Petala rosea*, *stamina rosea*, *styli virescentes*. — A *R. macrophyllum* W. et N. differt *inflorescentia aculeis validis armata*.

GALLIA : Haute-Garonne, Bouconne, prope Brax, loco dicto Bégué.

28 — (T. XLIV) — *R. MAJUSCULUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr. n° 205* (1898).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 238!

Validus; *turio* (1) *angulatus*, *faciebus planis*, *parce pilosus*, *glandulis sessilibus munitus*; *aculei æquales*, *compressi*, *recti vel reclinati*; *folia* (2) *magna*, *plerumque 5-nata*, *supra parce pilosa*, *subtus pallidiora*, *pubescentia*, *simpliciter et subæqualiter serrata*, *dentibus brevibus*, *mediocribus*; *foliolum* *terminale breviter obovatum* *vel suborbiculare*, *basi subemarginatum*, *cuspidatum*, *petiolulo proprio duplo vel triplo longius*, *infima petiolulata*; *petiolus* *supra planus*, *pubescens*, *aculeis valde reclinatis vel falcatis armatus*; *stipulae* *lineares*, *glandulis subsessilibus prætextæ*; *ramus florifer* (3) *elongatus*, *angulosus*, *pubescens*, *aculeis reclinatis vel falcatis armatus*; *folia* 3-nata, *subtus vulgo viridia* (in apricis leviter cinerascentia), *argute serrata*, *folioli terminali obovato*, *cuspidato*; *inflorescentia* *angustata*, *aphylla* *vel inferne foliosa*, *pauciflora*, *breviter pilosa*, *glandulis subsessilibus abdita*; *aculei mediocres*, *in apricis validi*, *plerumque reclinati*; *pedunculi medii ascendentes*, *1-3-flori*, *pedicellis fasciculatis*; *sepala* *tomentoso-virescentia*, *breviter pilosa*, *inermia* *vel parce aculeata*, *post anthesin reflexa* (6); *petala* (4, 5) *anguste obovata*, *in unguem attenuata*, *dis tantia*, *integra*, *alba vel pallide rosea*; *stamina* *alba stylis virescentes superantia*; *germina* *glabra*; *receptaculum pilosum*. *Pollen admixtum* (7). — Julius-julius.

GALLIA : *Tarn*, Mazamet, Lacabarède, Canitrot, la Sarrade, Fréjairolles, etc.

OBS. — La forme de ses folioles terminales, ses aiguillons ordinairement forts sur l'inflorescence, ses axes florifères non poilus-hérissés, le distinguent du *R. macrophyllum* W. N., auquel je l'avais primitivement rattaché. Ses pétales étroits le rendent facile à reconnaître. Dans les endroits couverts l'inflorescence est pauciflore et presque inerme, mais dans les haies exposées au soleil elle est garnie d'aiguillons longs, fortement déclinés ou géniculés et très vulnérants. Vu sous des spécimens vigoureux, il est bien distinct des autres espèces de la même série.

HYBRIDA

R. MAJUSCULUS × VALLISPARSUS Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. DOMENJOUANUS* Sud. *l. c.* — A *R. majuscule* dignoscitur: *aculeis inæqualibus*, *inflorescentia brevi*, *lata*, *glandulosa*, *floribus roseis*, *sterilibus*.

GALLIA : *Tarn*, Mazamet, vallée de l'Arnette.

29 — (T. XLV) — *R. RHOMBIFOLIUS* Wh. in Boenningh. *Prod. Fl. Monast.* p. 151 (1824); Focke *Syn. p. 204*; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 518; *R. vulgaris* var. *rhombifolius* Wh. et N. *Rub. germ.* p. 38, 40 (1825) p. p.; *R. carpinifolius* (P. roseus) W. et N. *Rub. germ.* p. 36; *tab. XIII*, *B, b*! *R. villicaulis* Sbsp. *R. rhombifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 36; *R. rothomagensis* N. *Boul. Assoc. Rub.* n° 364; *R. Sprengelii* × *Questieri* N. *Boul. ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 59.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 9; *Assoc. rub.* n° 364 (var.).

Turio (1) *arcuato-procumbens* *vel scandens*, *angulatus*, *faciebus planis vel leviter concavis*, *parce pilosus*, *eglandulosus*; *aculei æquales*, *distantes*, *mediocres*, *compressi*, *e basi dilatata*, *subulati*, *reclinati vel subarcurati*; *folia* 5-nata (2, 3), *supra plana*, *parce pilosa*, *subtus viridia*, *pubescentia*, *in apricis leviter cinerascentia*, *duplicato-serrata*; *foliolum* *terminale rhombeum*, *ellipticum vel ovatum*, *basi rotundatum vel subemarginatum*, *sensim et longe acuminatum*; *petiolus* *planus*, *parce pilosus*, *aculeis falcatis armatus*; *stipulae* *lineares*, *eglandulosæ*; *ramus florifer* (4) *flexuosus*, *gracilis*, *parce pilosus*, *aculeis sparsis*, *falcatis armatus*; *folia* 3-5-nata, *foliolis terminalibus angustatis*, *rhombensis*, *acuminatis*; *inflorescentia* *foliosa*, *basi interrupta*, *laxe pilosa*, *glandulis raris*, *occultatis*, *aculeis sparsis*, *debilibus instructa*; *pedunculi* *medii ascendentes*, *2-3-flori*; *pedicelli* *fasciculati*, *inermes vel aculeis raris muniti*; *bractæ* *sæpe glandulosæ*; *sepala* *tomentoso-virescentia*, *inermia*, *pilosa*, *post anthesin reflexa* (6); *petala* (5) *anguste obovato-cuneata*, *rosea*, *stamina* *alba vel pallide rosea stylis purpurascentes superantia*; *germina* *glabra* *vel parce pilosa*; *receptaculum* *hirsutum*. *Pollen imperfectum* (7). — Julius.

β . PYRAMIDALIFORMIS Spribille Abh. Bot. Ver. Prov. Brandg. IL (1907), p. 193; Sud. Bat. p. 7; *R. rhombifolius* Spribille Zeit. Nat. Abt. Posen (1902) 119 (39). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 239! — Ramorum floriferorum aculei validi; inflorescentia valde armata (8); petala ovata (9).

GERMANY : Guestphalia, Slesvig, Posen, Hannover, Saxonia; AUSTRIA : Pitten (Richter); BATTANIA : Hants, Surrey, Essex, Berks, Hereford, Derby, Ireland, Guernesey, etc. (Rogers); GALLIA : Vienne, Le Rond (de Lacroix); Seine-Inf., forêt de Rouvray (Letendre); Indre-et-Loire, Athée (Tourlet); LUSITANIA, Gerez (G. Sampaio). — β . GERMANY : Silesia, Gross-Strehlitz (Spribille).

OBS. — L'échantillon de Lejeune de l'herbier du Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles, qui représente le *R. carpinifolius* var. *roseus* Wh. appartient bien au *R. rhombifolius* tel que je le comprends et tel que je l'ai reçu de M. Focke; mais l'unique rameau qui, dans la même collection, représente le *R. vulgaris* var. *rhombifolius* Wh. appartient à une autre espèce; il a des feuilles grises-tomentueuses en dessous et, bien qu'il soit impossible d'interpréter sûrement des échantillons dépourvus de feuilles caulinaires, je crois que la plante doit appartenir au *R. argenteus* Wh.; les aiguillons raméaux sont toutefois plus fortement courbés, la plupart crochus, ce qui n'a pas lieu dans le type de cette espèce. Il est donc probable que Weihe et Nees ont confondu, sous le nom de *R. vulgaris* var. *rhombifolius*, plusieurs formes distinctes.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia ramealia tenuiter serrata; inflorescentia densa, subinermis.....	R. DENTULIFER Sud. B b.
II. — Folia ramealia grosse serrata.	
A. — Foliolum caul. terminale ellipticum vel rhombeum, angustatum; inflorescentia laxe pilosa.	
a. — Petala rosea; rami foliola terminalia rhombeo-acuminata.....	R. rhombifolius Wh.
b. — Petala alba; rami foliola terminalia rhombea; stamina stylos æquantia.....	R. WIMMERIANUS Sprib. b.
c. — Petala alba; rami foliola terminalia obovata; stamina stylos superantia.....	R. SAMPAIANUS Sud. B.
B. — Foliolum caul. terminale late ovatum; inflorescentia densa, hirsuta.	
a. — Ramus florifer aculeis crebris armatus.....	R. OPERTUS Sud. C.
b. — Ramus florifer subinermis.....	R. LIBERTIANUS Wh. B c.

b. — (T. XLVI) — *R. Wimmerianus* Spribille (s. n. R. Wimmeri, non Wh. nec Kœhl.) Zeit. Natur. Abt. Posen (1902) 117 (37); Sud. Bat. p. 71 (1907).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 240!

A *R. rhombifolio* Wh. distinguitur : turione glabrescenti; foliolis longe acuminatis; inflorescentia foliosa, aculeis crebris, tenuibus, pedunculis patentioribus; petalis albis; staminibus albis stylos virescentes æquantibus.

GERMANY : Silesia, Ratibor, Kosel, Gross-Strehlitz (Spribille).

B. — (T. XLVI) — **R. Sampaianus** Sud. ap. G. Samp. Rub. Portug. (1904) p. 32; Bat. p. 39; *R. silvaticus* Cout. et Fic. in Bull. Soc. Brot., non Wh. et N.; *R. leucandrus* G. Samp. in Ann. Sc. nat. 1902, non Focke.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 111!

Turio glabrescens, obtusangulus vel faciebus planis; *folia* duplicito-serrata, dentibus mediocribus, peracutis; *foliolum* terminale anguste ovatum vel ellipticum, basi rotundatum, acuminatum; *petiolus* aculeis valde falcatis vel uncinatis armatus; *stipulae* eglandulosæ; *ramus florifer* glabrescens, aculeis falcatis munitus; *folia* 3-5-nata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale obovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* densa, parum foliosa, laxe pilosa, eglandulosa, aculeis validis sparsis instructa; *pedunculi* breves; *sepala* inermia, reflexa; *petala* oblonga, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia. — Junius.

β . GENICULATUS. — Aculei debiles, pallidi, in ramis breves, geniculati, valde obliqui; pedunculi pauciflori, ascendentes; rachis hirsuta. A proximo *R. rhombifolio* Wh.

LUSITANIA : Montalegre, Vieira, Terras de Bouro, Povoa de Lanhoso (G. Sampaio). — β . GALLIA : Eure, Mandres, Breux, bois de la Troudière (Jourdes).

HYBRIDA

R. SAMPAIANUS \times *MUCRONIFER lusitanicus* Sud. ap. Gandg. Nov. Consp. p. 138 (1905); R. COUTINHII G. Samp. in Ann. Sc. Nat. (1904); Rub. Portug. p. 56; *R. Sprengelii* P. Cout. et Fic. in Bol. Soc. Brot., non W. et N.; *R. leucostachys* P. Cout. et Fic., non Schleich. — Exsicc. : Soc. Brot. n° 1433^a. — Diflert à *R. Sampaiano*: turione pilosiere, foliis subtus valde pubescentibus, foliolis latioribus; inflorescentia ampla, pyramidalis, multiflora, piloso-hirsuta et parce glandulosa; pedunculis patentibus ut in *R. lusitanico* Murr. Sterilis vel substerilis.

LUSITANIA : Melgaço, Arcos de Vale de Vez, Parades de Coura, Guarda Mealhada, Povoa de Lanhosa, Vila-Real, Montalegre, etc.; HISPANIA : Galicia (G. Sampaio).

OBS. — Il est possible que quelques-unes des formes rattachées au *R. Continhii* soient des *R. opertus* \times *lusitanicus*, ce qu'il faudrait examiner sur place.

b. — *R. dentulifer* Sud. Ronc. bret. p. 8 (1904).

Ab antecedentibus dignoscitur : *foliis* minute serratis, subtus pubescentioribus; *foliolo* terminali latiore, ovato vel obovato, abrupte et tenuiter acuminato; *ramo florifero* aculeis debilibus, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* densa, subinermi; *pedunculis* patentibus, brevibus.

GALLIA : Finistère, Quimper, route de Corag; Valois, Bourgfontaine (Questier).

c. — (T. XLVI) — *R. Libertarianus* Wh. ! ap. Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. II (1831) 163; Focke Syn. p. 122; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 459; Genev. Mon. p. 354, ex pte; *R. regalis* Lef. exsicc.

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 12.

Turio canaliculatus, pubescens, aculeis rariss; *folia* grosse serrata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum, longe petiolatum; *ramus* subinermis, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* inermis, pilosa, densa, pedunculis 1-2-floris, ascendentibus; *sepala* subvirescentia, pilosa, reflexa; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia. — Intermedius inter *R. sulcatum* et *R. rhombifolium*.

BELGIUM : Verviers (Lejeune); Stockel (du Pré); GALLIA : Aisne, bois du Roi (Lefèvre, Questier).

OBS. — Les spécimens de G. Genevier sont douteux et semblent appartenir au *R. clethrophilus* Gen. On rencontre en Portugal des variations du *R. Sampaianus* qui se rapprochent beaucoup du *R. Libertarianus* Wh. Ce dernier, tout en rappelant un peu le *R. sulcatus* Vest, n'appartient pas aux *R. subereci* P.-J. Müll.

C. — (T. XLVI) — **R. opertus** Sud. Rub. Pyr. p. 39 (1899); *R. minianus* G. Samp. in Revista (1904); *R. incurvatus* var. *minianus* G. Samp. Rub. Portug. p. 34; *R. villicaulis* G. Samp. in Ann. sc. nat. (1902), non Kœhl.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 264.

Turio faciebus planis, parce pilosus, eglandulosus, aculeis validis armatus; *folia* supra glabrescentia, subtus viridia, parce pilosa, grosse, inæqualiter et duplicito-serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbicular, basi emarginata.

tum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *petioli* aculei falcatae; *stipulae* eglandulosae; *ramus* pilosus, aculeis reclinatis vel falcatis armatus; *inflorescentia* densa, hirsuta, eglandulosa, inferne foliosa, aculeis mediocribus munita; *pedunculi* breves, patentes; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia vel parce aculeata; *petala* pallide rosea; *stamina* alba vel pallide rosea stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

β . IMITATUS; *R. imitatus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 67 (1900). — Aculei subinæquales, nonnulli tuberculiformes; *stipulae* sparsim glandulosæ; *inflorescentia* aculeis validis armata.

GALLIA: Ariège, Aulus; Haute-Garonne, Luchon, Bouconne; Sarthe, Saint-Povace (Henry); LUSITANIA: Terras de Bouro, Povo de Lanhouso, Amarante, Santo-Tirso, Valongo (G. Sampaio). — β . GALLIA: Ariège, Ercé.

HYBRIDA

R. OPERTUS \times *CLETHROPHILUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 40 (1899); *R. AULUSENSIS* Sud. *I. c.* — Folia ampla, subtus viridia; foliolum terminale latum, suborbicularare, emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* foliosa, pedunculis ascendentibus; *petala* stamineaque rosea; fructus male evolutus.

GALLIA: Ariège, Aulus.

R. OPERTUS v. β \times *e. glandulosis* (brumalis?) Sud. *Rub. Pyr.* p. 68 (1900); *R. INGRATUS* Sud. *I. c.* — Heteracanthus glandulosusque; flores rosei, stamina brevia; *sepala* erecta. Sterilis.

GALLIA: Ariège, Oust.

\bullet (T. XLVII) — *R. SILESIACUS* Wh. in Wimm. et Grab. *Fl. Sil.* I, 2 p. 53 (1829); Vimm. *Fl. v. Schles.* 3, 629; Focke *Syn.* p. 251; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 493; Hal. *Oest. bromb.* p. 242; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 137; *R. fructicosus* β . *silesiacus* Vimm. *Fl. Sil.* I, 2 p. 26; *R. lividicaulis* Neum. ap. Reichb. in *Verh. z. d. Ges. Wien* (1854) 279; *R. Treviranii* Kehl. in Wimm. et Grab. *I. c.* p. 53?; *R. sparsiglandulosus* Hayek in *Oest. B. Z.* LI (1901), 355?

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9576, 10394, 10395; *Rub. gall.* n° 78; Sud. *Bat. eur.* n° 58, 241.

Turio (1) arcuato-prostratus, angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, glabrescens, glandulis sessilibus vel interdum stipitatis munitus; *aculei* mediocres, e basi brevi compressa, angustati, recti vel reclinati; *folia* 5-nata (2); supra parce pilosa, subtus viridia, pubescens, inæqualiter et duplicato-serrata; *foliolum* terminale ovatum, basi emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, pubescens, aculeis debilibus, reclinati vel falcatis armatus; *stipulae* linearis-lanceolatae vel lanceolatae, glandulosæ; *ramus* florifer (3) angulatus, pilosus, sparsim glandulosus, aculeis debilibus, reclinati munitus; *folia* 3-nata, subtus viridia, foliolis acuminatis; *inflorescentia* angusta, elongata, basi foliosa, densa, \pm piloso-hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis crebris, tenuibus, subulatis instructa; *pedunculi* medii breves, patulo-ascendentes, multiflori, pedicellis tenuibus; *sepala* tomentoso-virescentia, albo-marginata, hirsuta, sparsim glandulosa aculeataque, in flore et fructu reflexa (6); *petala* (4, 5) obovata, mediocria, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollen* parum admixtum (7). — Junius-julius.

β . *TABANIMONTANUS* Sud. *Bat.* p. 72 (1907); *R. tabanimontanus* Figert *Allg. bot. Zeit.* (1905) n° 11; *R. macrocladus* S. Kupcok, exsicc., non Sabrs. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 242! — *Turio* glaber; aculei subæquales; *folia* subtus glabrescentia, grosse serrata; rachis laxe pilosa; *sepala* tomentosa, glandulis brevibus, raris obsita; *stamina* stylos superantia.

γ . *KINSCHERI*. — Folia grosse serrata; foliolum terminale ovato-cordatum; rachis florifera hirsuta, glandulis raris munita; *sepala* valde glanduloso-aciculata hirsutaque; *stamina* stylos parum superantia.

δ . *BRACTEOLENTUS* Kinscher (*pr. spec.*), exsicc. — Folia grosse et inæqualiter subinciso-serrata; foliola breviter petiolulata, marginibus sese tegentia, caulinum terminale profunde cordato-ovatum, acuminatum, petiolulo proprio quadruplo longius; *inflorescentia* usque apicem foliosa, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis crebris armata; *stamina* stylos superantia; *germina* glabra.

ϵ . *HUMILISERRATUS*; *R. villicaulis* var. *humiliserratus* Kinscher *Repertor.* VII (1909) p. 78. — Folia simpliciter mucronato-serrata; foliolum caulinum terminale late ovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, acutum vel cuspidatum; *inflorescentia* elongata, laxa, foliosa, pedunculis ascendentibus, parce glandulosis; *petala* ovata; *stamina* stylos parum superantia; *germina* glabra. — *Inflorescentia R. fimbriatum* revocat.

SAXONIA, SILESIA, BOHEMIA, HUNGARIA — β . *Silesia*, Glatz, Roter Berg (Kinscher). — γ . *Silesia*, Waldheim (Kinscher). — δ . GERMANIA: *Silesia*, Glatz (Kinscher). — ϵ . GERMANIA: *Saxonia*, Waldheim, prope Ziegra vicum (Kinscher).

OBS. — J'ai reçu de M. H. Hofmann, de Saxe, un *R. silesiacus* \times *thyrsoides* qui me paraît n'être qu'une variation du *R. candicans* Wh.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Turionis* aculei inæquales, e basi parum compressa, \pm conici; *inflorescentia* armata; *sepala* \pm aculeata.

A. — Flores albi vel pallide rosei; *stamina* alba.

a. — Rachis parce glandulosa; *petala* obovata.....
b. — Rachis dense glandulosa; *petala* suborbicularia; *folia* subtus pilosa.....

B. — Flores lœte rosei; *stamina* rosea.....

R. silesiacus Wh.
R. vallicolus P.-J. Müll. b.
R. amygdalanthoides Sprib. c.

II. — *Turionis* aculei subæquales, e basi valde compressa.

A. — Foliolum caul. terminale obovatum, basi rotundatum, longe petiolulatum; *inflorescentia* laxe, valde foliosa.....

B. — Foliolum caul. terminale cordato-ovatum; *sepala* inermia.

a. — *Folia* subtus glabrescentia; *inflorescentia* aculeata; *petala* rosea.....
b. — *Folia* subtus pubescens; *inflorescentia* subinermis.....

R. fimbriatus Sud. c.

R. amygdalanthus F. D.
R. chloophyllus Sud. B.

b. — (T. XLVIII) — *R. vallicolus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 126 (1859).

Exsicc. — Sud. *Hb. rub. rar.* n° 13!

Turio (1) *R. silesiacus* Wh. sed aculei tenuiores; *folia* subtus pilosa, subsimpliciter serrata (2), dentibus latis, inæquilibus; *rami* aculei tenues, flavescens; *inflorescentia* hirsuta, glandulis crebris, subtilibus munita; *sepala* dense aculeata glandulosaque; *petala* suborbicularia (3), pallide rosea, fere alba.

GERMANIA: Alsacia, Alsbach, carrefour de Lauterbach (P.-J. Müller).

c. — *R. amygdalanthoides* Spribille *Jahr. Schles. Ges.* (1906) II, *Abt.* 98 (*nomen sol.*); Sud. *Bat.* p. 72 (1907).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 244!

Folia caul. 3-5-nata, grosse serrata, ramealia supera leviter discolora; *inflorescentia* pauciflora; *petala* lâete rosea; *stamina* rosea stylos superantia; *sepala* glandulosa, inermia, pilosa. Cetera ut in *R. silesiaco* Wh.

GERMANIA: *Silesia*, Münsterberg, prope Schlause (Kinscher);

B. — (T. XLVIII) — **R. chloophyllus** Sud. *Diagn.* p. 7 (1907).

Exsicc. — Sub. *Rub. rar.* n° 14!

Turio canaliculatus, glabrescens; *aculei* æquales, compressi; *folia* subtus leviter pubescentia, irregulariter serrata; *foliolum* terminale (4) anguste ovatum, cordatum, acuminatum; *rami* aculei rari, debiles; *inflorescentia* (5) brevis, basi foliosa, subinermis, sparsim glandulosa, laxe pilosa; *pedunculi* medii patuli, pauciflori; *sepala* inermia; *stamina* stylos superantia (6); *germina* glabra. Fertilis. — Habitus *R. sulcata* Vest sed *folia* grosse serrata, *inflorescentia* glandulosa, *sepala* minus virescentia. Inflorescentia subinermis ut in *R. macrophyllum*, sed turionibus fere glabris, foliis minus amplis diversus est.

GALLIA: *Seine-Inférieure*, Aumale (Questier); *Sarthe*, Anmé (Gentil).

C. — (T. XLVIII) — **R. fimbriatus** Sud. hb.

Turio (7) faciebus planis, glabrescens, parce glandulosus; *aculei* validi, e basi dilatata; *folia* subtus pubescentia, grosse et subinciso-serrata, dentibus angulosis, peracutis; *foliolum* terminale (8) obovatum, basi rotundatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio paulo longius, infima manifeste petiolulata; *ramus* pubescens, aculeis validis, reclinatis vel falcatis armatus; *inflorescentia* laxa, usque ad apicem foliosa, parce pilosa, glandulis tenuibus et aculeis sparsis munita; *pedunculi* (9) elongati, ascendentes, multiflori, pedicellis valde elongatis; *sepala* subviridia, albo-marginata, pilosa, aculeata et parce glandulosa; *petala* oblonga; *stamina* stylos superantia.

GERMANIA: *Prov. Rhenana*, circa Coblenz (Wirtgen).

OBS. — Rappelle le *R. fimbriolatus* M. et W. par sa dentelure vive, mais ne saurait lui être rapporté.

D. — (T. XLVIII) — **R. amygdalanthus** Focke *Syn.* p. 174 (1877); *R. pubescens* Sbsp. *amygdalanthus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 491 (excl. var. β); *R. silesiacus* var. *roseiflorus*, *R. thyrsoideus* var. *viridis* Schwarzer, exsicc.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8536; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 5; *Rub. gall.* n° 117.

Diffr. a *R. silesiaco* Wh : *turione* (10) validiore, subpruinoso; *aculeis* majoribus; *foliis* \pm amplioribus, subtus glabrescentibus; *foliolо* terminali (11) latiō; *inflorescentia* elongata, foliosa, pilosa, parce et breviter glandulosa; *sepalis* inermibus; *petalis* roseis, *staminibus* stylos superantibus (12).

β . *GLIVICIENSIS* Spribille ap. Sud. *Bat. eur.* p. 78 (1908). — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 265! — Rami aculei elongati, reclinati; *inflorescentia* brevis, lata, parce pilosa glandulosaque. Intermedius inter *R. silesiacum* et *R. amygdalanum*.

γ . *PETIOLULATUS*. — *Turio* pubescens; *folia* argute et subsimpliciter serrata (13), subtus pubescentia; *foliolum* caulinum terminale ovatum, basi fere integrum, petiolulo proprio subduplo longius, infima manifeste petiolulata (pet. = 4-8 mm. longi); *petala* alba vel dilute rosea.

GERMANIA: *Silesia*, Striegau (Schwarzer), Jauer (Figert et Spribille); *Saxonia*, Hohenstein (Hofmann), Chemnitz (Missbach); *Thuringia* (Focke). — β . *Silesia*, Gleiwitz, Stadwald (Spribille). — γ . *Saxonia*, Chemnitz, prope Reichenbrand (Missbach).

OBS. — Le *R. amygdalanthus* Focke porte de nombreuses glandes fines qui ne me permettent pas de le rapprocher du *R. pubescens* Wh. ni des *R. discolors* P.-J. Müll., avec lesquels M. Focke le place. — Le *R. misniensis* Hofm., bien que voisin sous certains rapports du *R. silesiacus* W., est manifestement hétérocanthe et prend place dans les *R. Radulae* F.

31 — (T. XLIX) — **R. CORDIFOLIUS** W. et N. *Rub. germ.* p. 21 t. V (1825); Ser. ap. DC. *Prod. II* p. 562; Focke *Syn.* p. 150; *R. rubeolus* Wh. olim. sec. Reichb.; *R. airenensis* Schmid. *Cat. Genev.* p. 107. Excl. *R. cordifolius* Genev. et auct. plur.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9036!; *Assoc. rub.* n° 671.

Turio (1) validus, faciebus planis vel leviter convexis, glaber vel glabrescens; *aculei* subinæquales, e basi compressa, reclinati; *folia* 5-nata, supra, glabrescentia, subtus leviter pubescentia, viridia vel supera in apricis cinerascentia, argute et simpliciter serrata; *foliolum* terminale (2) orbiculare, cordatum, abrupte et breviter acuminatum vel cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius, infima distincte petiolulata, omnia ampla, marginibus sâpse sese tegentia; *ramus* florifer angulatus, pilosus, sparsim glandulosus, aculeis crebris, brevibus, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtus viridia, argute serrata; *inflorescentia* (3) aphylla vel basi foliosa, laxe pilosa, sparsim glandulosa, aculeis crebris, rectis vel reclinatis armata; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, pluriflori; *sepala* tomentosa, pilosa, aculeata, post anthesin reflexa; *petala* medicoria, suborbicularia vel ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* pilosum. Fertilis. *Pollen* parum admixtum (4). — Julius.

GERMANIA: *Guestphalia*, Volmerdingen, prope Minden (Lejeune, Weihe, F. Kretzer); HELVETIA: Aïre, prope Genève (Schmidely).

OBS. — Je ne crois pas que la plante que j'ai décrite dérive du *R. thyrsiflorus* W. et N. par croisement, ainsi que l'admet M. Focke (ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 477). L'échantillon très typique de Lejeune, de l'Herbier du Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles, et les exemplaires de l'*Herbarium europaeum*, qui proviennent de la localité classique, sont franchement virescentes, alors que Weihe et Nees disent « subtus cinereo-tomentosa »; mais M. Focke (*Syn.* p. 150) ajoute « adulta viridia ». Il est possible que les feuilles supérieures se montrent exceptionnellement un peu grises en dessous, cas qui est assez fréquent chez beaucoup de ronces normalement virescentes. Les spécimens de *R. airenensis* que M. Schmidely a obtenus de graines provenant d'Aire me paraissent coincider tout à fait avec la plante de Westphalie. Je crois bon d'ajouter que, d'après la plante de Lejeune et mes propres spécimens, le *R. cordifolius* W. et N. a l'inflorescence manifestement glanduleuse, en même temps que très armée, ce que ne mentionne pas le texte des *Rubi germanici*; les pétales sont de même assez grands et non petits, ainsi qu'ils sont représentés par la table V de l'ouvrage précité; quelques-uns sont presque orbiculaires et d'autres ovales, sur le même rameau. A remarquer que le pollen est plus parfait que chez le *R. rhamnifolius*, ce qui ne permet pas de supposer que l'espèce dérive de ce dernier par croisement.

Se place dans le voisinage du *R. cordifolius* Wh. V.

b. — (T. XLIX) — **R. quadraticus** P.-J. Müll. *Vers.* n° 120 (1859).

Turio (5) canaliculatus, glandulis sessilibus obsitus; *aculei* mediocres, parum compressi; *folia* irregulariter serrata, dentibus divaricatis; *foliolum* manifeste cuspidata (6); *inflorescentia* densa, parva, glandulis crebris, aculeis rariss, debilibus munita; *sepala* inermia, glandulis sessilibus obsita; *petala* rosea; *stamina* stylos virescentes superantia.

GERMANIA: *Alsacia*, Heiligenbach (P.-J. Müller).

HYBRIDA

R. QUADRATICUS \times ex *appendiculatus*; R. LELEVREI P.-J. Müll. *Vers.* n° 121 (1859).

A *R. quadratico* differt: turionibus planis vel convexis, parce pilosis et glandulosis; foliolis minus latis, leviter acuminatis, inflorescentia glandulosiore, petalis angustioribus. Petala rosea, stamina pallide rosea stylos roseos superantia; fructus male evolutus.

GERMANIA: *Alsacia*, Lauterbach « au bord du ruisseau, en aval du pont du carrefour » (P.-J. Müller).

Conspectus specierum

- I. — Inflorescentia aculeis validis vel mediocribus armata ; folia subtus molliter pilosa, velutina.
 A. — Antheræ glabræ; folia vulgo grosse serrata.....
 B. — Antheræ pilosæ; folia minute serrata.....
- II. — Inflorescentia aculeis debilibus, sparsis munita ; folia subtus vulgo non velutina.
 A. — Rubi validi ; folia magna.
 a. — Turio parum pilosus, faciebus planis vel leviter concavis ; foliolum terminale magnum, ovatum, acuminatum, basi vulgo cordatum
- b. — Turio dense pilosus, faciebus convexis ; foliolum terminale obovatum
- B. — Rubi debiles ; turio inferne teretiusculus, superne angulatus.....
- 32** — (T. L) — **R. PYRAMIDALIS** Kalt. *Fl. v. Achen Beck.* 275 (1845); Focke *Syn.* p. 288 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 549; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 135; Hal. *Oest. bromb.* p. 250; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 53, ex pte; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 50, non auct. angl.; *R. vulgaris* β. *umbrosus* Wh. et N. I *Rub. germ.* p. 38, t. XIV f. β; *R. villosus* Lasch in *Linn. VIII* p. 297 (1833), non Ait.; *R. umbraticus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) et *Vers.* n° 49; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 10; Genev. *Mon. p.* 220; *R. vestifer* Genev. l. c. p. 169, non P.-J. Müll.; *R. Rothii* Focke in *Abh. Nat. V. Brem.* II p. 461.
- Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I, n° 82; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 9; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 70, 71; Lindg. *Herb. rub. suec.* n° 36; *Assoc. rub.* n° 363, 410, 473, 535, 673, 1063, 1146; *Rub. gall.* n° 60, 61; Baenitz *Hb. eur.* n° 7236, 9975, 9976; *Set of Brit. Rub.* n° 37; Sud. *Bat. eur.* n° 112, 245; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 31.

Turio (1) arcuato-prostratus vel scandens, angulatus, faciebus planis, parce pilosus, glandulis stipitatis nullis vel rariss; aculei mediocres, subæquales, e basi compressa, dilatata, recti vel reclinati; *folia* 5-nata (2), supra glabrescentia, subtus viridia, piloso-subvelutina, pilis frequenter flavescentibus, ad nervos pectinatis, grosse, irregulariter et sæpe duplicato-serrata, dentibus principalibus refractis: *foliolum* terminale late ovatum vel ellipticum, vulgo emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, sparsim pilosus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, parce glandulosæ; *ramus florifer* (3) obsolete angulatus, pilosus, glandulis raris, aculeis reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtus viridia, velutina; *inflorescentia* pyramidalis, basi foliosa, piloso-hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis tenuibus, acicularibus, rectis vel reclinatis munita; *pedunculi* medii et superi patula, in fructu 2-3-flori, pedicellis brevibus; *sepala* cinereo-hirta, glandulosa aciculataque, post anthesin interdum patula, in fructu reflexa (6); *petala* (4,5) anguste obovata, pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *antheræ* glabræ; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen parum admixtum (7). — Julius.

R. MARSSONII Holzfuss in hb. Sud. — Aculei debiles, inæquales; folia grosse et inæqualiter serrata, subtus molliter pilosa; foliolum caul. terminale cordato-ovatum, acuminatum; inflorescentia hirsutissima, aculeis parvis munita.

γ. UMBROSIFORMIS Sud. *Diagn.* p. 9 (1906); *R. hirtifolius* P.-J. Müll. ap. Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 173 (1862), non Rogers *nec bot. plur.*; *R. umbrosiformis* P.-J. Müll. hb. — Foliolum terminale breviter obovatum vel suborbiculare, basi integrum vel subemarginatum; folia argute serrata; rachis et pedunculi valde hirsuta, glandulis brevibus, aculeis tenuibus munita. A proximo *R. silvatico* W. N. aculeis inflorescentiae debilibus, a *R. pyramidali* foliis subtus velutinis.

δ. FLACCIDUS N. Boul. *Ronc. vosg. Notes* p. 84 (1868); ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 53. — Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 9bis. — Folia tenuia, ampla, subtus leviter velutina, mediocriter serrata; inflorescentia laxa, parum pilosa, aculeis debilibus, pedunculis patentibus. In umbrosis.

ε. INSIGNIS Sud. in hb. Müller; *R. insignis* Wirtg. exsicc. — Folia subtus pallida, molliter velutina, acute et profunde dentata; foliolum terminale ellipticum, basi rotundatum, longe acuminatum; inflorescentia magna, foliosa, multiflora, glandulis crebris, aculeis validis munita; petala angusta. Inflorescentia *R. villicaulem* revocat.

ζ. SIMILATUS Sud. in hb. Müller; *R. similatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 50 (1859); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 54; *R. carpinifolius* G. G. *Fl. Fr.* t. I. p. 547, ex pte; *R. silvaticus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 41, ed. 2 n° 20. — Folia argute et æqualiter serrata, supera subtus cinerascentia; foliolum terminale (8) ellipticum; ramorum aculei manifeste falcati; inflorescentiae rachis laxe pilosa, parum glandulosa. In apricis.

η. OBESUS; *R. obesus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 57 (1867) et exsicc. n° 41. — Turio obtusus, glandulis crebris; folia minute serrata; foliolum terminale suborbiculare; ramus inflorescentiae glandulis crebris munita. « Les plus grands rapports avec le *R. umbraticus*, si ce n'est lui. » (P.-J. Müller, herb.)

BRITANNIA, BELGIA, GERMANIA, DANIA, SUECIA MERIDIONALIS, HELVETIA, AUSTRIA, GALLIA MEDIA ET BOREALIS. — β. GERMANIA: *Pomerania*, Bud- denhagen (Holzfuss)! — γ. GERMANIA: Bertrich (Wirtgen); Zerschoft (Holzfuss); GALLIA: *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier); *Eure*, forêt de Bourth (Jourdes). — δ. GALLIA: *Vosges*, St-Dié (Boulay); *Puy-de-Dôme*, La Bourboule (Henry). — ε. GERMANIA: Eifel (Wirtgen); Stettin (Holzfuss); *Saxonia*, Stolpenberg, prope Dornreichenhach (Kinscher); GALLIA: *Sarthe*, Le Mans, à Pied-Sec (Henry). — ζ. GALLIA: Nancy (Godron); *Nièvre*, Montsanche (Gillot); *Manche*, Cherbourg (Le Jolis); GERMANIA: Montabaurer (Wirtgen); *Pomerania*, Stettin (Holzfuss). — η. GALLIA: *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

HYBRIDÆ

R. PYRAMIDALIS × *CARPINIFOLIUS*; *R. SEMICARPINIFOLIUS*. — Habitus *R. carpinifolii* Wh. sed rachis inflorescentiae laxe hirsuta, parce glandulosa ut in *R. pyramidali* Kalt.; pollen atrophum.

BELGIA: Amspach (Du Pré).

R. PYRAMIDALIS × *SPRENGELII* Sud. *Diagn.* p. 9 (1906); *R. PYRAMIDALIFORMIS* Sud. l. c. — Differt a *R. pyramidali* Kalt.: turionibus pilosioribus, foliis 3-natis, subtus minus pilosis; petalis, staminibus stylisque roseis. Sterilis et subeglandulosus.

GALLIA: *Valois*, St-André (Questier); BELGIA: Louette-St-Pierre (Gravet).

R. PYRAMIDALIS × *ELONGATISPINUS belophorus*; *R. OXYBELUS* Sud. hb. — Aculei recti, elongati *R. belophorum* revocant. Differt a *R. pyramidali* Kalt. foliis subtus minus pilosis, inflorescentia parum pilosa; sterilis.

GALLIA: *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

R. PYRAMIDALIS × *ULMIFOLIUS*; *R. NEUSTRIACUS* Sud. et Gentil. — Turio glaber, glaucescens, eglandulosus; folia discolora, subtus pilosa; inflorescentia laxe, pilosa, armata; petala rosea, orbicularia; germina pilosa. Sterilis.

GALLIA: *Sarthe*, Traugé (Gentil).

R. pyramidalis Kalt. 32

R. DANICUS Focke 14

R. macrophyllus W. N. 33

R. Schlechtendalii Wh. 34

R. silvaticus Wh. N. 35

R. PYRAMIDALIS × GODRONII Sud. *Diagn.* p. 9 (1906); *R. VILLIRAMUS* Sud. *l. c.* — Pubes *R. pyramidalis*, frons *R. Godronii*. Inflorescentia eglandulosa, subinermis. Fructus abortivus vel male evolutus.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg (P.-J. Müller).

R. PYRAMIDALIS × PROPINQUUS Sud.; *R. IRICUS* Rogers, *Journ. Bot.* (1896), p. 506; *Handb. Brit. Rub.* p. 49 (*pr. spec.*). — Pubes *R. pyramidalis* sed : glandulæ nullæ, aculei æquales, folia coriacea, subtus cinereo-tomentosa, pilosa; inflorescentia brevis. Flores pallide rosei; pollen valde admixtum; fructus?

HIBERNIA : Maam, C. de Galway et de Mayo (Marshall); Cork, Whitegate (Phillips).

OBS. — J'ai décrit la plante de Maam, récoltée par Marshall et que M. le Rév. M. Rogers m'a très obligeamment donnée.

R. PYRAMIDALIS × CUSPIDIFER Sud. *Diagn.* p. 10 (1906); *R. cuspidatus* Sud. *l. c.* — A *R. pyramidali* recedit : foliis superis cinereo-tomentosis, foliolis cuspidatis, inflorescentia eglandulosa, petalis suborbicularibus, polline atropho.

GALLIA : Seine-Inférieure, St-Aignan (Malbranche).

R. PYRAMIDALIS × VESTITUS Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 138 (1905); *R. AMPHITAPOS* Müll. et Wirtg. *ap.* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. 1* n° 123 (1860); *R. tomintosus × vestitus* Focke. *ex pte.* — Habitus *R. pyramidalis* Kalt. sed foliis supra pilosis subtus molliter velutino-cinerascens, simpliciter serratis; inflorescentia valde hirsuta, glandulis raris munita insignis est.

GERMANIA : Bertrich (Wirtgen).

R. PYRAMIDALIS × APICULATUS v. *obscifolius* Sud.; *R. VESTIFER* P.-J. Müller. *in Boul. Ronc. vosg. Notes* p. 62 (1867). — Exsicc. : *Ronc. vosg.* n° 45. — A *R. pyramidali* Kalt. dignoscitur : turi one glandulosiore, foliis minute serratis, cinerascentibus, foliolis longe cuspidatis, inflorescentia valde hirsuta, glandulosiore. Fructus male evolutus.

GALLIA : Vosges, Gerbamont, à Bambois-de-Faite (Pierrat et Boulay).

OBS. — Le *R. pyramidalis × hedycarpus* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 79 dérive du *R. Questieri* Lef. et M.; le *R. pyramidalis × hirtus?* *l. c.* p. 127 est le *R. foliosus* W. et N.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentia distincte glandulosa.

A. — Rachis inflorescentiae piloso-hirsuta; folia subtus ad nervos pilis manifeste pectinatis.

a. — Turio epruinosus.

- 1. — Turio parce pilosus; foliolum terminale ovatum vel ellipticum.....
- 2. — Turio dense pilosus; foliolum terminale obovatum; inflorescentia elongata.....

b. — Turio pruinosus, glaber.....

B. — Rachis inflorescentiae breviter pilosa, valde glandulosa; folia minute serrata, subtus ad nervos pilis non manifeste pectinatis.....

R. pyramidalis Kalt.

R. AMPHICHLORUS P.-J. Müller. B.

R. GLAUCOXYLON Sud. C.

R. MELANODERMIS Sud. D.

II. — Inflorescentia eglandulosa vel glandulis raris munita.

A. — Folium caul. terminale obovatum.....

B. — Folium caul. terminale ovatum vel suborbiculare, interdum ellipticum.....

R. AMPLIFICATUS Lees. c.

R. DUMNONIENSIS Bab. b.

b. — (T. LI) — *R. dumnoniensis* Bab. *in Journ. bot.* (1890), 338, 339; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 32; *R. pyramidalis* var. *anadenes* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 21 (1902); Obs. *Set of Brit. Rub.* p. 11; *R. carpinifolius* Genev. p. p.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 17.

Ab affini *R. pyramidali* Kalt. dignoscitur : *aculeis* vulgo validioribus, compressioribus, æqualibus, *foliis* minus inæqualiter serratis, *foliolis* terminalibus (1) latioribus, brevioribus, ovatis vel suborbiculatis, emarginatis, breviter acuminate, longe petiolulatis; stipulis, pedicellis bracteisque eglandulosis vel glandulis raris munitis; *rachide* minus hirsuta.

β. *EUPLECTUS*; *R. pyramidalis* var. *euplectus* Sud. *Diagn.* p. 8 (1906). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 15. — Folia subtus molliter velutina, flavescens-cinerea; ramus aculeis validis armatus; inflorescentia elongata, valde foliosa (2).

γ. *SUBDISCOLOR*; *R. pyramidalis* var. *subdiscolor* Sud. *Diagn.* p. 8 (1906). — Folia grosse et inæqualiter inciso-serrata, ramealia supera subtus cinerascentia; foliola valde acuminata; inflorescentia ampla, subinermis, pedunculis patulis.

δ. *TRANSIENS*. — Exsicc. *Rub. gall.* n° 61; *Set of Brit. Rub.* n° 86. — Folium terminale ovatum vel rhombeum, breviter petiolatum. Habitus *R. pyramidalis* Kalt.

ε. *PSEUDO-DANICUS* Sud. *in Bouvet Rub. Anjou* (1907) p. 14. — Folia minute serrata; foliolum terminale suborbiculare, breviter acuminate; ramus parum pilosus, aculeis debilibus; rachis laxe pilosa; petala magna, pallide rosea. — Habitus *R. danici* Focke, sed antheris glabris, ramis minus pilosis, sepalis reflexis diversus est.

BRITANNIA, GALLIA BOREALI-OCCIDENTALIS : Finistère, Manche, Sarthe, Morbihan, Oise, Aisne, Cher, etc. — β. GALLIA : Valois, forêt de Reiz (Questier); BRITANNIA : Herefordshire, Powleight (A. Ley). — γ. GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier). — δ. BELGIA : Namur, Louette-St-Pierre (Gravet); GALLIA : Eure-et-Loir, Boissy-le-Sec (Jourdes); BRITANNIA : Dorset. — ε. GALLIA : Maine-et-Loire, Segré (Bouvet), Morbihan, Vannes (Arrondeau).

c. — (T. LI) — *R. amplificatus* Lees *in Steele* (1847) 58; *R. macrophyllus* γ. *amplificatus* Bab. *Brit. Rub.* p. 153 (1869); Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 44; non *R. amplificatus* Genev. *Mon.* p. 209.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 33.

Turio glabrescens; aculei validi, subæquales; folia grosse et duplicito-serrata; pubes *R. pyramidalis* Kalt.; foliolum terminale obovatum (3), basi integrum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; inflorescentia (4) valde foliosa, angusta, laxe pilosa, eglandulosa, aculeis validis armata; petala ovata (5).

θ. *ARRONDEAUANUS*; *R. amphichlorus* var. *Arrondeauanus* Sud. *in hb.* Müller; *R. phyllostachys* Arrondeau *Mon.*, non P.-J. Müller. — Folia argute serrata, supera subtus cinerea, inflorescentiae rachis recta; pedunculi ascendentis, multiflori, aculeis reclinatis vel geniculatis armati.

BRITANNIA. — θ. GALLIA : Morbihan, Vannes (Arrondeau).

OBS. — Babington identifiait le *R. amplificatus* Lees au *R. umbraticus* P.-J. Müller. (*R. pyramidalis* Kalt.), qu'il rappelle par la pilosité de ses feuilles. Les grands aiguillons de cette espèce l'éloignent du *R. macrophyllus* W. N. Il est possible que les auteurs anglais aient confondu plusieurs formes sous ce nom. J'ai décrit la plante de *Set of British Rubi* n° 33. Le n° 83 de cette collection, portant le nom de *R. macrophyllus*, est plutôt une variation du *R. amplificatus* Lees.

B. — (T. LI) — **R. amphichlorus** P.-J. Müller. *Bonpl.* (1861) p. 279; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 12; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 55.

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 10!; Sud. *Hb. rub. rar.* n° 30!

Turio angulatus, faciebus planis, dense pilosus, aculeis validis armatus; *folia* coriacea, utrinque pilosa, subtus ad nervos pilis pectinatis, simpliciter serrata, dentibus latis, parum profundis; *foliolum* terminale (6) obovatum, basi rotundatum, cuspidatum vel subacuminatum; *inflorescentia* angusta, elongata, basi foliosa, piloso-hirsuta, aculeis (7) validis, reclinatis vel subfalcatis, glandulis crebris, longis munita; *pedunculi* medii breves, multiflori, ascendentes; *sepala* pilosa, glandulosa aculeataque, in fructu reflexa; *petala* (8) oblonga, alba vel pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylis basi roseos superantia; *germina* glabra.

β. DECHENII; *R. Dechenii* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 135 (1861) — A *R. amphichloro* recedit: dentibus profundioribus, inflorescentia latiore, minus hirsuta, parum glandulosa. Pollen parum admixtum.

GALLIA: *Vosges*, Gérardmer (Müller), Rambervillers (N. Boulay). — β. GERMANIA: *Prov. rhenana*, Eifel (Wirtgen).

OBS. — Le *R. Dechenii* Wirtg. est réuni au *R. pyramidalis* Kalt. par M. Focke (*ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 550*), mais ne s'identifie pas avec cette espèce; il est parfois difficile à distinguer du *R. amphichlorus* P.-J. Müll., auquel il se rattache manifestement. On a distribué (*Assoc. rub. n° 536*) sous le nom de *R. amphichlorus* des plantes qui appartiennent à une autre section. Les formes de l'ouest de la France, rattachées tout d'abord au *R. amphichlorus* Müll. et qui correspondent au *R. amphichlorus* Gen., s'éloignent beaucoup du type vosgien et ne peuvent être subordonnées au *R. pyramidalis* Kalt.

C. — (T. LI) — **R. glaucoxylon** Sud. *Bat. eur. p. 40* (1905).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur. n° 113*!

A *R. pyramidali* Kalt. distinguitur: *turione* (9) glabro, glaucescenti; *aculeis* crebrioribus, inaequalibus, basi minus dilatatis; *foliis* argute serratis, dentibus ascendentibus; *foliolo* terminali (10) late ovato, basi parum emarginato, petiolulo proprio duplo longiore; *ramorum* aculeis tenuibus, inaequalibus; *inflorescentia* minus hirsuta, manifeste glandulosa (11); *sepalis* tomentoso-virentibus, aculeolatis, pilis raris munitis. *Petala* (12) pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylis virescentia superantia; *sepala* post anthesin patula, in fructu ± reflexa.

GALLIA: *Tarn*, forêt de Sérénac, Assac, Montirat, Ligots, Rosières, Carmaux, etc.

OBS. — Il est voisin du *R. gneissogenes*, qui est un peu discoloré, peu ou point glanduleux et à fleurs blanches. Il se rapproche aussi du *R. firmatus*, dont le turion est glauque, mais ce dernier a les étamines courtes et est discoloré comme le *R. gneissogenes*.

D. — (T. LI) — **R. melanocladus** Sud; *R. hirtifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub. p. 48*, non Müll. et Wirtg.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub. n° 118*!

Turio angulatus, faciebus planis, parce pilosus; *aculei* leviter inaequales, maiores compressi, reclinati vel falcatis, minores interdum tuberculiformes; *folia* tenuiter serrata, subtus valde pubescentia; *foliolum* terminale (13) ovatum vel ellipticum, basi rotundatum vel subemarginatum, acuminatum, breviter petiolulatum; *petiolus* aculeis brevibus, crebris, aduncis armatus; *stipulae* lanceolatae, sparsim glandulosae; *ramus* aculeis inaequalibus, reclinati vel falcatis, armatus; *folia* 3-nata, minute serrata; *inflorescentia* (14) elongata, basi foliosa, laxe pilosa, aculeis crebris, mediocribus, glandulis frequentibus instructa; *pedunculi* medii breves, leviter ascendentis, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia, breviter pilosa, glandulosa, parce aculeata, reflexa; *petala* angusta (15), pallide rosea; *stamina* stylis pallidos superantia; *germina* glabra. Turiones ramique atrirubentes.

BRITANNIA: *Dorset*, *Kent*, *Gloucester*, *Hereford*, *Carnarvon*, *Inverness*, etc. (M. Rogers).

33 — (T. LII) — **R. MACROPHYLLUS** W. et N. *Rub. germ. p. 35, t. XII (excl. var. β)* (1825); Focke *Syn. p. 215*; *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. p. 521, 522* (*R. eu-macrophyllus*); Hal. *Oest. bromb. p. 236*; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 49*; Rogers *Handb. Brit. Rub. p. 48 et auct. angl. ex pte*; Sud. *Bat. p. 72*; *R. Wimmeri* Wh. *ap. Wimmer et Grab. Fl. Sil. I, 2, p. 53* (1829); *R. silvaticus* Godr. *exsicc.*, non W. et N.; *R. pileostachys* Godr. *ap. Gr. et God. Fl. Fr. I, p. 548* (1848); P.-J. Müll. *in Flora* (1858) *p. 138*; N. Boul. *Ronc. vosg. p. p. 9, 57*; Sud. *Hb. Bor. p. 20*; Genev. *Mon. p. 192, ex pte*; *R. macrophyloides* Utsch *ap. Baenitz Hb. eur. n° 9056*, non Genev.; *R. macrophyllus* × *fuscus* N. Boul. *ap. R. et C. l. c. p. 107*; *R. silvarum* Rip. *in Genev. Mon. p. 196* (1880)? *R. hirtifolius* et *Schummiellii* Seurich, *exsicc.*; *R. quadicus* Sabrs. *Oest. bot. Zeit. (1891)*; *tir à p. 5*; Hal. *Oest. bromb. p. 236*; *R. macrophyllus* Sbsp. *quadicus* Sabrs. *Deutsch. bot. Monast. p. 131* (1889); Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI, p. 523*; *R. hypoleucus* Sabrs. *Z. B. G. (1886) p. 95, non Vest.*

Exsicc. — Billot *Fl. gall. et germ. n° 1660*; N. Boul. *Ronc. vosg. n° 8, 8bis*; *Assoc. rub. n° 67, 68, 146, 472, 533, 603, 644, 1001, 1059*; *Rub. gall. n° 13, 14, 15, 16, 63, 111*; Baenitz *Hb. eur. n° 9019, 9056, 9074, 9518*; *Herb. dendr. n° 111*; Hofmann, *Pl. crit. sax. n° 128* (s. n. *R. danica*); Sud. *Bat. eur. n° 246, 247, 248*.

Turio (1) arcuato-prostratus vel scandens, inferne subteres (2), superne distinete angulatus (3), faciebus planis vel leviter concavis, subglaucescens, pilosus, glandulosis nullis vel raris munitis; *aculei* sparsi, mediocres, e basi dilatata, compressa, reclinati vel leviter falcati; *folia* magna, 5-nata, supra parce pilosa, obscure viridia, subtus viridia, pubescens, inaequaliter serrata, dentibus tenuibus vel mediocribus; *foliolum* terminale late ovatum, basi cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis obliquis, recurvis armatis; *stipulae* lineares, glandulosis nullis vel raris; *ramus* florifer obsolete angulatus, pilosus, aculeis sparsis, falcatis armatus; *folia* 3-4-5-nata, subtus viridia, foliolis acuminatis; *inflorescentia* (4) brevis, obtusa, basi foliosa, ± piloso-hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis debilibus, sparsis munita; *pedunculi* medii patulo-ascendentis, 2-4-flori; *sepala* tomentoso-virescentia, hirsuta, inermia, in flore et fructu reflexa (7); *petala* (5, 6) obovata, alba vel vulgo pallide rosea; *stamina* alba stylis virescentes longe superantia; *antheræ* glabræ; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen admixtum (8). — Junius-julius.

β. *MEGAPHYLLUS*; *R. megaphyllus* P.-J. Müll. *in Flora* (1858), *Z. u B.*; *Pollich.* (1859), 293; *R. macrophyllus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. 1 n° 79, 80*; *ed. 2 n° 16, 17*; *R. Winteri* f. *latifolia* (G. Br.), Baenitz *Hb. eur. ann. 1894*; Sud. *Herb. rub. rar. n° 1*. — Folia supra discolora, inflorescentia tomentosa, laxe pilosa, angusta, foliosa, aculeis crebris munita. In apicis.

γ. *COMMISSUS*; *R. commissus* P.-J. Müll. *Vers. n° 47* (1859). — Aculei recti, etiam in petiolis; glandulæ crebræ; folia acuto-dentata, supra manifeste pilosa.

δ. *BOULAYI* Sud. *Bat. eur. p. 74* (1907) et *exsicc. n° 249*! — Folia tenuiter serrata; *foliolum* terminale obovatum, cuspidatum. Cetera ut in *R. macrophyllum*. Intermedius fere inter *R. macrophyllum* et *R. Schlechtendalii*.

BELGIA, BRITANNIA, DANIA, GERMANIA, HELVETIA, AUSTRIA, GALLIA MEDIA ET BOREALIS. — β. GERMANIA: *Prov. rhenana*, Coblenz (Wirtgen); *Guestphalia*, Stuttgart, Metz; GALLIA: *Meurthe-et-Moselle*, Montouville, Atton. — γ. GERMANIA: *Alsacia*, Heiligenbach (Müller). — δ. GALLIA: Nord? (Boulay).

OBS. — Le *R. pileostachys* Godr., qui est le *R. Wimmeri* Wh., me paraît inséparable du type *R. macrophyllus* W. et N. tel que je l'ai reçu de M. Focke et tel qu'il existe dans l'herbier du Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles (spécimens authentiques de Minden, récoltés par Jeune); la plante de Wirtgen, que l'on a souvent prise pour type, est une forme apricre relativement rare qui s'éloigne sensiblement des formes habituelles du *R. macrophyllus* (Cf. H. Sudre *Bat. eur. p. 72*). Le *R. quadicus* Sabrs., d'après les spécimens que M. Sabransky a bien voulu me communiquer, est inséparable du type *R. macrophyllus*.

HYBRIDA

D'après M. Focke (*ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 524*), le *R. MACROCARDIOPHYLLUS* Müll. et Wirtg. *exsicc.*; *Focke Syn. p. 337* (1877), dériverait du *R. macrophyllus* et d'une forme de la série des *R. glandulosi*. — GERMANIA : Minden (Wirtgen). — M'est inconnu. Il manque dans l'herbier de Müller et a probablement été brûlé par Favrat, qui a détruit un grand nombre de paquets de la collection de ce botanique.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Foliolum terminale ovatum, raro obovatum; turio pilosus.

A. — Foliolum terminale basi cordatum, acuminatum.

- a. — Folia subequaliter serrata; foliolum terminale leviter emarginatum.....
- b. — Folia inaequaliter et subinciso-serrata; foliolum terminale profunde cordatum; inflorescentia eglandulosa pedunculis ascendentibus.....

B. — Foliolum terminale basi rotundatum, integrum vel subemarginatum. Rubi eglandulosi.

- a. — Inflorescentia elongata, angusta; foliola acuminata; turio obtusangulus; petala alba vel dilute rosea.....
- b. — Inflorescentia laxa, aphylla; foliola acuta; turio angulatus; petala alba.....
- c. — Inflorescentia laxa, foliosa; foliola acuta; turio angulatus; petala rosea.....

II. — Foliolum terminale suborbicularis; turio dense pilosus.

- A. — Petala alba vel dilute rosea; folia subtus glabrescentia.....
- B. — Petala late rosea; folia subtus valde pilosa.....

b. — *R. fuxensis* Sud. *Rub. Pyr. p. 41* (1899); *R. umbrosus* Bor. *Fl. cent. ed. 3 n° 766*, non alior.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar. n° 16* !

Differt a *R. macrophylo* W. N. : turionibus obtusangulis, foliolo terminali basi leviter rotundato, longe et abrupte acuminato; inflorescentia elongata, foliosa, eglandulosa. A *R. Schlechtendalii* Wh. distinguitur aculeis validioribus, foliolis ovatis, glandulis nullis.

GALLIA : Ariège, Foix; Maine-et-Loire, Chalonnes (Bouvet), les Deux-Croix (Bastard).

c. — (T. LIII) — *R. patulus* M. et Lef. *Vers. n° 31* (1859), non Genev. *Mon. p. 294*.

Differt a *R. macrophylo* W. et N.; turione (1) leviter canaliculato, glabrescenti; dentibus acutioribus; foliolo terminali (2) late ovato, basi rotundato, acuto; inflorescentia subnuda, valde laxa; pedunculis (3) elongatis, tenuibus, valde patulis. Flores albi; bracteæ glandulis subsessilibus munitæ. Pollinis gradus puritatis 4/5. Planta fertilis, manifeste virescens.

GALLIA : Oise, bois de Lévignen (Lefèvre).

B. — (T. LIII) — ***R. eglandulosus*** M. et Lef. *Vers. n° 104* (1859); N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 48*; *R. mentilis* P.-J. Müll. in Billot *Ann. Fl. Fr. et Allem.* (1862), non *ap. Wirtg. exsicc.* (1861).

Exsicc. — Billot *Fl. Gall. et Germ. n° 2667* (*R. piletostachys* non G. et G.); Sud. *Bat. eur. n° 156* !

Turio faciebus leviter canaliculatis, pilosus, aculeis validis, rectis vel reclinatis armatus; folia grosse serrata, supra glabra, subtus parce pilosa; foliolum terminale (4) late ovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, acutum vel breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; ramus aculeis brevibus, perobliqui armatus; inflorescentia (5) ampla, laxa, usque ad apicem foliosa, hirsuta, aculeis crebris, brevibus, reclinatis vel falcatis munita; pedunculi medii elongati, multiflori, patulo-ascendentes; sepala tomentosa, parce pilosa, inermia, eglandulosa; petala late ovata, integra, pallide rosea; stamina alba stylis roseos superantia; germina glabrescentia. Fertilis. — An *R. Questieri* Lef. et M. X ?

GALLIA : Aisne, forêt de Retz; Oise, Cuvergnon (Lefèvre), Waligny (Questier).

HYBRIDA

R. EGGLANDULOSUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Diagn. p. 7* (1906); *R. PSEUDOEGGLANDULOSUS* Sud. l. c. — Differt a *R. eglanduloso*: foliis superis discoloribus, rachi de tomentosa, floribus late roseis.

GALLIA : Forêt de Villers-Cotterets (Questier).

C. — (T. LIII) — ***R. montanus*** Libert *ap. Lejeune Fl. Spa* (1813), II p. 317; Du Pré *Bull. Soc. bot. Belg. XXXVII p. 32-34* (1898), non *Virtg. (1857)*, nec *Hal. Oest. bromb. p. 226*; *R. leucander* Focke in *Alpers Verz. Gespf. Stad. p. 27* (1875); *Syn. p. 210*; *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 521* (excl. var. B).

Exsicc. — *Rub. gall. n° 112*; Sud. *Rub. rar. n° 21* !

Differt a *R. macrophylo* W. et N.: foliis acutis et inaequaliter serratis, foliolum terminali (6) basi profunde cordato, abrupte acuminato, petiolulo proprio triplo longiore; inflorescentia eglandulosa, bracteis latis, pedunculis (7) ascendentibus, aculeis elongatis, sparsis munita; sepalis in flore patulis, deinde laxe reflexis. Petala (8) alba vel dilute rosea.

BELGIA, GERMANIA : Saxonia, Guestphalia, Hannover (Focke); BRITANNIA ?

Obs. — Les spécimens authentiques de *R. montanus* Libert, de la collection Lejeune, du Jardin botanique de l'Etat, à Bruxelles, sont exactement identiques à ceux de Belgique que M. Focke a appellés *R. leucander* !, ainsi que l'a, le premier, constaté un zélé botaniste belge récemment décédé, M. du Pré. Aussi, bien que le terme de *R. montanus* ait servi à désigner le *R. senticosus* Kehl. et que quelques catalogues aient mal interprété l'espèce de M^e Libert, il est incontestable que le *R. montanus* Libert, aujourd'hui parfaitement connu, a la priorité sur le *R. leucander* Focke. Sur la table LIII de cet ouvrage la plante est désignée sous le nom de M. Focke parce que lorsque j'ai dessiné cette planche je n'avais pas encore vu les spécimens de Lejeune, que j'ai pu étudier depuis de très près. — Ma collection *Set of British Rubi* comprend sous le n° 11, portant le nom de *R. leucander*, une partie de *R. Muenteri* Marss. et une de *R. carpinifolius* Wh. L'existence du *R. montanus* Lib. en Angleterre reste donc douteuse. — La forme suivante tient à la fois du *R. montanus* Lib. et du *R. macrophyllus* W. N.

b. — (T. LIII) — *R. orbifer* Sud. *Rub. tarn.* (1909).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar. n° 17* !

Validus: turio faciebus planis, dense pilosus, glaucescens, glandulis sessilibus obsitus; folia subtus valde pubescentia, tenuiter serrata; foliolum terminale (9) suborbicularis, cordatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; inflorescentia brevis, laxa, breviter hirsuta, glandulis sparsis munita (10); sepala laxe reflexa;

petala alba vel dilute rosea, ovata; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. — Differt a *R. montano* Lib. turione pilosiore, foliis minute serratis, foliolis latoribus, inflorescentia sparsim glandulosae.

GALLIA : Tarn, Lescure, Brassac; Maine-et-Loire, forêt de Longuenée (Bouvet).

D. — (T. LIII) — **R. orbifolius** Lefèv. Assoc. rub. Diagn. p. 27 (1877); N. Boul. Rév. Rub. silv. p. 4; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 51.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 26, 262; Rub. gall. n° 113.

Turio (11) validus, faciebus planis, dense pilosus, glaucescens; *aculei* breves, compressi, recti vel reclinati; *folia* coriacea, supra pilis adpressis, subtus molliter pilosa, flavescenti-viridaria, ad nervos pilis pectinatis, inæqualiter et tenuiter duplicato-serrata; *foliolum* terminale suborbicularare, basi rotundatum, acutum vel parum acuminatum; *stipulae* eglandulosæ; *ramus* obtusus, dense pilosus, aculeis brevibus; *folia* 3-nata, supra interdum cinerascentia; *inflorescentia* angusta, densa, usque ad apicem foliosa (12), dense piloso-hirsuta, eglandulosa, aculeis debilibus munita; *pedunculi* medii breves, crassi, 2-3-flori; *petala* (13) suborbicularia vel late obovata, lâete rosea; *stamina* pallide rosea stylos virescentes vel pallide roseos superantia; *germina* glabra. Fertilis. — Habitus *R. vestiti* W. et N. sed ramorum aculei curvatores, glandulæ subnullæ.

GALLIA : Morvan, Autun (Gillot, Lucand), Mont (Basset).

Obs. — Le groupe du *R. macrophyllus*, tel que je l'ai établi, est relié aux *R. GRATI* par le *R. montanus* Lib., dont le calice ne se réfléchit pas nettement et qui, à cause de cela, pourrait se placer à côté du *R. tannensis*, dont il a un peu les facies; les *R. fuscans* et la var. *Boulayi* se rapprochent un peu du *R. Schlechtendalii* Wh.; le *R. orbifolius* Lef. est nettement intermédiaire entre les *R. vestitus* et *macrophyllus* W. N.; enfin le *R. eglandulosus* M. et Lef. rappelle un peu le *R. Questieri* Lef. et M., dont il dérive peut-être par croisement.

34 — (T. LIV) — **R. SCHLECHTENDALII** Wh. ap. Boenigh. Prod. Fl. Monast. (1824) p. 152; Wh. et N. Rub. germ. p. 34 t. XI; Müller Vers. n° 43; Focke Syn. p. 218; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 62; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 44, ex pte? *R. lophophilus* G. Braun exsicc.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 8574; Billot Fl. gall. et germ. n° 1469; Rub. gall. n° 159; G. Braun Hb. Rub. germ. n° 6; Sud. Bat. eur. n° 114, 250.

Turio (1) obsolete angulatus vel subteres, dense pilosus, aculeis mediocribus, subæqualibus, reclinatis armatus, glandulis nullis vel rarissimis; *folia* 5-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, subsimpliciter serrata, dentibus mediocribus; *foliolum* terminale vulgo anguste obovatum, interdum oblongo-subellipticum, basi rotundatum vel submarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius, infima petiolulata; *petiolus* pilosus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* glandulosæ; *ramus florifer* dense pilosus, subteres, aculeis debilibus, sparsis, reclinatis munitus; *folia* 3-nata, subtus viridia, pilosa; *inflorescentia* (3) brevis, obtusa, interdum subcorymbosa, foliosa, piloso-hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis debilibus munita; *pedunculi* medii elongati, patulo-ascendentes; *sepala* cinerea, hirsuta, parce glandulosa, pilosa, inerme, in flore et fructu reflexa (4); *petala* (5) ovata, alba vel pallide rosea; *stamina* alba vel rosea stylos virescentes superantia; *germina* glabra vel pilosa; *antheræ* glabræ; *receptaculum* pilosum. Pollen parum admixtum (6). — Junius-julius.

β. ANGLICUS; *R. macrophyllus* Sbsp. *Schlechtendalii* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 44, ex pte. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 84. — *Turio* faciebus concavis, parum pilosus; inflorescentia elongata, aculeis validis, sparsis armata; pedunculi breves; pedicelli patuli; *antheræ* pilosæ; *germina* glabra.

γ. VALDEPILOSUS Sud. Rub. tarn. (1909). — *Turio* teres, valde pilosus, folia subtus pilosa, argute serrata; foliola angustæ, acuminatissima, terminale ellipticum; pedunculi valde breves; pedicelli elongati, patuli; *petala* (7) perangusta, basi cuneata, distantia, pallide rosea; *stamina* alba, *antheræ* glabræ; *germina* pilosa. Planta conspicua, eglandulosa.

GERMANIA : *Guestphalia*, Mennighüffen, Minden (Weihe); Holzwinkelde (Demandt); Prov. *rhenana* (Focke). — GALLIA : *Valois*, forêts de Retz et de Compiègne (Lefèvre, Questier); Eure, Giverny (Toussaint); Tarn, Carmaux. — β. BRITANNIA : *Berkshire*, Mortimer Common (Rogers). — γ. GALLIA : Tarn, Pierre-Ségade.

Obs. — La plante de Minden a les feuilles velues-veloutées en dessous et les folioles étroites, les caulinaires terminales entières à la base; l'inflorescence est feuillée jusqu'au sommet, avec un axe florifère densément hérissé. Celle de Mennighüffen a les feuilles moins poiliées en dessous, à folioles terminales de même entières à la base. Celle de Carmaux (Bat. eur. n° 114, Rub. gall. n° 159), se rapproche beaucoup de cette dernière, mais a l'inflorescence moins feuillée; enfin la forme du *Valois* (Bat. eur. n° 250) ne me paraît différer de celle de Minden que par ses folioles caulinaires émargинées à la base et un peu moins étroites. Je crois que tous ces échantillons peuvent servir de types. — La var. *anglicus* est très remarquable et constitue peut-être une espèce particulière. Le n° 83 de *Set of British Rubi* paraît se rattacher au *R. amplificatus* Lees et non au *R. macrophyllus* W. N.

HYBRIDÆ

R. SCHLECHTENDALII × *SPRENGELII*; *R. PSEUDO-SCHLECHTENDALII* Sud. Bat. eur. p. 78 (1908). — Exsicc. : Bat. eur. n° 266 ! — Habitus *R. Schlechtendalii* Wh. sed folia plerumque 3-nata, inflorescentia fere aphylla, pedunculis patulis, glandulis valde brevibus munita; *petala* vive rosea. Pollen valide imperfectum.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz, bois de Fontaines (Questier), cum *R. Schlechtendalii*.

R. SCHLECHTENDALII × *MACROPHYLLUS* Sud. in hb. Mus. Paris : *R. HEMIMACROPHYLLUS* Sud. — Habitus *R. macrophylli* sed : folia minus acuminata, turiones dense pilosi, aculei debiliores. Fructus male evolutus.

GALLIA : *Valois*, Montlevron (Questier).

R. SCHLECHTENDALII × *FUSCUS*; *R. ERIOOTHYRSUS* Sud. hb. — Habitus *R. Schlechtendalii* Wh. sed glandulæ crebræ, inæquales, fructus male evolutus.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Questier).

Conspectus speciei et microgenerum

I. — Foliolum terminale obovatum vel ellipticum; pedunculi patulo-ascendentes.

- A. — Styli virescentes; folia subtus pubescens.....
- B. — Styli rosei; folia subtus ad nervos pilis pectinatis

R. Schlechtendalii Wh.
R. MACROPHYLOIDES Gen. b.

II. — Foliolum terminale late obovatum vel ovato-rhombeum; pedunculi patuli.

- A. — Inflorescentia foliosa, laxe pilosa; folia magna.....
- B. — Inflorescentia subaphylla, dense hirsuta; folia mediocria

R. SILVICOLUS L. et M. c.
R. HIRSUTISSIMUS Sud. et Ley. d.

b. — (T. LV) — *R. macrophyloides* Genev. Ess. mon. p. 172 (1869); Mon. p. 218; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 86; Bouvet Rub. Anj. (1903) p. 676, (1907) p. 15; *R. carpinitifolius* fl. roseo Bor. Mém. Soc. Acad. M.-et-L. t. VI p. 76.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 605; Rub. gall. n° 110.

Differt a *R. Schlechtendalii* Wh. : foliis subtilis ad nervos pilis pectinatis, superis interdum cinerascentibus; foliolis angustatis, terminali (1) elliptico-oblongo vel obovato, sensim acuminato, breviter petiolulato; rami aculeis falcatis; inflorescentia parva, pauciflora; petalis, staminibus stylisque roseis. Germina glabra.

GALLIA : Maine-et-Loire, Angers, étang St-Nicolas; Mayenne, Craon, pont du chemin de fer (A. Henry).

OBS. — Cette plante n'est pas hétéracanthe et ne peut être placée à côté du *R. adscitus* Genev., où elle se trouve dans la Flore de France de MM. Rouy et Camus. Elle tend à devenir un peu discoloré.

c. — (T. LV). — *R. silviculus* Lef. et M. ap. Müller Vers. n° 48 (1859); *R. Questieri* × e glandulosis N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 59.

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 18 !

Turio (3) *R. Schlechtendalii* Wh. *Folia ampla*, profunde et grosse serrata; *foliolum terminale* (4) late obovatum, emarginatum, acuminatum, ramealia late ovato-rhombea; *inflorescentia pyramidalis*, ampla, valde foliosa (5); *pedunculi medii elongati*, patuli, multiflori; *rachis laxe hirsuta*, glandulis crebris obsita; *sepala pilosa*, glandulosa, parce aculeata; *petala rosea*; *stamina alba* stylis virescentes superantia; *germina glabrescentia*. — *Pollinis gradus puritatis 4/5*. *Fructus bene evolutus*. — *Intermedius fere inter R. Schlechtendalii* W. et *R. silviculum* W. N.

GALLIA : Oise, bois de Lévignen (Lefèvre), route du Château (Questier).

d. — (T. LV) — *R. hirsutissimus* Sud. et Ley; *R. fuscus* f^a *hirsutissima* parce glandulosa Focke in hb. Ley !

Exsicc. — Sud. Rub. rari n° 19 !

Turio (6) obsolete angulatus, dense hirsutus, aculeis compressis, subæqualibus, glandulis rarioris munitus; *folia* 5-nata, coriacea, supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia, inæqualiter serrata; *foliolum terminale* (7) late ovato-rhombeum, basi leviter emarginatum, acutum vel subacuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia subaphylla*, hirsutissima, sparsim glandulosa, aculeis mediocribus vel ± validis armata (8); *sepala* aculeata; *petala* alba vel pallide rosea; *germina* pubescentia. — *R. fusco* Wh. admodum similis, a quo differt: aculeis subæqualibus, glandulis rarioris.

BRITANNIA : Herefordshire, W. Newton (A. Ley).

Series c. — *NEMORENSES* Sud.

Conspectus specierum

- | | |
|--|------------------------------------|
| I. — <i>Turio pilosus</i> ; <i>folia</i> caul. 5-nata; <i>inflorescentia</i> piloso-hirsuta..... | <i>R. silviculus</i> W. et N. 35 |
| II. — <i>Turio glaber</i> vel <i>glabrescens</i> ; <i>folia</i> caul. plerumque 3-nata; <i>inflorescentia</i> breviter et laxe pilosa. | |
| A. — <i>Petala</i> staminaque latè rosea; <i>inflorescentiae</i> rachis pilis nullis vel rariss. | <i>R. splendidiflorus</i> Sud. 36 |
| B. — <i>Petala</i> vulgo alba; <i>stamina</i> alba, stylis virescentes | <i>R. nemorensis</i> Lef. et M. 37 |

35 — (T. LVI) — **R. SILVATICUS** Wh. et N. Rub. germ. p. 41 (1825) t. XV; Focke Syn. p. 221; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 526; Hal. Oest. bromb. p. 237; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 41; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 54; non Wirtg. nec Auct. angl.; *R. aviiculus* M. et Lef. Vers. n° 51 (1859), ex pte; *R. contractus* G. Braun exsicc.; *R. pyramidalis* var. *derasus* N. Boul. l. c. p. 53.

Exsicc. — G. Braun Hb. rub. germ. nos 27, 28 (*contractus*), 87 (f. *teutoburgensis*), 154 (f. *baltica*); Assoc. rub. n° 147, 311 (var.), 535; Rub. gall. n° 62; Baenitz Hb. eur. n° 7440, 8547; Set of Brit. Rub. n° 82; Sud. Bat. eur. n° 59.

Turio (1) arcuato-prostratus, inferne teres, superne obsolete angulatus, patenter pilosus, glandulis rarioris vel nullis; aculei crebri, debiles, subæquales, e basi leviter dilatata, subconici, subulati, reclinati; *folia* 5-nata (2, 3), supra parce pilosa, subtus viridia, molliter pubescentia, grosse et saepe duplice-serrata; *foliolum terminale* ellipticum, elliptico-ovatum vel rhombeum, basi rotundatum, acuminatum, breviter petiolulatum, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis debilibus, falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis nullis vel parum apertis; *ramus florifer* subcyindricus, pilosus, aculeis parvis, pallidis, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtus viridia, foliolis terminibus elliptico-ovatis; *inflorescentia* (4) pyramidalis, saepe usque ad apicem foliosa, piloso-hirsuta, glandulis nullis vel rariss, aculeis debilibus, subulatis-reclinatis munita; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, multiflori; *sepala* cinereo-virescentia, vulgo inermia, sparsim glandulosa, in fructu reflexa (5); *petala* (6, 7) breviter obovata, integra, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen ± admixtum (8). — Julius.

β. *ARMORICUS*; *R. amphichlorus* v. *armoricus* Sud. Ronc. bret. p. 9 (1904). — Aculei e basi manifeste dilatata; *foliolum terminale* ovatum, acuminatum; *inflorescentia* densa, breviter pilosa, aculeis geniculatis armata; *petala* rosea, *stamina* alba, stylis rosei.

γ. *HYPOCLOUS*; *R. hypochrous* Sud. Rev. Rub. Hb. eur. in Bull. Soc. Bot. Fr. t. LII (1905), p. 342; *R. inuncatus* Baenitz Hb. eur. n° 10376, non M. et Lef. — Aculei sparsi, compressi; *folia* grosse serrata; *foliolum terminale* ovatum, cordatum, acutum; *inflorescentia* brevis, parum foliosa, aculeis crebri; *stamina* stylos vix superantia.

GERMANIA: Saxonia, Guestphalia, Schleswig-Holstein; DANIA; BRITANNIA; AUSTRIA: Moravia; GALLIA MEDIA ET BOREALIS: Cher, Oise, Pas-de-Calais, Eure-et-Loir, Seine-infra; BELGIA: Louette-St-Pierre (Gravet). — β. GALLIA: Finistère, Toull an Dioull. — γ. GERMANY: Badenia, Siegelau (Goetz).

HYBRIDA

R. SILVATICUS × *ADSCITUS* Sud. Diagn. p. 41 (1906); *R. PSEUDO-AVIICULUS* Sud. l. c.; *R. aviiculus* M. et Lef. ex pte. — Differt a *R. silvatico* W. et N.: turionibus pilosioribus, dentibus majoribus, foliis subtus pubescentioribus, inflorescentia laxiore, pedunculis valde patulatis. Pollen percommixtum.

GALLIA: Valois, forêt de Retz (Lefèvre).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

- | | |
|---|----------------------------------|
| I. — <i>Foliolum terminale</i> petiolulo proprio saltem quadruplo longius; <i>turio</i> debilis, obtusus..... | <i>R. silvaticus</i> W. N. |
| II. — <i>Foliolum terminale</i> petiolulo proprio duplo vel triplo longius; <i>turio</i> leviter angulatus; <i>folia</i> ampla. | |
| A. — <i>Turio</i> parce pilosus, aculeis compressis armatus; <i>foliolum terminale</i> acuminatum. | |
| a. — <i>Foliolum</i> caul. terminale late ovatum..... | <i>R. DEBILISPINUS</i> Sud. B. |
| b. — <i>Foliolum</i> caul. terminale obovatum..... | <i>R. AMPHICHLOUS</i> Sud. B. b. |
| B. — <i>Turio</i> dense pilosus, aculeis conicis armatus; <i>foliolum terminale</i> acutum..... | <i>R. PATULIFORMIS</i> Sud. C. |

B. — (T. LVII) — **R. debilispinus** Sud. *Bull. Assoc. pyr.* n° 282 (1902); *R. longicuspitatus* N. Boul. *ex pte*; *R. sparsipilus* Borbas ?, non Genev.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9926 (s. n. *R. amphichlori* non P.-J. Müll.) ; *Bat. eur.* n° 267.

A *R. silvatico* distinguitur : turione angulosiore, aculeis validioribus, rectis vel reclinatis ; foliis amplioribus ; foliolo terminali (1) ovato vel suborbiculari, emarginato, acuminato, petiolulo proprio duplo vel triplo longiore ; inflorescentia (2) breviore, minus foliosa hirsuta. Flores albi vel dilute rosei.

β. LIGERINUS Sud. in Bouvet *Rub. Anjou* (1907) p. 15; *R. amphichlorus* Genev. *Mon.* p. 207, non P.-J. Müll.; *R. Questieri* X *ulmifolius* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 78, *ex pte*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 302. — Aculei subaequales, leviter compressi ; foliola ramealia lata, acuta ; inflorescentia brevis, lata, pedunculis patulis, glandulis nullis vel rarissimis ; petala rosea.

γ. HUNGARICUS; *R. vulgaris*? Holuby *exsicc.*, non W. et N. — Turio distincte pilosus, aculeis valde obliquis, geniculatis armatus ; petiolorum aculei adunci ; inflorescentia glandulosa.

δ. SUBANGULOSUS; *R. subangulosus* Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 138 (1905); *R. latifolius* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 120 (1869) et *exsicc.* n° 104, non Bab. — Turionis aculei recti ; foliolum terminale suborbicularare, leviter emarginatum, tenuiter acuminatum ; dentes tenues ; inflorescentia aphylla, pedunculis patulis ; petala alba, stamina alba, stylis rosei.

ε. KOSLENIS; *R. kostensis* Spribille *in hb.* Sud. — Folia aequaliter et subsimpliciter serrata, subtus pilosa ; inflorescentia aculeis crebris armata, eglandulosa ; cetera un in typo.

GALLIA : *Tarn*, *Finistère*, *Manche*; **GERMANIA** : *Badenia*; **BELGIA**; **HELVETIA**? *Sauvabelin* (E. Vittoz). — **β. GALLIA**: *Vendée*, *Sarthe*, *Maine-et-Loire*. — **γ. HUNGARIA**: *Trencin* (Holuby). — **δ. GALLIA**: *Vosges*, *St-Dié*, *forêt du Camberg* (N. Boulay); **GERMANIA**, *Pomerania*, *Stettin* (Holsfuss). — **ε. SILESIA**: *Kosel* (Spribille).

HYBRIDA

R. DEBILISPINUS × **FICTUS teretiramus** Sud. *Rub. tarn.* (1909); **R. PRATICOLUS** Sud. *l. c.* — Gracilis ; folia 3-nata, supra cinereo-tomentosa ; inflorescentia sparsim glandulosa ; petala stylique rosea. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-Cirou, in pratis, cum parentibus.

b. — (T. LVII) — **R. amphichlorus** Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. amphichlorus* var. *basalticarum* Sud. *Bull. Soc. bot. France* t. LI (1904) p. 12.

Turio (3) pilosus, faciebus planis ; *aculei* subaequales, compressi, recti vel reclinati ; *folia* 3-4-5-nata, subtus parce pilosa ; *foliolum* terminale (4) obovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius ; *dentes* mediocres, parum profundi ; *inflorescentia* breviter pilosa, glandulis rarissimis vel nullis, aculeis sparsis, falcatis armata ; *petala* dilute rosea ; *stamina* alba stylos virescentes superantia.

GALLIA : *Corrèze*, *Bort*; *Tarn*, *Anglés*, *Brassac*, *Paulin*.

C. — (T. LVII) — **R. patuliformis** Sud. *Diagn.* p. 10 (1906).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 20 !

Turio (5) validus, obsolete angulatus, dense pilosus, aculeis crebris, inaequalibus, subconicis armatus ; *folia* 5-nata, grosse serrata, subtus pilosa ; *foliolum* terminale late ovato-suborbicularare, emarginatum, acutum, petiolulo proprio subtus duplo longius, infima longe petiolulata ; *ramus* *R. silvatici* W. N. ; *inflorescentia* (6) brevis, ampla, valde lata, basi foliosa glandulis nullis vel rarissimis, aculeis tenuibus munita ; *pedunculi* medii elongati, valde patuli ; *germina* glabrescentia, *Fructus* bene evolutus (7).

GALLIA : *Aisne*, *forêt de Retz*, à Bourgfontaine (Questier).

36 — (T. LVIII) — **R. SPLENDIDIFLORUS** Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 21 (1902).

Gracilis ; *turio* (1) obsolete angulatus, glaber vel glabrescens, glandulis rarissimis vel nullis ; *aculei* subaequales, compressi, recti vel reclinati ; *folia* (2, 3) 3-4, raro 5-nata, utrinque parce pilosa, subtus viridia vel in apricis leviter cinerascentia, subsimpliciter serrata, dentibus mediocribus, parum profundis ; *foliolum* terminale ovatum vel subrhombicum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius ; *petiolus* supra planus, aculeis reclinatis vel falcatis armatus ; *stipulae* lineares, glandulis tenuibus sparsis ; *ramus florifer* gracilis, parce pilosus, aculeis tenuibus, reclinatis vel falcatis armatus ; *inflorescentia* (4) pauciflora, aphylla vel parum foliosa, leviter tomentosa, glandulis nullis vel rarissimis, aculeis subrectis armata ; *sepala* tomentoso-virescentia, inermia vel parce aculeata, interdum sparsim glandulosa, in flore et fructu reflexa ; *petala* anguste ovata (6), late rosea ; *stamina* rubra stylos rubros superantia ; *germina* parce pilosa ; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* vulgo parum admixtum. — Julius.

GALLIA : *Tarn*, *Lacabarède*, *Labastide-Rouairoux*, *Trébas*, *Cambon*, etc.

OBS. — Plante grêle et élégante, facilement reconnaissable à ses axes florifères non poilus et à ses fleurs d'un rouge vif. On peut en rapprocher la suivante :

b. — (T. LVIII) — **R. gratiflorus** P.-J. Müll. *ap. N. Boul. Ronc. vosg.* p. 84 (1868); *Genev. Mon.* p. 198 ?

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 64 !

A *R. splendidiflora* differt : foliis minute serratis (7), inflorescentia manifeste sed tenuiter glandulosa, stylis lutescentibus. Petala obovata (8).

GALLIA : *Vosges*, *St-Dié* (Boulay); *Tarn*, *St-Martin-Laguépie*.

OBS. — La plante des Vosges, cueillie dans un endroit ombragé, fructifie mal ; celle du Tarn, qui ne me paraît pas en différer, est très fertile.

HYBRIDA

R. GRATIFLORUS × **ULMIFOLIUS** Sud. *Rub. tarn.* (1909); **R. SEMIGRATIFLORUS** Sud. *l. c.* — Validus ; folia grosse serrata, subtus tomentosa ; inflorescentia multiflora, stylis carnei. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, *St-Martin-Laguépie*.

37 — (T. LIX) — **R. NEMORENSIS** Lef. et M. *Vers.* n° 134 (1859); *R. rohlensiæ* Toch *Mon. Rub. Boh.* p. 19 (1903) ?

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 268 !

Gracilis ; *turio* angulatus, faciebus planis vel convexis, glaber vel glabrescens, glaucescens, glandulis nullis vel rarissimis ;

aculei subæquales, debiles, parum compressi, reclinati ; *folia* 3-4, raro 5-nata (1, 2), supra parce pilosa, subtus viridia et pubescentia, argute et subinæqualiter serrata ; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius ; *stipulae* lineares, tenuiter glandulosæ ; *petiolus* supra planus, parce pilosus, aculeis sparsis, reclinatis vel falcatis armatus ; *ramus florifer* glabrescens, tenuiter glandulosus, aculeis rarissimis, gracilibus munitus ; *folia* subtus viridia ; *inflorescentia* (3) laxa, basi foliosa, pilis nullis vel rarissimis, tenuiter glandulosæ, subinermis ; *pedunculi* medi leviter ascendentes, pauciflori ; *sepala* tomentoso-virescentia, parce pilosa, vulgo inermia, glandulis nullis vel rarissimis, munita, in flore et fructu reflexa (4) ; *petala* (5, 6) anguste ovata, integra, alba ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabrescentia ; *receptaculum* glabrescens. Pollen admixtum (7). Fertilis. — Junius-Julius.

β. CALVESCENS ; *R. calvescens* P.-J. Müll. ap. N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 11 (1864). — Exsicc. : *Ronc. vosg.* n° 11 ! — Turio angulatus ; folia grosse serrata ; foliolum terminale basi minus latum ; rami glandulæ subsessiles ; inflorescentia densior, parce pilosa, glandulis brevibus, aculeis tenuibus armata ; flores pallide rosei.

γ. MAGNIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* (1909). — Folia ampla, 3-5-nata ; foliolum terminale basi subintegrum ; inflorescentia brevis, eglandulosa ; pedunculi patuli, aculeis sparsis validis, armati ; petala angusta, distantia.

δ. DOMBROVICUS ; *R. dombrovicus* Spribille in hb. Sud. — Folia caul. 3-5-nata, ampla, inæqualiter, grosse et subinciso-serrata ; inflorescentia angusta, eglandulosa. Frons *R. debilispini* Sud. sed turio glaber. Intermedius inter *R. debilispini* et *R. nemorensis*.

GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz, de Billemont à Bourgfontaine, route de Faverolles (Lefèvre, Questier) ; *Tarn*, Sauveterre. — β. GALLIA : *Vosges*, forêt de St-Gorgon, près de Rambervilliers (Boulay) ; *Tarn*, Cambon-du-Temple ; GERMANIA : *Silesia*, Herrnsdorf, prope Glatz (Kinscher) ; BELGIA : Louette-St Pierre (Gravet) ; Woluwe (du Pré). — γ. GALLIA : *Tarn*, bords du Thoré, à Engasc, à Albine. — δ. SILESIA (Spribille).

HYBRIDA

R. NEMORENSIS × *QUESTIERI* Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. FALLACIOSUS* Sud. l. c. — Differt a *R. nemorensis* L. et M. aculeis validis, petalis, staminibus stylisque roseis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Sauveterre.

Conspectus speciei et subspeciei

I. — Foliolum caul. terminale ovatum, cordatum.....	<i>R. nemorensis</i> L. et M.
II. — Foliolum caul. terminale obovatum, basi rotundatum	<i>R. EGREGIUS</i> Focke B.

B. — (T. LIX) — ***R. egregius*** Focke in *Abh. Nat. V. Brem.* II p. 463 (1871) ; *Syn.* p. 253 ; *ap.* Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 536.

Gracilis ; *turio* subteres, glabrescens, glandulis nullis vel rarissimis ; *aculei* subæquales, leviter compressi ; *folia* plerumque 3-nata, subæqualiter et argute serrata, subtus viridia vel in apricis cinerascentia ; *foliolum* terminale (8) obovatum, basi rotundatum, cuspidatum, petiolulo proprio triplo longius ; *inflorescentia* parva, angusta, tomentosa, sparsim glandulosa, aculeis tenuibus, rarissimis, munita ; *petala* obovata (9), alba ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabra.

β. ELUMBIS ; *R. elumbis* Sud. in Bouvet *Rub. Anj.* (1903) p. 575, (1907) p. 16. — Foliolum terminale basi cuneatum, tenuiter cuspidatum ; rachis pilosa ; petala rosea.

γ. CETICUS ; *R. ceticus* Hal. *Oest. bromb.* p. 244 (1891) ; *R. epipsilos* Hal. et Borbas *Nacht. Fl. Nieder* p. 330, non Focke. — Turio validus ; foliolum terminale breviter obovatum, sensim acuminatum ; inflorescentia elongata, aphylla, pedunculis patulis.

? δ. SEMICALVUS ; *R. semicalvus* Sud. *Rev. Rub. Hb. eur.* in *Bull. Soc. bot. Fr. l. LII*, p. 333 (1905). — Folia grosse serrata ; foliolum terminale ovatum vel rhombicum ; inflorescentiae aculei validi. Eglandulosa.

GERMANIA BOREALI-OCIDENTALIS ; DANIA ; GALLIA : *Maine-et-Loire*, Montreuil-Belfroy (Bouvet) ; *Tarn*, St-Amans : *Sarthe*, St-Symphorien (Chenon). — β. GALLIA : *Maine-et-Loire*, forêt de Chandelais (Bouvet) ; *Sarthe*, Bazouges (Launay). — γ. AUSTRIA : Neuwaldegg (Halacsy). — δ. GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz).

Obs. — La var. *semicalvus* reste douteuse et serait peut-être mieux placée à la suite du *R. nemorensis* L. M.

HYBRIDA

R. SEMICALVUS × *BIFRONS* ; *R. Goetzi* Sud. hb. ; *R. argentatus* Goetz in Baenitz *Hb. eur.* n° 10347, non P.-J. Müll. — Gracilis ; folia subtus cinerascentia, argute serrata.

GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz).

Obs. — Les 3 séries des *R. EUVIRESCENTES* Gen. ne sont pas nettement tranchées mais servent de jalons dans cette longue série d'espèces affines.

Se reconnaissent :

- 1º A la glabrescence du turion et des feuilles : *R. Maassii* Focke, *R. Questieri* L. et M., *R. splendidiflorus* Sud. et *R. nemorensis* L. et M.
- 2º A la pilosité de la face inférieure des feuilles : *R. pyramidalis* Kalt. et *R. orbifolius* Lef.
- 3º A leur inflorescence presque inerme : *R. macrophyllus* W. N., *R. Schlechtendalii* Wh., *R. silvaticus* W. N., et *R. nemorensis* L. M.
- 4º A ses grands aiguillons presque droits sur le rameau : *R. elongatispinus* Sud.
- 5º A ses aiguillons très denses sur le turion, en même temps qu'à ses larges folioles : *R. fagicola* de Martr.-D.
- 6º A leurs fleurs d'un beau rose : *R. splendidiflorus* Sud., *R. elongatispinus* Sud., *R. Questieri* L. et M.
- 7º Au feuillage très ample : *R. macrophyllus* W. et N., *R. majusculus* Sud., *R. cordifolius* Wh., *R. Schlechtendalii* Wh.
- 8º Aux folioles caulinaires terminales obovales : *R. majusculus* Sud., *R. Schlechtendalii* Wh., et *R. egregius* Focke.
- 9º Aux foliolés terminales suborbiculaires : *R. Maassii* Focke, *R. cordifolius* Wh., *R. fagicola* de Mart.

Sont presque toujours églanduleux : *R. Maassii* Focke, *R. Questieri* L. M., *R. elongatispinus* Sud., *R. fagicola* de Martr., *R. majusculus* Sud., *R. rhombifolius* Wh., *R. silvaticus* W. et N. et *R. splendidiflorus* Sud.

Quelques-uns sont un peu hétéroanthès et se rapprochent des *R. APPENDICULATI* Gen., en particulier *R. silesiacus* Wh., *R. pyramidalis* Kalt., *R. silvaticus* W. et N. et *R. nemorensis* L. et M.

Les sépales sont parfois imparfaitement réfléchis ; cela s'observe chez les *R. pyramidalis* Kalt. et *R. montanus* Lib.

Une seule forme a les anthères poilues, c'est la var. *anglicus* du *R. Schlechtendalii* Wh.

Subsectio C. — *Discoloroides* Genev.Series a. — *SUBVIRESCENTES* Sud.

Conspectus specierum

I. — Inflorescentia eglandulosa vel glandulis elongatis, sparsis munita.

- A. — Inflorescentia lata, obtusa, saepe glandulosa; Rubi validi, floribus vulgo roseis.....
B. — Inflorescentia elongata, foliosa, eglandulosa; Rubi modici, floribus albis.....

II. — Inflorescentia glandulis crebris munita; flores albi vel dilute rosei.

- A. — Inflorescentia subaphylla, pedunculis patulis, glandulis elongatis munita.....
B. — Inflorescentia foliosa, pedunculis ascendentibus, glandulis brevibus munita.....

38 — (T. LX) — **R. VILICAULIS** Kœchl. in Wh. et N. Rub. germ. p. 43 (1825), t. XVII; Wimm. et Grab. Fl. Sil. II p. 27; Focke Syn. p. 206; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 56, ex pte; Hal. Oest. bromb. p. 284; R. eu-vilicaulis Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 516 (1902); R. sanctus O. Kuntze Ref. Bromb. p. 17, ex pte; R. megapolitanus E. H. L. Krause Verh. B. V. Brandb. XXVI, 14 (1884); R. macrophyloides Utsch., non Gen.

Exsicc. — G. Braun Hb. rub. germ. n° 8, 49; Assoc. rub. n° 885; Rub. gall. n° 65, 114; Baenitz Hb. eur. n° 9584 (R. vilicaulis × pubescens Utsch), 9561 (R. pubescens × vilicaulis Utsch), 9564, 9056, 9070 (R. Reichenbachi), 9577 (R. Sprengelii × vilicaulis Utsch), 9503 (R. Baenitzii Utsch ex pte), 9560 [R. pubescens × (Sprengelii × vilicaulis) Utsch], 9558, 9559 (R. pubescens × Schleicheri × vilicaulis Utsch), 10404; Hb deidr. n° 116; Sud. Bat. eur. n° 60.

Turio (1) validus, arcuatus, apice decumbens, inferne obsolete angulatus, superne faciebus planis vel leviter sulcatis, saepe obscurō-rubens, parce pilosus, glandulis sessilibus obsitus; *aculei* validi, crebri, aequales, e basi compressa, recti; *folia* (2) ampla, 5-nata, supra parce pilosa, subtus molliter pubescentia, viridia vel supera cinereo-tomentosa, argute et subaequaliter serrata, dentibus plerumque simplicibus; *foliolum* terminale ovatum vel late ellipticum, basi rotundatum vel submarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* inferne sulcatus, superne planus, aculeis validis, falcatis vel subuncinatis armatus; *stipulae* lineares, saepe sparsim glandulosae; *ramus* florifer angulatus, pilosus, aculeis crebris, leviter falcatis armatus; *folia* 3-5-nata, argute et duplikato-serrata, supera subtus cinerascentia; *inflorescentia* (3) lata, obtusa, saepe usque ad apicem foliosa, hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis crebris, validis, reclinatis vel falcati armata; *pedunculi* mediū patulo-ascendentes vel patuli, elongati, multiflori; *sepala* cinereo-tomentosa, pilosa, saepe aculeata, in flore et fructu reflexa (4); *petala* (5) ovata, alba vel rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylis virescentes longe superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* parce pilosum. Pollen admixtum (6). — Julius.

8. MARCHICUS E. H. L. Krause Rub. Rostoch. p. 194 (1880); R. marchicus ej. Verh. B. V. Brandg. Verh. XXVI, 15 (1884); R. vilicaulis B. incarnatus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 517, ex pte, (non P.-J. Müll.). — *Turio* pilosus; glandulæ nullæ; petala rosea, styli virescentes.

γ. RECTANGULATUS Hal. Oest. bromb. p. 235 (1891); R. vilicaulis Sbsp. R. rectangulatus Maass in Focke Syn. p. 209 (1877); R. vilicaulis B. incarnatus Focke ap. Asch. et Gr. l. c. ex pte. — *Turio* glabrescens, faciebus concavis; ramus valde angulatus, aculeis reclinatis; inflorescentia densa, superne aphylla, sparsim glandulosa, aculeis rectis vel reclinatis armata; petala rosea; styli virescentes.

δ. OBOTRITCHUS E. H. L. Krause Rub. Rost. p. 192 (1880); R. vilicaulis B. incarnatus Focke ap. Asch et Gr. l. c.; ex pte. — Inflorescentia glandulosa; petala, stamina stylique rosea. Cetera fere ut in typo.

ε. ATRICAULIS N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 57 (1900); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 518; R. atrocaulis P.-J. Müll. Vers. n° 103 (1859) non Gen.; R. vilicaulis var. doubravicensis Sabrs. ? O. B. Z. (1889) p. 403. — Exsicc.: Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1, n° 143. — Foliolum terminale suborbiculare (7); dentes tenues; inflorescentia depauperata, densa, glandulis nullis vel raris; petala pallide rosea; stamina dilute rosea, styli virescentes.

ζ. STEREACANTHUS; R. stereacanthus P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 64 (1867) et exsicc. n° 47; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 57, non Gen.; R. vilicaulis B. incarnatus Focke ap. Asch. et Gr. l. c. p. 517, ex pte. — *Turio* leviter canaliculatus, aculeis validis, peracutis armatus; folia subtiliter serrata (8); inflorescentia angusta, reducta, laxe pilosa, sparsim glandulosa; petala (9) rosea; stamina pallide rosea, styli virescentes. In apricis.

GERMANIA, DANIA, SUECIA MERIDIONALIS, AUSTRIA. — β. GERMANIA BOREALIS: *Saxonia*. — γ. GERMANIA BOREALIS: AUSTRIA. — δ. GERMANIA: Rostoch, Tamen, Müritz, etc. (Krause). — ε. GERMANINA: Alsacia, Heimbach, derrière les bains de Gleisweiler (P.-J. Müller); Prov. rhenana, Eifel (Wirtgen); BRITANNIA: Yorkshire. — ζ. GALLIA: Vosges, Planois (Pierrat).

OBS. — R. Kelleri Hal. in Oest. b. Zeit. p. 431 (1890); Oest. bromb. p. 235. — Differt a R. vilicauli Kœchl.: turionibus glabrescentibus, petalis ellipticis, parvis, albis. — AUSTRIA: Gloggnitz. — Mihi novus est.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Turionis aculei validi, aequales, e basi valde dilatata, compressa.

A. — Antheræ glabré.

a. — *Turio* glabrescens; inflorescentia valde armata; sepala in fructu reflexa.

1. — Inflorescentia vulgo glandulosa, ampla; stamina stylique vulgo pallida.....

2. — Inflorescentia eglandulosa, mediocris; folia subtus valde pubescentia; stamina stylique vulgo rosea.....

b. — *Turio* pilosus; inflorescentia parum armata; sepala in fructu laxe reflexa vel subpatula.....

B. — Antheræ pilosæ; turio canaliculatus, glabrescens.....

II. — Turionis aculei subinequales, e basi parum compressa, subconici.

A. — Inflorescentia glandulosa, valde foliosa; folia subtus viridia, parum pubescentia.....

B. — Inflorescentia vulgo aphylla, eglandulosa; folia subtus molliter pubescentia; petala augusta, pallida.....

R. vilicaulis Kœchl.

R. INSULARIS Aresch. b.

R. CARMAUXENSIS Sud. c.

R. LANGEI Jens. d.

R. CALVATUS Blox. B.

R. ORNATUS Sud. C.

b. — R. insularis Aresch. Skænes Flora ed. 2 p. 570 (1881); Some Obs. g. Rub. p. 139; R. vilicaulis Sbsp. R. insularis Frid. et Gel. Rub. exs. Dan. et Slesv. n° 8; R. similatus Lindg. Hb. rub. scand. n° 13, 14, non P.-J. Müll.; R. vilicaulis Rogers Handb. Brit. Rub. p. 34, ex pte; R. holerythrus ej. l. c., ex pte; R. vulnerans Neuman Bot. Not. p. 87 (1885).

Exsicc. — Lindg. l. c. n° 13, 14; K. Frid. et Gel. l. c. n° 8; Sef of Brit. Rub. n° 77, 111.

A simillimo *R. villicauli* Koehl. dignoscitur: omnino eglanduloso; foliis supra manifeste pilosis, subtus molliter pubescentibus; inflorescentia angustiore, pedunculis ascendentibus; petalis minus latis, obovatis, longe unguiculatis, pallide roseis; staminibus stylisque vulgo roseis.

B. ALBIFLORUS; *R. incarnatus* var. *albiflorus* Sud. in hb. Mus. Paris; Diagn. p. 13 (1906). — Foliola minus lata; flores albi.

γ. CONFINIS; *R. confinis* Lindg. Hb. rub. Scand. n° 12; Aresch. Som. Obs. g. Rub. p. 142, non P.-J. Müll. — Turio leviter canaliculatus; folia grosse serrata; foliolum terminale late ovatum; flores albi; germina glabra. Intermedius fere inter *R. villicaulis* et *R. insularis*.

SUECIA MERIDIONALIS, DANIA, BRITANNIA. — **β. GALLIA**: Valois, bois de Lévignen (Questier). — **γ. SUECIA**: Bohuslæn.

C. — (T. LXI) — R. carmauxensis Sud. Bat. eur. p. 79 (1908).

Exsicc. : Bat. eur. n° 269 !

Differt a *R. villicauli* Koehl.: turione (1) glaucescenti, dense piloso; foliis subsimpliciter et æqualiter serratis, foliolis latis (2); inflorescentia mediocriter armata, eglandulosa vel glandulis rarior, brevibus munita; sepalis post anthesin laxe reflexis vel subpatulis. — Petala pallide rosea, late ovata (3); stamina alba stylos virescentes superantia; germina pilosa; folia subtus molliter pubescentia. — Intermedius fere inter *R. macrophyllum* W. N. et *R. argenteum* W. N. Habitus *R. macrophylli* sed folia subdiscolora, inflorescentia armatior.

GALLIA: Tarn, St-Benoit, prope Carmaux, loco dicto Rieyssé.

d. — (T. LXI) — R. Langei G. Jensen in K. Frid. et Gel. Danm. o. Slesw. Rub. p. 67 (1887); Rés. fr. p. 13; *R. villicaulis* C. Langei Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 517 (1903).

Exsicc. — K. Frid. et Gel. Rub. dan. exsicc. n° 9, 66; Assoc. rub. n° 888; Rub. gall. n° 18.

Ab affini *R. villicauli* Koehl. dignoscitur: turione glabrescenti, leviter canaliculato; inflorescentia angustiore, elongatiore, densiore, glandulis rarior, aculeis validis munita; petalis (5) obovatis, albis vel pallide roseis, antheris pilosis (6). Stamina alba, stylis vulgo virescentes, germina glabra. Folium caul. terminale ± obovatum (4).

β. PARVIFOLIUS G. Jensen; K. Frid. et Gel. I. c. p. 68, 14; Sud. Bat. p. 79; *R. Langei* G. Jensen, prius. — Exsicc. : Bat. eur. n° 270. — Gracilior; turio parce pilosus; folia parva, foliolis angustis; foliolum caul. terminale basi cuneatum; antheræ sœpe glabrae.

DANIA: Jutlandia; GERMANIA: Schleswig. — **β. Slesvig, Holstein.**

B. — (T. LXI) — R. calvatus Blox. in Kirby Fl. Leicest. 38 (1850); Rogers Handb. Brit. Rub. p. 35; *R. Salteri* β. *calvatus* Bab. Brit. Rub. p. 133.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 112.

Turio glabrescens, faciebus planis vel leviter excavatis, aculeis mediocribus, leviter inæqualibus armatus; folia supra glabra, subtus viridia et parum pilosa, minute serrata, mucronibus patulis; foliolum terminale (7) ovatum, subcoronatum, acuminatum; rami aculei tenues, inæquales, reclinati vel falcatae; inflorescentia (8) elongata, interrupta, usque apicem foliosa, hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis crebris armata; pedunculi ascendentes, 2-3-flori, pedicellis brevibus; sepala pilosa, aculeata, laxe reflexa (9); petala (10) late obovata, pallide rosea; stamina dilute rosea stylos virescentes superantia; germina glabra. — Habitus *R. eglandulosi* M. et L. sed folia tenuiter serrata, inflorescentia dissimila.

BRITANNIA: Sussex, Surrey, Berks, Stafford, Derby, Lancaster, Warwick, etc. (M. Rogers).

HYBRIDA

R. CALVAUS × QUESTIERI Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 48 (1904); *R. DURESCENS* W. R. Linton in Journ. Bot. (1892), 80, 71; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 29 (pr. spec.). — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 57. — Differt a *R. calvata* Blox.: foliis subtus glabrescentibus, inflorescentia minus foliosa hirsutaque. Fructus male evolutus.

BRITANNIA: S. Derbyshire, Shirley (W. R. Linton).

C. — (T. LXI) — R. ornatus Sud. Bat. eur. p. 41 (1905).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 117 !

Validus; turio angulatus, faciebus leviter concavis, pilosus, glandulis sessilibus obsitus; aculei crebri, mediocres, subinæquales, e basi leviter dilatata, recti vel reclinati; folia ampla, supra parce pilosa, subtus pubescentia, in apricis cinereo-tomentosa, tenuiter et subæqualiter serrata; foliolum terminale (11) suborbiculare, cordatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius; ramus dense pilosus, aculeis reclinatis vel falcatis armatus; inflorescentia ampla, laxa, aphylla, hirsuta, glandulis nullis vel rariss, aculeis crebris, rectis vel reclinatis instructa; pedunculi medii (12) elongati, patuli, multiflori; sepala parce aculeata, laxe reflexa; petala (13) oblonga, distantia, alba vel dilute rosea; stamina alba stylos virescentes superantia; germina pilosa; receptaculum parce pilosum. — Habitus fere *R. macrophyllum* W. et N. sed inflorescentia aculeis validis armata; foliola lata *R. fagicolum* de Mart. revocant. A præcedentibus gregis *R. villicaulis* differt: turione dense piloso, petalis angustis, inflorescentia denudata vel solum inferne foliosa. — Junius.

GALLIA: Tarn, Cambon, Bellegarde, Foncouverte, Teulet, etc.

OBS. — *R. laciniatus* Willd. Enum. pl. hort. berol. 550 (1809); Ser. ap. D. C. Prod. II p. 558; Corb. Fl. Norm. p. 202.

Turio planus vel leviter canaliculatus, glabrescens, aculeis compressis, æqualibus armatus; folia 5-nata, subtus pubescentia, supera cinerascentia, profunde inciso-dentata vel sœpe laciniata, foliolis pinnatisectis; inflorescentia foliosa, brevis, subcorymbosa, laxe pilosa, eglandulosa, aculeis crebris, validis, falcatis armata; sepala aculeata, reflexa; petala trilobata, alba vel dilute rosea; germina glabrescentia; receptaculum glabrum. — Julius.

Subspontaneus: GERMANIA, GALLIA. — Patria ignota.

39 — (T. LXII) — R. GELETTII K. Frider. in Bot. Tidskr. XV p. 237 (1886); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 493; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 56.

Exsicc. — Rub. Dan. et Slesv. n° 39, 40; Assoc. rub. n° 945; Rub. gall. n° 170.

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, glaber vel glabrescens, glandulis nullis vel parum apertis; aculei subæquales, mediocres, e basi compressa, dilatata, reclinatis vel subrectis; folia 5-nata, supra glabra, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, subsimpliciter serrata, dentibus mediocribus, parum profundis; foliolum terminale (1, 2) late ovatum vel ellipticum, basi subcordatum, abrupte acuminatum, breviter petiolulatum, infima petiolulata; petiolus supra planus, sparsim glandulosus, aculeis falcatis armatus; stipulae anguste, lanceolatae, glandulosæ; ramus florifer angulatus, glabrescens, aculeis reclinatis; folia 3-nata, tenuiter serrata, supera subtus cinereo-tomentosa; inflorescentia

(3) inferne foliosa, laxe hirsuta, glandulosa, aculeis validis, rectis vel reclinatis armata; *pedunculi* medii patuli, 2-4-flori, pedicellis brevibus; *sepala* tomentosa, pilosa, parce aculeata glandulosaque, in flore et fructu reflexa (4), *petala* ovata (5), alba; *stamina* alba stylos virescentes longe superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. *Pollen* imperfектum (6). — Julius-augustus.

β. HOLUBYANUS; *R. Dechenii* Holuby, *exsicc.* 1898 (non 1895), non Wirtg. — Folia grosse serrata (7), subtus parum tomentosa; rachis laxe pilosa; *stamina* stylos parum superantia.

DANIA: Fünen, Jutlandia; GERMANIA BOREALIS: Slesvig, Brandsoe, Schleswig, Flensburg, Engelsby. — BRITANNIA: Sussex, Surrey, Carmarthen, Ross, Suffolk, Dublin, etc. (M. Rogers). — β. HUNGARIA: Podhrad, Trencin (Holuby).

OBS. — M. Focke le subordonne au *R. silesiacus* Wh., mais ce dernier est tout à fait virescent et a les aiguillons beaucoup plus faibles. M. M. Rogers le place dans le voisinage du *R. anglosaxonicus* Gelert (*R. apiculatus* Wh.), qui est très hétéracanthe et appartient aux *R. Radulae* Focke.

▲ 10 — (T. LXIII) — *R. LINDLEYANUS* Lees *Phyt.* III, 361 (1888); Bab. *Brit. Rub.* p. 75; Focke *Syn.* p. 143; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 28; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 58; *R. nitidus* Bell. Salt. in *Phyt.* 2, 101 (1845), non W. et N.; *R. leucostachys* Lindl. non Sm.; *R. vulgaris* C. Lindleyanus Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 482 (1902).

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 607; *Set of Brit. rub.* n° 29; Sud. *Bat. eur.* n° 303.

Turio (1) arcuatus, angulatus, faciebus planis, parce pilosus, eglandulosus; *aculei* subæquales, crebri, e basi compressa, recti vel reclinati; *folia* 5-nata (2, 3), supra glabra, subtus pubescens, leviter cinerascentia, inæqualiter et duplicito-serrata, dentibus parum profundis; *foliolum* terminale ovatum, rhombeum vel obovatum, basi rotundatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima breviter petiolulata; *petiolus* obsolete excavatus, pubescens, aculeis falcatis armatus; *stipulae* anguste lanceolatae, eglandulosæ; *ramus florifer* angulatus, aculeis reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata foliolis terminalibus rhombis vel cuneatis; *inflorescentia* (4) elongata, paniculata, interrupta, saepe usque ad apicem foliosa, piloso-hirsuta, eglandulosa vel glandulosa raris munita, aculeis validis, crebris, reclinatis vel falcatis armata; *pedunculi* medii elongati, valde patuli, 2-3-flori, pedicellis longis, saepe divaricatis; *sepala* tomentosa, breviter mucronata, pilosa, inermia, in flore et fructu reflexa (5); *petala* (6) obovata, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes longe superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. — *Pollen* parum admixtum (7). — Julius-augustus.

Foliola *R. vulgaris* W. et N. revocant, sed inflorescentia laxior, hirsuta, pedunculi patenties, pedicelli divaricati. sepalæ reflexa, flores minores.

BRITANNIA; GERMANIA BOREALIS: Bentheim, Burgsteinfurt, Borghorst, etc. (Focke). ; GALLIA: Tarn, Lacaune, Pierreségade; Gironde?

Series b. — SUBDISCOLORES Sud.

Conspectus specierum

I. — Inflorescentia eglandulosa vel in bracteis glandulis raris, brevibus, munita; rami aculei æquales vel subæquales.

A. — Inflorescentia aculeis validis armata, interdum subinermis, sed tum flores rosei.

a. — *Turio* glaber vel parce pilosus, raro pruinosis.

1. — *Folia* ramealia minute denticulata; *turio* parce pilosus.

a. — *Foliolum* caulinum terminale suborbiculare; *folia* subtus appresse tomentosa; bractæ breviter glandulosæ....

b. — *Foliolum* caulinum terminale obovatum; *folia* subtus pubescentia; bractæ eglandulosæ....

2. — *Folia* ramealia grosse serrata; *turio* saepe glabrescens; *folia* subtus pubescentia.

b. — *Turio* pruinosis, dense pilosus; flores albi vel dilute rosei....

B. — Inflorescentia inermis vel aculeis debilibus munita; foliola ampla; flores a'bi....

II. — Inflorescentia in bracteis pedunculisque glandulosa; ramus leviter heteracanthus.

A. — *Turio* planus, ± pilosus, saepe pruinosis; *folia* grosse vel mediocriter serrata....

B. — *Turio* canaliculatus, glaber, epruinosus; *folia* grosse serrata....

▲ 11 — (T. LXIV) — *R. ARGENTEUS* W. et N. *Rub. germ.* p. 45 t. XIX (1825); Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 480; *R. Horstensis* Banning in Focke *Syn.* p. 206 (1877); G. Braun, *exsicc.*; *R. rhombifolius* P.-J. Müll. in Pollich. (1859) p. 293 (nomen); *R. secophilus* Gen. *Ess. mon.* (1869) p. 178; *R. pubescens* Gen. *Mon.* p. 271, *ex pte*, non Wh.; *R. racemosus* Genev. *Ess. mon.* p. 180 (1869), *Mon.* p. 214, non Opiz; *R. Dechenii* Holuby, *exsicc.* p. p., non Wirtg.; *R. praecultus* (Lef.) *Gen. Mon.* p. 237?

Exsicc. — Wirtgen *Hb. rub. rh.* ed. 1 n° 81 (*R. vulgaris* v. *rhombifolius*); Baenitz *Hb. eur. ann.* 1885 (*R. arduennensis* v. *platythyrsus* Utsch.).

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, parce pilosus, eglandulosus; *aculei* æquales, e basi compressa, dilatata, recti vel subcurvati; *folia* 5-nata (1), supra glabrescentia, subtus molliter pubescentia, supera cinereo-tomentosa, grosse et duplicito-serrata, dentibus inæqualibus, acutis; *foliolum* terminale ovatum vel obovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima breviter petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis subsessilibus instructæ; *ramus florifer* obsolete angulatus, pilosus, aculeis falcatis; *folia* 3-nata, grosse serrata, supera subtus molliter pubescentia, albo-tomentosa; *inflorescentia* (2) pyramidalis, inferne foliosa, laxe hirsuta, aculeis mediocribus, redinatis vel subfalcatis armata; *pedunculi* medii patuli vel patulo-ascendentes, 2-3-flori, pedicellis brevibus; *glandulae* nullæ vel in bracteis sparsis, brevibus; *sepala* tomentosa, pilosa, parce aculeata, in flore et fructu reflexa (3); *petala* (4) ovata, pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra. — Julius.

β. LONGICUSPIDATUS Sud. *Bat. eur.* p. 79 (1908); *R. longicuspidatus* Boul. et Lucand, *ex pte* (1879). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 312; *Set of Brit. Rub.* n° 58; *Bat. eur.* n° 271. — *Foliola* angustiora, terminalia (5) elliptica, longe acuminate; rachis hirsuta, saepe sparsim glandulosa.

γ. MEDIOXIMUS Sud. *Rub. tarn.* (1909). — *Foliolum* terminale ovatum, subemarginatum, breviter acuminatum; dentes profundi; *petala* rosea; *stamina* pallide rosea.

δ. EMPELIOS; *R. empelios* Focke *ap.* Goetz B. V. Baden III, 152 (1894); *R. carpinifolius* B. *empelios* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 467 (1902). — Gracilis; *folia* supra pilosa; *foliolum* terminale rhombéum. Cetera ut in *R. argenteus*.

ε. GRANITICARUM. — *Foliolum* terminale ovatum; dentes mediocres; *pedunculi* patuli; flores albi; *turio* ramusque subheteracanthi.

R. polyanthemus Lindg. 42

Cf. *R. LINDEBERGH* P.-J. Müll. 54

R. argenteus W. N. 41

R. lasiothyrus Sud. 43

R. albiflorus B. et Luc. 44

R. alterniflorus M. et L. 45

R. Mercieri Gen. 46.

ζ. CLIVICOLUS ; *R. argentatus* v. *clivicola* A. Ley *Journ. bot.* (1896) p. 158; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 40; *R. oplothyrsus* v. *clivicola* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 33. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 114. — *Turio glaucescens*, aculeis crebris armatus; foliolum terminale obovato-orbiculare, abrupte acuminatum; inflorescentia sparsim glandulosa, aculeis falcatis armata; flores pallide rosei. — *Glandulæ sparsæ*, aculei crebri *R. oplothyrsus* revocant.

η. CASTROLINENSIS Sud. *Bat.* p. 79 (1903); *R. castrolinensis* Sud. *Ronc. bret.* p. 10 (1904). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 272 ! — *Turio subteres*; foliolum terminale (6) oblongo-obovatum. abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio quadruplo vel quintuplo longius; germina pilosa. Cetera ut in *R. argenteo*.

θ. ARMATISSIMUS Sud. *Bat. eur.* p. 80 (1908) et exsicc. n° 273 ! — *Turio* (7) pilosus, angulatus, aculeis validis, crebris, rectis armatus; folia subtus molliter pilosa, grosse et duplicato-serrata; foliolum terminale rhombicum, basi fere integrum; inflorescentia foliosa, eglandulosa, aculeis crebris, validis, rectis vel falcatis armatissima (8); sepala aculeata; flores albi vel pallide rosei. *R. consobrino* v. γ similis a quo differt turione pilosiore, foliolis terminalibus rhombicis.

GERMANIA : *Guestphalia*, Minden (Weihe), *Prov. rhénane*, *Silesia*, Gross-Strehlitz (Kinscher); HUNGARIA : Trencin (Holuby); GALLIA : *Tarn*, *Eure*, *Sarthe*, *Valois*, *Vendée*. — β. BRITANNIA : *N. Somerset*, Woollard (Fry); GALLIA : *Turn*, *Carmaux*; *Saône-et-Loire*, Autun (Lucand). — γ. GALLIA : *Tarn*, *Carmaux*. — δ. GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz). — ε. GALLIA : *Vendée*, Mortagne. — η. GALLIA : *Finistère*, Châteaulin. — θ. GALLIA : *Loire-Inf.*, La Haye (de l'Isle); Vigneux (Henry), etc.

HYBRIDÆ

R. ARGENTEUS v. η × *ULMIFOLIUS*; *R. AULNINUS* Sud. *Ronc. bret.* p. 11 (1904). — Differt a *R. argenteo* var. η foliis amplioribus, discoloribus, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : *Finistère*, Châteaulin.

R. ARGENTEUS × *ERICETORUM* Sud. *Diagn.* p. 14 (1906); *R. ASPERIFLORUS* Sud. l. c. — Differt a *R. argenteo* W. N. aculeis inaequalibus, foliis argute serratis, glandulis tenuibus frequentibus, floribus roseis. Sterilis.

GALLIA : *Valois*, laie de Briolles (Questier).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Foliolum caulinum terminale basi rotundatum, interdum obovato-emarginatum.

A. — *Turio* parce pilosus; ramus florifer pilosus; inflorescentiae rachis hirsuta.

a. — Rubi fertiles; flores vulgo rosei.

1. — *Turionis* aculei validi, basi compressa, dilatata.
 - a. — *Stamina* stylique pallida; bractæ glandulosæ.....
 - b. — *Stamina* rosea; stylæ rubri; bractæ eglandulosæ.....
2. — *Turionis* aculei debiles, e basi parum dilatata.
 - a. — *Turio* obtusus; foliolum caul. terminale ovatum vel late obovatum.....
 - b. — *Turio* canaliculatus; foliolum terminale anguste obovatum.....

b. — Rubi parum fertiles; flores albi; rachis dense hirsuta.....

B. — *Turio* glaber; ramus florifer glabrescens; rachis laxe pilosa; flores rosei.....

II. — Foliolum caulinum terminale basi dilatatum, cordatum.

A. — Sepala in flore et fructu reflexa.

a. — Inflorescentia aculeis crebris armata; turio manifeste angulatus; folia caulinæ 5-nata.

1. — *Turio* epruinosus, raro subglaucescens, fere glaber; glandulæ nullæ sel sessiles; pedunculi patulo-ascendentes.....
2. — *Turio* epruinosus, pilosus; bractæe glandulosæ; inflorescentia valde elongata
3. — *Turio* pruinosus, glabrescens; bractæe glandulosæ; inflorescentia brevis.....

b. — Inflorescentia subinermis; petala rosea.

1. — *Turio* canaliculatus, subpruinosus; folia caulinæ 5-nata.....
2. — *Turio* obsolete angulatus, epruinosus; folia caulinæ 3-4-5-nata.....

B. — Sepala post anthesin patula, in fructu laxe reflexa; turio glabrescens.

- a. — *Stamina* stylos virescentes superantia; turio epruinosus.....
- b. — *Stamina* stylos sequantia; turio glaucescens.....

b. — (T. LXV) — *R. uncinatifactus* Sud. *Diagn.* p. 20 (1906).

Turio (1) canaliculatus, pilosus; aculei debiles, inaequales, subconici; folia supra pilosa, subtus cano-tomentosa, pilosa, argute serrata; foliolum terminale (2) obovatum, acuminatum, breviter petiolulatum; rami aculei parvi, inaequales; inflorescentia brevis, foliosa, pedunculis (3) elongatis, ascendentibus, glandulis sessilibus obsita; petala obovata (4); germina pilosa. — *R. pubescens* admodum similis, a quo differt aculeis debilioribus, foliis subtus pilosis.

GALLIA : *Valois*, De Boursonne à Villers-Cotterets, champ familial (Questier); *Seine-et-Oise*, Montfort-l'Amaury (M^{me} Bélèze).

c. — (T. LXV) — *R. mollitus* Sud. *Rub. tarn.* (1909).

Differt a *R. argenteo* W. N. : *turione* obtuso, piloso, aculeis crebris, debilibus; foliis subtus molliter pubescentibus, grosse serratis; foliolæ terminali (5) ampio, late obovato vel ovato, cuspidato vel breviter acuminato; inflorescentia ampla, valde laxa, pedunculis patulis (6); petalis (7) suborbicularibus, roseis; staminibus inferne rubris, stylis roseos superantibus. Pollen quasi purum. — Folia ampla *R. macrophyllum* W. N. revocant.

GALLIA : *Tarn*, Lacabarède.

d. — (T. LXV) — *R. aurensis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 101 (1901); *Bat.* p. 80.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 274 !

Differt a *R. argenteo* W. N. : foliis mollibus, flaccidis, supra pilosis, grosse serratis, dentibus latis, parum profundis; foliolæ terminali ± obovato (8); inflorescentia aphylla, dense piloso-hirsuta, subglandulosa, bracteis latis (9); floribus albis (10). Fructus male evolutus; pollen valde imperfectum. — An *R. consobrinus* × ?

β. BREVISPINUS Sud. l. c. p. 102. — Aculei parvi, conici, inaequales.

GALLIA : In *Pyrenæis*, vallis Aurensis, Luchon, frequens; *Haute-Garonne*, Eaunes, prope Muret.

- R. argenteus* W. N.
R. INCARNATUS P.-J. Müll. C.
R. MOLLITUS Sud. c.
R. UNCIATIFACTUS Sud. b.
R. AURENSIS Sud. d.
R. CRYPTADENES Sud. D.

- R. CONSOBRINUS* Sud. B.
R. GYMNOTHYRSUS Sud. b.
R. OPLOTHYRSUS Sud. E.
R. CALLIMORPHUS Sud. F.
R. MULTIVAGUS Sud. G.
R. GNEISSOGENES Sud. H.
R. FIRMATUS Sud. H. b.

HYBRIDA

R. AURENSIS × *ULMIFOLIUS*; *R. SEMIAURENSIS* Sud. — Differt a *R. aurensi* foliis supra glabris, subtus appresse albo-tomentosis, floribus vive roseis, sterilibus.

GALLIA: Haute-Garonne, Eaunes.

B. — (T. LXV) — *R. consobrinus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 46 (1899) et 103; *Fl. Toul.* p. 72.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 275!

Turio angulatus, faciebus planis vel leviter canaliculatis, interdum subglaucescens, sparsim pilosus, aculeis validis, crebreis armatus; *folia* 5-nata, grosse et inaequaliter serrata, subtus molliter pubescentia, supera albo-tomentosa; *foliolum terminale* (11) late ovatum vel suborbiculare, cordatum, abrupte et breviter acuminatum; *ramus florifer* angulus, pilosus, aculeis validis, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtus pilosa, discolora; *inflorescentia* ± foliosa, hirsuta, eglandulosa, pedunculis ± ascendentibus (12), multifloris, aculeis ± validis armata; *sepala* hirsuta, interdum aculeata, reflexa; *petala* (13) ovata, alba vel dilute rosea; *stamina* alba styllos virescentes superantia; *germina* glabra; *receptaculum* parum pilosum.

♂. *ROSEIFLORUS* Sud. *Bat. p.* 21 (1904). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 333 (s. n. *R. bipartiti*); Sud. *Bat. eur.* n° 61. — Foliola terminalia ovata; aculei pervalidi; petala, stamina stylique pallide rosea.

γ. *FEROX* Sud. in hb. Müller; *R. stereacanthus* Genev. *Ess. Mon.* p. 189, non P.-J. Müll.; *R. appendiculatus* Gen. *Mon.* p. 348, p. p., non Trat.; *R. consobrinus* Bouvet *Rub. Anjou* (1903) p. 676; (1907) p. 19; *R. amplificatus* Gen. *Mon.* p. 209, non Lees. — Validus; aculei crebri; inflorescentia valde armata; flores albi vel pallide rosei. Intermedius inter *R. consobrinus* et *R. nitidum* W. N.

δ. *REFULGENS*; *R. refulgens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 41 (1899). — Folia ampla ut in *R. macrophyllum*, sed aculeis validis, foliis discoloribus. Foliolum terminale orbiculare, longe petiolatum; pedunculi patuli, multiflori, aculeis sparsis armati; flores pallide rosei.

ε. *OSSALENSIS*; *R. ossalensis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 100 (1901). — *Turio* glaucescens, glaber; folia supra obscure viridia; inflorescentia ampla, multiflora, pedunculis elongatis, sparsim glandulosis; petala rosea; stamina alba, styli virescentes; germina pilosa.

ζ. *MACROACANTHUS*; *R. macroacanthus* W. et N. *Rub. germ.* p. 44. t. XVIII (1825); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 506. — *Turio* (14) aculeis crebris armatus; folia grosse serrata; rami aculei breves, crebri, falcati; inflorescentiae aculei debiles; petala bifida, rosea; stamina inferne rosea.

η. *ERYTHRAXENDER* Sud. *Fl. Toul.* p. 72 (1907). — Folia subtus leviter pilosa; foliolum terminale orbiculare, cordatum, acuminatum, longe petiolatum; inflorescentia aculeis debilibus armata; petala rosea; stamina rubra, styli carnei; germina glabra.

GERMANIA: *Guestphalia*; GALLIA; LUSITANIA? — β. et γ. *GALLIA BOREALI-OCCIDENTALIS*. — δ. GALLIA: Ariège, Orlu. — ε. GALLIA: Basses-Pyrénées, Eaux-Chaudes. — ζ. GERMANIA: *Guestphalia*, Minden (Weihe). — η. GALLIA: Haute-Garonne, Bouconne.

HYBRIDÆ

R. CONSOBRINUS × *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. SEMIFAGICOLA* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 22! — Habitus *R. consobrinus*, sed minus discolor, folia latiora, aculei crebri. Fructus male evolutus.

GALLIA: *Tarn*, Sales, prope Lacabarède.

R. CONSOBRINUS var. γ × *QUESTIERI*; *R. ANGULOSIDENTATUS* Sud. et Bouv. in *Bouvet Rub. Anj.* (1907) p. 64. — Folia grosse serrata, subvirescentia; foliola minus lata quam in *R. consobrino*; inflorescentia parum hirsuta; flores rosei. Sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Maine (Bouvet).

R. CONSOBRINUS × *ULMIFOLIUS tetragonophyllum*; *R. CONSOBRINIFORMIS* Sud. hb. — Pubes ut in *R. consobrino*, folia argute serrata ut in *R. ulmifolium* *tetragonophyllum*.

GALLIA: Haute-Garonne, Luchon.

R. CONSOBRINUS × *BIFRONS* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. SEMICONSOBRINUS* Sud. l. c. — Manifeste discolor; folia minute serrata; petala rosea. Cetera ut in *R. consobrino*.

GALLIA: *Tarn*, inter Espérausses et Soulègre.

R. CONSOBRINUS × *TOMENTOSUS Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. OBTUSATIFORMIS* Sud. l. c. — Differt a *R. consobrino*: aculeis debilibus, subinæqualibus, foliis albo-tomentosis, dentibus latioribus, petalis angustioribus, albis. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Mazamet.

R. CONSOBRINUS var. γ. × *ADSCITUS*; *R. NUBILUS* Sud. *Diagn.* p. 14 (1906). — Aculei validi ut in *R. consobrino*, sed foliolis angustioribus, inflorescentia parce glandulosa. Sterilis.

GALLIA: Loire-Inf., Goulaine (de l'Isle).

R. CONSOBRINUS × ex *appendiculatus* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. EGNUMULUS* Sud. l. c. — Habitus *R. consobrini* sed leviter heteracanthus, inflorescentia sparsim glandulosa, petala alba, angusta. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, La Cabane.

R. CONSOBRINUS × *OBSCURUS* v. *jucundiflorus* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. VALDEHIRSUTUS* Sud. l. c. — Parum heteracanthus; folia subtus molliter pilosa, cinerascentia; rachis valde hirsuta, glandulitis sparsis munita; flores pallide rosei. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Tain.

R. CONSOBRINUS × *SCHLEICHERI irruptatus* Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. LUTEIMICANS* Sud. l. c. — Discolor, glandulosus heteracanthusque; folia 3-5-nata; inflorescentia ampla, flores albi, sepala patula; sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Lacrouzette, via Pont-de-Luzières.

R. CONSOBRINUS var. β × *SERPENS* (grex) Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. LUTEOLUS* Sud. l. c. — Folia ut in *R. consobrino* sed parte 3-nata; inflorescentia inordinata, glandulitis longis munita; sepala erecta, flores albi.

GALLIA: *Tarn*, Cambon.

b. — (T. LXV) — *R. gymnothrysus* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 294 (1903) et exsicc.; Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 20; *R. gymnostachys* Genev. *Mon.* p. 228, ex pte!

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 101.

Differt a *R. consobrino*: turionibus pilosioribus, foliis minute serratis, subtus subappresso tomentosis, foliolo termi-

nali (15) subquadrato, abrupte acuminato, longe petiolulato; *inflorescentia* elongata, aphylla, aculeis validis armata, pedunculis valde patulis, pedicellis brevibus. *Petala* rosea; *stamina* alba, *styli* virescentes; *bractae* glandulosæ.

GALLIA: Maine-et-Loire, Torfou, bois du Couboureau (Genevier, Sudre); Corrèze, Bort; Saône-et-Loire, Autun (Gillot).

Obs. — Genevier ayant confondu sous le nom de *R. gymnostachys* au moins 4 plantes différentes, ce nom ne saurait être conservé. Le *R. gymnostachys* Auct. Anglor. n'est pas identique à ceux de Genevier; les *R. macrothyrsus* Lange, *festivus* M. et Wirtg. et *obscuriifrons* Wirtg., rapprochés du *R. gymnostachys* par M. Focke, appartiennent aux *R. appendiculatus*.

C. — (T. LXV) — **R. incarnatus** P.-J. Müll. *Vers.* n° 22 (1859), *pr. sp.*; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 24, *non Gen. Mon.* p. 306; *R. macroacanthus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 135, *non W. et N.*; *R. villicaulis* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI, p. 56, *ex pte*; *non R. villicaulis* B. *incarnatus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 516.

Exsicc. — F. Schulz *Hb. norm.* n° 249 (*ex pte*); Sud. *Bat. eur.* n° 115!

Turio faciebus planis, pubescens, epruinosus, aculeis validis armatus; *folia* supra glabra, subtus molliter pubescentia, supera discolora; *dentes* acuti, leviter inæquales, diverse patuli; *foliolum* terminale (16) late ovatum, basi rotundatum, abrupte et breviter acuminatum, cuspide obliqua; *petioli* aculei valde falcati; *inflorescentia* elongata, foliosa, laxe pilosa, pedunculis (17) patulo-ascendentibus, aculeis validis armata; *sepala* inermia vel parce aculeata; *petala* (18) rosea; *stamina* pallide rosea stylos roseos superantia; *germina* glabra. E glandulosæ. — Differt a *R. villicaulis* Kœchl. aculeis curvatoribus, foliis discoloribus, glandulis nullis, etc. *R. Godronii* Lec. et Lamt. similis.

β. *conformis* Sud. *Bat. p.* 53 (1906); *R. conformis* P.-J. Müll. (*ineditus*); Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* (1904); *Diagn.* p. 19. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 157, 276! — *Foliolum* terminale basi minus latum; dentes minus divaricati, rami aculei leviter falcati, *germina* pilosa; *inflorescentia* elongata, ± foliosa.

γ. *SUBINCERTUS* Sud. *Bat. p.* 41 (1905); *R. subincertus* G. Sampaio in *Revista* (1904); *Rub. portug.* p. 31. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 116! — A *R. incarnato* P.-J. Müll. differt: foliis grosse et inæqualiter serratis, aculeis sparsioribus, *inflorescentia* parum pilosa, sepalis subvirescentibus. *R. affini* W. N. admodum similis.

δ. *CALICHROANTHUS* Sud. *Fl. Toul.* p. 72 (1907); *R. callichroanthus* Sud. *Diagn.* p. 21 (1906). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 277! — Validus; *folia* ampla, grosse serrata; *foliolum* terminale breviter obovatum, subcuspidatum; *inflorescentia* aculeis validis armata (19); *petala* magna, late ovata (20), lète rosea; *stamina* stylique rubra. — *Habitus R. Gillotti* N. Boul.

ε. *PSEUDO-NEMORALIS* Sud. *Fl. Toul.* p. 72 (1907); *R. villicaulis* v. *pseudo-nemoralis* Sud. *in hb.* Müller; *Diagn.* p. 12 (1906). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 278! — Aculei validi, in petiolis uncinati; *foliolum* terminale anguste ovatum vel leviter obovatum; *inflorescentia* valde armata; *petala* angusta.

ζ. *LEVENTII* Sud. *in hb.* Müller; *Diagn.* p. 13 (1906). — Exsicc. : *Assoc. Rub.* n° 1151 (s. n. *R. vulgaris*); Sud. *Rub. rar.* n° 23. — A *R. incarnato* P.-J. Müll. differt: turione angulosiore, aculeis validioribus, cuspide foliorum recta, dentibus minus divaricatis; rachide pilosiore, aculeis validioribus armata (21); *petala* elliptica (22), alba vel dilute rosea. *An. rotundatus* P.-J. Müll. var. ?

η. *BREVISPINUS* Sud. *Diagn.* p. 13 (1906). — Aculei tenues, breves; *folia* parum discolora; pedunculi ascendentes; *stamina* stylos vix superantia. Flores?

GERMANY: Alsacia, propre Weissenburg (Müller); BELGIA, Anderghem (du Pré); GALLIA: Valois, Chézy (Questier) — β. GALLIA: Haute-Garonne, inter Grizolles et Fronton. — γ. LUSITANIA: Porto Valongo, Santo Tirso, Povoa de Lanhosa (G. Sampaio); GALLIA: Valois, forêt de Retz (Questier). — δ. GALLIA: Haute-Garonne, Bouconne. — ε. GALLIA: Haute-Garonne, Bouconne; Tarn, Brassac. — ζ. GALLIA: Marne, bois de Mersy et de Rilly (Levent); BELGIA: inter Wolwue-St-Pierre et Anderghem (du Pré). — η. GALLIA: Valois, forêt de Retz, Château-Fée, le Pendu (Questier).

Obs. — P.-J. Müller avait appelé *R. brevipetalus*, *in hb.*, une forme à turion subarrondi et à feuillage virescent qui n'est apparemment qu'une variation du *R. incarnatus*. Fleurs? — ALSACIA: Bienwald (Müller). — Il est possible que la var. *Leventii* ne soit qu'une forme extrême du *R. rotundatus* P.-J. Müll., qu'on pourrait placer dans le voisinage du *R. incarnatus* P.-J. Müll., car il est parfois un peu discoloré. Müller et Genevier avaient rapporté ce *Rubus* au *R. stereacanthus* P.-J. Müll., qui m'en paraît sensiblement différent; ils l'avaient parfaitement distingué du *R. rotundatus* P.-J. Müll. La forme de Belgique (*Assoc. rub.* n° 1151; *Rub. rar.* n° 23) est très peu discoloré.

HYBRIDÆ

R. INCARNATUS × *MACROPHYLLUS* Sud. *Diagn.* p. 13 (1906); *R. INCARNATIFORMIS* Sud. l. c. — A proximo *R. incarnato* P.-J. Müll. sed *folia* ampla, subtus viridia, aculei sparsiores; pollens valde imperfectum.

GERMANY: Alsacia, Weissenburg (P.-J. Müller).

R. INCARNATUS v. *conformis* × *ULMIFOLIUS* Sud. *Fl. Toul.* p. 72 (1907); *R. PUGIONIFER* M. et Timb. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*). — Differt a *R. incarnato* var. β.: turione subpruinoso, foliis discoloribus, floribus sterilibus.

GALLIA: Haute-Garonne, Grizolles, à Bel-Soulel, au Grand-Bois.

R. INCARNATUS × *GODRONII* Sud. ap. Gdg. *Nov. Cons.* p. 138 (1905); *R. FALCIFER* P.-J. Müll. *Vers.* n° 16 (1859). — *Folia R. incarnatum revocant, sed inflorescentia laxior, foliosa, brevis; fructus male evolutus.*

GERMANY: Alsacia, La Reissbach, prope Weissenburg (P.-J. Müller).

D. — (T. LXVI) — **R. cryptadenes** Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 31 (1904); *R. erythrinus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 28, *non Genev.*; *R. elegans* Utsch, *non P.-J. Müll.*

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 108.

Differt a *R. argenteo* W. N.: *turione* (1) glabrescenti, *foliis* minus discoloribus, mediocriter serratis, subtus minus pubescentibus; *ramis* floriferis glabrescentibus, foliolis obovatis; *inflorescentia* (2) laxe pilosa; *floribus* roseis, petalis vulgo bifidis. *Glandulae* rarae, subsessiles.

β. *PUBIRAMUS* Sud. *Bat. eur.* p. 81 (1908). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 279! — Turio canaliculatus; *folia* discolora; *foliolum* terminale obovatum, cuspidatum; *inflorescentia* elongata, laxa, foliosa, multiflora; *sepala* laxe reflexa, *germina* pilosa.

γ. *STEREACANTHOIDES* Sud. *Bat. p.* 81 (1908); *R. stereacanthoides* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 23 (1902). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 280! — *Folia* minute serrata, parum discolora, subtus breviter pubescentia; *inflorescentia* densa; *stamina* alba, *styli* virescentes; *antheræ* pilosæ.

δ. *BIPARTITUS* Sud. *Bat. eur.* p. 81 (1908); *R. bipartitus* Boul. et Bouv. *Assoc. rub. exsicc.*, *ex pte*; Bouvet *Rub. Anj.* (1903) p. 672; (1907) p. 17; *R. appendiculatus* Gen. *Mon.* p. 296, *p. p.*, *non Tratt.*; *R. gratiflorus* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 570, *non P.-J. Müll.*; *R. recognitus* var. *bipartitus* Sud. *prius*. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 570; *Set of Brit. Rub.* n° 6, *ex pte*; Sud. *Bat. eur.* n° 281. — *Foliolum* terminale anguste obovatum (3), emarginatum, abrupte et longe acuminatum; *folia* subtus molliter pubescentia; *rami* aculei minus curvati; *petala* bifida (4); *stamina* pallide rosea.

e. *FLEXICAULIS*; *R. flexicaulis* Genev. *Ess. mon.* p. 198 (1869); *Mon.* p. 211, *ex pte*; Bouv. *Rub. Anjou* p. 678; *R. Reichenbachii* Bor. *Fl. cent. éd.* 3 p. 196, *non W.* et N. — *Turio planus*, pubescens, flexuosus; rami aculei elongati, reclinati; pedunculi patuli; stamina stylique pallida; folia discolora. *Intermedius inter R. argenteum et R. cryptadenem.*

BRITANNIA: GERMANIA: *Guestphalia*, Holzwickède (Demandt); **GALLIA:** *Tarn*, *Maine-et-Loire*, *Sarthe*, *Indre-et-Loire*, *Seine-et-Oise*, *Morbihan*, etc. — **β. GALLIA:** *Tarn*, Teulet. — **γ. GALLIA:** *Finistère*, Quimper; **BRITANNIA:** *Yorkshire*, Marsdur (Baker). — **δ. GALLIA:** *Anjou*, *Sarthe*, *Seine*, *Loire-Inférieure*, etc.; **BRITANNIA:** *Surte* (Murray). — **ε. GALLIA:** *Maine-et-Loire*. Montreuil-Belfroy (Genevier, Bouvet).

HYBRIDÆ

R. CRYPTADENES × PYRAMIDALIS; **R. CRYPTADENOIDES** Sud. — Differt a *R. cryptadeni*: turione parce piloso, foliis grosse serratis, subtus viridibus, pilosis.

GALLIA: *Sarthe*, Le Mans, à Pied-Sec (Henry).

R. CRYPTADENES var. **δ × MACROPHYLLOIDES**; **R. CONTRACTIFRONS** Sud. et Bouv. in *Bouvet Rub. Anj.* (1903) p. 686; (1907) p. 63. — Differt a *R. cryptadeni*: foliis subtus viridibus, foliolis latioribus, inflorescentia multiflora, inordinata. Sterilis.

GALLIA: *Maine-et-Loire*, Angers, Beaucozé (Bouvet).

R. CRYPTADENES var. **δ × ULMIFOLIUS**; **R. LUMECTICOLUS** Sud. et Bouv. in *Bouvet Rub. Anj.* (1903) p. 686; (1907) p. 63. — Discolor; inflorescentia multiflora, tomentosa; flores lète rosei. Sterilis.

GALLIA: *Maine-et-Loire*, Angers (Bouvet); *Tarn*, Fabas; *Sarthe*, La Flèche (Launay).

R. CRYPTADENES × GENEVIERI; **R. HEMICRYPTADENES** Sud. — Habitus *R. cryptadenis* sed dentes et inflorescentia *R. Genevieri* Bor.

GALLIA: *Sarthe*, St-Povace, à la Hammerie (Henry).

E. — (T. LXVI) — R. oplotyrsus Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 32 (1904).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 282, 283 !

Validus; *turio* faciebus leviter excavatis, glaucescens, glaber vel pilis rarissimis, aculeis validis, rectis munitus; *folia* (5) supra glabra, subtus appressa cinereo-tomentosa, inaequilatera serrata; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, acuminatum, interdum obovatum, petiolulo proprio triplo longius; *stipulae* glandulosæ; *ramus* parum pilosus, aculeis validis, reclinatis vel falcatis armatus; *inflorescentia* brevis, lata, parum foliosa, pilosa, aculeis crebris, validis, reclinatis vel falcatis munita; *bracteæ* glandulosæ; *pedunculi* medii patuli (6); *sepala* aculeata; *petala* (7) ovata, pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa.

GALLIA: *Sarthe*, Le Mans, Traugé, Amné, Yvré-l'Evêque, etc. (Gentil); Cré-sur-Loir (Launay); *Orne*, La Lande-sur-Eure (Jourdes).

HYBRIDÆ

R. OPLOTHYRSUS × ULMIFOLIUS Sud. in hb. Gentil; **R. AMBROSIANUS** Sud. l. c. — Differt a *R. oplothyrsos*: turionibus valde pruinosis, rachide tomentosa, floribus lète roseis. Pollen atrophum.

GALLIA: *Sarthe*, St-Mars-les-Bruyères (Ambroise Gentil).

R. OPLOTHYRSUS × LEPIDUS Sud. in hb. Henry; **R. OPLOTHYRANTHUS** Sud. l. c. — Aculei et glandulæ ut in *R. oplothyrsos*; turio pubescens; foliola ut in *R. lepido*. Flores rosei, steriles.

GALLIA: *Sarthe*, Chauffour (A. Henry).

F. — (T. LXVI) — R. callimorphus Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 14.

Validus; *turio* suberectus, canaliculatus, glaucescens, parce pilosus, glandulis sessilibus obsitus; *aculei* subæquales, breves, reclinati vel curvati; *folia* magna, supra glabra, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, inaequilatera serrata; *foliolum* terminale (8) late ovatum vel obovato-suborbicular, emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *ramus* pilosus, aculeis brevibus, falcatus vel geniculatis munitus; *inflorescentia* subinermis, pilosa, eglandulosa; *pedunculi* patulo-ascendentes (9); *sepala* inermia; *petala* (10) lète rosea; *stamina* rosea stylos roseos parum superantia; *germina* parce pilosa. — Habitus *R. alterniflori* M. L. sed eglandulosus; *inflorescentia* subinermi *R. clethrophilum* revocat.

GALLIA: *Cantal*, Ytrac, via Sansac.

G. — (T. LXVI) — R. multivagus Sud. *Bat. eur.* p. 81 (1908).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 284 !

Turio obsolete angulatus, glabrescens, aculeis validis, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-4-5-nata (11), supra obscuræ viridia, parce pilosa, subtus molliter pubescentia, cinereo vel albo-tomentosa, minute et subæqualiter serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbicular, leviter emarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolæ* aculei falcatae; *stipulae* lanceolatae, glandulis subsessilibus sparsis munitæ; *ramus* subteres, parum pilosus, aculeis sparsis armatus; *folia* 3-nata, foliolis latis; *inflorescentia* brevis, parum foliosa, piloso-hirsuta, aculeis debilibus, sparsis, reclinatis armata; *pedunculi* (12) patulo-ascendentes, multiflori, bracteis incurvatis, glandulis brevibus, tenuibus, sparsis muniti; *sepala* inermia; *petala* (13) pallide rosea; *stamina* alba, *styli* virescentes; *germina* pilosa. — Folia minute serrata, petala rosea *R. bifrontem* revocant, sed habitus gracilior, folia supra parce pilosa, subtus molliter pubescentia, etc...

GALLIA: *Tarn*, in regione montosa frequens: Alban, Anglés, Lacaune, Brassac, Montagne-Noire, etc.

H — (T. LXVI) — R. gneissogenes Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 285 (1902).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 285 !

Turio faciebus leviter excavatis, glabrescens, glandulis sessilibus, aculeis subæqualibus, parum compressis, relative gracilibus, reclinatis armatus; *folia* 5-nata (14), supra parce pilosa, subtus valde pubescentia, in umbrosis viridia, in apricis cinereo-tomentosa, inæqualiter et duplicito-serrata; *foliolum* terminale ovatum vel subobovatum, emarginatum, acuminatum; *stipulae* glandulosæ; *ramus* angulatus, parce pilosus, aculeis crebris, brevibus, subinæqualibus, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtus molliter pubescentia, supera in apricis manifeste discolora; *inflorescentia* pyramidalis, densa, parum foliosa, hirsuta, glandulis brevissimis, abditis, aculeis mediocribus, reclinatis munita; *pedunculi* medii (15) breves, multiflori, patulo-ascendentes; *sepala* vulgo inermia, in flore patula, in fructu laxe reflexa; *petala* (16) alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa.

GALLIA: *Tarn*, Aveyron, in vallis gneissicis Cérou, Céret, Viaur, Aveyron, etc.

OBS. — Dans les lieux couverts la plante, restant un peu virescente, ressemble beaucoup au *R. carpiniifolius* var. *glanduliger*, mais dans les endroits bien exposés elle devient nettement discolor et a la facies du *R. argenteum* W. et N. Ses poils ne sont pas manifestement pectinés le long des nervures des feuilles, caractère qui l'éloigne du *R. pyramidalis* Kalt., dont elle a parfois les apparences. C'est la plante visée par l'abbé N. Boulay (ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 54) lorsqu'il indique le *R. pyramidalis* dans le Tarn, vallée du Cérou; mais, ainsi que cet auteur le reconnaît lui-même, ce *Rubus* « n'appartient pas directement au *R. pyramidalis* Kalt. malgré les apparences » (N. Boulay, in litt.).

HYBRIDÆ

R. GNEISSOGENES × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. NERVOSUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. gneissogeni* turione pubescenti, foliis discoloribus, appresse tomentosis, rachide epilosa.

GALLIA : *Tarn*, Teulet, Monestiés.

R. GNEISSOGENES × LACERTOSUS Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. RURALIS* Sud. *l. c.* — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 24 ! — Differt a *R. gneissogeni* turione glabrescenti, canaliculati, aculeis validioribus, foliolis latioribus, fructu male evoluto.

GALLIA : *Tarn*, St-Benoit-de-Carmaux.

R. GNEISSOGENES × RUFESCENS v. rosaceiformis Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. SUBHORRIDUS* Sud. *l. c.* — Folia turioque ut in *R. gneissogeni*, sed inflorescentia parce glandulosa, sepala valde aculeata, petala rosea, stamina rubra stylos rubros æquantia.

GALLIA : *Tarn*, La Calquière.

b. — *R. firmatus* Sud. *Rub. tarn.* (1909).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 25 !

Habitus *R. gneissogenis*, sed : *turio* validior, glaber, glaucescens, *inflorescentia* glandulosior, *petala* rosea, *stamina* stylis vix æquantia. *Stamina* stylique post anthesin erubescantia. Intermedius inter *R. gneissogenem* et *R. glaucoxylonem*.

GALLIA : *Tarn*, cum *R. gneissogeni* sed rarior : Tanus, Moulardés, la Cabane, las Planques, etc.

HYBRIDÆ

R. FIRMATUS × IMMUTABILIS Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. callithrysus* Sud. *l. c.* — Differt a *R. firmato* turione piloso, foliis subtus viridibus, inflorescentia multiflora, floribus late roseis, sterilibus.

GALLIA : *Tarn*, Tanus.

R. FIRMATUS × OCCITANICUS Sud. *Rub. tarn.* (1909) ; *R. firmatiformis* Sud. *l. c.* — Habitus *R. firmati* sed heteracanthus glandulosusque ut in *R. occitanico* ; flores rosei, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Tanus.

OBS. — Le *R. pycnanthus* Genev. *Mon. p. 210* (1880) m'est inconnu. L'auteur l'indique dans trois localités de France mais peut-être a-t-il confondu sous ce nom plusieurs formes distinctes.

42 — (T. LXVII) — *R. POLYANTHEMUS* Lindbg. *Bot. Not.* (1883), 105 ; Aresch. *Some Obs. gen. Rub. p. 137* ; Lang. *Handb. ed. 4 p. 774* ; *R. pulcherrimus* Neuman in *Lunds bot. For. byt.* (1882) non Hooker ; Rogers *Handb. Brit. Rub. p. 32*, ex pte ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 478* ; *R. Neumanii* Focke in *Potonié Fl. I, Aufl. 257* (1885) ; *R. umbrosus* Auct. angl. pr. p.

Exsicc. — *Lindg. Herb. Rub. Scand.* nos 16, 35 ; K. Frid. et Gel. *exsicc.* n° 14 ; *Assoc. rub.* n° 946, 1066, 1067, 1068 ; *Rub. gall.* n° 169 ; Sud. *Rub. rar.* n° 26.

Turio (1) angulatus, faciebus planis, pilosus, glandulis sessilibus obsitus ; *aculei* mediocres, subæquales, e basi compressa, recti vel reclinati ; *folia* 5-nata (2), raro 7-nata, coriacea, supra parce, subtus breviter pilosa, cinerascentia vel albo-tomentosa, subtiliter et subsimiliciter serrata ; *foliolum* terminale suborbiculare, basi rotundatum vel subemarginatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata ; *petiolus* aculeis crebris, falcatis vel uncinatis armatus ; *stipulae* glandulis subsessilibus munitæ ; *ramus florifer* angulatus, pubescens, aculeis reclinatis vel falcatis armatus ; *folia* 3-5-nata, subtiliter serrata, ± discolora ; *inflorescentia* (3) grandis, multiflora, basi foliosa, pilosa, glandulis sparsis, brevibus, aculeis mediocribus, ad apicem raris, instructa ; *pedunculi* medii multiflori, leviter ascendentes ; *sepala* tomentoso-virescentia, breviter pilosa, inermia vel parce aculeata, in flore et fructu reflexa (4) ; *petala* (5, 6) suborbicularia, dilute rosea ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* parce pilosa ; *antheræ* glabræ. — Pollen admixtum (7).

SUECIA MERIDIONALIS, DANIA, BRITANNIA, GERMANIA BOREALIS.

OBS. — Se rapproche de certaines formes du groupe du *R. argenteus* W. N. mais a les feuilles bien plus finement dentées. Le n° 54 de *Set of British Rubi*, portant le nom de *R. pulcherrimus* Neum., est plutôt une variation du *R. Lindebergii* P.-J. Müll, qui vient du reste dans la même localité. Cette dernière espèce est placée dans les *R. discolors* P.-J. Müll.

Conspectus speciei et microgenerum

I. — Aculei e basi compressa, dilatata.		
A. — <i>Foliolum</i> caulimum terminale acuminatum.....		<i>R. polyanthemus</i> Lindg.
B. — <i>Foliolum</i> caulimum terminale abrupte cuspidatum.....		<i>R. CUSPIDATIFRONS</i> Sud. et Bouv. b.
II. — Aculei debiles, breves, subconici ; inflorescentia subinermis		<i>R. DUFFORTHII</i> Sud. c.

b. — (T. LXVII) — *R. cuspidatifrons* Sud. et Bouvet ap. Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 21.

Habitus *R. polyanthemi* Lindg. sed *aculei* debiliores, *foliola* manifeste et longe cuspidata, terminale (8) orbiculare vel breviter obovato-orbiculare, emarginatum, abrupte cuspidatum, longe petiolulatum ; *inflorescentia* subinermis, aculeis sparsis munita ; *petala* late obovata (9). Glandulæ in turionibus rarissimæ.

GALLIA : Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy (Bouvet).

c. — (T. LXVII) — *R. Duffortii* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LV (1908) p. 176.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 304 !

Turio pilosus (10) ; aculei debiles, breves, obliqui, subconici ; *foliolum* terminale (11) breviter obovatum, basi rotundatum, cuspidatum ; *ramus* valde pilosus, subinermis, foliolis cuspidatis ; *inflorescentia* elongata, foliosa, subinermis, dense pilosa ; *petala* late (12) ovata, pallide rosea ; *stamina* alba stylos carnosus vix superantia ; glandulæ sessiles frequentes ; *pollen* imperfectum.

GALLIA : Gers, Masseube (Duffort).

43 — (T. LXVIII) — *R. LASIOTHYRSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 92 (1900), p. 105 ; *R. lasiocaulon* Sud. *l. c.* p. 44, non Boul. ; *R. villicaulis* Boreau *Fl. cent. ed. 3 n° 762*, non Köhl.

Turio angulatus, faciebus planis, dense pilosus, pruinosus, glandulis sessilibus obsitus ; *aculei* validi, e basi compressa, dilatata, subæquales, recti vel reclinati ; *folia* (1) 5-nata, supra parce pilosa, subtus molliter pilosa, cinerascentia vel albo-tomentosa, dentibus acutis, mediocribus, inæqualibus ; *foliolum* terminale ovatum vel ellipticum, basi rodun-

datum vel leviter emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* pilosus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis raris, subsessilibus; *ramus florifer* angulatus, valde pilosus, aculeis falcatis armatus, *folia* 3-5-nata, discolora, foliolis acuminatis; *inflorescentia* (2) basi foliosa, piloso-hirsuta, eglandulosa, aculeis validis, leviter falcatis armata; *pedunculi* medii 1-3-flori, patulo-ascendentes; *sepala* hirsuta, parce aculeata, in flore et fructu reflexa (3); *petala* (4) ovata vel obovata, in unguem attenuata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen admixtum (5). — Julius.

β. FLAVESCENTISPINUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 191; *R. flavescentispinus* Sud. l. c. 92 (1900). — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 286. — Gracilis et minus pilosus; foliola angusta, valde acuminata; inflorescentia pauciflora; aculei flavescentes.

γ. FEROX Sud. in hb. Müller. — Inflorescentia valde laxa, pedunculis patulis, elongatis, aculeis crebris, validis munita; sepala aculeata; petala pallide rosea.

δ. FLACCIDIFLORENS. — Folia subitus parum pilosa; foliolum terminale cuspidatum; petala staminaque rosea, pollens valde imperfectum. Hybrida?

ε. OBTUSICAULIS Sud. *Rub. Pyr.* p. 44. — Turio subteres; aculei validi, crebri, arcuati; inflorescentia laxa, glandulis sparsis munita; petala dilute rosea; pollens fere purum.

GALLIA: Pyrénées, Tarn, Cher, Morbihan, Vendée, Manche, Finistère, Loire-Inferieure, Aisne, etc. — β. Cum typo sed rarior. — γ. GALLIA: Manche, Beaumont, à Valognes (Lebel). — δ. GALLIA: Tarn, Cambon. — ε. GALLIA: Ariège, Mérans.

HYBRIDÆ

R. LASIOTHYRSUS × ... ?; *R. INOPS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 62 (1900); *R. continens* × *ulmifolius* Sud. l. c. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 287! — Differt a *R. lasiothyrso*: turione epruinoso, foliis parvis, minute serratis, petalis roseis, staminibus stylis brevioribus. Sterilis.

GALLIA: In Pyrenæis Aurigeræ, circa Foix.

R. LASIOTHYRSUS × *BRACHYTHYRSUS* Sud. *Diagn.* p. 15 (1906); *R. INEXTRICABILIS* Sud. l. c. — Diflert a *R. lasiothyrso* foliis minus discoloribus, foliolis obovatis, inflorescentia valde multiflora. Sterilis.

GALLIA: In Pyrenæis, circa Luchon.

R. LASIOTHYRSUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 105 (1901); *R. ACARPUS* Sud. l. c. — Pubes *R. lasiothyrso* sed petala, stamina stylique rubra. Sterilis.

GALLIA: Hte-Garonne, Cier.

R. LASIOTHYRSUS × *TIMENDUS*?; *R. VESTITICAULIS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 44 (1899). — A proximo *R. lasiothyrso* a quo differt: ramo inflorescentiaque glandulosis, floribus roseis. Sterilis.

GALLIA: Ariège, St-Lizier-d'Ustou, via Belle.

R. LASIOTHYRSUS × *SERPENS*; *R. EGENS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 106 (1901). — Differt a *R. lasiothyrso* turionibus obtusis, aculeis valde inæqualibus, foliis tenuiter serratis, subtus viridibus. Fert glandulas breves crebrasque.

GALLIA: Hte-Garonne, Cier.

Conspectus speciei et microgeneri

I. — Folia supra parce pilosa.		
A. — Foliola terminalia acuminata; aculei basi dilatati; serratura inæqualis; petala anguste ovata.		<i>R. lasiothyrus</i> Sud.
B. — Foliola coriacea, terminalia acuta; aculei basi subconici, inæquales; serratura subsimplex; petala late ovata, alba.....		Cf. <i>R. pilifer</i> Sud. n° 62.
II. — Folia supra glabra, inæqualiter serrata; foliolum terminale obovatum.....		<i>R. PROLONGATUS</i> Boul. et Let. b.

b. — (T. LXVIII) — *R. prolongatus* Boul. et Letendre *Assoc. rub.* (1875); *Corb. Fl. Norm.* p. 203; *N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 87.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 178, 831, 890, 891; *Ch. Magnier, Fl. sel.* n° 248; *Rub. gall.* n° 162.

A *R. lasiothyrso* differt: turione debiliore, pilosiore; foliis (6) parvulis, 3-5-natis, supra glabris, inæqualiter serratis; foliolo terminali obovato, basi integro, cuspidato, breviter petiolatato; inflorescentia brevi, obtusa, minus armata. Petala (7) alba vel dilute rosea. Eglandulosus.

Per latera fossarum et ad sepes. — GALLIA BOREALIS: Seine-inf., forêt du Grand-Quevilly (Letendre); Manche (Corbière).

HYBRIDA

R. PROLONGATUS × *QUESTIERI*; *R. CONFERTUS* Sud. hb. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 628 (s. n. *R. prolongati*). — Subvirescens; inflorescentia laxe pilosa, parce glandulosa; flores *R. Questieri* Lef. et M.

GALLIA: Seine-inf., Grand-Quevilly (Letendre).

— (T. LXIX) — *R. ALBIFLORUS* Boul. et Lucand *Assoc. rub.* n° 365, *Annot.* p. 4 (1881); *R. macrophyllum* Sbsp. *albiflorus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 51; *R. Lingua* Bor. *Fl. cent. ed. 3* n° 741, non W. et N.; *R. flaccidus* Genev. *Mon.* p. 300, *ex pte*, non P.-J. Müll.; *R. macrophyllum* Gremli *Beitr.* p. 44, *ex pte*; *R. cavaticaulis* Boul. et Gillot, *ex pte*, *Assoc. rub.* n° 100, 329; *R. luxurians* Rip., Genev. *Mon.* p. 193 (1860), *ex pte*.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 100, 329, 365, 534, 1141, 1142, 1143; *Rub. gall.* n° 64; *Sud. Bat. eur.* n° 118.

Validus; *turio* (1) arcuato-procumbens vel scandens, angulatus, faciebus leviter canaliculatis, pilis sparsis, subadpressis; *aculei* validi, sparsi, e basi compressa, dilatata, recti vel reclinati; *folia* (2) magna, *R. macrophyllum* revocant, flaccida, supra parce pilosa, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pilosa, saepè subflavescens, grosse et duplicito-serrata, dentibus inæqualibus, angulosis; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, sensim acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis sparsis, validis, falcatis armatus; *stipulae* glandulosæ; *ramus florifer* elongatus, angulatus, dense pilosus, aculeis rarioris instructus; *folia* 3-5-nata, vulgo manifeste discolora, rarissime (in umbrosis) subvirescentia. *Inflorescentia* (3) inferne foliosa, dense piloso-hirsuta, subinermis; *pedunculi* medii 1-3-flori, valde patenties; *bracteæ* glandulis brevibus, rarioris, munitæ; *sepala* tomentosa, hirsuta, inermia, eglandulosa, in flore et fructu reflexa (5); *petala* (4) magna, ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes longe superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen valde imperfectum (6). — Julius-augustus.

In locis silvaticis montosis et ad ripas profluentum. — GALLIA MEDIA ET ORIENTALIS: Saône-et-Loire, Côte-d'Or, Yonne, Puy-de-Dôme, Allier, Cher, Ardèche, Rhône, etc. — HELVETIA, circa Schaffhouse (Gremli). — BAVARIA, Rückersdorf (A. Scherzer).

HYBRIDÆ

R. ALBIFLORUS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 42; *R. EXCAVATICAULIS* Sud. *I. c.* — Differt a *R. albiflorus* B. et Luc. : turionibus canaliculatis, foliis manifeste discoloribus, grosse serratis, inflorescentiae bracteis latis.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Arlanc.

R. ALBIFLORUS × ROSACEUS drepanophorus Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 42; *R. LATIORIFRONS* Sud. *I. c.* — Aculei leviter inaequales; folia 3-5-nata, inflorescentia brevis, glandulosa, sepala patula, flores rosei, stamna brevia. Fructus male evolutus.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Arlanc, prope Mons.

Obs. — Le *R. albiflorus × Menkei* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 107; Assoc. Rub. n° 331, semble bien dériver aussi du *R. albiflorus* B. et Luc., mais l'autre parent est douteux. — *Saône-et-Loire*, Brion.

b. — (T. LXIX) — *R. flaccidulus* Sud. *Rub. tarn.* (1909).

Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 27 (var.).

Differt a *R. albifloro* B. et Luc. : turionibus (7) minus validis, planis, pilosioribus; foliis (8) subtus albo-tomentosis, ± argute serratis, minus amplis; inflorescentia densiore, minus hirsuta, floribus minoribus.

GALLIA : *Tarn*, Teulet, Anglés, Albi.

45 — (LXX) — *ALTERNIFLORUS* M. et Lef. *Vers. n° 99* (1859); Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 51, *Ronc. bret.* p. 12; Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 21, non *Genev. Mon.* p. 213.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10374; Sud. *Bat. eur.* n° 305; *Rub. rar.* n° 28!

Validus; *turio* arcuato-procumbens, faciebus planis vel subexcavatis, ± glaucescens, parce pilosus, glandulis raris, brevibus instructus; *aculei* subæquales, e basi compressa, recti vel reclinati; *folia* (1) 5-nata, supra glabrescentia, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pubescentia, argute serrata; *foliolum* terminale breviter ovato-suborbiculare vel obovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, cuspidatum vel breviter acuminatum, saepe longe petiolatum; *petiolus* aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, tenui glandulosæ; *ramus florifer* angulatus, pilosus, sparsim glandulosus, aculeis mediocribus, reclinatis vel falcatis armatus; *folia* discolora, argute serrata; *inflorescentia* (2) pyramidalis, laxa, inferne foliosa vel aphylla, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis mediocribus, reclinatis vel subfalcatis armata; *pedunculi* medii patul vel patulo-ascendentes, elongati, multiflori; *sepala* tomentosa, laxe pilosa, parce glandulosa, saepe aculeata, in flore et fructu reflexa (3); *petala* (4) ovata, rosea; *stamina* alba vel pallide rosea, styllos virescetes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* glabrescens. Fertilis. Pollen admixtum (5). — A *R. argenteo* W. et N. turionibus ± pruinosis, inflorescentia glandulosa recedit; aculeis validis, subæqualibus, foliis caulinis discoloribus, 5-natis, a *R. adscito* Genev. facile distinguitur. — Julius.

β. *CLAVAUDII*; *R. Clavaudii* N. Boul. *Assoc. rub. exsicc.* n° 629 (1884); ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 88; Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 22. — Robustissimus; *turio* glabrescens; *petala* late rosea; *stamina* stylique pallide rosea.

γ. *GYNMOSTACHYS* Sud. *Bat. eur.* p. 82 (1908) et *exsicc.* n° 288!; *R. gymnostachys* Gen. *Mon.* p. 223, *ex pte.* — *Foliolum* caul. terminale late obovatum, cuspidatum; inflorescentia magna, elongata, fere aphylla, laxe, armatissima, pedunculis patulis (6); *sepala* aculeata; *germina* pilosa.

In locis silvaticis siliceis et in dumetis. — GALLIA : *Aisne*, *Oise*, *Bretagne*, *Vendée*, *Anjou*, *Tarn*, etc.; GERMANIA : *Guestphalia*, *Bavaria*, etc. — β. GALLIA : *Gironde*, Martillac (Clavaud); *Maine-et-Loire*, Montreuil-sur-Maine (Bouvet). — γ. GALLIA : *Maine-et-Loire*, bois du Couboureau (Genevier, Sudre)

Obs. — Je n'ai pas vu de spécimens des *R. pyramidatus* P.-J. Müll. in *Jahr. Pollich.* (1859) p. 291 et *Banningii* Focke *Syn.* p. 262 (1877), ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 511. D'après les descriptions des auteurs ces *Rubus* ne paraissent pas différer du *R. alterniflorus* M. et Lef. tel que le comprends.

Le *R. centronotus* Kerner *Pl. spec.* III p. 118 (1871); Halac. *Oest. bromb.* p. 233 appartient peut-être au même groupe; il m'est inconnu. — *Turio* glabrescens; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum; *rachis* breviter pilosa; *petala* alba, *stamina* stylos vix æquautia; *germina* pilosa. — AUSTRIA : *Tirol*, Stangensteig, prope Innsbruck (Kerner).

HYBRIDÆ

R. ALTERNIFLORUS × ULMIFOLIUS Sud. *Ronc. bret.* p. 43 (1904); *R. CONTECTUS* Sud. *I. c.*; *R. demotus* *Genev. Ess. Mon.* p. 223, *ex pte.* (1869); *Mon.* p. 260, *ex pte.* — A *R. alternifloro* M. et L. differt: turionibus pruinosis, aculeis æqualibus, validioribus, foliis supra obscuris viridis, glandulis rarioribus. Fructus male evolutus.

GALLIA : *Gironde*, Martillac (Clavaud).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentiae rachis distincte pilosa.

A. — *Foliolum* caulinum terminale latum, ovatum vel obovato-orbiculare.

a. — Inflorescentia aculeis crebris, validis vel mediocribus munita.

1. — *Foliolum* caulinum terminale ovatum; dentes tenues vel mediocres.

a. — *Folia* subtus parce pilosa, leviter pubescentia.

a. — Aculei rameales leviter falcati; *petala* rosea; inflorescentia aphylla vel inferne foliosa.

b. — Aculei rameales leviter falcati; *petala* alba; inflorescentia usque apicem foliosa.....

c. — Aculei rameales subrecti, elongati; *petala* alba.....

b. — *Folia* subtus molliter pubescentia, ad nervos pilis pectinatis; aculei rameales elongati, subrecti, crebri; flores rosei.....

2. — *Foliolum* caul. terminale orbiculare, subtiliter serratum; flores rosei.....

b. — Inflorescentia subinermis; aculei parum robusti.

1. — *Foliolum* caulinum terminale ovatum vel late obovatum. Parum discolor.....

2. — *Foliolum* caul. terminale orbiculare, cordatum. Discolor.....

B. — *Foliolum* caul. terminale angustatum, rhombeum, basi integrum; inflorescentia aculeis validis armata.

C. — *Foliolum* caulinum terminale obovatum.

a. — Inflorescentia inermis vel aculeis tenuibus, raris munita; *petala* rosea.....

b. — Inflorescentia aculeis crebris, ± validis armata.

1. — *Turio* obtusus, epruinosus; *foliola* marginibus sese tegentia

2. — *Turio* angulosus; *foliola* marginibus non sese tegentia.....

a. — *Turio* epruinosus; *stamina* rubra.....

b. — *Turio* ± pruinosis; *stamina* alba.....

R. alterniflorus M et Lef.
R. PHYLLANTHOIDES Sud. C.
R. ATTENUATISPINUS Sud. b.

R. SUEVIACUS Sud. B.
R. STEREobelus Sud. F.

R. OREIGENUS Sud. c.
R. HEREFORDENSIS Sud. d.
R. LESDAINI Sud. G.

R. SEPTICOLUS Sud. H.

R. VALDEPROXIMUS Sud. I.

R. NOULETHI Sud. Ib.
R. OBVALLATUS B. et Gill. J.

II. — Inflorescentiae rachis tomentosa, pilis rari vel nullis.

- A. — Turio pruinosus ; petala alba, styli rubri.....
 B. — Turio epruinosus ; styli virescentes

R. SEPARINUS Genev. D.
 R. DURIMONTANUS Sabrs. E.

Ont l'inflorescence très peu armée : *R. septiculus* Sud., *R. oreigenus* Sud. et *R. herefordensis* Sud.

Le turion glaucescent : *R. alterniflorus* M. et L., *R. separinus* Gen., *R. herefordensis* Sud. et *R. obvallatus* B. et Gill.

b. — (T. LXX) — *R. attenuatispinus* Sud. *Diagn.* p. 14 (1906).

Turio pubescens; aculei validi; dentes foliorum divaricati; *foliolum* terminale (7) late ovatum, emarginatum, abrupte acuminatum; *rami* aculei validi, subrecti, sensim attenuati; *inflorescentia* laxa, grandis, aculeis rectis armata, pedunculis patulis (8); *petala* alba, ± late ovata (9); *stamina* alba stylos virescentes superantia.

β. NEUROPHANES; *R. neurophanes* Boul. et Cornet *Assoc. rub. exsicc.* n° 9 (1873); *Gen. Mon.* p. 247; *R. albiflorus* × *Menkei* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI, p. 107, *ex pte.* — Dentes non divaricati, foliolum terminale sensim acuminatum, aculei subfalcati, pedunculi ascendentes.

GALLIA : *Valois*, forêt de Villers-Cotterets, au Cuvret et à Plessis-au-Bois (Lefèvre, Questier). — β. GALLIA : *Saône-et-Loire*, St-Léger-sous-Beuvray (Cornet); Autun (Gillot); *Puy-de-Dôme*, Thiers, prope Chassaignes (Arbost).

OBS. — Le type fut adressé à P.-J. Müller par Lefèvre sous le nom de *R. urgenteus*, mais ne fut pas décrit dans le Versuch. La var. *neurophanes* se rapproche du *R. obvallatus* B. et Gill.

c. — (T. LXXI) — *R. oreigenus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 18.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 289 !

Turio (1) epruinosus, aculeis debilibus, reclinatis armatus; *folia* subtus cinerascentia, dentibus mediocribus; *foliolum* terminale (2) ovatum vel subobovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *foliola* ramealia obovata, cuspidata; *inflorescentia* densa, inferne foliosa, pilosa, aculeis raris, debilibus munita; *pedunculi* (3) patuli; *pedicelli* breves; *sepala* inermia; *petala* ovata (4), rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa. *Pollinis* gradus puritatis 3/4.

β. PUBESCENS Sud. *in hb. Mus. Paris.* — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 29 ! — *Turio* ramusque pilosiores; *foliolum* terminale e basi lata, cordata; *inflorescentia* glandulosior; flores ?

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Arlanc, via Mons. — β. GALLIA, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

d. — (T. LXXI) — *R. herefordensis* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 33 (1904); *R. pubescens* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 40, *ex pte.*

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* p. 115.

Turio (5) pruinosus, pilosus, faciebus planis, aculeis debilibus, reclinatis armatus; *folia* manifeste discolora, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (6) orbiculare, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *ramorum* aculei debiles, reclinati falcative; *foliola* ramealia terminalia lata, ovata vel rhombea, acuminata; *inflorescentia* densa, angusta, aculeis debilibus instructa; *pedunculi* (7) breves, multiflori; *pedicelli* breves; *sepala* inermia; *petala* ovata (8), pallida; *germina* glabrescentia.

BRITANNIA : *Herefordshire*, Caplar (A. Ley), etc. ?

HYBRIDA

R. HEREFORDENSIS × VESTITUS Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 8 (1904); R. MACROTHYRHOIDES Sud. l. c.; R. leucostachys v. *gymnostachys* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 51. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 14. — *Discolor*; *folia* pilosa, tenuiter serrata *R. vestitum* W. N. revocant; rachis parum pilosa, flores rosei; pollen atrophum.

BRITANNIA : *Herefordshire*, Kerne Bridge (Rogers).

B. — (T. LXXI) — *R. sueviacus* Sud. *Bat. eur.* p. 82 (1908).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 290 !

Turio (9) glabrescens, epruinosus, eglandulosus, faciebus planis; *folia* supra parce pilosa, subtus molliter pilosa, ad nervos pilis pectinatis; *foliolum* terminale (10) late ovatum vel breviter obovatum, leviter emarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *ramus* pubescens, aculeis validis, valde elongatis, rectis vel subarcuatis armatus; *folia* supra manifeste discolora; *inflorescentia* valde foliosa, laxe hirsuta, glandulis sparsis, elongatis, aculeis crebris, validis plerumque rectis instructa (11); *sepala* hirsuta, glandulosa, aculeata, reflexa; *petala* rosea (12), oblonga; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. Fertilis. — *Folia* subtus subvelutina, villoso-canescens *R. pyramidale* Kalt. revocant; aculei validi, subrecti *R. villicaulis* Köhl.

BAVARIA, Neuburg-s.-Danube, Esterholz (Zinsmeister).

C. — (T. LXXI) — *R. phyllanthoides* Sud. *Bat. p.* 53 (1906).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 159 !

Turio (13) angulatus, epruinosus, glabrescens, glandulis subsessibilis crebris obsitus; *folia* inæqualiter serrata, subtus pubescens, supera cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale (14) late ovatum, cordatum, acuminatum; *ramorum* aculei falcati; *inflorescentia* elongata, valde foliosa, hirsuta, aculeis mediocribus, glandulis crebris, brevibus instructa; *pedunculi* (15) ascendentes; *sepala* parce aculeata, glandulis brevibus obsita; *petala* ovata (16), alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

β. INCERTUS; *R. villicaulis* var. *incertus* Sud. *in hb. Mus. Paris.* — *Foliolum* caulinum terminale suborbiculare, cordatum, breviter acuminatum; glandulæ sparsæ.

GALLIA : *Tarn*, Lacaune, Pampelonne, Tréban, Moulardés, Rosières, etc.; *Finistère*, Toull an Dioul, manoir du Nivot. — β. Oise, Buisson-de-Waligny (Questier).

HYBRIDA

R. PHYLANTHOIDES × SCHLECHTENDALII ?; R. CAUDATIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* (1909). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 30 ! — Differt a *R. phyllanthoides*: foliolis angustioribus, longe acuminatis, inflorescentia minus foliosa, multiflora, glandulis rari obsita. Sterilis vel parum fertilis.

GALLIA : *Tarn*, St-Benoît-de-Carmaux, Rosières.

D. — (T. LXXI) — *R. separinus* Genev. *Ess. Rub. M.-et-L.* (1860) p. 25; *Mon.* p. 181; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 51; *Bat. eur.* p. 5; Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 32; *R. thyrsiflorus* Bor. *Fl. cent. ed. 3 p. 211, ex pte, non W. et N.*; *R. ulmifolius* × *adscitus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI, p. 107.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 12 ! 291.

Turio pruinosis, glabrescens, aculeis validis, leviter inaequalibus armatus; *folia* coriacea, discolora; *foliolum* terminale (17) ovatum vel obovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *ramus* aculeis crebris, subinaequalibus, glandulis sparsis instructus; *inflorescentia* lata, tomentosa, parce glandulosa, aculeis validis, reclinatis vel falcatis armata; *pedunculi* medii elongati (18), patentes, multiflori; *sepala* tomentosa, parce aculeata, glandulis brevibus obsita; *petala* alba, ovata (19), interdum dilute rosea; *stamina* alba stylos rubros superantia; *germina* glabra. Fertilis.

In collibus graniticis. — GALLIA : Vendée, Loire-Inf., Maine-et-Loire, Tarn.

HYBRIDÆ

R. SEPARINUS × ULMIFOLIUS Sud. Rub. Hb. Bor. p. 52; R. MICROCARPUS Genev. Ess. Mon. p. 113 (1869); Mon. p. 183. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 43 ! — Differt a R. separino foliis supra obscure viridibus, subtus appresse tomentosis, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : Vendée, St-Hilaire-de-Mortagne, au port (Genevier), gare d'Evreunes.

R. SEPARINUS × PROPINQUUS Sud. Rub. Hb. Bor. p. 52 (1902); R. SEPARINOIDES Sul. l. c.; R. gymnostachys Gen. Mon. p. 223, ex pte. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 31 ! — Differt a R. separino : foliolis latioribus, suborbicularibus, inflorescentia laxe pilosa, ampla, valde multiflora, armata ; petalis roseis. Sterilis.

GALLIA : Vendée, Mortagne (Genevier).

E. — (T. LXXI) — R. durimontanus Sabrs. ap. Hayek Fl. stir. exsicc. 5 Lief. (1905), n° 230; Sud. Bat. eur. p. 83 (1908); R. bifrons × macrophyllus Sabrs. l. c.

Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 292 !; Hayek l. c. n° 230.

Turio (20) obtusangulus, pilosus, epruinosus, eglandulosus, aculeis crebris, subaequalibus, reclinatis armatus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus appresse cinereo-tomentosa, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* caul. terminale (21) orbiculare vel late ovatum, basi rotundatum vel subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia* elongata, inferne foliosa, sparsim glandulosa vel subeglandulosa, tomentoso-puberula, laxe et breviter pilosa, aculeis gracilibus munita, pedunculus tenuibus (22), erecto-patentibus; *sepala* angusta, subinermis; *petala* obovata (23), mediocria, alba vel pallide rosea; *stamina* pallida stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. Pollen parum admixtum. — Serratura foliorum R. harpactorem Sabrs. revocat, sed glandulis rarissimis, aculeis subaequalibus, inflorescentia parum armata diversus est. Fertilis.

STIRIA MEDIA : in locis scaturiginosis silvarum inter urbem Hartberg et pagum Poellau; solo calcareo, alt. 350 m.; Soechau (H. Sabransky).

F. — (T. LXXII) — R. stereobelus Sud. Diagn. p. 12 (1906) et in hb. Mus. Paris.

Turio pilosus, aculeis validis armatus; *folia* supra parce pilosa, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, tenuiter et duplicato-serrata, dentibus acutis; *foliolum* terminale (1) orbiculare, leviter cordatum, tenuiter cuspidatum; *ramus* pilosus, aculeis validis, basi dilatatis, inaequalibus, majoribus falcatis armatus; *folia* ramealia 3-5-nata, minute serrata, foliolis terminalibus orbicularibus, cuspidatis; *inflorescentia* foliosa, elongata, piloso-hirsuta, glandulosa, aculeis validis, crebris, pallidis, falcatis armata; *pedunculi* (2) multiflori; *sepala* pilosa, parce glandulosa, aculeata; *petala* (3) rosea, ovata; *stamina* alba stylos lutescentes superantia; *germina* parce pilosa. — Foliorum figura R. vestitum W. N. revocat, sed aculeis curvatoribus, petalis minus latis facile distinguitur.

GALLIA : Seine-Inf., Aumale (Questier).

G. — (T. LXXII) — R. Lesdainii Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 139 (1905); R. ulmifolius × foliosus N. Boul. et Bouly de Lesdaine Rub. gall. exsicc. (1901).

Exsicc. — Rub. gall. n° 195 !

Turio (4) faciebus planis, parce pilosus, aculeis compressis, leviter inaequalibus armatus; *folia* inaequaliter serrata, dentibus peracutis; *foliolum* terminale (5) angustum, rhombeum vel ellipticum, basi integrum, sensim acuminatum; *ramus* angulatus, aculeis validis, crebris, inaequalibus, majoribus reclinatis vel falcatis armatus; *inflorescentia* angusta, elongata, foliosa, hirsuta, glandulosa, aculeis crebris, validis, reclinatis falcativis instructa; *pedunculi* medii breves (6), ± patuli; *sepala* pilosa, aculeata glandulosaque; *petala* magna (7), ovata, laete rosea; *stamina* rosea stylos roseos longe superantia; *germina* parce pilosa. Pollinis gradus puritatis 4/5. Fertilis.

In sepibus. — GALLIA : Nord, Rexpoëde (Bouly de Lesdaine); Puy-de-Dôme, bois du Bouchat (Lamotte).

HYBRIDA

R. LESDAINII × ULMIFOLIUS Sud. Bat. p. 53 (1906); R. DREPANOSTACHYS Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 458 ! — Habitus R. Lesdainii Sud. sed turio pruinosis, folia subtus albo-tomentosa, glandulæ breves, abditæ, inflorescentia laxa, valde armata. Sterilis.

GALLIA : Nord, Rexpoëde (Bouly de Lesdaine).

H. — (T. LXXII) — R. septicolus Sud. in Bouvet Rub. Anj. p. 22 (1907); R. pubescens Bor. Cat. rais. pl. Maine-et-Loire p. 75, non W. et N.; R. septorum Gen. Mon. p. 219, ex pte, non P.-J. Müll.

Turio (8) faciebus leviter excavatis, pilosus; aculei mediocres, subaequales; *folia* flaccida, supra glabra, subtus mollier pilosa, dentibus inaequalibus, parum profundis; *foliolum* terminale (9) late elliptico-obovatum, leviter emarginatum, acuminatum, breviter petiolulatum; *ramus* dense pilosus, aculeis raris, debilibus, foliis 3-5-natis, superis discoloribus; *inflorescentia* valde hirsuta, subinermis (10), densa; *sepala* inermis; *petala* (11) rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia. — Inflorescentia subinermis ut in R. macrophyllum, a quo differt habitu humiliore, foliis discoloribus. Turione angulato, staminibus stylisque pallidis a R. macrophyllioidi Genev. facile distinguitur.

In collibus schistosis. — GALLIA : Maine-et-Loire, Angers, étang St-Nicolas.

I. — (T. LXXII) — R. valdeproximus Sud. Rub. Pyr. p. 103 (1901).

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 32 !

Turio (12) obsolete angulatus, epruinosus, sparsim pilosus, aculeis crebris, mediocribus, subinaequalibus, rectis vel reclinatis; *folia* supra glabrescentia, subtus molliter pubescentia, albo-tomentosa, dentibus mediocribus, leviter inaequalibus; *foliola* lata, marginibus sese tegentia (13); *foliolum* terminale magnum, breviter obovatum, basi emarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum, petiolulo proprio quadruplo longius, infima breviter petiolulata; *ramus* aculeis crebris, pallidis, reclinatis vel falcatis instructus, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* brevis, lata, obtusa, parum foliosa, sparsim glandulosa, piloso-hirsuta, aculeis crebris, validis, reclinatis armata (14); *bracteæ* latae; *pedunculi* medii elongati, patuli, multiflori, pedicellis brevibus; *sepala* pilosa; *petala* ovata (15), alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa. Pollen admixtum. Fertilis.

GALLIA. In vallibus Pyrenæorum : Luchon, Arreau, Ys, Pouy, Ardengost, etc.

HYBRIDÆ

R. VALDEPROXIMUS × PROCERUS : *R. DUBITABILIS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 104 (1901). — Differt a *R. valdeproximo* foliolis ovatis, acuminatis, inflorescentia eglandulosa. Parum fertilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, via Luchon.

R. VALDEPROXIMUS × TOMENTOSUS *Lloydianus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 104 (1901); *R. CRASSIRAMUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 33 ! — Differt a *R. valdeproximo* foliolis minus latis, inflorescentia elongata, eglandulosa, petalis angustioribus. Parum fertilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, Ys.

*R. VALDEPROXIMUS × SCHLEICHERI fissuraru*m Sud. *Rub. Pyr.* p. 105 (1901) : *R. TRACHYCLADUS* Sud. l. c. — Differt a *R. valdeproximo* turionibus glanduloso-aciculatis, foliis 3-natis, inflorescentia angusta, valde glandulosa, sepalis erectis. Parum fertilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Ardengost.

J. — (T. LXXII) — **R. obvallatus** Boul. et Gillot *Assoc. Rub.* n° 8 (1878); *Genev. Mon.* p. 175; *Sud. Bull. Soc. Bot. Fr.* t. LI p. 13; *Fl. Toul.* p. 72; *R. silvisparsus* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 27 (1902); *R. albiflorus × vestitus acutidens* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 107.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 8, 422 (s. n. *R. coarctati*) ; *Sud. Bat. eur.* n° 293.

— *Turio* faciebus planis vel leviter excavatis, glaucescens, glandulis raris, aculeis compressis, subæqualibus instructus ; *folia* supra fere glabra, subtus cinereo-tomentosa, breviter pubescentia, dentibus mediocribus, acutis, inæqualibus ; *foliolum* terminale obovatum (16), basi rotundatum vel subemarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo vel subtriplo longius ; *petiolus* sparsim glandulosus, aculeis falcatis munitus ; *folia* ramealia 3-nata, supera discolora, foliolis obovato-cuneatis ; *inflorescentia* basi foliosa, pilosa, parce glandulosa, aculeis crebris armata ; *pedunculi* medii breves (17), leviter ascendentes ; *sepala* aculeata, sparsim glandulosa ; *petala* (18) alba vel dilute rosea, anguste ovata ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabra.

R. GLAUCINUS Sud. *Rub. tarn.* (1909). — Glaucissimus ; ramorum aculei debiles ; inflorescentia inermis ; germina parce pilosa.

γ. **BAGNALLII**; *R. bracteatus* Bagnall in *Journ. Bot.* (1894) p. 187, non *Bor.* ; *R. mercicus* Sbsp. *bracteatus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 33; *R. ramosus* Blox., ex pte. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 110. — Folia tenuiter serrata ; inflorescentia pyramidalis pedunculis multifloris, patulis ; folia parum discolora.

δ. **EXALBATUS** ; *R. exalbatus* Lef. et M. *Vers.* n° 100 (1859) ; *R. bifrons × hypoleucus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 108. — *Turio* glaber ; folia manifeste discolora, tenuiter serrata ; rachis parce pilosa ; pedunculi ascendentes ; flores pallide rosei. Fertilis.

ε. **UNCINULATUS** Sud. *Bat. eur.* p. 83 (1908) et exsicc. n° 294, 295. — *Turio* pilosus ; foliolum terminale cuspidatum (19) ; dentes divaricati refractive ; petiolorum aculei crebri, uncinati ; germina parce pilosa.

ζ. **VELUTINUS**. — *Turio* eglandulosus, subepruinosus ; folia parum discolora, in umbrosis viridia, subtus pubescenti-velutina ; inflorescentia laxa, parce pilosa, glandulis longis, inæqualibus prædicta ; flores albi, germina pilosa.

GALLIA : Côtes-du-Nord, Plemuf (Coilliot), Saône-et-Loire, Roussillon, Autun (Gillot), Valois, Cantal, Haute-Vienne, Tarn, Haute-Garonne, etc. — β. GALLIA : Tarn, La Condamine. — γ. BRITANNIA : Warwick, Sussex, Berks, Yorks, etc. — δ. GALLIA : Oise, bois de Tillet, aux champs de Gondreville (Lefèvre) — ε. GALLIA : Sarthe, Le Mans. Pontlieu, à Pied-Sec (Henry, Coilliot). — ζ. GALLIA : Saône-et-Loire, St-Prix-en-Morvan, Roussillon-en-Morvan, forêt de Folin, à la Coulette (Gillot).

OBS. — Je n'ai pas vu vivante la plante de Saône-et-Loire, mais certains de mes spécimens du Cantal ne paraissent pas en différer ; elle ne dérive certainement pas ni du *R. vestitus* W. N., ni du *R. albiflorus* B. et Luc. C'est une espèce très caractérisée et facile à reconnaître. — Le *R. chloracanthus* Boul. et Gill. *Assoc. rub.* n° 103, *Notes p. 33*; *Genev. Mon.* p. 224, de Roussillon (Saône-et-Loire), dérive peut-être du *R. obvallatus* par croisement.

HYBRIDÆ

R. OBVALLATUS var. ε? × **ULMIFOLIUS** ; *R. LAUNAYI* Sud. in hb. Gentil. — Habitus *R. obvallati* var. ε. sed manifeste discolor, glandulae sessiles, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Sarthe, La Flèche, via Crê (Launay).

R. OBVALLATUS × GILLOTII Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. LI (1904) p. 14; *R. CANTALICUS* Sud. l. c. — Differt a *R. obvallato* : foliis magis discoloribus, foliolo terminali ovato, emarginato, petalis latioribus, roseis. Sterilis.

GALLIA : Cantal, Yolet, via Polminhac.

R. OBVALLATUS × TOMENTOSUS *Lloydianus* Sud. l. c. (1904) p. 14; *R. LAXIPILUS* Sud. l. c. — Differt a *R. obvallato* : aculeis geniculatis, inflorescentia laxissima, hirsuta, aculeis crebris. Sterilis et discolor.

GALLIA : Cantal, Vic-sur-Cère.

b. — **R. Nouletii** Sud. *Fl. Toul.* p. 72 (1907) ; *Bat. eur.* p. 83.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 296 !

Differt a *R. obvallato* B. et Gill. : turione epruinoso, glabro ; inflorescentia glandulosiore, petalis roseis, staminibus rubris. Inflorescentia pauciflora, armatissima, pedunculis brevibus ; sepala inermia, styli virescentes, germina glabra.

GALLIA : Haute-Garonne, Saint-Geniès.

▲ — (T. LXXXIII) — **R. MERCIERI** Genev. *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire* XXIV, 174 (1868); *Essai Mon.* p. 271; *Monog.* p. 271, ex pte; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI, p. 84; Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI, p. 494; Schmid. *Cat. rais.* p. 53 ; *R. spectabilis* Merc. *Rub. gen.* p. 291, non Pursh.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 715, 720 (var.) ; Sud. *Bat. eur.* n° 11.

Turio canaliculatus, glaber vel sparsim pilosus, glandulis nullis vel rarissimis ; aculei validi, subæquales, e basi dilatata, compressa, recti ; *folia* 5-nata (1), supra glabra, pallide viridia, subtus pilosa, albo-tomentosa, grosse et subduplicato-serrata, dentibus acutis ; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, sensim acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata ; *petiolus* aculeis falcatis armatus ; *stipulae* glandulosæ ; *ramus* florifer angulatus, dense pilosus, leviter heteracanthus, aculeis falcatis munitus ; *folia* 3-nata, grosse serrata ; *inflorescentia* (2) pyramidalis, foliosa, ± obtusa, piloso-hirsuta, parce glandulosa, aculeis validis, pallidis, reclinatis, falcatis geniculatis armata ; *pedunculi* medii ascendentes vel subpatuli, multiflori ; *sepala* tomentosa, hirsuta, sœpe aculeata, in flore et fructu reflexa (3) ; *petala* (4, 5) late ovata vel suborbicularia, alba vel pallide rosea ; *stamina* pallide rosea stylos virescentes superantia ; *germina* glabra. Pollen imperfectum (6). — Julius.

HELVETIA meridionali-occidentalis ; GALLIA : Savoie, Champagny ; Haute-Savoie, Salève, Icrès, Reignier (Schmidely) ; Tarn, Montcouyoul.

HYBRIDÆ

R. MERCIERI × ULMIFOLIUS Schmid. Cat. p. 60 ; *R. SALEVENSI* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 139 (1905) ; *R. collinus* var. *hybridus* Mercier. — Exsicc. Assoc. rub. n° 684. — *Turio pruinosus*, folia appresse tomentosa; eglandulosus. *Fructus male evolutus.*

GALLIA : Haute-Savoie, M¹-Salève, à Mornay; HELVETIA, Vaud, Chexbres (Schmidely).

R. MERCIERI × PROCERUS; *R. SEMIPROCRERUS* Sud. hb.; *R. insericatus × macrostemon* Schmid. Cat. p. 83. — *Turio glabrescens* et folia ut in *R. procero* P.-J. Müll., sed inflorescentia laxior, sparsim glandulosa.

GALLIA : Haute-Savoie, Monts Voiron, au-dessous de la Chapelle (Schmidely).

R. MERCIERI × TOMENTOSUS; *R. ACERATUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 139 (1905); *R. collinus* Merc. non DC; *R. Mercieri* var. *hybridus* Merc. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 709. — Folia supra supra tomentosa, inflorescentia multiflora, flores albi. Sterilis.

GALLIA : Haute-Savoie, Mont Saleve, sous Mornoy (Mercier, Schmidely).

R. MERCIERI × VESTITUS; *R. PSEUDO-MERCIERI* Sud. hb. — Habitus *R. Mercieri* sed *turio pilosus*, folia supra pilosa, petala lata.

HELVETIA : C^{on} Fribourg, Torny-Villarimboud (Jaquet).

b. — (T. LXXIII) — *R. Bouvetianus* Sud. ap. Bouvet Rub. Anjou (1907) p. 28.

Habitus *R. Mercieri* Gen. sed : *foliola* caulina terminalia rhombaea (7), breviter petiolulata, vulgo basi rotundata; *foliorum* dentes divaricati; *ramus* parum pilosus; *inflorescentia* minus hirsuta, valde foliosa, pedunculis ascendentibus; glandule rarissimæ; *petala* pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea styllos lutescentes superantia; *germina* parce pilosa. Folia subinciso-serrata *R. discerptum* P.-J. Müll. revocant.

GALLIA : Maine-et-Loire, St-Jean-de-Linières, St-Lambert-la-Potherie, Beaucouzé, Brissac, etc. (Bouvet).

OBS. — Le *R. Mercieri* Gen. a le rameau hétéracanthe et se rapproche un peu des formes de la série des *R. RADULÆ* Focke; toutefois le *R. Bouvetianus* appartient manifestement aux *R. HOMALACANTHII*.

Series c. — IMBRICATI Sud.

Conspectus specierum

I. — Rubi debiles; turio faciebus planis vel convexis, arcuato-procumbens; folia mediocria.....	<i>R. imbricatus</i> Hort. 47
II. — Rubi validi; turio canaliculatus, arcuatus, decurvus; folia magna	<i>R. rhamnifolius</i> W. et N. 48

47 — (T. LXXIV) — ***R. IMBRICATUS*** Hort in Ann. Nat. Hist. ser. 2, 374 (1851); Bab. Brit. Rub. p. 91; Focke Notes of Engl. Rub. p. 5; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 13; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 14; *R. immitis* Genev. Mon. p. 63 !, non Bor.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 8; Sud. Bat. eur. n° 62, 297; Rub. rar. n° 34.

Turio (1) arcuato-procumbens, angulatus, faciebus planis vel convexis, interdum superne leviter canaliculatis, glaber, eglandulosus; *aculei* æquales, compressi, recti vel leviter falcati; *folia* (2) plerumque 5-nata, supra parce pilosa, subtus pilosa, viridia vel supra cinerascentia; dentes mediocres, acuti, inæquales; *foliolum* terminale orbiculare vel late ovatum, cordatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius, lateralia breviter petiolulata, infima subsessilia, omnia marginibus sese tegentia; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandule subsessilibus sparsis munitæ; *ramus florifer* superne angulatus, parce pilosus, aculeis falcatis instructus; *folia* 3-5-nata, supra sæpe discolora; foliola lata, sese tegentia; *inflorescentia* (3) basi foliosa, apice densa, parum pilosa, eglandulosa, aculeis falcatis munita; *pedunculi* medii breves, multiflori, ascendentes; *sepala* tomentoso-viridia, sæpe parce aculeata, in flore et fructu reflexa (4); *petala* ovata (5, 6), alba vel dilute rosea; *stamina* alba styllos virescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen parum admixtum (7). — Junius-julius.

α. VIRESCENTS; *R. imbricatus* v. *genuinus* Sud. prius. — Folia subtus viridia.

β. DISCOLOR Sud. Rub. Hb. Bor. p. 15 (1902); *R. carpinifolius* Arrondeau Mon. n° 15, non W. N. — Folia supera discolora; cetera ut in typo.

γ. SUBROTUNDUS Sud. l. c. p. 15. — Exsicc. : Bat. eur. n° 298 ! — Folia subtus viridia vel cinerascentia, argute serrata; foliolum terminale (8) orbiculare; sepala aculeata, petala rosea. *Turio* subpruinosus.

δ. RECTISPINUS Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 16 (1904); *R. cariensis* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 25, non Genev. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 53. — Folia ampla; foliolum terminale sensim acuminatum; ramorum aculei subrecti, tenues; inflorescentia densa, aculeis subrectis armata. Discolor.

ε. CARIENSIS Sud. Rub. Hb. Bor. p. 15 (1902); Bouvet Rub. Anjou p. 24 (1907); *R. cariensis* Rip. et Gen. 1^{er} suppl. Mon. p. 55 (1872); Mon. p. 265, saltem ex pte; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 467. — Folia ampla, grosse et inæqualiter serrata, supera discolora; foliolum terminale ovato-cordatum, acuminatum; rami et inflorescentiae aculei validi, falcati; sepala aculeata, interdum subpatula. — In umbrosis. Habitus *R. affinis* W. N.

ζ. HAMULOSUS Sud. Rub. Hb. Bor. p. 15 (1902). — Exsicc. : Bat. eur. n° 299. — Folia ampla, subtus appresse albo-tomentosa; inflorescentiae aculei crebri, validi, adunci (9). Habitus *R. discolorum*.

In sepiibus et ad silvarum margines. — α et β. BRITANNIA, GALLIA BOREALI-OCCIDENTALIS : Valois, Morbihan, Vendée. — γ. GALLIA : Finistère, Quimper, via Corag. — δ. BRITANNIA : N. Devon (R. P. Murray). — ε. GALLIA : Loire-Inf., Cens (Genevier), St-Aignan, la Haye (de l'Isle). — ζ. GALLIA : Vendée, Eyrunes.

OBS. — Les variétés admises pour le *R. imbricatus* Hort sont bien caractérisées, mais elles sont reliées par des intermédiaires insensibles. La var. *discolor*, que j'ai élevée de graines prélevées sur des échantillons récoltés en Vendée, se rapproche de la var. *cariensis*, que M. Focke considère comme une espèce distincte et qui rappelle un peu le *R. affinis*. Je crois que les caractères de cette variété *cariensis* sont dus à ce que la plante a végété sur un terrain gras et ombragé; elle est, du reste, fort rare. La var. *subrotundus*, que j'ai également obtenue par semis, est bien constante dans ses caractères et très remarquable; elle a le port des *R. trivialis* P.-J. Müll. et rappelle le *R. Martrinii* Sud. La var. *hamulosus* est nettement discoloré; je n'en ai vu qu'un buisson près de la gare d'Eyrunes, et l'ai également élevée de graines; elle est très vigoureuse.

HYBRIDÆ

R. IMBRICATUS var. ε × *ULMIFOLIUS*; *R. POLYANCHUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 137 (1905); Diagn. p. 15 (1906). — Differt a *R. imbricatus* var. ε : foliis subtus obscure viridibus, foliolis minus latis, aculeis crebris, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : Loire-Inf., Auverné (de l'Isle).

R. IMBRICATUS var. × *PROPINQUUS*?; *R. PLEIOPHON* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 16 (1902); *R. demotus* Genev. Ess. Mon. p. 223 (1869); Mon. p. 260, pr. min. p. — *Turio* pubescens, folia discolora, subtus pubescentia, argute serrata; foliolum terminale obovatum, cuspidatum; inflorescentia laxa, armatissima. Sterilis.

GALLIA : Vendée, la Verrie (Genevier).

b. — (T. LXXIV) — *R. recognitus* Sud. *Bat. eur.* p. 84 (1908).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 300 !

Differt a *R. imbricato* Hort : *aculeis* minus validis, *foliis* (10) argute et subæqualiter serratis, foliolis minus latis, terminalibus longe petiolulatis, sensim acuminatis; *inflorescentia* pauciflora, laxiore; germinibus receptaculoque glabris. *Folia* supera subtus vulgo cinereo-tomentosa; *petala* alba vel pallide rosea. *Præcox*. — *Intermedius* fere inter *R. imbricatum* et *R. cardiophyllum*. — Junius.

β. HETERACANTHUS. — *Turio* leviter heteracanthus; *styli* rubri.

In collibus schistosis. — GALLIA : *Tarn*, le Bez, Ambialet, Alban, Assac, la Fontasse, etc. — *β. Tarn*, Villefranche.

HYBRIDÆ

R. RECOGNITUS × OCCITANICUS Sud. *Rub. tarn.* (1909); *R. SEMIRECOGNITUS* Sud. *l. c.* — *Virescens*; leviter glandulosus heteracanthus-que, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Assac.

R. RECOGNITUS × HEBECAULIS Sud. *l. c.* (1909); *R. RECOGNITIFORMIS* Sud. *l. c.* — *Glandulæ sparsæ*; *turio* pilosus, *sepala* patula.

GALLIA : *Tarn*, Assac.

18 — (T. LXXV) — *R. RHAMNIFOLIUS* Wh. et N. *Rub. germ.* p. 22, t. VI (1823); Focke *Syn. p. 146*; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 474 (*R. eu-rhamnifolius*); *R. rhamnifolius germanicus* Focke in Potonié *Ill. Fl. Deutschl.* I, 233 (1885); Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 29, *saltē ex pte.* — Excl. *R. rhamnifolius* Wirtg., Holuby, Fischer Oester, etc.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 547; *Set of Brit. Rub.* n° 79; Baenitz *Hb. eur.* n° 7237; Sud. *Bat. eur.* n° 306.

Validus; *turio* (1) arcuatus, decurvus, faciebus canaliculatis, glaber; *aculei* robusti, e basi compressa, dilatata, subito angustati, æquales, recti vel apice subfalcati; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, breviter pubescens, inæqualiter minute mucronato-serrulata; *foliolum* terminale (2, 3) orbicularis vel late ovatum, basi rotundatum vel submarginatum, cuspidatum vel breviter acuminatum, petiolulo proprio parum longius, infima petiolulata; *petiolus* supra leviter concavus, aculeis crebris, falcatis uncinatis armatus; *stipulae* lineares; *ramus florifer* parce pilosus, angulatus, aculeis crebris, validis, falcatis uncinatis armatus; *folia* 3-5-nata, minute serrata, discolora, foliolis cuspidiatis. *Inflorescentia* (4) pyramidalis, conferta, basi foliosa, parum pilosa, aculeis densis, validis, falcatis uncinatis onusta; *pedunculi* medi i patuli, multiflori; *sepala* tomentosa, pilosa, aculeata, in flore et fructu reflexa (5); *petala* suborbicularia vel late ovata (6, 7), breviter unguiculata, alba; *stamina* alba stylos rubros superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* glabrescens; *pollen* valde admixtum (8). Eglandulosus. — Julius.

β. STENOPLOS Focke *Syn. p. 118* (1877). — Aculei debiles, minus curvati.

In sepiibus et ad sylvarum margines. — GERMANIA : Minden (Weihe), Osnabrück, Burgsteinfurt, Baden-Baden, Bergen, Posen, etc. (Focke); BRITANNIA : S. Derby (R. Linton), etc. ?

HYBRIDÆ

M. Focke (ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 477) mentionne des hybrides de cette espèce avec les *R. rudis* W. et N. (à Minden) et *Schleicheri* Wh. (à Minden).

Conspectus speciei, subspeciei et microgeneris

I. — <i>Folia</i> minute serrata; <i>foliolum</i> terminale basi rotundatum vel parum emarginatum.....	<i>R. rhamnifolius</i> W. N.
II. — <i>Folia</i> mediocriter serrata; <i>foliolum</i> terminale basi cordatum.	
A. — <i>Petala</i> rosea; <i>stamina</i> stylos vix æquantia: <i>inflorescentia</i> laxa.....	<i>R. nemoralis</i> P.-J. Müll. b.
B. — <i>Petala</i> alba; <i>stamina</i> stylos superantia; <i>inflorescentia</i> densa.....	<i>R. CARDIOPHYLLUS</i> L. M. B.

*b. — (T. LXXVI) — *R. nemoralis* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 139, non Genev. nec Auct. plur. (Rogers, Focke, etc...); *R. plicatus* × *villicaulis* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 59.*

Differt a *R. rhamnifolio* W. N. : aculeis sparsioribus, nunquam aduncis, foliis subvirescentibus, grosse serratis, dentibus acutis; foliolo terminali suborbiculari (1), leviter emarginato; *inflorescentia* laxa (2), interrupta, elongata, usque ad apicem foliosa; sepalis hirsutis, petalis (4) roseis, staminibus stylos virescentes vix æquantibus. — *Fructus* (3) bene evolutus; frons magna.

GERMANIA : Alsacia, la Reissbach (P.-J. Müller).

*B. — (T. LXXVI) — *R. CARDIOPHYLLUS* Lef. et M. *Vers.* n° 18 (1859); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 58, non Genev. *Mon.* p. 248; *R. dumosus* K. Frider. et Gel. *Rub. Dan. et Slesv.* p. 61, *Rés. fr.* p. 13, non Lefèv.; *R. pseudodumosus* K. Frid. et Gel.; *R. rhamnifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 29, *ex pte.**

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 177, 414, 1003, 1009, 1167; *Rub. gall.* n° 19; Sud. *Bat. eur.* n° 307 !

Turio canaliculatus, glaber; *aculei* subrecti; *folia* (5) supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, mediocriter et duplicito-serrata; *foliolum* terminale suborbicularare, cordatum, breviter acuminatum; *folia* ramealia supera albo-tomentosa; *ramorum* *aculei* reclinati falcative; *inflorescentia* (6) densa, basi foliosa, aculeis reclinatis falcatis armata; *pedunculi* breves, patuli, pedicellis fasciculatis; *sepala* tomentosa, breviter pilosa, inermia; *petala* (7) late ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen parum admixtum (8). — Aculeis non subito angustatis, ramealibus minus curvatis, foliis duplicito-serratis, foliolis terminalibus cordatis, stylis virescentibus, polline perfectiore a *R. rhamnifolio* diversus est.

GALLIA BOREALIS : Aisne, Oise, Somme, Seine-inf., Maine-et-Loire, etc.; BRITANNIA : Clifton, Bristol (White), etc.; GERMANIA BOREALIS, Schleswig (K. Friderichsen).

OBS. — Cette espèce se rapproche beaucoup des *R. DISCOLORES hedycurpi*. Les *R. Lindebergii* P.-J. Müll. et *cuspidifer* L. et M., que M. Focke considère comme de simples variétés du *R. rhamnifolius* W. N., appartiennent plus manifestement à la section des *R. DISCOLORES*.

Les espèces de la sous-section des *R. discoloroides* Gen. sont intermédiaires entre les *R. SILVATICI* virescentes et les espèces des autres sections. Le *R. villicaulis* Kochl. est souvent presque entièrement virescent (*R. insularis* Aresch., *calvatus* Blox., *ornatus* Sud.) et mérite d'être placé en tête de ce groupe; le *R. albiflorus* B. et Luc. rappelle le *R. macrophyllus* W. N.; les nombreuses formes du groupe du *R. alterniflorus* M. et Lef. conduisent insensiblement aux *R. vestiti* Focke; le *R. Mercieri* Genev., dont le rameau est hétéracinthe, rappelle un peu les *R. Radulae* Focke; le *R. imbricatus* Hort. sous certaines de ses variétés, tient de près au *R. affinis* W. N.; enfin le *R. rhamnifolius* W. N., tout à fait eglanduleux, confine aux *R. DISCOLORES* P.-J. Müll.

Sect. III. — DISCOLORES P.-J. Müll.

Characteres subsectionum

- A. — **GYPSOCAULONES** P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*) ; Sud. *Bat. eur.* p. 5 (1903). — *Turio pruinosus*.
- B. — **HEDYCARPI** (Focke *pr. sp. collect.*) *Syn.* p. 190 (1877) ; Sud. *Bat. eur.* p. 7. — *Turio epruinosus*, pilosus vel glaber, vulgo validus ; inflorescentia paniculata, aculeis validis, crebris vulgo armata ; pedunculi ± patuli ; foliorum caulinorum foliola infima petiolulata ; petala lata.
- C. — **CANDICANTES** Focke *Syn.* p. 154 (1877) (*pr. max. pte*). — *Turio epruinosus*, arcuatus, canaliculatus, saepe glaber ; folia subtus cinereo-tomentosa, pilosa, interdum subvirescentia ; foliola infima breviter petiolulata ; inflorescentia elongata, angusta, apicem versus vix decrescens ; pedunculi ± ascendentes, parce aculeati vel inermes ; petala saepe angusta, vulgo pallida.
- D. — **SUBTOMENTOSI** Sud. *Bat. eur.* p. 25 (1904). — *Turio epruinosus*, saepe debilis ; folia 3-5-nata, subtus albo-tomentosa ; drupeolarum nucleus desiccatus oblongus. Rubi fertiles, homalacanthi, eglandulosi, intermedii inter subsectiones praecedentes et *R. tomentosum* Borkh. Forsan hybridæ fixæ e *R. tomentoso* Borkh.

Subsectio A. — **Gypsocaulones** P.-J. Müll.

Conspectus specierum

- I. — Antheræ glabrae; pollen perfectum; stamina stylos vix superantia; folia supra glabra vel interdum pilis simplicibus obsita, subtus vulgo appresse tomentosa ; inflorescentiae rachis tomentosa, raro pilosa..... *R. ulmifolius* Schott. 49
- II. — Antheræ pilosæ ; pollen vulgo ± admixtum ; stamina stylos æquantia vel vix superantia ; folia supra pilis simplicibus et minutisstellulatis dense obsita, subtus pubescentia ; inflorescentiae rachis pilosa..... *R. sanctus* Schreb. 49 b.
- III. — Antheræ vulgo glabrae ; pollen ± admixtum ; stamina stylos longe superantia ; folia supra glabra vel parce pilosa, subtus pubescentia ; inflorescentiae rachis pilosa..... *R. Godronii* Lec. et Lmt. 50

49 — (T. LXXVII) — **R. ULMIFOLIUS** Schott in *Isis* (1818) p. 821 ; Ser. *ap. DC. Prod.* II p. 506 ; Focke *Syn.* p. 177 ; *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 501 ; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 60 ; Sud. *Rub. Pyr.* p. 10 ; *R. discolor* W. et N. *Rub. germ.* p. 46, *ex pte et auct. plur. ex pte* (Reichb., Bab., Chabosseau, etc...) ; *R. amoenus* Portensehl. ; Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 47 ; Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III, p. 220 ; *R. abruptus* Lindl. *Syn. Brit. Fl. ed.* I p. 92 (1829) ; *R. hispanicus* Willk. in *Bol. Ztg.* (1844) p. 819 ; *R. rusticana* Merc. in *Reut. Cat. pl. Genev.* p. 279 (1861) (*pr. max. pte*) ; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 40 ; Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 501 ; *R. dalmaticus* Guss. *Fl. Sic. Syn.* I p. 567 (1842).

Turio arcuato-procumbens, angulatus, saepe canaliculatus, pruinosus, glabrescens pilosus, saepe tomentosus vel squamosus ; aculei validi, conformes, e basi dilatata, recti, pilosi ; folia 5-nata, coriacea, supra convexa, obscure viridia, glabra vel parce pilosa, subtus appresse albo-tomentosa ; foliola infima petiolulata ; petiolus supra planus aculeis aduncis armatus ; stipulae lineares ; ramus aculeis falcatis armatus ; inflorescentia (2) pyramidalis, superne aphylla, tomentosa, raro pilosa ; pedunculi mediis vulgo patuli ; sepalæ tomentosa, in flore et fructu reflexa (4) ; petala suborbicularia, breviter unguiculata (3), vulgo rubra ; stamina stylos fere æquantia ; germina saepe tomentosa. Pollen perfectum (5). Species serotina. — Julius-augustus.

EUROPA OCCIDENTALIS, AFRICA BOREALIS, AMERICA MERIDIONALIS.

Conspectus subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentiae rachis tomentosa, pilis raris vel nullis.

- A. — Foliolum caulinum terminale latissime ovatum vel suborbiculare.
- a. — Foliolum caul. terminale profunde cordatum, sensim acuminatum.
 - 1. — Fol. caul. term. latissime ovatum, petiolulo proprio triplo longius..... *R. PEDUNCULARIS* Timb.-Lag. A.
 - 2. — Fol. caul. term. suborbicular, petiolulo proprio duplo longius..... *R. MELANCAULON* Sud. Ab.
 - b. — Foliolum caul. terminale basi emarginatum, truncato-cuspidatum ; flores rosei.
 - 1. — Folia inæqualiter serrata ; folium terminale subquadratum..... *R. SUBTRUNCATUS* Sud. B.
 - 2. — Folia subtiliter serrata ; folium terminale rotundatum ; foliola sese tegentia..... *R. ARGILLACEUS* Sud. Bb.
 - c. — Foliolum caul. terminale basi rotundatum, cuspidatum.
 - 1. — Foliola sese non tegentia ; folia grosse et inæqualiter serrata..... *R. DILATATIFOLIUS* Sud. C.
 - 2. — Foliola sese non tegentia ; folia subtiliter serrata..... *R. SERRICULATUS* Rip. Cb.
 - 3. — Foliola orbicularia, sese tegentia, styli rubri..... *R. CRUENTIFLORUS* Sud. Ce.
- B. — Foliolum caulinum terminale oblongum vel oblongo-ellipticum, raro ovatum, acuminatum vel attenuato-acutum.
- a. — Petala rosea ; foliolum terminale acuminatum.
 - 1. — Foliolum terminale ovatum vel ovato-ellipticum..... *R. INSIGNITUS* M. et T. D.
 - 2. — Foliolum terminale angustum, oblongum vel oblongo-lanceolatum..... *R. CONTRACTIFOLIUS* Sud. Dc.
 - b. — Petala alba ; foliolum caul. terminale acutum vel cuspidatum..... *R. RUSTICUS* Sud. Db.
- C. — Foliolum caulinum terminale raro ovatum, fere semper obovatum, basi rotundatum, acuminatum ; folia inæqualiter serrata.
- a. — Petala rosea.
 - 1. — Foliolum caul. terminale relative breve, longe petiolulatum..... *R. ANISODON* Sud. E.
 - 2. — Foliolum caul. terminale angustum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius... *R. ANGUSTIFACTUS* Sud. Eb.
 - b. — Petala alba ; stamina alba, styli virescentes..... *R. ALBIDIFLORUS* Sud. Ec.
- D. — Foliolum caulinum terminale manifeste obovatum, apice truncato-cuspidatum, basi rotundatum.
- a. — Petala rosea.
 - 1. — Foliolum terminale relative latum, breve, petiolulo proprio duplo longius..... *R. VULGATUS* Sud. F.
 - 2. — Foliolum terminale angustum, breviter petiolulatum ; folia minute serrata..... *R. CUNEATUS* B. et Bv. Fb.
 - b. — Petala alba ; turio canaliculatus
 - b. — Petala alba ; turio canaliculatus

II. — Inflorescentiae rachis floccosa, piloso-hirsuta ; folia subtus saepe pubescentia.

- A. — Foliolum caulinum terminale ovatum, obovatum vel ellipticum.
- a. — Flores rosei.
 - 1. — Foliolum terminale abrupte cuspidatum..... *R. HETEROMORPHUS* Rip. D.
 - 2. — Foliolum terminale acuminatum..... *R. LEMAIREI* Rip. Db.
 - b. — Flores albi..... *R. GARBEtinus* Sud. Dc.
 - B. — Foliolum caul. terminale latum, suborbicular ; dentes tenues ; flores rosei..... *R. TILIIFORMIS* Sud. Dd.

OBS. I. — Les feuilles caulinaires doivent être prélevées sur des turions bien développés et vers le milieu de ceux-ci, celles de la base étant peu caractéristiques et celles du sommet ayant des folioles presque toujours plus ou moins obovées.

OBS. II. — Les formes décrites sont très affines mais de valeur très inégale ; de plus, quelques-unes sont très constantes dans leurs caractères et on ne saurait les placer toutes sur le même rang en les envisageant comme de simples variétés du *R. ulmifolius* Schott ; agir ainsi serait tomber dans une erreur analogue à celle des botanistes pour qui ces formes constituent autant d'espèces distinctes. Toutefois les sous-espèces admises sont moins tranchées que celles des autres groupes spécifiques, en particulier des *R. Godronii* Lec. et Lam., *argenteus* W.N., etc.

A. — (T. LXXVII) — ***R. peduncularis*** Timb.-Lag. Assoc. rub. exsicc. n° 160 (1875) ; N. Boul. Rub. disc. in Bull. Soc. bot. Fr. t. XLV, p. 516 ; Sud. Rub. Pyr. p. 193.

Exsicc. : Assoc. rub. n° 160 ! 10 (s. n. *R. Weiheanus*) ; Sud. Bat. eur. n° 309.

Validus ; *turio* canaliculatus, pubescens, aculeis validis armatus ; *folia* duplicito-serrata ; *foliolum* caulinum terminale (1) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio subtriplo longius ; *ramorum* aculei falcati ; *rachis* tomentosa ; *pedunculi* patuli ; *flores* rosei, *germina* pilosa.

β. PRASINIFOLIUS ; *R. prasinifolius* Timb.-Lag. Assoc. rub. exsicc. n° 162 (1875) ; N. Boul. l. c. p. 517. — Habitus *R. peduncularis* sed *turio* subfloccosus, inflorescentia parum armata, *pedunculus* subfloccosis ; *germina* parce pilosa.

γ. CERATACANTHUS Sud. in hb. Müller. — Folia tenuiter serrata, petiolorum aculei breves, adunci, inflorescentiae plerumque uncinati ; *germina* glabrescentia.

δ. DEDOLATUS Sud. in hb. Müller ; *R. semiviridis* Boul. et Motelay Assoc. rub. (ex pte) n° 87, non 686, nec 370. — Habitus *R. peduncularis* sed aculei sparsi, in ramo rari ; inflorescentia inermis, *germina* pilosa.

ε. AMBLYBASIS Sud. in hb. Müller. — Folia ampla, subtiliter serrata ; *foliolum* terminale basi latum ; inflorescentia subinermis ; *pedunculi* e basi ramosi.

GALLIA MERIDIONALIS : Pyrénées, Haute-Garonne, Tarn, Indre-et-Loire, etc. ; BELGIA : Borlon (du Pré).

b. — (T. LXXVII) — ***R. melanocaulon*** Sud. Rub. Pyr. p. 110 (1901).

Turio atrirubens, faciebus planis, aculeis validis armatus ; *folia* magna ; *foliolum* terminale suborbiculare (6), cordatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *ramus* inflorescentiae aculeis validis armata ; petala, stamina stylique rosea ; *germina* pilosa.

β. ACUTICUSPIS Sud. in Bouvet Rub. Anjou p. 26 (1907). — Folia mediocria ; *foliolum* terminale longe acuminatum ; stamina stylique pallida.

GALLIA MERIDIONALIS : in Pyrenées, Luchon, St-Mamet, etc. ; Aude, Mas-Cabardès (Ozanon). — β. Maine-et-Loire, Sarthe.

B. — (T. LXXVII) — ***R. subtruncatus*** Rub. Pyr. p. 193 (1903).

Validus ; *turio* faciebus ± canaliculatis ; *foliolum* terminale (7) breve, suborbiculare vel fere quadratum, basi emarginatum, truncato-cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius ; *folia* ramealia 3-5-nata ; *rachis* tomentosa ; *petala* rosea.

α. GLAPHYRUS Sud. l. c. p. 193 ; *R. glaphyrus* Rip. et Genev. in Genev. Ess. mon. p. 235 (1869) ; Mon. p. 281. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 82 ; Sud. Bat. eur. n° 310. — Inflorescentia aculeis crebris, curvatis armata ; stamina stylique rosea ; *germina* pilosa.

β. WEIHEANUS Sud. l. c. p. 193 ; *R. Weiheanus* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 253 (1869) ; Mon. p. 275 ; Bouvet Rub. Anj. p. 26 (1907), non Focke in Gremli Beitr. p. 32 (1870). — Inflorescentia aculeis rariori munita ; cetera ut in var. α.

γ. CONOACANTHUS Sud. in hb. Müller ; *R. conoacanthus* P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 309 (nom. sol.). — Inflorescentia inermis ; *ramorum* aculei breves, debiles, curvati ; cetera ut in var. α. et β.

δ. CALCAREUS Sud. Rub. Pyr. p. 193 (1903) ; *R. calcareus* Rip. ap. Genev. Ess. mon. p. 254 (1869) ; Mon. p. 274. — Inflorescentia parum armata ; stamina stylique rosea ; *germina* glabrescentia.

ε. TRUNCIFACTUS Sud. in hb. Müll. — Stamina alba, stylis virescentes ; cetera ut in var. δ.

ζ. DISPULSIFLORUS Sud. l. c. ; *R. semiviridis* Boul. et Motelay Assoc. rub. ex pte, n° 686, p. p. — Inflorescentia laxa, ampla, multiflora, parum armata, pedicellis divaricatis ; stamina alba, stylis virescentes ; *germina* glabrescentia.

η. ANOPLOTHYRSUS. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 311. — Ramorum aculei rari, falcati ; inflorescentia laxa, inermis, *pedunculis* patulis ; stamina basi rubra, stylis virescentes, *germina* glabrescentia.

In locis calcareis frequens. — η. GALLIA : Ariège, Usson-les-Bains.

b. — ***R. argillaceus*** Sud. Bull. Assoc. Pyr. n° 236 (1899) et exsicc.

Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 312 !

Robustus ; *turio* aculeis brevibus armatus ; *folia* magna, coriacea, subtiliter serrata ; *foliola* rotundata, marginibus sese tegentia ; inflorescentia conferta, *pedunculus* brevibus ; stamina alba, stylis virescentes ; pollen admixtum. — An *R. ulmifolius* × *perconspicuus* ?

In aggeribus argillosis. — GALLIA : Tarn, Albi, Bellegarde ; Seine-et-Oise, Montfort-l'Amaury (M^{le} Bélèze).

C. — (T. LXXVII) — ***R. dilatatifolius*** Sud. Rub. Pyr. p. 193 (1903) ; Bat. eur. p. 22 ; Bouvet Rub. Anj. p. 26 ; *R. dilatatus* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. (1899), non Boul et Let.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 151, 214, 217, 531, 539 ; Sud. Bat. eur. n° 65.

Validus ; *turio* ± canaliculatus ; *folia* grosse serrata ; *foliola* lata, terminale (8) late ovatum vel suborbiculare, basi rotundatum, raro subemarginatum, cuspidatum ; *rachis* tomentosa ; *petala* rosea.

α. GENUINUS Sud. l. c. — Rami aculei satis validi, falcati ; stylis virescentes.

β. AVELIANUS Sud. l. c. ; *R. avellanus* Müll. et Timb. Assoc. rub. n° 14. — Aculei in ramis petiolisque parvi ; inflorescentia inermis ; stylis virescentes.

γ. RECURVUS Sud. l. c. — Aculei in ramis inflorescentiisque uncinati ; stylis virescentes.

δ. AGGERICOLUS Sud. l. c. ; Bouvet Rub. Anjou p. 26 ; *R. rotundellus* P.-J. Müll., inédit, non Sud. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 90, 475. — Folia grosse et inaequilater serrata ; inflorescentia conferta, aphylla ; stylis rubri.

ε. PRÄTERVISUS ; *R. prætervisus* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 247 (1869) ; Mon. p. 272. — Dentes parum profundi ; inflorescentia foliosa, interdum valde elongata [*R. longiflorens* Rip. ap. Genev. Mon. p. 276 (1880)] ; stylis rubri ; *germina* pilosa.

ζ. FRANCHETI ; *R. contemptus* Genev. Mon. p. 242 (*ex pte*). — Dentes mediocres; inflorescentia laxa, ampla, subinermis, pedunculis patulis, elongatis; stylis rosei. Forma constans (sec. Franchet).

α, β, γ, δ, ε frequentes. — ζ. GALLIA : Loir-et-Cher, Cour Cheverny (Franchet).

b. — *R. serriculatus* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 250 (1869); Genev. Mon. p. 290; Bouvet, Rub. Anjou p. 26.

Turio angulatus; *folia* subtiliter serrulata; *foliolum* terminale late ovatum, basi rotundatum, apice cuspidatum; *inflorescentia* laxa, leviter armata; *petala* rosea; *stamina* alba, *stylis* virescentes; *germina* glabrescentia.

β. CONGENERATUS Sud. Bat. p. 54 (1906); *R. congeneratus* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (*nomen*). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 160 ! — Folia subinæqualiter serrata; inflorescentia subinermis, laxissima.

γ. TETRAGONOPHYLLUS; *R. tetragonophyllus* Müll. et Timb. l. c. (*nomen*). — Folia subinæqualiter serrata; ramorum aculei validi; inflorescentia elongata, laxissima, parce pilosa; *germina* pilosa.

δ. ALBINEUS Sud. in Bouvet Rub. Anjou p. 27 (1907). — Inflorescentia subinermis; petala alba; *germina* dense pilosa.

ε. TILIIFOLIUS; *R. tiliæfolius* Timb. et Baillet (*inedit.*); *R. rusticanus* v. *tiliæfolius* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 28. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 313 ! — Folia magna; inflorescentia ampla, laxa, subinermis; petala, *stamina* stylique rosea; *germina* glabrescentia. *R. vulgato* v. *apiculifero* affinis.

ζ. PARVISERRATUS; *R. parviserratus* Sud. Rub. Pyr. p. 193 (1908). — Microphyllus; inflorescentia armatissima; petala rosea, *stamina* alba, *stylis* rosei; *germina* pilosa.

In locis calcareis, haud frequens. — γ et ζ. GALLIA, in *Pyrenæis centralibus*, Luchon. — δ. Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy (Bouvet).

c. — *R. cruentiflorus* Sud. Bull. Assoc. Pyr. n° 281 (1902).

* Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 15 !

Turio arcuato-procumbens, teres vel obsolete angulatus; *foliola* lata, marginibus sese tegentia, terminale orbiculare, basi rotundatum, raro subemarginatum, cuspidatum; *ramus* subteres aculeis falcatis armatus; *inflorescentia* conferta; *petala* lâete rosea; *stamina* stylique rubra; *germina* glabrescentia.

β. CRASSULUS Sud. Rub. tarn. (1909). — Folia coriacea; *foliola* breviter petiolulata; rami aculei subrecti; *germina* pilosa.

GALLIA : Tarn, La Sarrade, Marssal, in locis schistosis. — β. Tarn, Albi, in collibus calcareis.

D. — (T. LXXVII) — **R. insignitus** Timb. et Müll. Assoc. rub. exsicc. n° 18; Bonpl. (1861) p. 309 (*nomen*); N. Boul. Rub. disc. p. 516 et ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 62.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 18; Sud. Bat. eur. n° 161, 314.

Validus; *foliolum* caulinum terminale (9) anguste ovatum vel subellipticum, basi subrotundatum, leviter emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *dentes* mediocres, inæquales; *rachis* tomentosa; *flores* vive rosei; *stylis* vulgo colorati; *germina* pilosa.

β. DISPALATUS; *R. dispalatus* Sud. Rub. Pyr. p. 10 (1908). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 315, 316. — *Foliolum* terminale basi latum, cordatum, petiolulo proprio duplo longius; *dentes* grossi, aculei validi.

ζ. BELONACANTHUS; *R. belonacanthus* P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 309 (*nomen*); *R. dispalatus* v. *belonacanthus* Sud. Rub. Pyr. p. 194. — Folia ut in var. β sed subtus pubescentia; rami aculei subrecti; *rachis* crassa; *stamina* stylique rosea.

δ. STRIATUS; *R. striatus* Boul. et Tuezk. Assoc. rub., ex pte, n° 155, 156, 220; Sud. Rub. Pyr. p. 49. — Exsicc. Rub. gall. n° 67. — Folia supra lâete viridia; *foliolum* terminale basi integrum; *flores* pallide rosei.

In GALLIA MERIDIONALI frequens. — β et δ. In *Pyrenæis centralibus*, Occitania, etc. — γ. Manche, St-Germain-de-Tournebut (Lebel); Haute-Garonne, Luchon.

b. — *R. rusticus* Sud. Rub. Pyr. p. 10 (1898).

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 35.

Turio angulatus; *foliolum* terminale ovatum, acutum vel cuspidatum; *dentes* inæquales; *petala* alba, *stamina* alba, stylis virescentes; *germina* pilosa.

β. PSEUDO-INERMIS; *R. pseudo-inermis* L. Motelay, Bordeaux (1903). — Aculei breves, rari; inflorescentia elongata, inermis; *foliorum* nervi inermi.

GALLIA MERIDIONALIS, haud frequens. — β. Gironde, le Verdon, à 300 m. au sud de l'auberge Simonet (L. Motelay).

c. — (T. LXXVIII) — *R. contractifolius* Sud. Rub. Pyr. p. 194 (1903); Bouvet Rub. Anj. p. 27 (1907).

Foliolum terminale angustatum (1), oblongum vel oblongo-ellipticum, basi rotundatum vel subtruncatum, acuminatum, *dentes* mediocres; *petala* stylique rosea.

β. DISJUNCTIFOLIUS Sud. Rub. Pyr. p. 194; *R. lanceifolius* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (*nomen*); *R. disjunctifolius* Boul. et Letendre, ex pte. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 267; Sud. Bat. eur. n° 119. — *Foliolum* terminale basi attenuatum, sublanceolatum.

γ. BOUVETI Sud. l. c. p. 194; Bouv. Rub. Anj. (1907) p. 27; *R. Bouvetii* Genev. Mon. p. 296 (1880). — Exsicc. : Assoc. rub. n° 86. — Microphyllus; *folia* grosse serrata; *foliolum* terminale basi truncatum, subemarginatum.

δ. SUBLENIS Sud. l. c. p. 194; *R. sublenis* Boul. et Tuezk. Assoc. rub. n° 158. — Microphyllus; *folia* grosse serrata; *foliolum* terminale basi attenuatum, subrhombéum; *pedicelli* graciles.

In GALLIA et alias probabiliter.

OBS. — Le *R. Francipanii* Tineo in Guss. Suppl. 157 (1832-34); *R. rusticanus* v. *Francipanii* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 503 est apparemment voisin de la var. *sublenis*. Je n'en ai pas vu de spécimens.

E. — (T. LXXVIII) — **R. anisodon** Sud. Rub. Pyr. p. 194 (1903); Bat. p. 22; Bouv. Rub. Anjou p. 27.

Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 64, 317; Billot Fl. Gall. et germ. n° 1659, ex pte; Lej. et Court. Ch. pl. Belg. n° 93.

Turio angulatus; *foliolum* terminale (2) late ellipticum vel elliptico-obovatum, basi integrum, acuminatum vel acutum, unquam truncato-cuspidatum, longe petiolulatum; *aculei* petiolorum adunci; *dentes* inæquales; *rachis* tomentosa; *flores* rosei.

o — *Folia supra obscure viridia; stamina stylique plerumque rosea.*

α. GENUINUS Sud. l. c. — Inflorescentia aculeis sparsis instructa.

β. ENOPLOSTACHYS Sud. l. c.; *R. enoplostachys* Müll. et Timb. Assoc. rub. n° 84. — Inflorescentia aculeis crebris, validis armata, sepala inermia.

γ. BASTARDIANUS Sud. l. c.; Bouvet Rub. Anj. p. 27; *R. Bastardianus* Genev. Ess. mon. p. 229 (1869); Mon. p. 266, ex pte; *R. inaequidentatus* Boul. et Timb. Assoc. rub. n° 83, 481. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 318. — Ramorum aculei sparsi; inflorescentia subinermis; germina glabrescentia. In umbrosis.

δ. PUBIFOLIUS; *R. Weiheanus* Gen. Mon. p. 275, ex pte. — Habitus var. γ sed folia minute serrata, supra pubescentia; germina pilosa.

οο — *Folia supra obscure viridia; stamina stylique plerumque pallida; inflorescentia subinermis.*

ε. LONGIPETIOLULATUS; *R. longipetiolulatus* Müll. et Timb. (inedit). — *Foliolum caulinum terminale petiolulo proprio parum longius; dentes grossi; pedicelli fasciculati.*

ζ. CANNABINUS; *R. cannabinus* Boul. et Letendre Assoc. rub. n° 16 (1873), non Gremli. — Var. ε. affinis sed folia grosse et inciso-serrata.

η. PETIOLULATUS Sud. Bat. p. 42 (1905); *R. petiolulatus* M. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen), non Assoc. rub. n° 152. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 120! — Habitus var. ε sed foliola minora, infima minus longe petiolulata; rami subinermes.

οοο — *Folia supra pallide viridia, stamina stylique pallida; foliola angusta.*

θ. PALLESCENS Sud. Rub. Pyr. p. 194 (1903); Bouv. Rub. Anj. p. 28; *R. pallescens* Rip. in Genev. Ess. Mon. p. 248 (1869); Mon. p. 289; *R. albescens* Boul. et Gillot Assoc. rub. n° 216. — Aculei mediocres; inflorescentia subinermis; germina glabrescentia.

ι. DREPANACANTHUS Sud. l. c.; *R. drepanacanthus* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen). — Inflorescentia ampla, laxa, parce pilosa, armatissima; aculei rami falcatai, 10-15 mm. longi; germina pilosa.

κ. ACULEATUS. — Aculei crebri; sepala aculeatissima; petala pallide rosea; germina glabrescentia. *R. vulgato* affinis.

λ. PRONATIFLORUS; *R. pronatiflorus* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen). — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 319! — Inflorescentia laxa, flexuosa, armatissima, pedunculis elongatis, patulis vel deflexis, pedicellis divaricatis; sepala acuteata; petala rosea; stamina pallida; germina pilosa.

Frequens, præcipue var. α, β, γ, θ. — δ. GALLIA: Chér, Rhin-du-Bois (Genevier). — ε et η, Toulouse (Timbal). — ζ. Seine-Inferieure, Rouen (Letendre). — ι. Haute-Garonne, Luchon. — ξ. Tarn, Lisle, præterea in insulis CANARIIS, puerto d'Orotava. — λ. Haute-Garonne, Toulouse, à l'Embouchure.

β. — (T. LXXVIII) — *R. angustifactus* Sud. Rub. Pyr. p. 194 (1903); Bouvet Rub. Anj. p. 28.

R. anisodonti affinis sed foliolum terminale (3) anguste obovatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; flores rosei.

ο — *Inflorescentia subinermis.*

α. CONFUSUS Sud. l. c.; *R. confusus* Rip. in Gen. Ess. mon. p. 231 (1869); Gen. Mon. p. 269, ex pte; *R. macilentus* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen). — Folia grosse serrata; styli rosei; germina pilosa. In umbrosis.

β. CONTROVERSUS Sud. l. c. p. 195; *R. controversus* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 244 (1869); Mon. p. 270. — Dentis satis tenues; stamina alba, styli virescentes; germina glabrescentia.

οο — *Inflorescentia aculeis armata; styli rubri.*

γ. POLYANCHUS Sud. l. c. — Inflorescentiae aculei falcatai, crebri; sepala inermia.

δ. ASPERICALYX Sud. in hb. Müller. — Inflorescentia laxa, aculeis validis armata, sepala aculeata.

ε. ACUMINATIFRONS Sud. l. c.; *R. callimorphus* P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen)? — Folia minute serrata; foliola longe acuminata, rachis parce pilosa; flores vive rosei, sepala inermia, germina glabrescentia.

οοο — *Inflorescentia armata; styli virescentes.*

ζ. GEMINATUS Sud. Rub. Pyr. p. 1903 (1903); *R. geminatus* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen). — Exsicc.: Assoc. rub. n° 68. — Inflorescentia non divaricata; sepala inermia; petala pallide rosea; stamina pallida.

Frequens, præcipue var. α, β, γ, ζ. — δ. GALLIA: Hérault, Agde. — ε. Marne, Chenay (Levent).

κ. — *R. albidiflorus* Sud. Rub. Pyr. p. 195 (1903); Bouvet Rub. Anj. p. 28 (1907).

Exsicc.: Assoc. rub. n° 614 (s. n. *R. brachycladi*? non Boul. et Timb. n° 88); Sud. Bat. eur. n° 320. — Habitus *R. anisodontis* sed flores albi.

GALLIA: Pyrénées, Tarn, Haute-Garonne, Maine-et-Loire, Sarthe, Ardèche, Loire-inferieure, etc...

Φ. — (T. LXXVIII) — **R. vulgatus** Sud. Rub. Pyr. p. 192 (1903); Bat. p. 5; Bouvet Rub. Anj. p. 29; *R. rusticanus* (Merc.) N. Boul. Rub. disc. p. 505, ex pte; *R. tephraeanthus* Boul. et Motelay Assoc. rub. n° 85; *R. brachycladus* Boul. et Timb. Assoc. rub. n° 88. p. p.

Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 14; Assoc. rub. n° 11, 85, 88, 152, 213, 263, 480, 611, 612.

Folia supra obscure viridia, satis grosse serrata; foliolum caulinum terminale (4) breviter obovatum, basi rotundatum, apice truncatum vel rotundato-cuspidatum, petiolulo proprio fere duplo longius; rachis tomentosa; petala rosea.

ο — *Foliolum caulinum terminale breviter apiculatum.*

α. GENUINUS Sud. l. c. — Folia grosse serrata; rami aculei falcatai; styli rosei.

β. APICULIFER Sud. l. c.; *R. apiculifer* Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nomen); *R. valentinus* Pau exsicc. — Exsicc.: Assoc. rub. n° 81, 154 (*R. latifrons* Boul. et Tuezk.), 265, 412, 475, 479, 679. — Foliola lata, argute serrata; styli rosei.

γ. CONGESTUS; *R. congestus* Boul. et Malbranche Assoc. rub. n° 153. — Differt a var. α inflorescentia confertissima, angustata, petiolulis brevioribus.

δ. TENACELLUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 195 (1903) ; *R. tenacellus* Gen. 1^{er} Suppl. *Ess. mon.* p. 52 (1872) ; *Mon. p.* 286. — Var. α affinis sed inflorescentia aculeis geniculatis vel aduncis armata.

ε. MASSILIENSIS ; *R. massiliensis* Boul. *Assoc. rub.* n° 159 (1875). — Folia supra pilosa. Cetera ut in var. α.

ζ. MACROBELUS ; *R. macrobelus* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 222 (1877). — Aculei robustissimi in ramo 15 mm. et ultra longi ; flores pallidi.

η. ANCHOSTACHYS Sud. l. c. ; *R. anchorstachys* Rip. ap. *Genev. Ess. mon.* p. 243 (1869) ; *Genev. Mon. p.* 285. — Foliolum terminale subovatum ; inflorescentiae aculei parvi, falcatae ; styli virides.

θ. EXPALLESCENS Sud. l. c. ; *R. expallescens* Müll. et Timb. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 161. — Ramus flexuosus, gracilis ; petala pallide rosea ; stamina alba, styli virescentes.

οο — *Foliolum caulinum terminale longe apiculatum.*

ι. MUCRONIFOLIUS Sud. l. c. ; *R. mucronifolius* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 63 ! — Folia grosse serrata ; foliolum terminale basi saepe cuneatum ; inflorescentia subinermis ; styli rosei.

κ. APICULATIFOLIUS Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 319. — Folia sinuato-dentata ; foliolum terminale longe petiolatum ; inflorescentia armata ; petala magna, late rosea ; stamina rosea, styli rubri.

λ. SUBEMARGINATUS ; *R. subemarginatus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 12. — Var. α affinis sed foliolum terminale leviter emarginatum, ± longe apiculatum ; styli virescentes.

μ. PARVIDENS Sud. l. c. — Folia minute denticulata ; inflorescentia armata.

Var. α, β, γ, δ, θ, η, ι, λ frequentes. — ε. GALLIA : *Bouches-du-Rhône*, les Olives, prope Marseille (N. Boulay). — ζ. Gard, Maine-et-Loire.

β. — (T. LXXVIII) — *R. cuneatus* Boul. et Bouvet *Assoc. rub.* n° 13, 477 ; *Genev. Mon. p.* 287 (1880) ; Sud. *Rub. Pyr.* p. 195 ; *R. obcuneifolius* M. et Timb. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*) ; *R. flexipes* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 221.

A proximo *R. vulgato* sed foliolo terminali (5) anguste obovato, cuneato, cuspidato, foliis minute denticulatis facile distinguitur. Inflorescentia subinermis ; stamina stylisque rosea ; germina glabrescentia.

θ. ISCHNOACANTHUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 195 (1903) ; *R. ischnoacanthus* P.-J. Müll. (*ined.*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 320. — Inflorescentia aculeis crebris, falcatis armata.

γ. CONSTRICTIFOLIUS Sud. l. c. ; *R. constrictifolius* Boul. et Timb. *Assoc. rub.* n° 15 (1875). — Foliola elongata, suboblonga, terminale longe petiolatum ; inflorescentia armata ; stamina stylisque pallida.

δ. BRACHIATUS ; *R. brachiatus* Boul. et Foucaud *Assoc. rub.* n° 369. — Foliola longe petiolulata (petiolulus folioli terminalis 5 cm. longus) ; inflorescentia armata ; stamina stylisque rubra.

Var. α, β, γ, δ, frequentes. — δ. GALLIA : Charente-Inf., St-Christophe (Foucaud).

ε. — *R. cuneatiformis* Sud. *Rub. tarn.* p. 20 (1909).

Habitus *R. cuneati* B. et Bv. sed turio canaliculatus, glaber ; petala alba ; stamina alba, styli virescentes. — Turio et flores *R. candeicantem* Wh. revocant.

GALLIA : Tarn, Foncouverte, St-André, Narthoux.

Γ. — (T. LXXVIII) — ***R. heteromorphus*** Rip. ap. *Genev. Ess. mon.* p. 255 (1869) ; *Gen. Mon. p.* 298 ; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 29 ; *Rub. Pyr.* p. 195 ; *R. fruticosus* var. *dalmatinus* Tratt. *Ros. mon.* III, 33 (1824) ; *R. dalmatinus* Focke *Syn. p.* 184 (1877) p. p. ; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI*, p. 503 ; *R. segorbicensis* Pau exsicc.

Ab antecedentibus differt : inflorescentiae rachide floccosa, ± piloso-hirsuta (7), foliis subtus, præcipue in nervis, pubescens. — Foliolum terminale ovatum vel obovatum, cuspidatum *R. vulgatum* revocant. Flores rosei ; antheræ fere semper glabrae ; pollen perfectum ; germina pilosa.

ο — *Turio manifeste pilosus.*

α. GENUINUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 196. — Foliolum terminale leviter obovatum (6), longe petiolatum ; dentes inæquales ; folia subtus distincte pubescens ; styli carnei.

β. SUBCUNEATUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 321. — Validus ; folia subtus appresse tomentosa ; antheræ breviter pilosæ ; cetera ut in var. α. Habitus *R. cuneati* B. et Bv.

γ. ARGUTICUSPIS Sud. l. c. — Foliolum terminale ovatum, basi rotundatum, argute et longe cuspidatum, longe petiolatum ; dentes tenues ; aculei validi, crebri.

δ. FLOCCOSUS ; *R. floccosus* Boul. et Méhu *Assoc. rub.* n° 17. — Foliolum terminale obovatum, breviter cuspidatum ; dentes inæquales ; petala oblonga, styli purpurei.

ε. TRUNCATUS Sud. ad amic. — Foliolum terminale obovato-cuneatum, truncato-cuspidatum ; dentes satis tenues ; petala, stamina stylisque rosea.

οο — *Turio glabrescens vel pubestellulata sparsim obsitus.*

ζ. LATIFLORENS. — Foliolum terminale ovatum, cuspidatum ; dentes inæquales ; tomentum appressum ; inflorescentia lata, densa, multiflora.

η. ACRIDENS ; *R. floccosus* Assoc. rub. n° 680 (*non* n° 17). — Habitus var. α sed folia inæqualiter, grosse et acute dentata, turio pubestellulata obsitus.

Passim, cum antecedentibus.

β. — (T. LXXVIII) — *R. Lemairei* Rip. ap. *Genev. Ess. mon.* p. 257 (1869) ; *Mon. p.* 299 ; *R. heteromorphus* var. *Lemairei* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 30.

Diftet a *R. heteromorpho* Rip. : foliolo caulinico terminali (8) apice acuto vel acuminato ; flores rosei ; germina plerumque pilosa.

o — *Foliolum caulinum terminale ovatum.*

a. GENUINUS. — *Turio pubescens*; folia inæqualiter mucronato-dentata, dentibus latis; inflorescentia aculeis sparsis munita; petala in unguem attenuata.

β. NOULETIANUS; *R. Nouletianus* Timb. (*ined.*). — *Turio pilosus*; folia inæqualiter mucronato-serrata; inflorescentia ampla, multiflora, aculeis crebris, partim geniculatis armata; petala vive rosea, in unguem attenuata; stamina alba, styli virescentes.

γ. VILLOSPINUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 196 (1903); *R. Legatianus* Timb. *p. p. (ined.)* — *Turio pilosus*; folia grosse et inæqualiter dentata; ramus aculeique dense pilosi; inflorescentia hirsuta, angusta; petala lète rosea, styli purpurea; germina glabra.

δ. IRREGULARIDENS Sud. *l. c.* — *Turio glabrescens*; folia grosse, profunde et inæqualiter dentata; foliolum terminale angustum; ramus pubescens; inflorescentia lata, germina pilosa.

ε. PERACUTISPINUS; *R. peracutispinus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 196 (1903). — *Turio pubescens*; folia inæqualiter serrata; foliolum terminale late ovatum; ramus pubescens aculeis elongatis, acutis armatus; inflorescentia magna; stamina stylique rosea.

ζ. MINUTISERRATUS Sud. *l. c.* — *Turio glaber*; folia tenuiter serrulata; inflorescentia laxa.

η. SUBDOLUS; *R. subdolus* Sud. *Bull. Assoc. pyr.* n° 178 (1896). — *Turio planus*, pilosus; folia minute serrata; rami aculei debiles; inflorescentia subinermis.

θ. MEDIANUS. — *Turio glabrescens*; folia inæqualiter serrata, supra pallide viridia; stamina stylique pallida; germina glabrescentia.

oo — *Foliolum caulin. terminale obovatum vel rhombeum, basi attenuatum.*

ι. COGNOBILIS; *R. cognobilis* Müll. et Timb. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*); *R. heteromorphus* v. *cognobilis* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 29 (1902). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 322 ! — *Turio* dense pilosus; folia minute denticulata, foliola longe acuminata; inflorescentia parum armata.

κ. DELTOPHYLLUS Sud. *in hb.* Müller: — *Turio pubescens*; folia inæqualiter serrata; inflorescentia aculeis validis armata.

ooo — *Foliolum terminale angustum, oblongum vel oblongo-ellipticum.*

λ. TENUICULUS. — *Turio pubescens*; dentes parum profundi; inflorescentia elongata; stamina stylique pallida. *Habitus R. contractifolii* var. β.

GALLIA MEDIA ET MERIDIONALIS. — β. Toulouse. — δ, ε, γ et ζ *in Pyrenæis centralibus*, Luchon. — η. Tarn, Carmaux. — κ. Haute-Garonne, Toulouse; Vendée, Evrunes. — θ, λ. Tarn, Cantal.

ε — *R. garbetinus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 49 (1899).

Turio faciebus planis, dense pilosus; folia grosse serrata, appresse tomentosa; foliolum terminale ovatum, emarginatum, breviter acuminatum; ramus dense pilosus; inflorescentia laxa, hirsuta; sepala pilosa; petala alba; stamina alba, styli virescentes; germina pilosa; pollen perfectum.

GALLIA : Ariège, vallée du Garbet entre Ercé et Aulus.

d. — (T. LXXVIII). — *R. tiliiformis* Sud. ; *R. tiliaceus* Sud. *in hb.* Müller, *non Liebm.*

Validus; *turio* canaliculatus, pilosus; folia argute denticulata, appresse tomentosa; foliolum terminale suborbicularis (9), cordatum, breviter acuminatum, longe petiolatum; ramus aculeis validis armatus; inflorescentia foliosa, pilosa; petala rosea, suborbicularia (10); stamina alba; styli carnei; germina parce pilosa; pollen perfectum. — Habitus *R. cuspidiferi* M. et L. sed turio leviter pruinosus, pollen purum.

GALLIA : Toulouse, via Poumourville (Timbal).

OBS. I. — Cette plante est très remarquable, mais je n'ai pu la retrouver. Müller l'avait ainsi annotée : « Forme des feuilles insolite; n'est comparable à aucun autre; ce n'est pas un *R. gypsoaulon* ». Le turion m'a paru glaucescent; de plus la perfection du pollen ne me laisse aucun doute au sujet de la place à donner à ce *Rubus*.

OBS. II. — Les formes subordonnées au *R. heteromorphus* Rip. (*sensu ampio*) relient insensiblement le *R. ulmifolius* Schott aux autres *R. discolor* et, dans certains cas, l'examen microscopique du pollen fournit le seul caractère qui permette de les déterminer sûrement. Faut-il considérer ces formes comme des hybrides ayant fait retour au *R. ulmifolius* Schott tout en ayant conservé quelques-uns des caractères de l'autre parent ou bien se sont-elles produites par variation lente ou brusque des autres sous-espèces? Je crois que l'extrême polymorphisme du *R. ulmifolius* Schott est du plutôt à cette dernière cause. Il importe de constater que la pilosité des axes florifères n'est pas un fait accidentel et momentané comme cela se produit parfois sur quelques rameaux (pilosisme). J'ai retrouvé en 1905 certaines formes que Timbal-Lagrange avait cueillies vers 1860 aux environs de Toulouse : le caractère tiré des axes florifères s'était parfaitement conservé.

OBS. III. — Le *R. bellidiflorus* C. Koch *Dendrol.* I p. 292; Sud. *Bat. eur.* n° 308, est un *R. ulmifolius* Schott à fleurs doubles que l'on trouve chez les horticulteurs. Les espèces suivantes, voisines du *R. ulmifolius* Schott, se rencontrent quelquefois échappées des cultures :

R. inermis Willd. *Enum.* I p. 548. — Differt a *R. ulmifolius* turione glabrescenti, inermi; foliis 3-natis, supra parce pilosis; ramo inflorescentia inermibus.

R. chlorocarpus Bor. *ap. Genev. Ess. mon.* p. 239 (1869). — *Habitus R. ulmifolii* sed fructus maturus viridi-lutescens. — Maine-et-Loire, Ville-moisan (Boreau, Bouvet).

HYBRIDÆ

× e Silvaticis.

R. ULMIFOLIUS × SPRENGELII; *R. HALINII* Sud.; *R. Sprenzelii* Halin *in Herb. Hort. Bruxell.*, *non W. N.* — Gracilis; turio appresse pilosus; folia 3-nata, argute serrata, subtus ± cinerascentia; inflorescentia multiflora, breviter pilosa; flores parvi, lète rosei, steriles; petala suborbicularia; stamina stylos vix æquantia.

BELGIA : Ensival, buissons, à Donheid (M. Halin).

R. ULMIFOLIUS *cruentiflorus* × TARNENSIS Sud. *Rub. tarn.* p. 20 (1909); R. RUTILUS Sud. *l. c.* — *Habitus R. cruentiflori* sed turio epruinosus, folia minus discolora, sepala patula. Sterilis.

GALLIA : Tarn, La Sarrade.

R. ULMIFOLIUS × BRACHYTHYSUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 111 (1901); R. MACERIARUM Sud. *l. c.* — Turio pruinosus, folia discolora, inflorescentia multiflora, sepala patula. Sterilis.

GALLIA : *in Pyrenæis centralibus*, St-Mamet, prope Luchon.

R. ULMIFOLIUS melanocaulon × *SALTUIVAGUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 414 (1901); *R. SALTUICOLUS* Sud. *l. c.* — *Habitus R. ulmifolii* (*melanoc.*) sed turio epruinosus, inflorescentia parce glandulosa, stamna brevia, sepala patula.

GALLIA : in *Pyrenaeis centralibus*, St-Mamet, prope Luchon.

R. ULMIFOLIUS × *ELONGATISPINUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 50 (1900); *R. ADULTERATUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. ulmifolii* : inflorescentia elongata, pilosa, foliis minus discoloribus, floribus sterilibus.

GALLIA : In *Pyrenaeis aurigeranis*, Ercé.

R. ULMIFOLIUS × *FAGICOLA tolosanus* : *R. SEMITOLOSANUS* Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 325 ! — Turio subglaber, epruinosus, glandulis sessilibus obsitus ; folia argute serrata, subtus appresse albo-tomentosa ; foliolum terminale suborbiculare, cordatum ; inflorescentia pilosa, aculeis crebris munita ; flores rosei, steriles.

GALLIA : *Haute-Garonne*, Brax, prope Paquet.

R. ULMIFOLIUS × *MACROPHYLLUS orbifer* Sud. *Rub. tarn.* p. 20 (1909) ; *R. ACUTIDENTATUS* Sud. *l. c.* — *Habitus R. ulmifolii anisodontis* sed folia subtus subviridia, rachis pilosa, flores pallidi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Arthez.

R. ULMIFOLIUS × *LASIOOTHYRSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 411 (1901) ; *R. LASIOPUS* Sud. *l. c.* — Turio pruinosus, hirsutus, folia subtus pilosa, rachis hirsuta, stamna stylique pallida.

GALLIA : *Haute-Garonne*, Lèze.

R. ULMIFOLIUS × *ARGENTEUS cryptadenes* var. *bipartitus* Sud. et Bouvet ap. Bouv. *Rub. Anj.* p. 65 (1907) ; *R. SEMIBIPARTITUS* Sud. et Bouv. *l. c.* — Turio pruinosus ; folia subtus pubescentia, rachis tomentosa, germina pilosa. Sterilis.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, Montreuil-Belfroy, coteaux de la Mayenne (Bouvet).

R. ULMIFOLIUS × *VALDEPROXIMUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 411 (1901) ; *R. ARRENSIS* Sud. *l. c.* — Turio pruinosus ; folia subtus pubescentia ; rachis hirsuta ; bracteæ late, flores albi.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Arreau, via Luchon.

R. ULMIFOLIUS × *MERCIERI* Sud. *Rub. tarn.* p. 20 (1909) ; *R. FLACCIDIPES* Sud. *l. c.* — *Habitus R. ulmifolii* sed folia subtus pubescentia, inflorescentia hirsuta, parce glandulosa, flores pallidi. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Montcouyoul.

R. ULMIFOLIUS × *IMBRICATUS* Sud. in Bouvet *Rub. Anjou* p. 65 (1907) ; *R. POLYANCHOIDES* Sud. *l. c.* — Differt a *R. ulmifolii* : turione epruinoso, foliis subtus pilosis, foliolis latioribus, sese tegentibus, floribus pallidis.

GALLIA : *Vendée*, Mortagne (Bouvet).

× ex Discoloribus.

R. ULMIFOLIUS × *WINTERI* Sud. *Rub. Pyr.* p. 51 (1900) ; *R. CONSORANENSIS* Sud. *l. c.* — Turio pruinosus ; folia subtus pubescentia ; foliola acuminata ; inflorescentia laxa, parce pilosa ; flores pallidi ; sterilis.

GALLIA : *Ariège*, inter Oust et Ercé.

R. ULMIFOLIUS × *PROPINQUUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 43 (1902) ; *R. PSEUDOPROPINQUUS* Sud. *l. c.* ; *R. hirsutus* Genev. *prius, ex pte.* — *Habitus R. vulgati* sed folia subtus pubescentia, inflorescentia laxa, pilosa, multiflora. Sterilis.

GALLIA : *Vendée*, Mortagne (Genevier) ; *Loire-Inf.*, Ancenis (de l'Isle) ; *Sarthe*, Le Mans (Coilliot).

R. ULMIFOLIUS × *ELLIPTICIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 51 (1900) ; *R. AURIGERANUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. ulmifolii* : foliolis ellipticis, inflorescentia laxa, floribus pallidis, sterilibus.

GALLIA : *Ariège*, Ax, via Ascou.

R. ULMIFOLIUS × *GILLOTTII* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 283 (1902) ; *R. DENSIFLORENS* Sud. *l. c.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 326 ! — *Habitus R. ulmifolii* sed aculeis validis, dentibus acutis, floribus sterilibus diversus est. Inflorescentia multiflora, densa ; turio pruinosus.

GALLIA : *Tarn*, Le Fraissé, via Alban.

R. ULMIFOLIUS × *CUSPIDIFER* v. *cordibasis* Sud. *Ronc. bret.* p. 43 (1904) ; *R. PSEUDOCUSPIDIFER* Sud. *l. c.* — Turio pruinosus ; folia appressa tomentosa, rachis parce pilosa ; stamna stylique pallida. Sterilis.

GALLIA : *Finistère*, Menez-Kerque, prope Châteaulin.

R. ULMIFOLIUS × *PROCERUS* ; *R. SEPIMENTICOLUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 412 (1901). — Turio glaucescens ; folia subtus pubescentia, rachis pilosa, flores pallidi. Sterilis.

GALLIA, HELVETIA, etc.

R. ULMIFOLIUS × *PROCERUS lacertosus* Sud. *Bat. eur.* (1905) ; *R. PLATYPETALUS* Müll. et Timb. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*) ; de Martr.-D. Fl. Tarn p. 213 (1864). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 121 ! — *Habitus R. ulmifolii* sed : turio pruinosus, folia subtus pubescentia, inflorescentia magna, pilosa ; flores steriles.

GALLIA MERIDIONALIS : *Tarn*, *Haute-Garonne*, etc.

R. ULMIFOLIUS × *THYRSOIDEUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 412 (1901) ; *R. SUBALBIDUS* Sud. *l. c.* — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 36 ! — Turio glabrescens, glaucescens ; folia grosse serrata, rachis pilosa, flores albi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Loupiac, St-Benoit-de-Carmaux ; *Hautes-Pyrénées*, Bordères.

R. ULMIFOLIUS garbetinus × *THYRSOIDEUS hispidulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 412 (1901) ; *R. NESTEINUS* Sud. *l. c.* — Turio canaliculatus, pilosus ; folia flaccida, grosse serrata, rachis hirsuta ; flores albi, steriles.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Neste de Louron, prope Bordères.

R. ULMIFOLIUS × *SUBVILLOSUS* Sud. *l. c.* p. 413 (1901) ; *R. ANGUSTIRACEMOSUS* Sud. *l. c.* — Turio dense pilosus ; folia subtus pubescentia, inflorescentia angusta, hirsuta, multiflora ; flores albi, steriles.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Barrancoueu.

× ex Appendiculatis.

R. ULMIFOLIUS × *TOMENTOSUS* (*canescens*) Sud. (*hybr. coll.*) ; *R. PULVERULENTUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 243 (1899) ; *Rub. Pyr.* pp. 61, 113. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 327. — *Habitus R. ulmifolii* sed folia supra tomentosa, inflorescentia ± pilosa, flores albi. Sterilis vel parum fertilis.

Passim, cum parentibus : *GALLIA*, HELVETIA, etc.

Oss. — Dans ce groupe rentrent : *R. extensifolius* Boul. et Rip., Gen. Mon. p. 334 (1880), foliolo terminali ovato, acuminato ; — *R. obtectus* N. Boul. Assoc. rub. n° 170, foliolo terminali suborbiculari ; — *R. undulatus* Merc. (p. p.) var. *cineraceus* ; *R. micrandus* Rip. in Gen. Mon. p. 338 ; *R. brachybotrys* Focke N. Gior. Bot. Ital. XVI (1884) p. 170 et un grand nombre d'autres formes que je crois inutile de mentionner ici, car il est bien rare de trouver deux buissons identiques à cause du polymorphisme du *R. ulmifolius*.

R. ULMIFOLIUS × TOMENTOSUS Lloydianus; *R. NOTHUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 160 (1899); *Rub. Pyr.* pp. 52, 113 (*hyb. coll.*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 328. — Differt a *R. ulmifolio* inflorescentia hirsuta, floribus albis, sterilibus, petalis angustioribus. Folia supra glabra.

Passim, cum parentibus.

OBS. — Appartiennent à ce groupe : *R. consimilis* Rip. ap. *Gen. Ess. Mon.* p. 274 (1869); *Mon.* p. 308, non P.-J. Müll., foliis grosse serratis, inflorescentia conferta; — *R. obtusidens* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 72, inflorescentia diffusa; — *R. cuneifolius* Merc. a. a. O. 282 (1861) non Pursh *Fl. Am. sept.* I p. 347 = *R. sphenoïdes* Focke ap. *Gremlii Beitr. Fl. Schw.* p. 48 (1870), non Boul.; *R. thamnophilus* Rip. ap. *Gen. Mon.* p. 247; *R. latidens* Clavaud *Assoc. rub.* n° 707; *R. longiracemosus* Timb. *Assoc. rub.* n° 165; *R. ononis* Rip. in *Genev. Mon.* p. 252 (1880); *R. myrtanthus* Freyn in *Verh. z.-b. Ges. Wien* (1881), et beaucoup d'autres formes que je crois inutile de décrire et qui ne correspondent pas exactement à celles que je mentionne.

R. ULMIFOLIUS × TOMENTOSUS valespirensis Sud. *Rub. Pyr.* p. 113 (1901); *R. AMELIENSIS* Sud. l. c. — *Turio* epruinosus, glabrescens; foliolum terminale suborbiculaire, cordatum, cuspidatum; ramorum aculei breves, adunci; rachis hirsuta, eglandulosa. *Habitus R. inca-* *nescens*, sed eglandulosus.

GALLIA : *Pyrénées-Orient.*, Amélie-les-Bains, hôpital militaire.

R. ULMIFOLIUS × VESTITUS; *R. FULGENTISSIMUS* Sud. *hb.*; *R. vestitiformis* Sud. *prius, non Rogers*; *R. ulmifolius × vestitus f. superul-* *mifolius* Schmid. *Cat.* — Folia supra obscure viridia *R. ulmifolium* revocant, sed *turio* epruinosus vel parum pruinosus, rachis parce pilosa. Flores vive rosei, steriles.

GALLIA : *Ain*, Divonne, Sergy (Schmidely); BELGIA : Boendael, Sy (du Pré).

R. ULMIFOLIUS × COLEMANII sparsus Sud. *Rub. Pyr.* p. 11 (1898); *R. RARIGLANDULOSUS* Sud. l. c. — *Turio* glaucescens; aculei subi-*næqua*les; folia 3-5-nata, supera discolora; inflorescentia pilosa, sparsim glandulosa. Sterilis.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Cauterets.

R. ULMIFOLIUS × MICANS; *R. CREPINII* Sud. — Differt a *R. ulmifolio* (*vulgato*): inflorescentia parce glandulosa, pilosa, floribus subalbis, sepalis patulis. A *R. micanti* aculeis subæqualibus, foliis manifeste discoloribus, glandulis rarissimis. Parum fertilis.

BELGIA : La Hulpe (Crépin).

R. ULMIFOLIUS × RADULA pallidiformis Sud. *Rub. Pyr.* p. 52 (1900); *R. GIRAUDIASII* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 329! — *Turio* pruinosus; inflorescentia ampla, laxa, parce glandulosa; flores pallidi. Sterilis.

GALLIA : *Ariège*, Ax-les-Thermes, Orlu.

R. ULMIFOLIUS × GENEVERI Sud. et Bouvet in *Bouv. Rub. Anj.* p. 76 (1907); *R. SCALARISTACHYS* Sud. et Bouvet l. c. — *Turio* pruino-*sus*; glandulæ nullæ vel raræ et breves; foliorum figura, inflorescentia elongata *R. Genevieri* Bor. revocant. Sterilis.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, Beaucouzé (Bouvet); *Valois*, forêt de Retz (Questier); *Seine-et-Oise*, forêt de Rambouillet (M^{me} Bélèze); *Sarthe*, Crê-sur-Loir (Launay).

R. ULMIFOLIUS × RADULA timendus Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1909); *R. STERILIS* Sud. l. c. — *Turio* glaucescens; foliolum terminale obova-*tum*, acuminatum; dentes tenues; ramus glandulis subsessilibus obsitus; petala pallide rosea. Sterilis.

GALLIA : *In Pyrenæis centralibus*, Luchon, St-Mamet.

OBS. — Le *R. acerispinus* est probablement une forme en voie de retour au *R. ulmifolius* Schott.

R. ULMIFOLIUS × OCCITANICUS Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1909); *R. AMPLITHYRSUS* Sud. l. c. — *Turio* glaber, epruinosus; folia discolora; foliolum terminale ellipticum; inflorescentia ampla, sparsim glandulosa. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Carmaux; *La Renaudié*, prope Albi.

R. ULMIFOLIUS × OBSCURUS erraticus Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1909); *R. ERRATICIFORMIS* Sud. l. c. — *Habitus R. erratici* sed subdiscolor et fere eglandulosus. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Mézens.

R. ULMIFOLIUS ×?; *R. VALDELAXUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 207 (1898). — Exsicc. Sud. *Bat. eur.* n° 330! — *Turio* epruinosus; folia parum discolora, argute mucronato-serrata; inflorescentia inordinata, laxa, tomentosa, subinermis; flores albi, steriles. Eglandulosus.

GALLIA : *Tarn*, Arthez.

R. ULMIFOLIUS ×?; *R. ORBATUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 52 (1900). — *Turio* glaber, glaucescens; glandulæ sparsæ; folia supera cinereo-tomentosa; rachis hirsuta; flores rosei, steriles.

GALLIA : *Ariège*, Foix, via St-Pierre.

(? ×) *R. ULMIFOLIUS ×?*; *R. CALDESIANUS* Focke in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* XVI (1884), 162; *R. rusticanus* II *Caldesianus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 503. — Differt a *R. ulmifolio* stipulis glandulosis, rachide pilosa, parce glandulosa.

ITALIA, Brisighella, prope Faenza (Caldesi). — Mihi novus est.

R. ULMIFOLIUS × VALLISPARSUS Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1909); *R. BURLATENSIS* Sud. l. c. — Differt a *R. ulmifolio* turione obsolete angulo-*lato*, foliis minus discoloribus, glandulis sparsis, floribus sterilibus.

GALLIA : *Tarn*, Burlats.

R. ULMIFOLIUS × GLAUCELLUS var. Sud. *Rub. Pyr.* p. 115 (1901); *R. VALDEGLAUCUS* Sud. l. c. — *Pruinosus*, folia 3-5-nata, subtus cinerascentia; inflorescentia glandulis brevibus obsita; flores pallidi, sepala reflexa. *Fructus male evolutus*.

GALLIA : *In Pyrenæis centralibus*, Luchon, fontaine d'Amour.

49 b. — (T. LXXXVIII). — *R. SANCTUS* Schreb. *Dec.* p. 15 l. 18; *Ser. ap. DC. Prod.* II p. 561; *Ascher. et Schweinfurth Suppl. Illust. Fl. Egypt.* 1889; *R. discolor* Boissier; *R. anatolicus* Focke in *Abh. Nat. Ver. Bremen* IX, 335 (1880) et ap. *Asch. et Gr. Syn.* VI p. 503; *R. rusticanus foliis supra pilosis*, *R. collinus* (non D. C.) Focke in *hb. hort. bot. Tiflis.*; *R. tomentosus × ulmifolius* Utsch ap. Baenitz *hb. eur.*

Exsicc. — *Relig. Mailleance* n° 1079 (*R. discolor* var. *amœnus*); Baenitz *Herb. eur.* n° 9085 (*R. ulmifol.* var. *anatolicus f. macilenta*); 9570 (*R. sanctus* Schreb.), 9991 (*R. dalmaticus* Tratt.); Sud. *Bat. eur.* n° 331.

Differt a *R. ulmifolio* Schott: foliis supra pilis simplicibus vel stellulatis intermixtis dense obsitis, subtus pubescentibus; inflorescentiae (18) rachide ± pilosa; antheris (15) pilosis; polline vulgo ± admixto, interdum subpuro. — *Turio* ± pilosus, pube stellulata sericeo-micanti; folia (11, 12) 5-nata vel in apricis 3-nata; foliolum terminale vulgo obovatum, basi integrum, cuspidatum; flores rosei vel purpurei [*R. sanguineus* Frivaldszky in *Flora* XVIII (1835), 384?]; *germina* pilosa.

HERCEGOVINA : Mostar (Baenitz) ; BOSNIA, CORCYRA ; ROSSIA MERID. : Caucasus, Transcaucasia. Præterea in AEGYPTA, ASIA MINORE, SYRIA, MESOPOTAMIA.

Obs. — Plante intermédiaire entre *R. ulmifolius (vulgatus)* et *R. propinquus* P.-J. Müll. A souvent les apparences d'un *R. tomentosus* × *ulmifolius*, mais une telle interprétation ne rend pas compte de la pilosité des anthères ; de plus l'espèce fait défaut dans l'Europe occidentale, où les hybrides de *R. tomentosus* et *ulmifolius* sont fréquents et ont toujours les anthères glabres. En Egypte, la plante fructifie assez mal, mais cela peut être dû à la sécheresse ou à l'aridité de la station.

HYBRIDA

R. SANCTUS × *ULMIFOLIUS* ; *R. MOSTARENSIS* Sud. hb. — Exsicc. : Baenitz Hb. eur. n° 9383 (*R. vestitus* × *ulmifolius*). — Turio pilosus, folia supra glabra, foliolis latis ; antheræ pilosæ ; pollen valde imperfectum.

HERCEGOVINA : Mostar (Baenitz).

50 — (T. LXXIX) — **R. GODRONII** Lecoq et Lamotte Cat. rais. pl. Plat. Cent. (1847) p. 151 ; Gr. et G. Fl. Fr. I p. 540 ; Godr. Fl. Lorr. 2^e éd. I p. 233 ; J. Harmand Descr. Rub. Meuri.-et-Mos. p. 34 ; N. Boul. Rub. disc. p. 535 et ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 70 ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 509, ex pte ; *R. argenteus* P.-J. Müll. ! in Flora (1858), p. 36, non W. et N. ; *R. argentatus* P.-J. Müll. in Flora (1858), Zus. u. Ber. ; Vers. n° 26 ; non *R. Godronii* Genev. Mon. p. 41.

Exsicc. — F. Schultz Hb. norm. n° 251 ; Assoc. rub. n° 1006 ; Rub. gall. n° 69 ; Sud. Bat. eur. n° 332 !

Turio (1) inferne subteres, superne obsolete angulatus, glaucescens, parce pilosus ; aculei leviter inæquales, e basi subconica, recti vel reclinati ; folia 5-nata (2), supra glabra, subtus cinerascentia vel albo-tomentosa, pubescens, inæqualiter, minute et subsimpliciter serrata ; foliolum caulinum terminale ovatum, basi rotundatum vel leviter emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata ; petiolus planus, aculeis falcatis uncinatis instructus ; stipulæ lineares, glandulis subsessilibus sparsis munite ; ramus florifer subcylindricus, pubescens, aculeis instructus ; brevibus, tenuibus, e basi subconica armatus ; folia 3-5-nata, argute serrata, foliolis terminalibus ovato-rhombeis, acutis ; inflorescentia (3) inferne ± foliosa vel subaphylla, elongata, laxe pilosa, aculeis mediocribus, reclinatis instructa ; pedunculi medii patuli, 2-3-flori ; bractæ glandulis subsessilibus sparsis munite ; sepala tomentosa, pilosa, inermia vel parce aculeata, in flore et fructu reflexa (4) ; petala (5) oblonga, in unguem attenuata, pallide rosea ; stamina alba parum stylis virescentes longe superantia ; germina parce pilosa ; antheræ glabrae ; receptaculum pilosum. Pollen parum admixtum (6). — Julius.

GALLIA : Meurthe-et-Moselle, La Malgrange prope Nancy (Godron, Harmand) ; GERMANIA : Alsacia, Wissembourg, « lignes du Pigeonier, bords de la Lauter, etc... » (P.-J. Müller).

Obs. — La plante d'Auvergne appelée de ce nom par Lamotte est apparemment le *R. Gillottii* N. Boul.

HYBRIDA

R. GODRONII × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. Diagn. p. 17 (1906) ; *R. TORNATICAULIS* Sud. l. c. — Turio *R. Godronii* sed folia albo-tomentosa, grosse serrata, inflorescentia hirsuta bracteis latis. Sterilis.

GERMANIA : Alsacia, « entre Doerrenbach et la route, au nord d'Obersitterbach » (P.-J. Müller).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum.

I. — Turio teres vel obsolete angulatus ; aculei sæpe e basi subconica.

- A. — Foliolum caulinum terminale basi rotundatum vel vix emarginatum ; dentes tenues.
 - a. — Foliolum caul. terminale ovatum ; folia supra glabra.....
 - b. — Foliolum caul. terminale obovatum ; folia supra pilosa.....
- B. — Foliolum caul. terminale latum, basi emarginatum.
 - a. — Stipulæ lineares ; foliolum terminale e basi dilatata, cordata, longe acuminatum.....
 - b. — Stipulæ dilatatae : foliolum terminale basi rotundatum, emarginatum, acutum vel breviter acuminatum.....

II. — Turio manifeste angulatus, faciebus planis vel concavis ; aculei e basi dilatata.

- A. — Inflorescentiae rachis tomentosa, laxe pilosa ; inflorescentia laxa ; folia subtus cinerascentia vel cinereo-tomentosa ; foliolum caul. terminale basi integrum vel leviter emarginatum, acuminatum.
 - a. — Pedunculi leviter ascendentes, aculeis validis, crebris, falcatis geniculatis armati ; pollen parum admixtum.....
 - b. — Pedunculi patuli ; pollen valde imperfectum.
 - 1. — Stamina stylique rosea ; foliola lata ; inflorescentia aculeis validis armata.....
 - 2. — Stamina stylique pallida ; foliola angusta : inflorescentia inermis vel parum armata.....
- B. — Inflorescentiae rachis dense pilosa ; foliolum terminale sæpe latum et emarginatum ; folia subtus albo-tomentosa ; inflorescentia ± densa.....
- b. — (T. LXXIX) — *R. grandibasis* Sud. Diagn. p. 16 (1906).

R. Godronii L. et Lamt.

R. CALDASIANUS G. Samp. F.

R. GRANDIBASIS Sud. b.

R. AMPLISTIPULUS Sud. B.

R. WINTERI P.-J. Müll. C.

R. WINTERIFORMIS Sud. Cb.

R. ELLIPTICIFOLIUS Sud. D.

R. PROPINQUUS P.-J. Müll. E.

Turio aculeique ut in *R. Godronii*. Folia magna, discolora, satis grosse serrata, subtus pubescens ; foliolum terminale suborbicularare (7), basi dilatatum, cordatum, longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius ; inflorescentia dense pilosa, glandulis sessilibus defecta ; sepala inermia ; petala magna, suborbicularia (8).

GERMANIA : Alsacia, La Buchbach, prope Weissenburg (P.-J. Müller).

B. — (T. LXXX) — **R. amplistipulus** Sud. Rub. Pyr. p. 116 (1901).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 333 !

Validus ; turio obsolete angulatus, glaucescens, glabrescens, aculeis crebris, compressis armatus ; folia supra pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pilosa, simpliciter serrata ; foliolum terminale (1) late ovatum vel subobovatum, cordatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima subsessilia, omnia marginibus sese tegentia ; stipulæ dilatatae, eglandulosæ ; inflorescentia (2) aphylla, parum pilosa, aculeis mediocribus, reclinatis falcatis armata ; bractæ dilatatae, trifidæ ; petala late ovata (3), rosea ; stamina stylique pallida ; germina glabrescentia. Pollinis gradus puritatis 1/3-2/3 (4).

β. DUBIUS Sud. l. c. — Subvirescens ; pruina parum evidens. In umbrosis.

GALLIA : In Pyrenæis centralibus, Luchon, Arreau, Bordères, etc.

HYBRIDA

R. AMPLISTIPULUS × *OMALUS rigiduliformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 117 (1901); *R. IMPURIPULVIS* Sud. l. c. — Folia *R. amplistipulum* revocant sed aculei inaequales, glandulae sparsae, flores albi. Sterilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Barrancoueu.

C. — (T. LXXX) — *R. VINTERI* P.-J. Müll. ap. Wirtg. *Hb. pl. sel. Fl. rh.* n° 1063; Focke *Syn.* p. 196 (1877); Sud *Rub. Pyr.* p. 53; *Contr. Fl. Plat. cent.* p. 15; N. Boul. *Rub. disc.* p. 533 et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 70; *R. argentatus* Focke, Koch's *Syn.* p. 751, non P.-J. Müll.; *R. Godronii* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 510, ex pte; *R. argentatus* var. *robustus*, Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 39; *R. serratus* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 5 (1878); *R. cavaticaulis* Boul. et Gill. ex pte, *Assoc. rub.* n° 488; *R. rorulentus* Hal. in Kern. *Sched. Fl. Aust.-Hung.* III p. 49 (1884); *Oest. bromb.* p. 230 (1891); *R. carpinifolius* Hal. et Br. *Fl. Niederöst.* 325, non W. et N.; *R. Rivulii* Boul. et Quincy *Assoc. rub.* n° 675 (1886); *R. longicuspidatus* var. *discolor* N. Boul. *Rub. gall. exsicc.* n° 59.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. pl. sel. Fl. rhen.* n° 1063; F. Schultz et Winter *Hb. norm.* n° 38 (1870); *Set of Brit. Rub.* n° 113; *Assoc. rub.* n° 5, 488, 550 (s. n. *R. striati*), 675, 698 (s. n. *R. rhodobati* var.); *Rub. gall.* n° 59; Sud. *Bat. eur.* n° 16, 334.

Validus; *turio* pruinosis, faciebus planis vel leviter excavatis, parce pilosus, aculeis robustis, compressis armatus; *folia* supra glabrescentia, pallide viridia, subtus cinereo-tomentosa, pubescens, inaequaliter et duplicito-serrata, dentibus acutis; *foliolum* terminale (5) ovatum vel late ellipticum, basi integrum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *stipulae* lineares, tenuiter glandulosae; *ramus* angulatus, aculeis validis, compressis, falcatis armatus; *folia* 3-5-nata foliolis acuminatis; *inflorescentia* (6) ampla, laxa, pyramidalis, basi foliosa, laxe pilosa, aculeis validis, falcatis geniculatis armata, glandulis sessilibus crebris obsita; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, elongatis, multiflori; *sepala* inermia, laxe reflexa; *petala* (7) magna, ovata, pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylis virescentes superantia; *germina* pilosa. *Pollinis* gradus puritatis 5/6. Species serotina. — Julius-augustus.

β. *OBTUSIFLORENS* Sud. in hb. Müller; *R. glaucinus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 309, ex pte (nom. sol.) — Turio obsolete angulatus; foliolum terminale ellipticum vel obovatum, inflorescentia brevis, obtusa; flores albi.

γ. *RHOMBEUS*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 335! — Folia discolora, grosse et subinciso-serrata; foliolum terminale rhombeum, basi cuneatum; inflorescentia pyramidalis, foliosa.

GERMANIA OCCIDENTALIS : Sarrebrück, St-Johan (Winter). Merzig-s.-Saar (Schuhler); *Guestphalia* (Demandt); AUSTRIA, Gloggnitz (Halacsy); BRITANNIA, Dorset, Hants, Surrey, Oxford, Derby, etc. (Rogers); GALLIA MEDIA ET MERIDIONALIS : Seine-et-Oise, Morvan, Auvergne, Tarn, Ariège. — β. GALLIA : Marne, Haute-Marne (Levent). — γ. GALLIA : Tarn, Sorèze, vallée de La Mandre.

HYBRIDÆ

R. WINTERI × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 54 (1900); *R. PSEUDO-WINTERI* Sud. l. c. — Differt a *R. Winteri* foliolis cuspidatis, rachide minus pilosa, stylis rubris. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Aulus; Saône-et-Loire, le Creusot (Quincy).

R. WINTERI × *TOMENTOSUS* Lloydianus Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LI (1904) p. 15; *R. SUBROSILIS* Sud. l. c. — Habitus *R. Winteri* sed folia albo-tomentosa, grosse serrata, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : Puy-de-Dôme, Arlanc, via Chassaingues-Hautes.

R. WINTERI × *VESTITUS* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 34 (1904); *R. LASIODERMIS* Sud. l. c.; *R. leucostachys* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. p. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 119, ex pte. — Turio glaucescens; aculei validi, aequales; dentes acuti; foliolum terminale ovatum; inflorescentia dense pilosa, eglandulosa. Sterilis.

BRITANNIA : Dorset, Wimborne (E.-F. Linton).

b. — (T. LXXX) — *R. winteriformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 115 (1901).

Differt a *R. Winteri* P.-J. Müll. : foliolo terminali late ovato (8), abrupte acuminato; foliis grosse serratis, subtus albo-tomentosus; aculeis majoribus, ramealibus subrectis; pedunculis patulis (9); petalis (10) orbicularibus, staminibus stylisque roseis; germinibus glabris, polline valde admixto.

GALLIA : in Pyrenæis centralibus, Cazeaux-Debat, prope Arreau.

D. — (T. LXXXI) — *R. ELLIPTICIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 55 (1900), excl. var. β.; *R. portuensis* G. Samp. in *Ann. Sc. Nat.* (1902); *Rub. Port.* p. 44; *R. striatus* N. Boul., ex pte.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 122, 336!; *Assoc. rub.* n° 1073 (s. n. *R. striati*).

Turio glaucescens, faciebus leviter excavatis, pilosus, aculeis compressis armatus; *folia* supra glabra, subtus breviter pubescentia, dentibus mediocribus, inaequalibus, acutis; *foliolum* terminale (1) angustum, ellipticum vel elliptico-obovatum, basi rotundatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *stipulae* lineares, glandulis sessilibus sparsis munitæ; *ramus* angulatus, aculeis sparsis, falcatis armatus; *folia* 3-5-nata; *inflorescentia* (2) magna, laxa, pyramidalis, subaphylla, laxe pilosa, aculeis sparsis instructa; *pedunculi* medii patuli, multiflori, saepe a basi ramosi, pedicellis gracilibus, breviter pilosis; *sepala* inermia; *petala* angusta ovata (3), pallide rosea; *stamina* alba, stylis virescentes; *germina* parce pilosa. *Pollen* imperfectum.

β. *FOLIOLOSUS*. — Inflorescentia usque apicem foliosa, aculeis falcatis armata; flores albi. *R. Winteri* similis.

GALLIA : in Pyrenæis aurigeranis, Ax, Foix, Aulus, etc.; Tarn, Teulet; LUSITANIA : Melgaço, Vila do Conde, Maia, Porto, Valongo, Gaya, etc. (G. Sampaio). — β. GALLIA : Haute-Marne, Charmoy (Madiot).

OBS. — La plante de Portugal fructifie moins bien que celle des Pyrénées, mais n'en diffère pas autrement.

HYBRIDÆ

R. ELLIPTICIFOLIUS × *CLETHROPHILUS*?; *R. ARGETINUS* Sud. hb. — Differt a *R. ellipticifolio*: turione obsolete angulato, foliolis angustioribus, argute serratis, staminibus pallidis stylis roseos æquantibus.

GALLIA : Ariège, Foix, vallée de l'Argent.

R. ELLIPTICIFOLIUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 56 (1900); *R. MARCAILHOANUS* Sud. l. c.; *R. portuensis* × *ulmifolius* G. Samp. *Rub. Port.* p. 79. — Habitus *R. ellipticifolio* sed inflorescentia ampla, multiflora, styli rubri; sterilis.

GALLIA : Ariège, Ax, Orgeix.

R. ELLIPTICIFOLIUS × *BIFRONS*. — LUSITANIA, prope Porto (G. Sampaio). — Mihi novus est.

E. — (T. LXXXI) — *R. PROPINQUUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 20 (1859); *Sud. Rev. Rub. Hb. Bor.* p. 30; *Bouvet Rub. Anj.* p. 30, non N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 106, nec *Genev. Mon.* 258 (*pr. max. pte*); *R. ulmifolius* \times *thyrsoides* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 79, *ex pte*; *R. argentatus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 39, non P.-J. Müll.; *R. cuspidifer* G. *Genev. Mon.* p. 263, *ex pte*, non M. et Lef.; *R. abbreviatus* Boul. et Feuilleaubois *Assoc. rub.* n° 420; *R. crassifolius* Gen. *Ess. Mon.* p. 236 (1869), *Mon.* p. 279?; *R. Godronii* var. *holmariensis* Spribille *Zett. Nat. Abt. Posen* (1902), 119 (39).

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 30; *Assoc. rub.* n° 420, 474, 485, 582; *Sud. Bat. eur.* n° 17! 337; *Baenitz Hb. eur.* n° 10382 (*R. holmariensis* Sprib.).

Validus; *turio* faciebus planis vel leviter excavatis, glaucescens, parce pilosus, aculeis validis, compressis armatus; *folia* supra glabrescentia, subtus pubescentia, albo-tomentosa, argute et subsimpliciter serrata; *foliolum* terminale (4) ovatum, subemarginatum, satis abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *stipulae* angustæ, glandulis sessilibus sparsis munitæ; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis validis reclinatis falcativis armatus; *folia* plerumque 3-nata; *inflorescentia* (5) ampla, lata, basi foliosa, piloso-hirsuta, aculeis sparsis instructa; pedunculi medii patuli, multiflori, pedicellis brevibus; *sepala* inermia; *petala* (6) suborbicularia, rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylos virescens longe superantia; *germina* parce pilosa; *antheræ* glabrae vel interdum pilosæ. *Pollen* parum admixtum.

β. *IMMITS*; *R. immitis* Bor. *Fl. cent. ed. 3* p. 188 (1857); *Sud. Rub. Hb. Bor.* p. 33; *Bouvet Rub. Anj.* p. 31 (1907), non *Genev. Mon.* p. 63. — *Exsicc.* : *Sud. Bat. eur.* n° 338. — *Foliolum* terminale profunde cordatum, breviter petiolulatum; *inflorescentia* brevis, latissima, multiflora, subinordinata.

γ. *ACUTICUSPIS* Sud. in *Bouv. Rub. Anjou* (1907) p. 32. — *Foliolum* terminale suborbicularare, abrupte et longe acuminate.

δ. *CONFUSUS* Sud. in *Bouvet Rub. Anjou* (1907) p. 32; *R. confusus* Gen. *Mon.* p. 269, *ex pte*. — *Foliolum* terminale rhombicum, basi integrum.

ε. *PSEUDO-BIFRONS* Sud. in *hb.* Müller; *Bouvet Rub. Anjou* p. 32 (1907); *R. tristifrons* (Rip.) Gen. *Mon.* p. 302 p. p.; *R. discolor* Gen. *Mon.* p. 262, non W. et N.; *R. argentatus* Genev. *Mon.* p. 268, *ex pte*, non P.-J. Müll.; *R. cuspidifer* var. *vulnerificus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 67 et 68, *ex pte*. — Differt a *R. propinquum*: foliololo terminali basi latiore, saepe integro, apice oblique cuspidato; dentibus divaricatis, rachide laxe pilosa, staminibus minus elongatis, antheris glabris.

ζ. *PSEUDO-RUSTICANUS* Sud. in *hb.* Müller. — *Folia* supra obscure viridia, foliorum figura *R. vulgatum* revocant; cetera ut in *R. propinquum*.

η. *MACROBLOPHORUS*; *R. macrobelophorus* Sud. *Diagn.* p. 17 (1906). — Aculei validi, elongati; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum; *inflorescentia* laxe pilosa, densa, armata; *antheræ* pilosæ vel glabrae.

θ. *DUMOSUS* Sud. in *hb. Mus. Paris*; *R. dumosus* Lefèv. *Assoc. rub.* n° 76; N. Boul. *Diagn.* p. 22; *Rub. disc.* p. 529; *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 68. — *Exsicc.* : *Sud. Bat. eur.* n° 339! — *Folia* argute serrata; *foliolum* terminale late ellipticum vel obovatum, basi rotundatum, abrupte acuminatum; *folia* ramealia supra pilosa, foliolis obovatis; *inflorescentia* densa, parum armata; *antheræ* glabrae.

ι. *BELOPHOROIDES*; *R. belophoroides* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 22 (1902). — *Folia* grosse serrata, parum discolora, supra parce pilosa; *foliolum* terminale suborbicularare, cuspidatum; rachis hirsuta aculeis validis armata; flores vive rosei; *antheræ* glabrae. — *Habitus R. vestiti*.

GALLIA MEDIA ET OCCIDENNALIS, BRITANNIA, GERMANIA, *Posen* (Spribille). — Β. GALLIA: *Maine-et-Loire*, *Sarthe*. — γ. GALLIA: *Vendée*, *Sarthe*, *Orne*, *Oise*. — δ. GALLIA: *Vendée*, *Maine-et-Loire*, *Loire-inf.* *Sarthe*, etc. — ε. GALLIA: *Vendée*, *Maine-et-Loire*, etc. — ζ. GALLIA: *Côtes-du-Nord*, *Loire-inférieure*, *Haute-Garonne*. — η. GALLIA: *Valois*, *Le Plessis-au-Bois* (Questier). — θ. GALLIA: *Aisne*, *Oise*, *Sarthe*. — ι. GALLIA: *Deux-Sèvres*, *La Châtre*, prope *Le Temple* (Genevier).

OBS. — Le type *R. propinquus* P.-J. Müll., de Pindray (Vienne), que j'ai distribué dans mon *Batotheca europaea* n° 17, est très distinct des *R. Winteri* et *Godronii*; mais par sa var. *pseudo-bifrons* il se relie à ces deux espèces. Le nom de *R. immitis* Bor. est plus ancien que celui de *R. propinquus*, mais il a été donné à une forme peu normale qui ne saurait être prise pour type de l'espèce. La var. *pseudo-rusticanus* est extrêmement voisine du *R. heteromorphus* Rip. et ne s'en distingue guère que par son pollen un peu irrégulier et ses axes florifères plus hérissés. — Le *R. tristifrons* Rip. in *Genev. Mon.* p. 302 rentre apparemment dans le *R. propinquus* P.-J. Müll., tel que je le comprends, et se rattache vraisemblablement à la var. *pseudo-rusticanus*. Je n'en ai pas vu de spécimens authentiques.

HYBRIDÆ

× e *Silvaticis*.

R. PROPINQUUS var. ε. × *QUESTIERI*; *R. PERFRONDOSUS* Sud. et Bouv. in *Bouvet Rub. Anj.* p. 65 (1907). — *Habitus R. propinquui* var. ε. sed *folia* subviridia, *inflorescentia* multiflora, foliosa, *styli* rosei. Sterilis.

GALLIA: *Maine-et-Loire*, Angers; inter Prullé et Grez (Bouvet).

R. PROPINQUUS × *CONSOBRINUS* v. *ferox* Sud. *Diagn.* p. 17 (1906); *R. EUCHROANTHUS* Sud. l. c. — *Turio* glaucescens; *folia* subtus pubescentia; *inflorescentia* laxa; flores vive rosei.

GALLIA: *Loire-Inférieure*, bois de St-Aignan (de l'Isle).

R. PROPINQUUS × *LASIOOTHYSUS* Sud. *Diagn.* p. 18 (1906); *R. LASIOPUS* Sud. l. c. — *Habitus R. propinquui* sed minus discolor, pubes ut in *R. lasiothysus*.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, carrefour du Passage (Questier).

R. PROPINQUUS × *CARDIOPHYLLUS* Sud. *Diagn.* p. 17 (1906); *R. CARDIOPHYLLOIDES* Sud. l. c. — Differt a *R. propinquum* foliis minus discoloribus, foliolis terminalibus suborbicularibus. Parum fertilis.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Questier).

× e *Discoloribus*.

R. PROPINQUUS × *ULMIFOLIUS* Sud. et Bouvet; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 44 (1902); *R. PROPINQUIFORMIS* Sud. et Bouv. l. c.; *R. Saulii* Gen. p. p., non Rip.; *R. occiduus*? *Assoc. rub.* n° 610; *R. Questieri* × *ulmifolius* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 78, *ex pte*. — Differt a *R. propinquum* foliis supra obscure viridibus, rachide minus pilosa, floribus vive roseis. Sterilis.

GALLIA: *Vendée*, St-Hilaire, à la Croix-Bouchère (Genevier), Evrunes, Mortagne; *Maine-et-Loire*, Angers, Cholet (Sudre, Bouvet); *Sarthe*, Le Mans (Coilliot); *Indre-et-Loire*, Chaveignes (Tourlet); *Valois*, forêt de Retz, au Rond-des-Dames (Questier) [= var. *PSEUDO-DUMOSUS* Sud. in *hb. Mus. Paris*; *R. propinquus* v. *dumosus* × *ulmifolius*].

R. PROPINQUUS × *CUSPIDIFER*; *R. SEMIPROPINQUUS* Sud. — *Turio* pruinosis *R. propinquum* sed *folia* *R. cuspidiferi*. Parum fertilis.

GALLIA: *Eure*, Armentières-sur-Avre (Jourdes).

R. PROPINQUUS × GENICULATUS Sud. *Diagn.* p. 18 (1906); *R. JACULIFER* Sud. *l. c.* — *Turio pruinosis R. propinqui*; pubes foliorum rachidæque ut in *R. geniculato (cerasifolius)*; inflorescentia aculeis validis, subrectis armata. Sterilis.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz, chemin de Bourgfontaine à Villers-Cotterets (Questier).

R. PROPINQUUS × PUBESCENS emollitus v. *falcatispinus* Sud. et Bouv. *ap. Bouv. Rub. Anj.* p. 67 (1907); *R. RIGIDISPINUS* Sud. et Bouv. *l. c.* — *Turio pruinosis*; foliolis aculeisque ut in *R. emollii* var. *falcatispino*. Multiflorus sterilis.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, de Seches à Montreuil (Bouvet).

X ex *Appendiculatis*.

R. PROPINQUUS × TOMENTOSUS Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 45 (1902); *R. HOOLEUCUS* Genev. *Ess. Rub. M.-et-L.* (1860) p. 39; *Mon.* p. 311, *ex pte.* — Habitus *R. propinqui* sed folia ramealia supera supra leviter tomentosa; flores albi. Sterilis.

GALLIA : *Vendée*, Mortagne (Genevier).

R. PROPINQUUS × VESTITUS Isucanthemus Sud. *Bat.* p. 7 (1893); *R. PILEODERMIS* Sud. *l. c.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 18 ! — *Turio pruinosis*; folia minute serrata; foliolum terminale suborbicularare. Sterilis eglandulosusque.

GALLIA : *Cantal*, Aurillac, via Vic-sur-Cère; *Valois*, forêt de Retz.

R. PROPINQUUS × ADSCITUS; *R. PERDOLOSUS* Sud. *hb.*; *R. phyllostachys* Gen. *p. p.*, non P.-J. Müll. — Folia grosse serrata; inflorescentia parce glandulosa. Sterilis.

GALLIA : *Vendée*, Eyrunes (Genevier).

F. — (T. LXXXI) — **R. Caldasiyanus** G. Sampaio (*pr. sp.*) *Pl. nov. Fl. Port. in Ann. Sc. nat.* VIII (1902) n° 6; *tir. à part* p. 6; *Rub. Portug.* p. 50; *Bat. eur.* p. 22.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 66 !

Turio obsolete angulatus, glabrescens, glaucescens, aculeis compressis armatus; *folia* supra parce pilosa, manifeste discolora, minute denticulata; *foliolum* terminale (7) obovatum, basi integrum, cuspidatum, petiolulo proprio duplo vel tripli longius, infima petiolulata; *stipulae* lineares, eglandulosa; *ramus* pubescens, aculeis falcatis munitus; *folia* 3-5-nata, supra pilosa, foliolis obovatis; *inflorescentia* subaphylla, densa, hirsuta, aculeis falcatis sparsis munita; *pedunculi* (8) breves, patuli; *sepala* pilosa, inermia; *petala* (9) ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *antheræ* glabrae; *germina* glabra. — *R. propinquus* v. *dumoso* admodum similis, a quo differt floribus albis, foliis albo-tomentosis.

LUSITANIA : Montalegre, Terras de Bouro, Vieira, Povoa de Lanhoso, Amarante (G. Sampaio). .

Subsectio B. — *Hedycarpi* (Focke)

Conspectus specierum

I. — *Turio* pubescens vel pilosus, faciebus planis.

- A. — Petala orbicularia, magna, vive rosea; aculei validi; stamina longa.....
- B. — Petala ovata vel obovato-suborbicularia, raro vive rosea.
 - a. — Folia subtilis appressa albo-tomentosa, argute serrata; rachidis aculei subrecti; petala rosea, styli virides.....
 - b. — Folia subtilis pubescentia; rachidis aculei vulgo curvati.
 - 1. — Folia grosse vel mediocriter serrata; petiolorum aculei mediocres.....
 - 2. — Folia minute denticulata; petiolorum aculei validi, curvati.....
- II. — *Turio* canaliculatus, pilosus.....
- III. — *Turio* glaber vel parce pilosus; petala alba vel pallide rosea.
- A. — *Turio* glaber, mediocris; basis inflorescentia aculeis elongatis, rectis vel reclinatis munita; petala pallida, obovata vel ovata; ramus glabrescens.....
- B. — *Turio* validus, faciebus planis vel concavis; inflorescentia aculeis falcatis armata; petala magna, lata.....

R. GILLOTH N. Boul. 52

R. bifrons Vest. 51

R. cuspidifer M. et L. 53

R. Lindebergii Müll. 54

R. pubescens Wh. 55

R. geniculatus Kalt. 56

R. procerus P.-J. Müll. 57

51 — (T. LXXXII) — **R. BIFRONS** Vest. in *Tratt. Ros. Mon.* III, 28, (1823); Focke *Syn.* p. 186 et *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 505; Gremli *Beit.* p. 46; Hal. *Oest. bromb.* p. 229; N. Boul. *Rub. disc.* p. 517; *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 63; *R. discolor* G. G. *Fl. Fr.* I p. 546, *ex pte*; God. *Fl. Lorr.* 2^e ed. I p. 239, non W. et N.; *R. speciosus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 13; *R. rusticanus* var. *silvestris* Merc.; *R. albatus* Bayer; *R. amœnus* Molendo in *Flora* (1857) p. 468 ?

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. 1 n° 4, 39, 53, 77; ed. 2 n° 9, 10; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 5, 5 bis; *Assoc. rub.* n° 6, 373, 1074; F. Schultz *Hb. norm.* n° 250; Billot *Fl. gall. et germ.* n° 3073; *Rub. gall.* n° 23, 118, 164; Baenitz *Hb. eur.* n° 9973; Sud. *Bat. eur.* n° 19, 340; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 264.

Turio (1) arcuato-prostratus vel scandens, angulatus, faciebus planis, sparsim appressa pilosus, epruinosus; *aculei* validi, e basi compressa, dilatata, longi, recti; *folia* 5-nata (2), nonnunquam 3-nata, supra obscure viridia, glabra vel parce pilosa, subtus appressa albo-tomentosa, argute serrata, dentibus parum profundis, majoribus refractis; *foliolum* terminale breviter obovatum, interdum ovatum vel ellipticum, basi rotundatum, integrum vel leviter emarginatum, breviter et abrupte acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis uncinatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis sessilibus obsitæ; *ramus florifer* angulatus, pubescens, aculeis validis armatus; *folia* 3-nata, argute serrata; *inflorescentia* (3) elongata, parum foliosa, laxè pilosa, aculeis validis, rectis vel reclinatis instructa; *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori, pedicellis brevibus, bracteis glandulis subsessilibus munitis; *sepala* tomentosa, breviter pilosa, vulgo inermia, in flore et fructu reflexa (4); *petala* (5) late ovata, suborbicularia, pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* satis imperfectum (6). — Julius.

β. DURIMINIUS G. Sampaio in *Ann. Sc. Nat.* (1902); *Rub. Port.* p. 49. — *Folia* 3-nata, subtus pilosa; inflorescentia subinermis.

In locis apertis, saxosis, ad viarum limites. — GERMANIA, BELGIA, GALLIA, HELVETIA, AUSTRIA, ITALIA, HISPANIA, LUSITANIA. — β. LUSITANIA.