

HYBRIDÆ

R. BIFRONS × SULCATUS Sabrs. *in hb.* Sud.; *R. PLICATIFORMIS* Sabrs. *O. B. Z.* (1905). — *Turio glaber*; *folia parum discolora*; *inflorescentia* *R. sulcatum* revocat.

AUSTRIA : *Styria*, Soeschau (Sabransky).

R. BIFRONS × ULMIFOLIUS Sud. *Bat. eur.* p. 23 (1904); *R. MODESTIFRONS* Sud. *l. c.* — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 67 ! — *Habitus R. bifrontis* sed *inflorescentia laxa*, *parum pilosa*, *flores vive rosei*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Brassac, Mazamet, Grandval, Pont-de-Cirou; *Lusitania* (G. Sampaio); BELGIA : Barze (Charlet); Hyon, Linkenbeck, Watermael (du Pré).

R. BIFRONS × CUSPIDIFER Sud. *ap. Gandg. Nov. Cons.* p. 141 (1905); *Diagn.* p. 49 (1906); *R. REDUCTISPINUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. bifronti* folioli terminali suborbiculari, cuspidato, rami aculeis brevibus, inflorescentia valde laxa. Sterilis.

GALLIA : *Valois*, « Plessis-au-Bois, lisière de la forêt de Villers-Cotterets » (Questier).

R. BIFRONS × TOMENTOSUS; *R. SCHWARZERI* Holuby *O. B. Z.* xxiii (1873), 376. — Exsicc. : *Baenitz Hb. eur.* n° 2606 !, 9936. — Differt a *R. bifronti*: *foliis superis supra tomentosis*, *rachide pilosiore*, *floribus pallidis*. Sterilis.

HUNGARIA : Podhrad (Holuby); GERMANY : Koenigsberg, etc.

R. BIFRONS × TOMENTOSUS Lloydianus; *R. INCONSTANS* Sud. *in hb.* Müll. — Differt a *R. Schwarzeri* Hol. *foliis supra glabris*, *pallide viridibus*.

GALLIA, GERMANY, HELVETIA, etc.

OBS. — Le *R. bifrons* × *thelybatus* Zinsmeister Bay. *Bot. Ges.* (1906), 526; *R. neoburgensis* ej., *l. c.*, a peut-être la même origine. Je ne crois pas qu'il dérive du *R. thelybatus* F. Il n'est pas toutefois identique au *R. inconstans*.

R. BIFRONS × VESTITUS Sud. *Bat. p.* 7 (1903); *R. PERROUDII* Sud. *l. c.*; *R. macroacanthus* Perroud et Cast. *Guide Frib.* p. 94, *ex pte*, *non W.* et *N.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 20. — Differt a *R. bifronti* foliolis latioribus, pilosis, rachide hirsuta, petalis latioribus. Subglandulosus sterilisque.

GALLIA : Versailles (Bouly de Lesdain); forêt de Retz (Questier), HELVETIA, Villarimboud (Perroud); BAVARIA, Nürnberg (Hoenig); BELGIA : Anderghem (du Pré).

(×?). *R. BIFRONS × ... ?* *R. PSEUDO-MELANOXYLON* Hal. *Oest. bromb.* p. 246 (1891); *R. melanoxyylon* Hal. et Br. *non Müll. et Wirtg.* — AUSTRIA : Wien (Halacsy). — Mihi novus est.

R. BIFRONS × OBSCURUS erraticus v. *anostachys* Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1809); *R. MISCELLUS* Sud. *l. c.* — *Turio obtusus*; *discolor*, *dentes tenues*, *glandulæ subsessiles*, *inflorescentia inermis*; *sterilis*.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-Cirou.

R. BIFRONS × FORMIDABILIS; *R. EUCHROUS* Sud. — Differt a *R. bifronti* foliis minus discoloribus, grosse serratis, inflorescentia armata, petalis staminibusque purpureis. Glandulæ subsessiles frequentes.

GALLIA : Forêt de Rambouillet (M^{me} Bélèze).

R. BIFRONS × SERPENS Sud. *Rub. tarn.* p. 21 (1909); *R. PERGRACILISPINUS* Sud. *l. c.* — *Turio glaucescens*, *glandulosus*; *aculei inaequales*; *folia 3-5-nata*, *leviter discolora*; *rachidis glandulæ pallidæ*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Vabre.

R. BIFRONS × HIRTUS (gr.); *R. NUDICAULIS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 123 (1869) et exsicc. n° 107 (pr. spec.). — Differt a *R. bifronti* aculeis ramealibus subinaequalibus, foliis parum discoloribus, inflorescentia glandulis rubris munita, floribus albis. Sterilis.

GALLIA : *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

52 — (T. LXXXIII) — *R. GILLOTII* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 415 (*Annot.*); *Rev. Rub. disc.* (1891) p. 23; *Rub. disc.* p. 525; *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 66; Sud. *ap. Gandg. Nov. Cons.* p. 141; *R. Godronii*, *Thuillieri*, *macroacanthus*, *Lingua Bor. Fl. Cent.* éd. 3; *R. litigiosus* Boul. et Gill. *Assoc. rub. (prior)*, *ex pte*; *R. Neesii* Rip. in *Genev. Ess. mon.* p. 227 (1869) et *Mon.* p. 264, *ex pte*.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 7, 374, 415, 418 (p. p.), 419, 490, 618, 619, 1161, 1162; *Rub. gall.* n° 24, 70, 71; Sud. *Bat. eur.* n° 21, 341; *Baenitz Hb. eur.* n° 9949.

Validus; *turio* (1) *angulatus*, *faciebus planis vel leviter excavatis*, *parce pilosus*; *aculei* *crebri*, *robusti*, *basi compressi*, *dilatati*, *recti*; *folia* 5-nata, *supra glabra*, *subtus albo-tomentosa*, *breviter pilosa*, *inæqualiter serrata*, *dentibus acutis nonnullis refractis*; *foliolum terminale* (2) *ovatum*, *basi rotundatum vel vix emarginatum*, *acuminatum*, *petiolo proprio duplo longius*, *infima petiolula*; *petiolus* *planus*, *aculeis crebris*, *validis*, *falcatis uncinatis*; *stipulae angustæ*, *glandulis sessilibus sparsis munitæ*; *ramus florifer* *pilosus*, *aculeis robustissimis*, *falcatis armatus*, *foliis 3-5-natis foliolis acuminatis*; *inflorescentia* (3) ± *foliosa*, *densa*, *laxe hirsuta*, *aculeis validis*, *reclinatis falcatis armata*; *pedunculi* *medii breves*, *multiflori*, *patulo-ascendentes*; *bractæ* *glandulis subsessilibus sparsis obsitæ*; *sepala* *tomentosa*, *laxe pilosa*, *inermia*, *in flore et fructu reflexa* (4); *petala* (5) *magna*, *orbicularia*, *vive rosea*; *stamina* *stylos longe superantia*; *germina* *vulgo pilosa*; *receptaculum* *glabrescens*. *Pollen admixtum* (6). — Julius.

α. *NEMOPHILUS* Sud. *Bat. eur.* n° 21; *R. nemophilus* Rip. in *Genev. Ess. mon.* (1869) p. 206; *Mon.* p. 255; *R. protermissus* Rip. in *Genev. l. c.* (*ex pte*). — *Foliolum terminale ovatum*; *stamina alba vel dilute rosea*; *styli virescentes*; *germina pilosa*.

β. *HOLORHODUS*; *R. holorhodos* Rip. in *Genev. Mon.* p. 256 (1880). — *Foliolum terminale suborbiculare*; *stamina stylique rosea*; *germina glabrescentia*.

R. Gillotii differt a *R. bifronti*: *aculeis majoribus*, *crebrioribus*; *foliis profunde serratis*; *inflorescentia densiore*; *petalis majoribus*, *latioribus*, *vive roseis*; *staminibus longioribus*.

In locis siliceis apertis, ad sæpes et viarum limites. — GALLIA CENTRALIS : Morvan, Aveyron, Tarn, Plateau central.

HYBRIDÆ

R. GILLOTII × ULMIFOLIUS Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 241 (1899); *R. PSEUDO-GILLOTII* Sud. *l. c.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 22 ! — *Habitus R. Gillotii* sed *folia supra obscure viridia*, *appresse tomentosa*, *rachis tomentosa*. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Loupiac, Ste-Gemme; *Puy-de-Dôme*, Riom (Lamotte).

R. GILLOTII × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 45 (1902); *R. coruscus* Sud. *l. c.* — *Habitus R. Gillotii* sed *folia grosse serrata*, *rachis hirsuta*, *flores pallidiore*.

GALLIA : *Tarn*, Gaillac; *Cantal*, Molompise, Vic-sur-Cère; *Dordogne*, Lauquier.

R. GILLOTII \times *VESTITUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. LI (1904) p. 16; *R. BORTENSIS* Sud. — Differt a *R. Gillotii* turione pilosiore, foliis minute serratis, rachide hirsuta.

GALLIA : *Cantal*, Murat ; *Corrèze*, Bort.

53 — (T. LXXXIV) — R. CUSPIDIFER M. et Lef. Vers. n° 21 (1859); N. Boul. Rub. disc. p. 527; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 67; Sud. ap. Gdg. Nov. Cons. p. 142, non Genev. Mon. 233; R. spina curva Boul. et Gillot Assoc. rub. exsicc. n° 102. Notes p. 34; Genev. Mon. p. 317; R. ustulatus (Lef.) Genev. Mon. p. 277?

Fysica — Assoc. ruyb. nos 102, 164 ! 225, 268, 271, 484, 486, 621, 630.

Exsicc. — ASSOC. RUR. II. 102, 104: 333, 335, 337, 339, 340.

Validus; *turio* angulatus, faciebus planis, laxe pilosus; *aculei* robusti, basi compressi, recti; *folia* 5-nata (1), supra fere glabra, pallide viridula, subtus albo-tomentosa, breviter pilosa, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbicularre, basi rotundatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus aculeis falcatis uncinatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis sessilibus sparsis munitæ; *ramus florifer* obsolete angulatus, pilosus, aculeis compressis, obliquis, falcatis armatus; *folia* 3-5-nata, foliolis munitæ; *ramus* *florifer* obsolete angulatus, pilosus, aculeis compressis, obliquis, falcatis armatus; *inflorescentia* (2) pyramidalis, saepe usque ad apicem foliosa, laxe hirsuta, aculeis crebris, reclivis, abrupte acuminatis; *pedunculi* mediæ patulo-ascendentes, multiflori, pedicellis brevibus; *bractæ* glandulis subsessilis sparsis munitæ; *sepala* tomentosa, pilosa, vulgo inermia, in flore et fructu reflexa (3); *petala* (4) suborbicularia, abrupte et breviter unguiculata, alba vel pallide rosea; *stamina* alba styllos virescentes longe superantia; *germina* pilosa. *Pollen* parum admixtum (5). — Julius.

S. ORBICULATUS Sud. *Diagn.* p. 19 (1906). — *Pervalidus*; *turio leviter canaliculatus*; *foliolum terminale cordato-orbiculatum*; *dentes grossi, inaequales*; *inflorescentia parum armata, apice aphylla*.

CORDIBASIS Sud. *Ronc.* p. 14 (1904). — *Turio glabrescens*; foliola latissima, marginibus sese tegentia, terminale orbiculare (6), cordatum, cuspidatum; dentes tenues; inflorescentia conferta, stamina stylique pallida.

RHOMBOPHYLLUS Sud. *Bat. eur.* p. 43 (1905) et exsicc. n° 123. — *Foliolum caulinum terminale late rhombicum, breviter petiolatum; stamina styligae pallidae. Habitus R. lepidi P.-J. M.*

R. robusti (L.) Benth. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 163 (s. n. *R. robusti*). — Turio obtusus, *R. vallium* Sud. Rub. Pyr. p. 119 (1901). — petiolatum ; staminia stylique pallida. Folia 15-20 mm.

ζ. SUBRECTISPINUS Sud. *Ronc. bret.* p. 14 (1904). — Folia subtus manifeste pilosa, argute serrata ; foliolum terminale ovatum, basi rotundatum, breviter acuminatum ; rami aculei subrecti ; inflorescentia densa, multiflora ; petala staminata rosea ; styli virescentes.

R. grossedentatus Boul. et Motelay Assoc. rub. n° 166 (1875). — Dentes lati, parum profundi; foliolum terminale late ovatum, emarginatum; rami aculei subrecti; inflorescentia subinermis; petala, stamina stylique vive rosea.

G. CALLIACANTHUS; *R. calliacanthus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 117 (1901). — Aculei crebri, validi ut in *R. Gillottii*; foliolum terminale suborbiculare, emarginatum, cuspidatum; pedunculi patuli (8); petala rosea, stamina dilute rosea, styli rubri; germina pilosa.

R. oegacanthus Sud. *Diagn.* p. 20 (1906); *R. spicatus* (Lef.) Gen. *Mon.* p. 278? — *Turio subcanaliculatus*; folia minute serrata, supra obscure viridia; foliolum terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; ramulus; aculei subrecti, elongati (9); inflorescentia densa, hirsuta; petala rosea; stamina stylique pallide rosea.

HAB. — Ad saepes et limites viarum. — GALLIA: *Aisne*, *Oise*, *Seine-Inf.*, *Maine-et-Loire*, *Sarthe*, *Eure-et-Loir*, *Tarn*, etc. — β . *Valois*, bois de Ste-Catherine (Questier). — γ . *Finistère*, Quimerch, Châteaulin. — δ . *Tarn*, *Sarthe*, *Maine-et-Loire*. — ϵ . *Maine-et-Loire*, *Hautes-Pyrénées*. — ζ . *Finistère*, gorges de Toull an Dioull. — η . *Gironde*, Lamotte, au Castéra (Motelay). — ν . *Hautes-Pyrénées*, vallée d'Aulon, Guchen. — ι . *Loire*, *Finistère*, *Auxerrois* (de l'île).

OBS. — M. Focke (*ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 476*) fait du *R. cuspidifer* L. et M. une var. du *R. rhamnifolius* W. et N. et lui donne comme synonymes *R. propinquus* N. Boul. (qui n'est pas celui de Müller) et *R. rosulentus* Goetz, qui, d'après les échantillons que j'ai reçus sous ce nom, appartiennent au *R. integrabasis* P.-J. Müll. J'ai tout lieu de croire que M. Focke n'a pas vu de spécimens authentiques de la plante de Lefèvre.

HYBRIDÆ

R. CUSPIDIFER \times *SPRENGELII* Sud. ap. Gdg. Nov. Conspl. p. 142 (1905); *R. PHILYROPHYLLUS* Lef. et M. Vers. n° 127 (1859); *R. Sprengelii* \times *hedycarpus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 77. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 41! — Folia ut in *R. cuspidifera*; aculei minus validi; infl. rescentia glandulis brevibus sparsis munita; stamina stylis breviora. Sterilis.

CALIA : *Aisne*. Buisson de Waligny (Lefèvre, Questier).

R. CUSPIDIFER \times *CARDIOPHYLLUS* Sud. ap. Gd. Nov. *Consp.* p. 142 (1905); *R. COMPLANATUS* Boul. et Letendre *Assoc. rub.* n° 215 (1877); *R. cuspidifer* N. Boul. ex pte. — Differt a *R. cuspidifero* rachide minus pilosa, inflorescentia laxa, polline atropho. Sterilis.

Cuspidaria N. Bou.: ex psc. Direct à M. Ampère.
Gaulle : Seine-Inf. Grand-Quévilly, prope Rouen (Letendre).

R. CUSPIDIFER \times *ULMIFOLIUS* Sud. *Ronc. bret.* p. 14 (1904); *R. elongatiracemosus* Sud. l. c.; *R. longiracemosus* Assoc. rub. n° 685, non Timb. — *Habitus cuspidiferi* sed *folia supra obscure viridia*, appresse tomentosa; *inflorescentia elongata*; *flores rosei*, steriles.

Gaulle: *Eure*, *Finistère Nord*, *Valois*, *Pyrénées*.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

Peltaria suborbicularia : foliolum caule terminale ovatum, suborbiculare vel obovatum.

- A. — Folia supra glabra vel pilis raris munita.

 - a. — Foliolum caulinum terminale late ovatum vel suborbiculare ; rami aculei obliqui ; pollen parum admixtum..... *R. cuspidifer* L. et M.
 - b. — Foliolum caulinum terminale vulgo obovatum ; pollen valde imperfectum.
 - 1. — Foliola caulina marginibus sese tegentia ; rami aculei crebri, curvati..... *R. DENSUS* Sud. c.
 - 2. — Foliola caul. marginibus sese non tegentia ; rami aculei subrecti.
 - a. — Turio angulatus ; petala pallida..... *R. VULNERIFICUS* Lef. b.
 - b. — Turio teres ; petala rosea..... *R. COMPLANATISPINUS* Sud. d.

B. — Folia supra appresse pilosa ; foliola magna, lata..... *R. MEGACLADUS* Sud. B.

II. — Petala ovata, distantia ; foliolum terminale rhombeum vel ellipticum.

- A. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta ; dentes tenues vel mediocres.
 - a. — Inflorescentia magna, laxa, aculeis validis, crebris armata; folia cinerascentia ; styli rubri..... R. DIFFICILIS Sud. C.
 - b. — Inflorescentia densa ; folia discolora ; foliolum terminale rhombeum..... R. LEPIDUS P.-J. Müll. D.
- B. — Inflorescentiae rachis parce pilosa ; folia grosse serrata ; foliola rhombica..... R. RHOMBIFRONS Sud. Db.
- b. — (T. LXXXV) — R. vulnerificus Lef. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1877) p. 222 (s. n. R. vulnerifici, nomen sol.) ; Genev. Mon. p. 261, ex pte ; Corb. Fl. Norm. p. 201 ; R. intersitus P.-J. Müll. Bonpl. 1861 (nom. sol.) non Sud. ; R. bipartitus (Boul. et Bouv.) Assoc. rub., ex pte ; R. cuspidifer v. vulnerificus N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 67 (1900).

Exsicc. — Assoc. rub. n° 237 ; Sud. Rub. rar. n° 42 !

Diffrert a R. cuspidifero L. et M. : turione (1) pube stellulata, pilosiore, aculeis longe subulatis, in petiolis falcatis, in ramo subrectis, longissimis ; foliolo terminale (2) obovato, basi integro ; inflorescentia obtusa, pedunculis minus patulis (3) ; polline valde imperfecto. R. bifronti Vest interdum similis a quo differt foliis subtus pilosis, foliolis obovatibus, rachide pilosiore.

β. UMBROSUS Corb. Fl. Norm. p. 201 (1894). — Exsicc. : Assoc. rub. n° 820, 879, 880 ; Ch. Magnier Fl. sel. n° 3763 ; Rub. gall. n° 25. — Pili coactiles ; folia minute denticulata ; petala rosea, stamina stylique pallide rosea.

γ. FEROX Corb. l. c. p. 201. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 892, 893 ; Rub. gall. n° 27. — Serratura ut in typo ; inflorescentia coactili-hirsuta, armatissima ; sepala aculeata ; stamina stylique pallida.

δ. APRICUS Corb. l. c. p. 201. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 830, 881 ; Rub. gall. n° 26. — Serratura tenuis et pili coactiles ut in var. β, sed aculei rameales breves, crebri, debiles, inaequales, leviter curvati ; stamina stylique pallida.

GALLIA BOREALIS : Aisne, Oise, Seine-Inf^e, Manche, Maine-et-Loire, Cher. — β. γ. δ. Manche (Corbière).

HYBRIDÆ

R. VULNERIFICUS × MACROPHYLLUS Sud. Diagn. p. 21 (1906) ; R. SEMIVULNERIFICUS Sud. l. c. — Parum discolor ; folia ampla, lata. Sterilis.

GALLIA : Valois, Waligny (Questier).

R. VULNERIFICUS × ULMIFOLIUS Sud. ; R. MARTINII Corb. Rub. Gall. n° 126 (1897) ; R. ulmifolius × vulnerificus Boul. et Corb. l. c. — Turio pruinosus ; folia appresse tomentosa, rachis pilosa. Parum fertilis.

GALLIA : Manche, Pont Rilly (Lebel).

c. — (T. LXXXV) — R. densus Sud. Ronc. bret. p. 14 (1904).

Turio pilosus ; aculei validi, crebri ; foliola lata, marginibus sese tegentia (5), breviter petiolulata, terminale obovato-orbiculare, basi emarginatum, apice truncato-cuspidatum ; folia ramealia 3-5-nata, minute serrata, foliolis cuspidatis ; inflorescentia angusta, elongata, densusima, aculeis validis, compressis, reclinatis vel geniculatis armata ; pedunculi (6) breves ; sepala aculeata ; petala rosea ; stamina alba stylos roseos parum superantia ; germina glabra ; pollen imperfectum. — Habitus R. cuspidiferi v. cordibasis sed turio pilosus, inflorescentia densa, styli rubri, etc.

GALLIA : Finistère, Quimper, Pont-l'Abbé, etc.

HYBRIDA

R. DENSUS × ULMIFOLIUS Sud. Ronc. bret. p. 15 (1904) ; R. DENSIFORMIS Sud. l. c. — Habitus R. densi sed turio pruinosus, folia appresse tomentosa. Sterilis.

GALLIA : Finistère, Le Plomeur, Quimper, via Corag.

d. — (T. LXXXV) — R. complanatispinus Sud. Rub. Pyr. p. 102 (1901).

Turio teres (7), pilosus ; aculei validi, compressi ; folia subtus cinereo-tomentosa, pilosa, simpliciter serrata ; foliolum terminale late ovatum vel obovatum, basi rotundatum, cuspidatum ; ramus obtusus aculeis validis, rectis vel falcatis armatus, foliis 3-natis ; inflorescentia brevis, lata, obtusa, armata (9) ; sepala inermia ; petala (8), stamina stylique rosea ; germina pilosa. — Intermedius fere inter R. villicaulum et R. cuspidiferum.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Aulon.

B. — (T. LXXXV) — R. megacladus Sud. Rub. Pyr. p. 120 (1901).

Validus ; turio (10) faciebus planis, pilosus ; folia supra pallide viridia, pilis crebris, appressis obsita, subtus albo-tomentosa, pilosa, subsimpliciter et mediocriter serrata ; foliola magna, lata, marginibus sese tegentia, terminale orbiculare, cordatum, cuspidatum, petiolulo proprio triplo longius, infima subsessilia ; ramus pilosus, aculeis reclinatis falcatis armatus ; folia 3-5-nata, superiora supra leviter tomentosa ; inflorescentia magna, subaphylla, hirsuta, aculeis mediocribus, reclinatis falcatis instructa (11) ; petala pallide rosea ; stamina alba stylos virescentes superantia ; germina glabra. Pollinis gradus puritatis 4/5.

GALLIA : Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes, vetula via Laruns ; Manche, Cherbourg.

C. — (T. LXXXVI) — R. difficilis Sud. Rub. Pyr. p. 56 (1900) p. 117 ; Bat. p. 54 ; R. ellipticifolius var. rubristylus Sud. l. c. p. 55 ; R. megathamnus Müll. et Timb. Bonpl. (1861) p. 309 (nom. sol.).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 162 !

Turio pube stellulata, pilosus, faciebus planis, aculeis validis, rectis ; folia (1) supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, subsimpliciter serrata, dentibus parum profundis ; foliolum terminale anguste ovatum vel ellipticum, basi integrum, satis abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata ; petiolulus aculeis falcatis ; stipulæ glandulæ subsessilibus obsitæ ; ramus subteres, pilosus, aculeis validis, falcatis, foliis 3-5-natis, foliolis acuminatis ; inflorescentia (2) magna, laxa, subaphylla, pilosa, aculeis validis, crebris, compressis, reclinatis falcatis armata ; pedunculi medii elongati, patuli, multiflori ; sepala inermia ; petala (3) ovata, in unguem attenuata, distantia, lète rosea ; stamina rosea stylos rubros longe superantia ; germina glabra. Pollen (4) valde imperfectum ; receptaculum pilosum. Fertilis. — Aculei R. elongalispinum revocant, foliolorum figura R. ellipticifolium.

GALLIA : in Pyrenæis centralibus frequens : Ascou, Mérens, Arreau, Jézeau, Bordères, Cazeaux-Débat, etc.

HYBRIDÆ

R. DIFFICILIS × *ULMIFOLIUS*; *R. SEMIDIFFICILIS* Sud. — Habitus *R. difficilis* sed folia appresse tomentosa, serratura inaequalis, flores vive rosei, petala suborbicularia.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, vallis Aurensis (Duffort).

R. DIFFICILIS × *CUSPIDIFER* v. *vallium* Sud. Rub. Pyr. p. 118 (1901); *R. PSEUDO-VALLIUM* Sud. l. c. — Folium terminale ovato-acuminatum, flores pallidi, steriles vel parum fertiles.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Bordères.

R. DIFFICILIS × *THYRSOIDEUS hispidulus* Sud. *l. c. p. 119* (1901); *R. INORDINATUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. difficilis* turione canaliculato, foliis grosse serratis, pedunculis ascendentibus, floribus pallidis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, inter Cadéac et Arreau.

R. DIFFICILIS × *TOMENTOSUS* Sud. l. c. p. 119 (1931); *R. IMPERMISUS* Sib. l. c. — *Habitus R. difficilis* sed turio glabrescens, folia superiora supra tomentosa.

GALLIA : Hautes-Pyrénées. Arreau, bois de Bédat.

D. — (*T. LXXXVI*) — **R. lepidus** P.-J. Müll. in *Jahr. Pollich.* (1859) p. 294; **R. argenteus** Wirtg. in *sched.*, non *W. et N.*; **R. amiantinus** Focke *Syn.* p. 195 (1877); **N** Boul. *Rub. disc.* p. 534; **R. Godronii** Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 510, *ex pte*; **R. malgrangianus** Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 51 (1887); **R. cavaticaulis** Boul. et Gillot (*ex pte*), *Assoc. rub.* n° 487 (1882); **R. spina curva** Boul. et Gill. *Assoc. rub.* n° 489, *non prius*; **R. albiflorus** \times *ulmifolius* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 79; **R. villicaulis** var. *beirensis* G. Samp. in *Ann. Sc. nat.* (1904); **R. obtusangulus** var. *beirensis* G. Samp. *Rub. Port.* p. 41 (1904).

Exsicc. — Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 15 (*R. discolor*), ed. 2 n° 12 ! (*R. argenteus*) ; Assoc. rub. n° 487, 489 ; Bat. eur. n° 351.

Turio faciebus planis, pilosus, aculeis validis, compressis; *folia* (5) supra glabra, subtus albo-tomentosa, ± pubescens-
centi-velutina, dentibus acutis, inaequalibus; *foliolum* terminale angustum, rhombicum vel oblongum, vulgo basi
integrum, acuminatum; *petiolis* aculeis falcatis uncinatis armatus; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis mediocribus,
subfalcatis, foliis 3-5-natis foliolis acuminatis; *inflorescentia* (6) elongata, densa, pyramidalis, subaphylla, coactili-
hirsuta, aculeis crebris, ± reclinatis falcatis munita; *pedunculi* patuli; *sepala* pilosa, sæpe aculeata; *petala* (7) ovata,
in unguem attenuata, rosea; *stamina* pallide rosea stylos superantia; *germina* parce pilosa. Pollen parum admixtum (8).

R. STENOPHYLLUS Sud. *Fl. Toul.* p. 73 (1907); *R. stenophyllum* P.-J. Müll. *Vers.* n° 32 (1859); *R. colliculus* v. *stenophyllum* Sud. *Bub. Hb. Bor.* p. 39 (1902). — *Gracilis*; foliolum terminale anguste rhombicum; pedunculi ascendentibus, flores albi.

GALLIA : *Vienne, Sarthe, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Saône-et-Loire, Meurthe-et-Moselle, Oise, Gers, etc.* — GERMANIA : *Provincia rhenana, Coblenz* ! *Winningen* (Wirtgen) ; HELVETIA, *Villarimboud*, la *Folliaz* (Perroud) ; LUSITANIA, *Guarda*, *Vila-Réal* (G. Sampaio). — β. GALLIA : *Vienne, Montmorillon* ! *Chaboisseau* ; *Hte-Garonne*, *Balma*, *Bouconne*.

HYBRIDÆ

R. LEPIDUS × *ULMIFOLIUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 142 (1903) ; *R. CONFERTIFLORENS* Sud. l. c. ; *R. cavaticaulis* ? Boul. et Gill. Assoc. rub. n° 615 (non 317). — Turio pruinosa; folia obscure viridia, appresse tomentosa, rachis pilosa. Sterilis.

GALLIA : Sarthe, Les Courbes, Le Mans (Coilliot); Saône-et-Loire, Brion, le Pignon Blanc (Lucand).

R. LEPIDUS × *TOMENTOSUS*; *R. LEPIDIFORMIS* Sud. *hb.*; *R. discolor* var. *velutinus* Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. I n° 38. — *Habitus R. lepidi sed folia flaccida superiora supra tomentosa.*

GERMANY: Prop. *xrenana*, Bertrich (Wirtgen).

b. — (T. LXXXVI) — *R. rhombifrons* Sud. *hb.*
 Differt a *R. lepido* foliis grosse serratis (9), aculeis ramealibus subrectis, inflorescentia (10) laxa, parce pilosa;
R. rhombifolia Wh. similis.

R. rhombofolia Willd. Smiths. GALLIA : Loire-Inf., le Gâvre (Henry); Meurthe-et-Moselle, bois de Boussières (Salle); LUSITANIA : montagne de Bussaco (G. Sampaio). — T. LXXXVII) — R. LINDEBERGII P.-J. Müll. in Pollich. XVI (1859), 292; Aresch. Some Obs. g. Rub. p. 144;

Rogers Handb. Brit. Rub. p. 33; *R. rhamnifolius* B. Lindebe

Turio arcuatus, angulatus, faciebus planis vel sursum leviter concavis, pilosus, glandulis sessilibus obsitus; *aculei* validi, basi valde compressi, recti vel subfalcati; *folia* 5-nata (1, 2), parva, supra pallide viridia, appresse pilosa, subtus cinereo-tomentosa et pilosa, minute subæqualiter et simpliciter serrulata; *foliolum* terminale late obovatum, basi rotundatum vel leviter emarginatum, abrupte acuminatum, longe petiolatum, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis validis, crebris, fortiter falcatis; *stipulae* linear-lanceolatae, glandulis sessilibus sparsis munitæ; *ramus* florifer angulatus, pilosus, aculeis validis, falcatis armatus; *folia* 3-nata, subtiliter denticulata, aculeis petiolaribus validis, falcatis; *inflorescentia* (3) densa, basi foliosa, hirsuta, aculeis robustis, crebris, falcatis munita; *pedunculi* medii breves, leviter ascendentes, 2-3-flori, pedicellis brevibus; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia, in fructu reflexa (4); *petala* obovata (5). basi attenuata, alba; *stamina* alba stylos virescentes longe superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen imperfectum (6). — Differt a *R. polyanthemo* Lindg. foliolis terminalibus obovatis, aculeis petiolaribus valde majoribus, curvatis, inflorescentia armatiore, eglandulosa. — Julius.

SCANDINAVIA BRITANNIA

55 — (T. LXXXVIII) — R. PUBESCENS Wh. in Boenningh. Prod. Fl. Monast. 152 (1824); Wh. et N. Rub. germ. 42 t. XVI; Focke Syn. p. 199; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 490; Hal. Oest. bromb. p. 232; N. Boul. Rub. disc. p. 530; Sud. an. Gandg. Nor. Consn. p. 142; non Vest in Tratt., nec Ser. in DC Prodr. II, 559.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 548

Turio arcuatus, sursum procumbens, angulatus, sulcatus, epruinosus, pubescens vel pilosus; *aculei* validi, sparsi, basi compressi, recti vel parum arcuati; *folia* 5-nata (1, 2), supra parce pilosa, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pilosa, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* terminale anguste ovatum vel ovato-oblongum, basi integrum vel vix emarginatum, sensim acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima angusta, ± petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis; *stipulae* lineares, glandulosis subsessilibus sparsis instructæ; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis falcatis, foliis 3-5-natis foliolis acuminatis. *Inflorescentia* (3) ampla, elongata, subaphylla, piloso-hirsuta, aculeis crebris,

falcatis armata ; *pedunculi* breves, saepe e basi ramosi, 2-3-flori, pedicellis elongatis, patulis ; *sepala* cinereo-tomentosa, pilosa, inermia, reflexa (4) ; *petala* obovata (5), alba vel pallide rosea ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* parce pilosa ; *receptaculum* pilosum ; *pollen* valde imperfectum (6). — Julius.

R. CONTECTUS ; *R. coarctatus* var. *connectus* N. Boul. Assoc. rub. n° 703 (1886). — Folia supra pilis appressis ; *pedunculi* ascendentes, elongati.

Ad sepes et silvarum margines. — GERMANIA : *Guestphalia*, Minden ! (Weihe), *Saxonia*, *Thurinjia*, *Bavaria* ; AUSTRIA : Bozen, Klobenstein, Goerz (Halacsy) ; LUSITANIA (G. Sampaio) ; GALLIA : *Hte-Garonne*, *Balma* — *R. GALLIA* . *Seine-et-Marne*, Fontainebleau (Feuilleaubois).

HYBRIDA

R. PUBESCENS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. hb. ; *R. TRICOTHECUS* Waisbecker *Oest. bot. Zeit.* (1893) 394. — Exsicc. : Baenitz Hb. eur. n° 8879. — Differt a *R. pubescens* aculeis debilibus, foliis flaccidis, dentibus latis, floribus sterilibus.

HUNGARIA, prope Güns (Waisbecker) ; GERMANIA : *Saxonia*, Egertal (Missbach).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentia aculeis crebris armata.

- A. — Folium caulinum terminale basi latum, ovatum, sensim acuminatum.
 - a. — Folium terminale longe petiolatum ; pedunculi e basi ramosi.....
 - b. — Folium terminale breviter petiolatum ; pedunculi elongati, non e basi ramosi.....
- B. — Folium caulinum terminale obovatum, cuspidatum, interdum rhombeum.
 - a. — Folia flaccida, molia, supra pilis appressis munita.
 - 1. — Aculei validi, aequales, basi compressi, dilatati.....
 - 2. — Aculei debiles, subinæquales, leviter subulati.....
 - b. — Folia firma, supra glabra.
 - 1. — Manifeste discolor ; rachis laxe pilosa ; pedunculi patuli, breves, e basi ramosi.....
 - 2. — Parum discolor ; rachis hirsuta ; pedunculi ascendentes.....

II. — Inflorescentia subinermis; pedunculis ascendentibus.

- A. — Folium caulinum terminale obovatum ; folia flaccida ; petala suborbicularia.....
- B. — Folium terminale ovatum ; petala ovata vel obovata.
 - a. — Petala stylique rosea ; foliola infima petiolata.....
 - b. — Petala stylique alba ; foliola infima subsessilia.....

b. — (T. LXXXIX) — *R. evagatus* Sud. Bull. Assoc. Pyr. n° 284 (1902) ; Bat. p. 8 ; *R. elatior* Focke exsicc. ; Syn. 171, pr. min. p.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 28.

Differt a *R. pubescens*, foliolis caulinis terminalibus (1) basi latis, ± emarginatis, breviter petiolatis, inflorescentia minus laxa, bracteis latis munita (2) ; pedunculis e basi non ramosis, pedicellis valde brevioribus. Petala (3) alba vel dilute rosea.

HYBRIDÆ

* *R. EVAGATUS* × *TARNENSIS* Sud. Rub. tarn. p. 22 (1909) ; *R. PILOSPINUS* Sud. l. c. — Parum discolor ; sepala patula ; flores vive rosei. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Boucardenque, prope Rosières.

R. EVAGATUS × *ULMIFOLIUS* Sud. Bat. p. 23 (1904) ; *R. EVAGATIFORMIS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 68. — Folia supra obscure viridia ; inflorescentia magna ; petala suborbicularia, rosea. Parum fertilis.

GALLIA : *Tarn*, Albi, Grésigne, Cambon, Foncouverte, Fréjairolles ; *Haute-Garonne*, Eaunes.

R. EVAGATUS × *GILLOTII* Sud. Rub. tarn. p. 22 (1909) ; *R. HIRSUTIRAMUS* Sud. l. c. — Differt a *R. evagato* foliis acute serratis, aculeis validioribus, ramis dense pilosis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Ambialet, via Villefranche.

R. EVAGATUS × *TOMENTOSUS* ; *R. ERIOPSILON* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI (1899) p. 87 ; *R. collinus* de Martr.-D. Fl. Tarn p. 245, non DC. — Folia supra tomentella, rachis hirsuta, bracteæ latæ, flores albi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, in collibus, prope Villefranche (de Martrin-Donos).

R. EVAGATUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI p. 16 (1904) ; *R. LATIDENTATUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 352. — Differt a *R. evagato* dentibus latioribus, foliis albo-tomentosis, bracteis latis ; sterilis.

GALLIA : *Cantal*, Aurillac, via Vic-sur-Cère ; *Tarn*, Albi, Tonnac.

B. — (T. LXXXIX) — *R. EMOLLITUS* Sud. Rub. Pyr. p. 56 (1900), 120, 121 ; *R. pubifolius* Müll. et Timb. Bonpl. 1861 (nom. sol.).

Exsicc. — Sud. : Bat. eur. n° 353 !

Differt a *R. pubescens* : foliis pallide viridibus, mollibus, supra pilosis, subtus cinereo-tomentosis ; foliolis terminalibus (4) late ovatis vel breviter obovatis, acutis vel cuspidatis ; inflorescentia piloso-hirsuta, bracteæ trifidæ, pedunculis (5) elongatis, patulis, non e basi ramosis. Petala (6) pallide rosea, fere alba ; stamina alba stylos virescentes superantia ; pollen valde imperfectum. Interdum folia subtus viridia (s.-var. *virescens* Sud. l. c. et exsicc. Rub. rar. n° 45 !)

R. TRUNCIFRONS ; *R. truncifrons* Sud. in hb. Müller ; Diagn. p. 20 (1906). — Folium terminale suborbiculare, truncato-cuspidatum ; rachis laxe pilosa ; petala rosea, styli pallide rosei. *R. cuspidifero* similis.

? *FALCATISPINUS* Sud. in Bouvet Rub. Anjou (1907) p. 34 ; *R. rostratus* Boul. et Foucaud Assoc. rub. n° 322 (1879). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 44. — Folium terminale obovatum, angustum ; inflorescentia laxissima, aculeis falcatis vel geniculatis armata.

? *CONFLUENTINUS* Sud. in Bouvet. l. c. p. 34 ; *R. confluentinus* Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1, n° 75 ; *R. acanthostachys* P.-J. Müll. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 354. — Folium terminale rhombeum ; dentes lati ut in *R. tomentoso* ; inflorescentia magna, aculeis crebris, geniculatis armata.

? *PERARMATUS* Sud. Rub. tarn. p. 22 (1909). — Habitus typi, sed aculei validi, in ramo recti ; inflorescentia armatissima, flores albi.

GALLIA : Pyrénées, Languedoc, Morvan, Bretagne, etc. — HELVETIA, GERMANIA OCCIDENTALIS, MORAVIA.

HYBRIDÆ

R. EMOLLITUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 121 (1901); *R. INCOMMODUS* Sud. *l. c.* — *Folia supra obscure viridia, appresse tomentosa : flores rosei, steriles.*

GALLIA : *Hauts-Pyrénées*, Ys ; *Tarn*, Assac, St-Benoit, Rosières ; *Indre-et-Loire*, Chinon ; *HELVETIA* : Monsalvens (Jaquet).

R. EMOLLITUS × AMPLISTIPULUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 121 (1901); *R. LORONENSIS* Sud. *l. c.* — *Folia ut in R. amplistipulo; cetera ut in R. emollito. Sterilis.*

GALLIA : *Hauts-Pyrénées*, vallée de Louron.

R. EMOLLITUS × DIFFICILIS Sud. *l. c.* p. 121 (1901) ; *R. EMOLLITIFORMIS* Sud. *l. c.* — *Differt a R. emollito foliis minus pilosis, argute serratis ; foliolo terminali ovato, acuminato ; floribus roseis. Sterilis.*

GALLIA : *Hauts-Pyrénées*, Pailhac.

R. EMOLLITUS × LACERTOSUS Sud. *Rub. tarn.* p. 22 (1909) ; *R. ROBUSTISSIMUS* Sud. *l. c.* — *Differt a R. emollito foliis amplis, pedunculis ascendentibus, petalis magnis, latis.*

GALLIA : *Tarn*, Le Verdier, St-Benoit-de-Carmaux.

R. EMOLLITUS × THYRSOIDEUS phyllostachys ; *R. INCOMPERTUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 57 (1900). — *Turio glabrescens ; foliolum terminale suborbicularare, inflorescentia angustata. Sterilis.*

GALLIA : *Ariège*, Reims, prope Foix.

R. EMOLLITUS × TOMENTOSUS Sud. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 142 (1905) ; *R. LEUCOPHÆATUS* Sud. *l. c.* — *Folia supra tomentella R. tomentosum revocant ; cetera ut in R. emollito.*

GALLIA : Toulouse (Timbal) ; *Pyrénées-Orientales*, Collioure (Gillot).

R. EMOLLITUS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. in Bouvet *Rub. Anj.* (1907), p. 71 ; *R. MOLLIDENS* Sud. — *Differt a R. emollito foliis albo-tomentosis, grosse serratis, rachide hirsuta, floribus albis, petalis angustioribus.*

GALLIA : *Haute-Garonne*, Maine-et-Loire, Tarn.

R. EMOLLITUS var. γ × *OCCITANICUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 22 (1909) ; *R. STENOCERCUS* Sud. *l. c.* — *Turio glaber ; aculei parum inaequales ; inflorescentia glandulifera sparsis munita, flores albi. Foliola longe acuminata. Sterilis.*

GALLIA : *Tarn*, Carmaux, via Rodez.

C. — (T. LXXXIX) — **R. aduncispinus** Sud. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 142 (1905) ; *Bat.* p. 43 ; Bouvet *Rub. Anj.* p. 35 ; *R. pubescens* Genev. *Mon.* p. 271 (pr. max. p.) ; *R. thyrsoides* var. *phyllostachys* (non P.-J. Müll.) G. Samp. *Rub. Port.* p. 43.

Exsicc. — Sud. : *Bat. eur.* n° 124, 355 !

Inflorescentia *R. pubescensem* revocat a quo differt : foliis subappresse albo-tomentosis, supra glabris, argute serratis ; foliolo terminali (7) obovato, abrupte acuminato ; ramo parum piloso, inflorescentiae (8) rachide laxe pilosa. Aculei petiolaris ramealesque uncinati. Petala (9) pallide rosea.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, Torfou ; *Loire-Inférieure*, La Haye (de l'Isle) ; *LUSITANIA* : *Pavo de Lanhosa* (G. Sampaio).

b. — (T. LXXXIX) — *R. stenopetalus* Lef. et M. *Vers.* n° 27 (1859) ; *R. ulmifolius* × *thyrsoides* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 79 (ex pte).

Exsicc. — Sud. : *Bat. eur.* n° 342 !

Differt a *R. pubescenti* : turione minus piloso, fusco-rubro ; foliis supra glabris, argute serratis ; foliolo terminali (10) obovato, basi integro, satis abrupte et tenuiter cuspidato ; inflorescentia angusta, pedunculus (11) ascendentibus, non e basi ramosis. A *R. aduncispino* : foliis minus discoloribus, subtus pilosis, dentibus acutioribus, inflorescentiae forma dissimili. Petala angusta (12), pallide rosea. Aculeis crebris in inflorescentia, foliorum caulinorum foliolis infimis petiolulatis a *R. thyrsideo* diversus est.

GALLIA : *Valois*, bois de Tillet, près Vaumoise (Lefèvre, Questier).

HYBRIDA

R. STENOPELATUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Diagn.* p. 24 (1906) ; *R. SPHENOPHORUS* Sud. *l. c.* — *Differt a R. stenopetalo foliis supra obscure viridibus, appresse tomentosis, petalis latioribus. Foliola cuneata, cuspidata. Sterilis.*

GALLIA : *Valois*, « Le Fournet, chemin de la Tournelle à Ivors » (Questier).

D. — (T. LXXXIX) — **R. flaccidus** P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 10, p. 134 ; non Genev. *Mon.* p. 300.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 46 !

Turio leviter canaliculatus, parce pilosus, aculeis sparsis, compressis, rectis armatus ; *folia* supra glabra, pallide viridia, subtus albo-tomentosa, pubescens, dentibus lati, parum profundis ; *foliolum* terminale (13) breviter obovatum, subemarginatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio subtriplo longius ; *ramus* pilosus, foliis 3-5-natis, flaccidis, grosse serratis ; *inflorescentia* ampla, laxissima, basi foliosa, hirsuta, bracteis lati, aculeis sparsis, falcatis instructa ; *pedunculi* crassi, elongati, multiflori, patuli vel leviter ascendentes (14) ; *petala* suborbicularia (15), breviter unguiculata, pallide rosea ; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia ; *germina* pilosa. Fertilis. — Intermedius fere inter *R. pubescensem* et *R. thyrsoides*. *R. albifloro* admodum similis a quo differt : foliis minus amplis, albo-tomentosis, foliolo terminali obovato, inflorescentia laxiore.

GERMANIA : *Alsacia*, Weissenburg « lignes du Pigeonnier, Lauterbach, route de Bitche » (P.-J. Müller).

HYBRIDA

R. FLACCIDUS × *TOMENTOSUS* Sud. *Diagn.* p. 22 (1906) ; *R. FLACCIDIDENS* Sud. ap. Gdg. Nov. *Consp.* p. 142 (1905) ; *Diagn.* 22. — *Foliolis minus latis, foliis supra tomentellis, floribus sterilibus a R. flaccido facile distinguitur.*

GERMANIA : *Alsacia*, Weissenburg, prope Weiler (Müller).

E. — (T. LXXXIX) — **R. corisopitensis** Sud. *Ronc. bret.* p. 15 (1904)

Foliolum terminale (16) late ellipticum, satis abrupte acuminatum ; *inflorescentia* subinermis, usque ad apicem foliosa, pedunculus (17) elongatis, subascendentibus, multifloris ; *petala* (18) rosea, ovata ; *stamina* pallide rosea stylos carnosus superantia ; *germina* glabra. Cetera ut in *R. pubescensi*. — *R. thyrsideo* similis.

GALLIA : *Finistère*, Menez Kerque, prope Châteaulin ; *Loire-Inférieure*, La Haye, Auverné.

56 — (T. XC) — **R. GENICULATUS** Kalt. *Fl. Aachen Beck.* p. 267 (1845); Focke *Syn.* p. 202; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 513; N. Boul. *Rub. disc.* p. 534; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 143; *R. cerasifolius* Lef. et M. *Vers.* n° 33 (1859); *R. Godronii* var. *cerasifolius* N. Boul. *Rub. disc.* p. 539 (1898) et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 70; *R. protermissus* (Rip.) *Genev. Mon.* p. 256, p. p.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. 1 n° 74; ed. 2 n° 5; Billot n° 543; *Assoc. rub.* n° 328, 1159; *Rub. gall.* n° 165; Sud. *Bat. eur.* n° 343, 344 (*cerasifolius*!).

Turio (1) arcuatus, scandens, angulatus, faciebus planis, glaber, epuruinosus; *aculei* validi, basi valde dilatati, recti vel reclinati; *folia* 5-nata (2), ampla, supra glabra, subtus albo-tomentosa, ± pilosa, inaequaliter, acute et subduplicato-serrata; *foliolum* terminale ellipticum, oblongo-ellipticum vel rhombeum, basi integrum, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, parce pilosus, aculeis crebris, validis, falcatis vel (in apricis) uncinatis armatus; *stipulae* lineares; *ramus florifer* parce pilosus, aculeis elongatis, reclinatis; *folia* 3-5-nata, foliolis angustis, acuminatis; *inflorescentia* (3) magna, pyramidalis, basi interrupta et foliosa, laxe hirsuta, aculeis crebris, validis, longis, subrectis armata; *pedunculi* medii tenues, valde patuli multiflori; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia vel parce aculeata, in flore et fructu reflexa (4); *petala* (5) ovata, breviter unguiculata, alba vel pallide rosea; *stamina* alba styllos virescentes longe superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* parce pilosum. *Pollen* satis imperfectum (6). — Julius.

In nemoribus et sepiibus. — GERMANIA: Aachen, Bertrich (Wirtgen); BELGIA: Verviers, Stavelot, Woluwe-St-Lambert (du Pré), Ardennes belges (Durand), etc.; GALLIA: Valois, forêt de Retz (Lefèvre, Questier); Poitou, Le Rond (de Lacroix); Puy-de-Dôme, Arlanc, Ambert; Cher, Rhin-du-Bois (Désiglise); Indre-et-Loire, Gizeux (Tourlet); Meurthe-et-Moselle, Nancy.

Conspectus speciei, subspeciei et microgeneris

- A. — Foliolum terminale ellipticum vel rhombeum; *turio* planus..... *R. geniculatus* Kalt.
- B. — Foliolum terminale ovatum vel obovatum; *turio* faciebus convexis.
 - a. — Folia minute serrata; foliolum terminale ovatum vel obovatum..... *R. hebes* B. et Luc. B.
 - b. — Folia grosse et inaequaliter serrata; foliolum terminale obovatum..... *R. hebetatus* Sud. Bb.
- B. — (T. XCI) — **R. hebes** Boul. et Lucand *Assoc. rub.* n° 269 (1878); N. Boul. *Rév. Rub. disc.* p. 26; *Rub. disc.* p. 526; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 66; *R. obtusangulus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 476, ex pte, non Greml.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 269, 312, 492, 620, 1007; *Rub. gall.* n° 28.

A *R. geniculato* dignoscitur: *turio* (1) minus angulato, faciebus convexis, *foliolis* caulinis terminalibus brevioribus latioribusque, obovatiss vel late ellipticis. *Folia* ramealia plerumque 3-nata, argute serrata, foliolis terminalibus late ellipticis vel obovatiss, breviter acuminatis; *inflorescentia* laxe pilosa (2); *petala* obovata (3). *Pollen* valde imperfectum (4).

GALLIA: Saône et Loire, circa Autum (Gillot, Lucand).

b — (T. XCI) — *R. hebetatus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 122 (1901); *R. hebes* Sud. l. c. p. 11, non B. et Luc.; *R. macrocladus* Müll. et Timb. *Bonpl.* (1861) (nomen).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 47!

Differt a *R. hebeti*: *aculeis* validioribus, basi valde dilatatis, petiolaribus majoribus; *foliolis* terminalibus (5) angustioribus, basi cuneatis; *foliis* grosse serratis; *ramis* (6) laxe pilosis, *aculeis* validioribus armatis; *inflorescentia* laxiore, elongata, apice attenuata, dense pilosa. *Petala* (7) pallide rosea.

GALLIA: In Pyrenæis centralibus: Cauterets, Arreau, Luchon, etc. TIROLIA: Innsbruck (Progel).

57 — (T. XCII) — **R. PROCERUS** P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. Vosg.* p. 7 (1864); Sud. *Bat.* p. 43; *Genev. Mon.* p. 242 ex pte; *R. communis* Bayer *Bot. Excurs.* p. 298 (1869); *R. macrostemon* Focke *Syn.* p. 193 (1877); ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 508; Sud. *Rub. Pyr.* p. 123; *R. discolor* W. et N. *Rub. germ.* 46, ex pte; t. XX (1825); Greml. *Beitr.* p. 45; *R. Karstianus* Borb. *Term. Kœzl.* XXIV, 271 (1892); *R. macrostemon* var. *procerus* N. Boul. *Rub. disc.* p. 522 et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 65, ex pte; *R. robustus* *Genev. Mon.* p. 246, ex pte; *R. leucander* var. B. *procrus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 521 (1902); *R. candidans* Holuby exsicc., non Wh.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 6! *Assoc. rub.* n° 706, 637, 639, 690, 692, 941; Sud. *Bat. eur.* n° 125! Baenitz *Hb. eur.* n° 8551.

Validus; *turio* (1) arcuatus, scandens, angulatus, faciebus planis vel sursum leviter sulcatis, sparsim pilosus; *aculei* sparsi, robusti, basi dilatati, recti vel leviter falcati; *folia* magna, 5-nata, supra glabra, subtus albo-tomentosa, pubescens, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* terminale (2) late ovatum vel obovato-rhombeum, basi rotundatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, pubescens, aculeis uncinatis, basi dilatatis armatus; *stipulae* lineares, glandulis sessilibus sparsis munitæ; *ramus florifer* angulatus, pilosus, aculeis validis, sparsis, falcatis geniculatissimis armatus; *folia* 3-5-nata, foliolis terminalibus ovato-rhombeis, breviter acuminatis; *inflorescentia* (3) oblonga, basi interrupta et foliosa, hirsuta, aculeis crebris, falcatis geniculatissimis armata; *pedunculi* inferi leviter ascendentes, multiflori, superi erecto-patentes, cymoso-pauciflori; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia, in flore et fructu reflexa (4); *petala* (5) magna, ovato-orbicularia, breviter unguiculata, primum rosea, deinde fere alba; *stamina* alba vel dilute rosea stylis virescentes vel inferne roseos longe superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* pilosum. *Pollen* admixtum (6). — Junius-julius.

R. robustus Sud. *Bat.* p. 43 (1905); *R. robustus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 19 var. a (1859); N. Boul. *Ronc. Vosg.* p. 8; Sud. *Bat.* p. 23, non Presl. *Epimel. bot.* 196; *R. rhamnifolius* Godr. *Fl. Lorr.* 2^e ed. 1 p. 242, ex pte; *R. macrostemon* N. Boul. *Rub. disc.* p. 521 et var. *robustus* p. 523; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 65; *R. macrostemon* var. *dynatus* Focke ap. Asch. et Gr. l. c. p. 509; *R. Radula* v. *coloratus* Holuby exsicc., p. p. — Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 7! *Assoc. rub.* n° 417, 691, 693, 706; *Rub. gall.* n° 119; Sud. *Bat. eur.* n° 69; Baenitz *Hb. eur.* n° 10388. — Foliolum terminale late ovatum vel suborbiculare, leviter emarginatum; *inflorescentia* densior pedunculis superis patulis.

R. obtusangulus Sud. *Bat.* p. 54 (1906); *R. obtusangulus* Greml. *Beitr. Fl. Schw.* 19 (1870); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 476, ex pte. — Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 163. — Gracilior; *turio* planus; *folia* supra pilosa; *foliolum* terminale obovatum vel ovatum.

R. collisparsus Sud. *Bat. tarn.* p. 23 (1909); *R. collisparsus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. XLVI (1899), p. 86. — Gracilior; *turio* glaber; *aculei* minus validi; *folia* minora; *foliolum* terminale breviter petiolulatum; *inflorescentia* densa, laxe pilosa.

R. arrigentiflorus. — Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 356! — *Turio* obtusangulus, fere glaber; *folia* supra glabra subtus molliter pubescentia; *ramus* glabrescens; *inflorescentia* brevis, pedunculis mediis patulis, *aculeis*

validis, crebris, falcatis geniculatisve armatis; flores albi, germina glabra; pollen admixtum. Forma vergens in *R. arrigentem*.

ζ. BREVISTAMINEUS Sud. in hb. Müller. — Habitus typi sed: turio glabrescens, leviter canaliculatus; ramus glabrescens; stamina stylis breviora. *R. lacertoso* similis.

(?) ν. PRÆCOX; *R. præcox* Bertol. *Fl. Ital.* V, 220 (1842); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 509. — Differt a *R. procero* foliolis amplis, marginibus sese tegentibus, lateralibus infimisque breviter petiolulatis. — Mihi novus est.

Ad sepes et limites viarum. — GERMANIA, AUSTRIA, HELVETIA, BELGIA, GALLIA, ITALIA, TRANSCAUCASIA, LUSITANIA. — γ. HELVETIA. — δ. GALLIA: Tarn, Sarthe, Maine-et-Loire. — ε. BAVARIA: Wengen (Zinsmeister). — ζ. GALLIA: Maine, Chenay, Mersy (Levent). — η. ITALIA CENTRALIS.

OBS. — Bien que M. Focke rattache le *R. procerus* P.-J. Müll. à son *R. leucander* et identifie le *R. robustus* P.-J. Müll. à son *R. macrostemon*, j'estime, avec N. Boulay, que les *R. robustus* et *procerus* P.-J. Müll. ne sont que deux variétés d'un même type. Comme le nom de *R. robustus* a été donné à une forme du Pérou, l'espèce doit porter le nom de *R. procerus*, bien antérieur à celui de *R. macrostemon* F. Du reste, le groupe du *R. procerus*, tel que je le comprends, ne correspond pas exactement au *R. macrostemon* Focke puisqu'il englobe le *R. præcox* Bertol., que M. Focke considère comme une sous-espèce de son *R. hedyacarus*.

HYBRIDA

R. PROCERUS × *SULCATUS* Sud.; *R. MENYHAZENSIS* Simk. in *Term. füz.* IX p. 82; *R. discolor* × *sulcatus* Sabrs. *Oest. bot. Zeit.* (1892) — AUSTRIA, Menyhazi (Simonkai). — Mihi novus est.

R. PROCERUS × *BRACHYTHYRSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 123 (1901); *R. SINUUM* Sud. l. c. — Habitus *R. proceri* sed inflorescentia brevis, laxa, obtusa. Parum fertilis.

GALLIA: In *Pyrenæis centralibus*, Luchon, val de Burbe.

R. PROCERUS × *ULMIFOLIUS* Sud.; *R. robustifrons* Sud. ap. Gd. Nov. *Consp.* p. 113 (1901). — Exsicc.: *Sud. Bat. eur.* n° 346. — Differt a *R. procero* foliis supra obscure viridibus, inflorescentia multiflora, floribus vive roseis. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Saône-et-Loire, Indre et-Loire; LUSITANIA (*R. bifrons* v. *duriminius* G. Samp. p. p.)

R. PROCERUS × *GILLOTTII*; *R. AURELIACENSIS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t.* XI (1901) p. 17. — Turione pilosiore, aculeis validioribus, inflorescentia multiflora, floribus vive roseis a *R. procero* facile distinguitur.

GALLIA: Cantal, Aurillac, via Vic-sur-Cère.

R. PROCERUS × *THYRSOIDEUS*; *R. SEMIFECUNDUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 123 (1901). — Differt a *R. procero* turione canaliculato, aculeis debilitibus, dentibus latioribus. Parum fertilis.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Tramezaïgues.

R. SEMIFECUNDUS × *ULMIFOLIUS* Sud. l. c. p. 124 (1901); *R. IMPLICATUS* Sud. l. c. — Differta *R. semifecundo* foliis supra obscure viridibus, foliolo terminali integro, stylis rubris. Sterilis.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Tramezaïgues.

R. PROCERUS × *TOMENTOSUS* Sud.; *R. chnoophyllus* P.-J. Müll. ap. Billot *Annot. Fl. Fr. et All.* p. 291 (1862); *R. collinus* Godr. *Fl. Lorr.* 2^e éd. p. 240; Boul. *Ronc. vosg.* p. 85, non DC; *R. ablutus* Beck p. p.; *R. medioximus* Sabrs. p. p.; *R. romanus* Evers in *Scheda* (1892). — Exsicc.: *Ronc. vosg* n° 63; *Assoc. rub.* n° 1015; *Rub. gall.* n° 77; *Bat. eur.* n° 347. — Differt a *R. procero*: turione canaliculato, foliis flaccidis, grosse serratis, supra tomentosis, inflorescentia dense hirsuta, bracteis latioribus. Sterilis.

GALLIA: Meurthe-et-Moselle, Laxou, prope Nancy; Saône-et-Loire (Gillot); ITALIA, Roma (Evers).

R. PROCERUS × *TOMENTOSUS* Lloydianus Sud.; *R. collum* Sud. *Rub. Pyr.* p. 123 (1901); *R. thamnophilus* Rip. in *Genev. Mon.* p. 247? (1880); *R. medioximus* Sabrs. O. B. Z. (1891) p. p.; *R. ablutus* Beck *Fl. v. N. Oest.* II p. 727 (1892) p. p.; *R. dalmatinus* v. *tomentosus* Baenitz *Hb. eur.* n° 9992; *R. podhradiensis* Holuby pr. min. p., exsicc. — Habitus *R. chnoophylli* P.-J. Müll. sed folia supra glabra vel parce pilosa.

GALLIA, AUSTRIA, HUNGARIA, etc.

R. PROCERUS × *VESTITUS* Sud.; *R. robustiramus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t.* LII (1903) p. 333; *R. ulmifolius* × *vestitus* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9588; *R. ulmifolius* × *Francipanii* Focke. — Differt a *R. procero* turione dense piloso, rachide valde hirsuta. Sterilis.

HERCEGOVINA: Mostar (Baenitz).

Conspectus speciei, subspecierum et microgeneris

I. — Turio parce pilosus, faciebus planis vel leviter concavis.

- | | |
|---|---------------------------------|
| A. — Folia subtus albo-tomentosa, pubescentia; foliolum terminale latum; pollen parum admixtum..... | R. <i>procerus</i> P.-J. Müll. |
| B. — Folia subtus appresse cinereo-tomentosa, supra obscure viridia; foliolum terminale anguste ovatum; pollen valde imperfectum..... | R. <i>occiduus</i> B. et Bv. b. |

II. — Turio glaber, canaliculatus; foliolum terminale latum, cordatum.

- | | |
|---|------------------------------|
| A. — Pedunculi valde patuli, aculeis crebris armati; pollen valde admixtum..... | R. <i>ARRIGENS</i> Sud. B. |
| B. — Pedunculi ascendentis, aculeis sparsis; pollen parum imperfectum..... | R. <i>LACERTOSUS</i> Sud. C. |

b. — T. XCIII — *R. occiduus* Boul. et Bouv. *Assoc. rub.* n° 4 (1873); *Genev. Mon.* p. 236; Bouvet *Rub. Anj.* p. 36; *R. vagans* Clavaud *Assoc. rub.* n° 697 (1886); *R. Questieri* × *hedyacarus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 78, ex pte. An *R. Questieri* × *procero*?

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 48.

Turio (1) planus, parce pilosus; folia supra obscure viridia, subtus appresse cinereo-tomentosa, dentibus acutis, tenuibus, inaequabilis; foliolum terminale (2) elliptico-ovatum, basi integrum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius; inflorescentia laxa, breviter pilosa, aculeis crebris (3), falcatis armata; petala (4) pallide rosea, ovata; stamina alba vel dilute rosea carnos superantia; germina glabra. Pollen valde imperfectum (5). Fertilis.

β. CURTIPIES Sud. *Rub. tarn.* p. 23 (1909). — Exsicc.: *Bat. eur.* n° 348! — Foliolum terminale breviter petiolulatum; inflorescentia densa, styli virescentes.

γ. FLEXILIS; *R. flexilis* Sud. in hb. Müller. — Foliolum terminale basi cuneatum; pedunculi ascendentis; flores?

δ. COILLIOTH. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 357! — Foliolum caul. terminale basi cordatum, inflorescentia laxa, germina pilosa.

GALLIA: Maine-et-Loire, Angers, La Membrolle (Bouvet); Gironde, Lacanau (Clavaud); Sarthe, Le Mans; Haute-Garonne, bois d'Eaunes. — β. Tarn, La Sarrade; Gers. — γ. Haute-Garonne, Bouconne (Timbal). — δ. Sarthe, Le Mans, Magasins généraux, Pontlieu (Coilliot).

OBS. — A un peu le faciès du *R. Questieri* L. et M. et est intermédiaire entre cette espèce et le *R. procerus* P.-J. Müll. — Dans le valton de la Sarrade où la var. *curtipes* abonde, le *R. Questieri* est très rare et assez mal caractérisé; dans les bois d'Eaunes, il paraît manquer totalement. Il semble donc peu probable que le *R. occiduus* soit d'origine hybride.

HYBRIDA

R. OCCIDUUS × CARDIOPHYLLUS Sud. et Bouv. in Bouvet Rub. Anj. p. 66 (1907); *R. occiduiformis* Sud. et Bv. l. c. — Habitus *R. occidu* sed turio glaber, canaliculatus, pedunculi minus patuli, flores albi, perum fertiles.

GALLIA : Maine-et-Loire, Angers, étang St-Nicolas (Bouvet).

B. — (T. XCIII) — ***R. arrigens*** Sud. Bat. eur. p. 8 (1903).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 24 !

Turio (6) glaber, canaliculatus, aculeis robustis; *folia magna*, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, grosse et inaequaliter serrata; *foliolum terminale* (7) late ovatum, cordatum, breviter emarginatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius; *petiolus* aculeis crebris, falcatis uncinatisve armatus; *ramus* glabrescens; *inflorescentia* (8) ampla, foliosa, pilosa, aculeis validis, crebris, geniculatis uncinatisve armata, pedunculis valde patul. multifloris; *petala* (9) ovata, alba vel pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa; *pollen* valde admixtum (10). Fertilis.

β. AGASTACHYS; *R. agastachys* P.-J. Müll. et Wirtg. ap. Wirtg. Herb. rub. rh. ed. 1, n° 129 (1860). — Inflorescentia laxior, pedicellis longioribus, divaricatis, aculeis sparsis, minus curvatis; turio profunde canaliculatus. *R. thyrsideo* admodum similis.

GALLIA : Tarn, Albi, Crespinet, Carmaux, Sérénac, Cadalou, etc.; Canal, Chaliac-de-la-Chapelle-Laurent (Charbonnel). — β. GERMANIA : Coblenz (Wirtgen).

HYBRIDÆ

R. ARRIGENS × ULMIFOLIUS Sud. Rub. tarn. p. 23 (1909); *R. subcarneus* Sud. l. c. — Habitus *R. arrigentis* sed folia albo-tomentosa, rachis minus pilosa, flores vive rosei. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Carmaux, via Rodez.

R. ARRIGENS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. Rub. tarn. p. 23 (1909); *R. pseudo-ARRIGENS* Sud. l. c. — Habitus *R. arrigentis* sed folia flaccida, mollia, grosse serrata; rachis dense pilosa, bracteis latis. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Sérénac; inter Travanet et Arifat.

C. — (T. XCIII) — ***R. lacertosus*** Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI (1899) p. 99; Rub. Pyr. p. 58; Bat. p. 9; *R. cor-difolius* Bor. Fl. Cent. éd. 3 p. 203, non Wh. N.; *R. cardiophyllus* Gen. Mon. p. 248, p. p., non Lef. et M.; *R. anceps* Rip. exsicc., non Boul. et Let.; *R. nemophilus* Gen. p. p., non Rip.; *R. macranthemus* P.-J. Müll. inedit; *R. thyrsanthus* f. *grandiflora* F. Kretzer, exsicc.; *R. macrostemon* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 65, ex pte; *R. candicans* Holuby, exsicc.

Exsicc. — Rub. gall. n° 123 ! (s. n. *R. phyllostachys*); Assoc. rub. n° 491, 700; Baenitz Hb. eur. n° 9985 !; Sud. Bat. eur. n° 25, 349, 350.

Validus; *turio* (11) arcuatus, canaliculatus, glaber; *folia magna*, supra glabra, subtus albo-tomentosa, pubescens, grosse et inaequaliter serrata; *foliolum terminale* (12) late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *ramus* pubescens, aculeis validis, sparsis, foliis 3-5-natis foliolis acuminatis; *inflorescentia* (13) ± foliosa, hirsuta, aculeis sparsis, falcatis geniculatisve instructa; *pedunculi* inferi medieque ascendentes, superi subpatuli; *petala* (14) magna, late ovata, breviter unguiculata, vulgo rosea, interdum alba; *stamina* alba stylos virescentes vel pallide roseos longe superantia; *germina* parce pilosa. *Pollen* parum admixtum (15). — Habitus *R. thyrsideoi* sed robustior et elatior, foliorum caulinorum foliola infima petiolulata, petala latiora, pollen perfectius. Praecox. — Junius-julius.

β. *HAMULOSUS* Sud. in Bouv. Rub. Anj. p. 37 (1907); *R. macrostemon* v. *hamulosus* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 36; *R. humosus* Genev. Ess. Mon. p. 212 (1869); Mon. p. 251, ex pte; *R. stereocaulon* P.-J. Müll. hb., ined. — Aculei rameales uncinati, validi; flores rosei.

γ. INTEGRIBASIS Sud. in Bouv. Rub. Anj. p. 37 (1907). — Foliolum terminale basi cuneatum, dentes grossi, acuti.

δ. MEDULLOSUS; *R. medullosus* N. Boul. Rub. gall. n° 122 (*nomen*). — Foliola lata, argute serrata; inflorescentia aphylla, dense pilosa.

ε. MOLLITUS Sud. in Bouvet l. c. p. 38 (1907); *R. cardiophyllus* Genev. p. p., non Lef. et M. — Habitus var. δ. sed folia subtus molliter pubescentia, inflorescentia densa.

GALLIA; BELGIA; GERMANIA: Hannover (Kretzer); HUNGARIA (Holuby). — β. GALLIA: Deux-Sèvres, Marne, Maine-et-Loire. — γ. Tarn, Haute-Garonne, Maine-et-Loire. — δ. Gironde, Artigues (Brochon). — ε. Maine-et-Loire (Bouvet).

HYBRIDÆ

R. LACERTOSUS × ULMIFOLIUS Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. (1899) p. 98; Flor. Toul. p. 73; *R. Bosquetianus* Timb. et Müll. ap. de Martir. - Fl. Tarn p. 212 (1864); *R. Saulii* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 237 (1869); Mon. p. 280, p. p.; *R. orthobelus* Sud. in hb. Müller. — Exsicc. : Rub. gall. n° 68 ! Sud. Bat. eur. n° 358. — Folia ut in *R. lacertosus*; turio pubescens, inflorescentia laxa, flores rosei, steriles.

Passim, cum parentibus. — GALLIA: Tarn, Cher, Haute-Garonne, Ariège, etc.

R. LACERTOSUS × ULMIFOLIUS cruentiflorus Sud. Rub. tarn. p. 23 (1909); *R. luculentus* Sud. l. c. — Turio ut in *R. lacertosus*, folia ut in *R. cruentifloro*; flores vive rosei, steriles.

GALLIA: Tarn, Cambon.

R. LACERTOSUS × BIFRONS Sud. Rub. tarn. p. 23 (1909); *R. pseudo-LACERTOSUS* Sud. l. c. — Differt a *R. lacertosus*: foliis appressé tomentosis, minute serratis, inflorescentia laxiore. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Mazamet, Valdériès.

R. LACERTOSUS × ELLIPTICIFOLIUS Sud. Rub. Pyr. p. 59 (1900); *R. axensis* Sud. l. c. — Validus ut *R. lacertosus* a quo differt inflorescentia laxa, pedunculus patulus. Sterilis.

GALLIA: Ariège, Ax-les-Thermes.

R. LACERTOSUS × TOMENTOSUS; *R. pseudo-simillimus* Sud. — Exsicc. : Bat. eur. n° 359. — Differt a *R. lacertosus* foliis supra tomentosis, floribus albis, sterilibus.

GALLIA: Haute-Garonne, Balma, bois de St-Clair.

R. LACERTOSUS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 143 (1905); *R. latistipulus* Sud. l. c. — Folia flaccida, grosse serrata; stipulae bracteæque lata, flores albi

GALLIA: Tarn, Haute-Garonne, Gers, Cher [v. *biturigensis* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 47 (1902)].

R. LACERTOSUS × OCCITANICUS Sud. Rub. tarn. p. 23 (1909); *R. oligocarpus* Sud. l. c. — Habitus *R. lacertosus* sed aculei minus validi, inaequales, petala, stamina stylique rosea. Fructus male evolutus.

GALLIA: Tarn, Cambon.

Subsectio C. — Candicantes Focke p.p.

58 — (T. XCIV, XCV) — **R. THYRSOIDEUS** Wimm. *Fl. Schles.* ed. I. p. 204 (1840); Focke *Syn.* p. 161; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 485 (*spec. coll.*); N. Boul. *Rub. disc.* p. 539 et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 71; Sud. *Rub. Pyr.* p. 54; ap. Gdgr. *Nov. Cons.* p. 143; *R. montanus* Hal. *Oest. bromb.* p. 226, non Libert! *R. Decloeti* Ortm. in *Flora* (1835), 389.

Turio arcuatus, scandens, angulatus, canaliculatus, glaber vel parce pilosus, epruinosus; *aculei* mediocres, ad angulos dispositi; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pubescentia, inaequaliter, duplicato et saepe subinciso-serrata; *foliola* infima subsessilia; *stipulae* lineares; *ramus florifer* angulatus, saepe debilis, aculeis sparsis; *inflorescentia* saepe angusta, pilosa, pedunculis elongatis, ascendentibus, aculeis sparsis munita; *sepala* tomentosa, pilosa, in flore et fructu reflexa; *petala* vulgo obovato-oblonga, alba vel pallide rosea; *stamina* minus numerosa quam in *R. hedycarpis*, stylos pallidos superantia; *receptaculum* pilosum. *Pollen* valde imperfectum. — Præcox. Junius-julius.

Conspectus subspecierum et microgenerum

I. — *Turio* parce pilosus; inflorescentia saepe foliosa.

- A. — *Foliolum caulinum terminale late ovatum, basi emarginatum vel cordatum.*
 - a. — *Folia subtus albo-tomentosa; petala suborbicularia, rosea*
 - b. — *Folia subtus cinereo-tomentosa; petala anguste ovata, alba vel dilute rosea*
- B. — *Foliolum caulinum terminale obovatum vel rhombium, basi fere integrum.*
 - a. — *Dentes inaequales, lati; inflorescentia apice aphylla; turio distincte pilosus*
 - b. — *Dentes æquales, acutissimi, divaricati; inflorescentia foliosa; turio glabrescens*

II. — *Turio* glaber vel pilis raris munitus.

A. — *Foliolum caulinum terminale magnum, late ovatum vel suborbiculare.*

- a. — *Foliolum caulinum terminale acuminatum.*
 - 1. — *Foliola vulgo non plicata; petala ovata.*
 - a. — *Folia ampla; ramus parum pilosus; rachis laxe pilosa*
 - b. — *Folia mediocria; ramus pilosus; rachis coactili-pilosa*
 - 2. — *Foliola plicata; petala suborbicularia.*
- b. — *Foliolum caulinum terminale obovato-orbiculare, cuspidatum.*

B. — *Foliolum caulinum terminale anguste ovatum vel ellipticum.*

- a. — *Folia subtus subviridia; inflorescentia angusta, pauciflora, aculeis falcatis uncinatis.*
- b. — *Folia plerumque discolora; inflorescentia laxa, aculeis parum curvatis.*
 - 1. — *Foliolum caulinum terminale emarginatum; flores pallidi*
 - 2. — *Foliolum caulinum terminale basi integrum.*
 - a. — *Flores vive rosei, odorati; foliola infima distincte petiolulata*
 - b. — *Flores pallidi; inflorescentia parce aculeata, pedunculis ascendentibus*
 - c. — *Flores pallidi; inflorescentia aculeis crebris, pedunculis ± patuli*

R. *NEOMALACUS* Sud. A.
R. *PHYLLOSTACHYS* P.-J. Müll. B.

R. *LEVENTII* Sud. Bb.
R. *ACIODONTUS* L. et M. Be.

R. *THYRSANTHUS* F. C.
R. *HISPIDULUS* Gen. Ob.
R. *CYCLOPETALUS* Focke Co.
R. *TUMIDUS* Gremli Cd.

R. *CONSTRICHTUS* L. et M. D.
R. *CANDICANS* Wh. E.
R. *FRAGANS* Focke Eb.
R. *GONIOPHYLLUS* M. L. Ec.
R. *GONIOPHYLLOIDES* Sud. Ed.

A. — (T. XCIV). — **R. neomalacus Sud. in hb. Müller; ap. Gdg. *Nov. Cons.* p. 144 (1905); *Diagn.* p. 22; Bouvet *Rub. Anj.* p. 41 (1907); *R. incarnatus* Genev. *Mon.* p. 306, non P.-J. Müll.; *R. malacus* Sud. *Rub. Hb. Bor.*, p. p.**

Turio canaliculatus, parce pilosus, atrorubens; *folia* mediocria, coriacea, supra parce pilosa, subtus albo-tomentosa, pubescenti-velutina; dentis acuti, inaequales, parum profundi; *foliolum terminale* (1) ovatum, cordatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *ramus pubescens*, aculeis sparsis, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* parum foliosa, breviter pilosa, subinermis (2), pedicellis brevibus; *petala* suborbicularia (3), rosea; *stamina* alba, numerosa, stylos virescentes superantia; *germina* pilosa.

β. ARMORICUS; *R. armoricus* Sud. *Ronc. bret.* p. 16 (1904). — *Turio* glabrescens; *folia* grosse serrata, supra glabra; *petala*, *stamina* stylique rosea; *pollen* parum admixtum.

GALLIA: Vendée, La Verrie, St-Hilaire (Genevier); Maine-et-Loire, Angers (Bouvet), Torfou; Sarthe, Le Mans (Coilliot), Pontlieue (Gentil). — *β. Finistère*, Menez Kerque, prope Châteaulin.

B. — (T. XCIV). — **R. phyllostachys P.-J. Müll. in *Flora*, XLI (1858), p. 133; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 4; Chaboiss. *Et. spec. g. Rub.* 22; Focke *Syn.* p. 172; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 488; Sud. *Bat.* p. 55; *R. piletostachys* *X thyrsoides* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 78.**

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 4; *Assoc. rub.* n° 543, 546; Baenitz *Hb. eur.* n° 8565; *Soc. Roch.* n° 3761 (s. n. *R. thyrsoides*); Sud. *Bat. eur.* n° 164, 360, 361.

Turio (4) canaliculatus, pubescens; *folia* supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, grosse serrata; *foliolum terminale* (5) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius; *ramus pilosus*, foliis 3-natis, aculeis mediocribus, geniculatis uncinatis; *inflorescentia* (6) elongata, saepe usque ad apicem foliosa, foliis 3-natis, aculeis sparsis, debilibus, falcatis; *petala* ovata (7), hirsuta, pedunculis ascendentibus, multifloris, pedicellis fasciculatis, aculeis sparsis, debilibus, falcatis; *germina* glabrescentia. *Pollen* valde imperfectum (8).

β. CITRIODORUS; *R. thyrsoides* v. *citriodorus* Bouly de Lesd. *Rub. gall. exsicc.* n° 73 (1896); *R. hylophilus* v. *citriodorus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 72 (1900). — *Validus*; *petala* alba; *flores* odorem citri emittens.

γ. ELATIOR Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 489 (1902), *ex pte*; *R. elatior* ej. in. Gremli *Beitr. Fl. Schw.* (1870), 50; *Syn.* p. 171 (1877), p. p., non Schmid. *exsicc.* — *Dentes grossi, peracuti; inflorescentia parum foliosa; foliola minora quam in typo.*

δ. AUSTROTIROLIENSIS; *R. pubescens* sbsp. *austrotirolensis* Sabrs. *O. B. Z.* (1902) n° 4. — *Dentes mediocres, acuti; ramus dense pilosus aculeis tenuibus, raribus; inflorescentia aphylla, subinermis; germina pilosa.*

ε. PECULIARIS; *R. peculiaris* G. Samp. *Rub. Port.* p. 39 (1904). — *Foliolum terminale tenuiter acuminatum, longe petiolatum; aculei basi valde dilatati, adunci; inflorescentia subaphylla; petala rosea; germina glabra.*

ζ. MONTIGENUS Sud. *Bat. eur.* p. 43 (1905) et *exsicc.* n° 126! *R. montigenus* P.-J. Müll. hb.; *R. chlorocarpus* Borbas, non Bor. — *Turio* glabrescens; *folia* grosse serrata; rami aculei pervalidi, falcati; *inflorescentia* valde foliosa, aculeis robustis armata; *rachis* flexuosa.

η. INCISISERRATUS Spribille. — *Exsicc.* : Sud. *Bat. eur.* n° 362! — *Turio* profunde canaliculatus; *folia* grosse et inaequaliter subinciso-serrata; *foliolum terminale* breviter petiolatum, petiolulo proprio quadruplo longius; *inflorescentia* foliosa; *flores* parvi; *germina* pilosa. *Forma vergens in R. candicantem.*

θ. SUBHISPIDULUS. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 49 ! — *Turio* ramusque manifeste pilosi; aculei crebri, mediocres; folia mediocria, inæqualiter et acute serrata; foliolum terminale ovatum, basi leviter emarginatum, longe acuminatum; inflorescentia densa, angusta, foliosa, pedunculis 1-2-floris, ascendentibus, brevibus; germina glabra. *R. hispidulo* Gen. similis.

In memoribus et sepibus. — GALLIA, GERMANIA, HELVETIA, BELGIA, etc. — β. GALLIA: *Seine-et-Oise*, forêt de Montmorency (B. de Lesdain). — γ. Cum typ: GALLIA, BAVARIA. — δ. AUSTRIA: Tramin (Sabransky). — ε. LUSITANIA: Melgato, Terras de Bouro (G. Sampaio). — ζ. GERMANIA: Alsacia, Weissenburg (Müller); *Silesia* (Kinscher); Prov. *rhenana*; GALLIA: *Marne*, *Valois*, *Cantal*, *Seine-et-Oise*; TRANSYLVANIA. — η. GERMANY: *Silesia*, Trebnitz (Spribille). — θ. GALLIA: *Seine-et-Oise*, Versailles (Bouly de Lesdain); *Eure*, Damville (Jourdes).

OBS. — N. Boulay (*Rub. disc.* p. 576, 1898) voyait dans le *R. phyllostachys* P.-J. Müll. un hybride des *R. macrophyllus* et *thyrsoides*. Cette interprétation est inadmissible car le *R. phyllostachys* fructifie aussi bien que les autres formes de ce groupe et croît souvent là où manque le *R. macrophyllus*. Le *R. malacodon*, décrit plus loin, intermédiaire entre les *R. cundicans* W. et *macrophyllus* W. et N., est bien distinct de la plante de Müller.

HYBRIDÆ

R. PHYLOSTACHYS × *TOMENTOSUS* Sud. *Diagn.* p. 23 (1906); *R. TOMENTACEUS* Sud. ap. *Gdg. Nov. Conspl.* p. 144 (1905). — Differt a *R. phyllostachyi* foliis supra tomentosis.

GERMANIA: Alsacia, La Steinegrüb, prope Weissenburg (Müller).

R. PHYLOSTACHYS var. × *TOMENTOSUS* *Lloydianus*?; *R. hypomallus* Müll. et Wirtg. ap. *Wirtg. Hb. rub. rh.* ed. 1, n° 121 (1860). — Aculei leviter inæquales, folia grosse serrata, inflorescentia armata.

GERMANIA: Prov. *rhenana*, Oberlahnstein (Wirtgen).

b. — *R. Leventii* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 34 (1902); *Fl. Toul.* p. 78.

Exsicc. — Sud. : *Bat. eur.* n° 363.

Turio pilosus; *foliolum* terminale obovatum vel rhombicum, leviter emarginatum, breviter petiolatum; *inflorescentia* sæpe subaphylla, densa, hirsuta, pedunculis paucifloris.

GALLIA: *Marne*, bois de Rilly (Levent); *Sarthe*, Le Mans (Gentil); *Cantal*, Leynhac (Lavergne); *Haute-Garonne*, Quint; — BAVARIA: Neuburg (Zinsmeister), Regensburg (Loritz).

c. — (T. XCIV) — *R. aciodontus* Lef. et M., *Vers.* n° 15 (1859).

Exsicc. — Sud. : *Bat. eur.* n° 364!

Turio canaliculatus, pubescens; *folia* supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pilosa, dentibus peracutis, inæqualibus; *foliolum* terminale (9) obovatum, integrum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *ramus* aculeis valde obliquis, foliis 3-5-natis, foliolis obovatis, tenuiter cuspidatis; *inflorescentia* angusta, foliosa, pedunculis brevibus, ascendentibus, multifloris, foliis valde brevioribus; *petala* alba vel dilute rosea; *germina* glabra. Fertilis.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, taillis d'Ivors, forêts de Vaumoise et de Lévigne (Lefèvre, Questier).

OBS. — Dérive peut-être des *R. stenopetalus* L. et M. et *propinquus* Müll. v. *dumosus*.

C. — (T. XCIV) — ***R. thyrsanthus*** Focke *Syn.* p. 168 (1877); ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 487; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 72; *R. discolor* v. *euodes* G. Braun exsicc.; *R. montanus* a *thyrsanthus* Hal. *Oest. bromb.* p. 227; *R. intermedius* G. Braun exsicc., non Ortm.; *R. discolor* f. *polyanthemos* G. Braun exsicc.

Exsicc. — Frid. et Gel. *Rub. dan.* exsicc. n° 5 et 6; *Assoc. rub.* n° 701, 944, 1013, 1164; Sud. *Bat. eur.* n° 365; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 64, 65, 126 a, b, c.

Validus; *turio* canaliculatus; glaber; *folia* magna, supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, inæqualiter serrata, foliolum terminale (10) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *inflorescentia* multiflora (11), basi foliosa, aculeis falcatis; *petala* (12) ovata, alba vel dilute rosea; pollen valde imperfectum; stamina stylique pallida; *germina* glabra vel parce pilosa.

δ. MUELLERIANUS; *R. Muellerianus* de Martr.-D. *Fl. Tarn.* p. 861 (1864); *R. plicatus* var. *candicans* ej. l. c. p. 222. — *Folia plicata*; *inflorescentia* simplex, pauciflora.

γ. ARGYROPISIS; *R. thyrsanthus* sbsp. *argyropisis* Focke *Syn.* p. 170 (1877); *R. persicinus* B. *argyropisis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 487 (1902); *R. argenteus* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 48, non W. et N. — Exsicc. *Soc. dauph.* n° 5227. — *Foliolum* terminale basi rotundatum, integrum vel leviter emarginatum; *inflorescentia* foliosa; aculei rameales validi, curvati.

δ. GRABOWSKI Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 488 (1902); *R. Grabowskii* Wh. in Wimm. et Grab. *Fl. Sil.* I 2, p. 32 (1829); *R. propinquus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 123 (non P.-J. Müll.), et exsicc. n° 106; *R. vulgaris* Oborny exsicc. — *Foliolum* terminale suborbicularare, abrupte acuminatum; *inflorescentia* ampla.

ε. SIMPLICIDENDATUS Sud. et Sprib. — *Folia simpliciter mucronato-serrata*; *inflorescentia* pyramidalis; *germina* dense pilosa. Cetera ut in typo.

ζ. HYLOPHILUS; *R. hylophilus* Rip. ap. Gen. *Mon.* p. 238 (1880); N. Boul. *Rub. disc.* p. 544. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 366. — *Foliolum* caul. terminale late ovatum, emarginatum; *inflorescentia* angusta, brevis; *petala* alba, ovata; *germina* pilosa.

In memoribus et locis umbrosis. — GERMANIA, DANIA, AUSTRIA, HELVETIA, GALLIA. — β. GALLIA: *Tarn.* — γ. HELVETIA: Schaffouse (Gremli); GERMANIA: Alsacia, Silesia; GALLIA: Rhône, Tassin (Boulliu), Saône-et-Loire. — δ. GALLIA: Vosges; AUSTRIA: Moravia, Znain (Oborny); GERMANIA: Alsacia, Silesia, Bavaria, Pomerania, etc. — ε. GERMANIA: Silesia, Kosel (Spribille). — ζ. GALLIA: Cher, Sarthe.

OBS. — Le n° 106 des *Ronc. vosgiennes* est rattaché au *R. rhamnifolius* D. *cuspidifer* par M. Focke (ap. Asch. et Gr. l. c. p. 476); je le considère comme bien distinct non seulement du *R. rhamnifolius* W. N. mais encore des *R. cuspidifer* L. et M. et *propinquus* P.-J. Müll. C'est un *R. thyrsanthus* venu dans un endroit bien exposé. La var. B. *Schnelleri* Focke l. c. appartient aux *R. triviales* P.-J. Müll. J'ai reçu d'Autriche, sous le nom de *R. Vestii* Focke, des spécimens qui appartiennent au *R. thyrsanthus* Focke.

HYBRIDÆ

R. THYRSANTHUS × ***IMBRICATUS*** var. Sud. *Diagn.* p. 23 (1905); *R. MINORIFLORUS* Sud. l. c. — Differt a *R. thyrsantho* *inflorescentia* armatiore, minus pilosa, staminibus stylos æquantibus, petalis parvis, albis.

GALLIA: Loire-Inf., Auverné (de l'Isle).

R. THYRSANTHUS × ***ULMIFOLIUS*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 124 (1901); *R. SIMILLIMUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9520. — *Folia* supra obscure viridia, subtus albo-tomentosa, flores rosei.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Arreau; Haute-Garonne, Balma; Herzegovina, Mostar (Baenitz).

R. THYRSANTHUS × TOMENTOSUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 125 (1901); *R. SEMICANESCENS* Sud. *l. c.* — *Habitus R. thyrsanthi* sed *folia supratomentosa*.

GALLIA : *Hauts-Pyrénées*, Arreau.

R. THYRSANTHUS × TOMENTOSUS *Lloydianus* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 253 et *exsicc.*; *R. CASTANEICOLA* Sud. *l. c.* (1900). — A *R. thyrsantho* distinguitur : gracilior, dentibus latis, foliis albo-tomentosis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, St-Benoit-de-Carmaux.

b. — *R. hispidulus* Genev. 1^{er suppl.} *Ess. mon.* p. 51 (1872); *Mon.* p. 234; Sud. *Rub. Pyr.* p. 126; *R. candicans* var. *hispidulus* N. Boul. *Rub. disc.* p. 541 (1898); *R. carpinifolius* Gen., *p. p.*, non Wh.

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 74:

Folia paulo minora quam in R. thyrsantho; ramus pilosus aculeis falcatis, foliis 3-natis, albo-tomentosis; *inflorescentia* brevis, piloso-hirsuta, bracteis latis, aculeis crebris armata; *sepala* vulgo aculeata; *petala* alba; *germina* glabra. *GALLIA* : Passim, in *Pyrenæis centralibus*; *Allier*; *Puy-de-Dôme*.

c. — *R. cyclopetalus* Focke *Syn. Rub. Germ.* p. 169 (1877) : Sud. *Rub. Pyr.* p. 125.

Aculeis crebris, validioribus, foliis magnis, plicatis, petalis suborbicularibus, albis, germinibus glabris a *R. thyrsantho* facile dignoscitur.

GERMANIA : *Silesia* (Focke), Kunhern, Streitberg (Kinscher); *GALLIA* : *Hauts-Pyrénées*, vallée d'Aulon.

HYBRIDA

R. CYCLOPETALUS × MALACUS var. Sud. *Rub. Pyr.* p. 126 (1901); *R. TRAMITUM* Sud. *l. c.* — *Folia non plicata, flaccida, albo-tomentosa*; *inflorescentia* multiflora.

GALLIA : *Hauts-Pyrénées*, Guchen, via Aulon.

d. — (T. XCV) — *R. tumidus* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 20 (1870); *R. phyllostachys* v. *tumidus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 489 (1902).

A *R. thyrsantho* distinguitur : foliolo terminali (2) obovato-orbiculari, leviter emarginato, cuspidato; ramo aculeis validis, aduncis armato, foliis 3-natis foliolis cuspidatis. Inflorescentia pauciflora, pedunculis tenuibus, ascendentibus, unifloris (3); *germina* glabra. Fertilis. — Differt a *R. phyllostachyi* turionibus glabris et figura foliolis terminalibus.

HELVETIA : Schaffhouse (Gremli); *GALLIA* : *Loire-Inférieure*, La Haye (de l'Isle).

D. — (T. XCV) — **R. constrictus** Lef. et M. *Vers.* n° 10 (1859); Sud. *Bull. Soc. bot. Fr. t. LII* p. 329, 338; *R. hamulosus* × *thyrsoides* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 77; *R. Vestii* Focke *Syn. p. 155* (1877); *R. sulcatus* v. *Vestii* Focke *ap. Asch. et Gr. l. c. p. 458*; *R. carpinifolius* Genev. *Mon.*, *p. p.*; *R. Fabryi* Richter *Bot. Centr.* XXXVIII (1889), 819 ? *R. phaneronothus* G. Braun, *exsicc.*

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 210; Baenitz *Hb. eur.* n° 9538, 9539, 9986, 10399 (var.); Sud. *Bat. eur.* n° 367; *Rub. rar.* n° 50 !

Turio canaliculatus, glaber; *folia* plerumque suotus viridia, pubescentia, superiora parum discolora, omnia inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (4) ovatum vel leviter obovatum, emarginatum, acuminatum; *petiolorum* aculei aduncis; *ramus* canaliculatus, parce pilosus, aculeis geniculatis uncinatis, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* angusta (5), pauciflora, pilosa, basi foliosa, pedunculis ascendentibus, aculeis crebris, falcatis uncinatis armatis; *sepala* cinereo-viridia, pilosa; *petala* (6) late ovata, alba; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra. — *Intermedius* fere inter *R. candidans* et *R. suberectos*. *Turio* manifeste sulcatus *R. sulcatum* Vest revocat a quo differt inflorescentia contracta, armatiore, foliis inæqualiter serratis, polline valde imperfecto.

β. ROSEIFLORUS. — *Exsicc.* : *Bat. eur.* n° 368 ! — *Inflorescentia* valde foliosa, laxe pilosa; *petala* rosea; *stamina* stylos roseos æquantia vel parum superantia; dentes acutissimi.

γ. PERSICINUS ; *R. persicinus* A. Kerner *Nov. pl. spec.* III p. 14 (1871); Focke *Syn. p. 174*; *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI 487 (*eu-persicinus*). — *Turio* parce pilosus, faciebus planis vel obtusangulis. Cetera ut in var. β.

In memoribus. — *GALLIA* : *Oise*, forêt de Retz, à la Brase ! (Lefèvre), *Euro*, *Loir-et-Cher*, *Sarthe*, *Saône-et-Loire*, *Cher*, *Puy-de-Dôme*; *GERMANY*, *BOHEMIA*, *HUNGARY*, *GALICIA*, etc. — β. *STYRIA ORIENTALIS* : Sœchau (Sabransky); *BAVARIA* : Neuburg-s. Danube (Zinsmeister). — γ. *TIROLIA SEPTENTR.* : Stangensteig, sol. calc. (A. Kerner).

E. — (T. XCV) — **R. candidans** Wh. in *Reichb. Fl. Germ. excurs.* 601 (1832); Focke *Syn. p. 164*; *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 486; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 71; *R. fruticosus* Wh. et N. *Rub. germ.* p. 24 t. VII (1825) non L.; *R. bicolor* Opiz in *Lotos* (1834) 70; *R. thyrsoides* Genev. *Mon.* p. 239; Rogers *Handb.* p. 38; *R. cladotrichus* Gandg. *ap. Genev. Mon.* p. 352 (1880); *R. gallicus* Lef. *exsicc.*; *R. anomalus* J. Harmand *Rub. M. et Mos.* p. 57 (1887), non P. J. Müll.; *R. thyrsoides* v. *gallinimontanus* Spribille *Zeil. Nat. Abt. Posen* 118 (38) (1902).

Exsicc. — Billot *Fl. gal. et germ.* n° 1866; Baenitz *Hb. eur.* n° 9506, 9586; *Set of Brit. Rub.* n° 116; Sud. *Bat. eur.* n° 127.

Turio canaliculatus, glaber; *folia* supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (7) anguste ovatum vel ovato-oblongum, cordatum, acuminatum, infima brevissime petiolulata; *ramus* gracilis, angulatus, inferne glabrescens; foliis 3-5-natis profunde serratis, foliolis angustis; *inflorescentia* (8) elongata, angusta, laxa, pilosa, pedunculis vulgo ascendentibus; *petala* (9) magna, ovato-oblonga, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra.

β. COARCTATUS Sud. *Bat. p. 24* (1904); *R. coarctatus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 8. — *Exsicc.* : Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. 1*, n° 69, 71, 120, etc.; *Assoc. rub.* n° 223, 224, 372; *Rub. gall.* n° 29; Sud. *Bat. eur.* n° 70 ! G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 125, a (*R. cand. f. diffusa*). — *Turio* sulcatus; foliolum terminale acuminatum; foliola ramealia acuta vel subacuminata, terminale dentibus parum inæqualibus; inflorescentia subaphylla pedunculis ascendentibus, aculeis sparsis, raris; petala ovata, pallida.

γ. OBLONGATUS Sud. in *hb.* Müller. — *Turio* sulcatus; foliolum terminale oblongum, longe petiolulatum, infima petiolulata; folia grosse serrata; inflorescentia ut in var. β.

δ. GRANDIS Sud. in *hb.* Müller. — *Turio* sulcatus; folia ampla, dentibus parum profundis; foliolum terminale ovatum, sensim acuminatum; inflorescentia magna, subaphylla, multiflora, densa, pedunculis e basi ramosis; petala pallida.

ε. EXCELSIOR Sud. *Bat. p. 44* (1905); *R. excelsior* P.-J. Müll. *ap. Wirtg. Hb. pl. sel. Rhen.* n° 1064; *R. Winteri* f. *valida* (G. Br.) F. Kretzer in Baenitz *Hb. eur. ann.* 1889. — *Exsicc.* : Wirtg. *l. c.*; *Hb. rub. rh. ed. 1* n° 70; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 28; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 82 (*R. candidans* f. *subinermis*); Sud. *Bat. eur.* n° 128, 129; *Assoc. rub.* n° 699. — *Turio* sulcatus; foliola terminalia acuminate; dentes grossi, valde inæquales, præsertim in ramo; inflorescentia maxima, foliosa, multiflora, pedunculis subpatulis, pedicellis elongatis, interdum divaricatis; flores pallidi.

ζ. PATULIPES Sud. in hb. Müller. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 369. — Turio foliaque ut in var. β. sed inflorescentia densa, pedunculis patulis deflexis.

η. SUBVELUTINUS Lindg. Hb. rub. scand. n° 10; Aresch. Some Obs. g. Rub. p. 150 (1887). — Turio sulcatus; folia mollia, albo-velutina, foliolis acuminatis; petala alba, angusta.

θ. ROTUNDIPETALUS; R. rotundipetalus P.-J. Müll. Vers. n° 13 (1859); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 73. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 51! — Differt a var. β. foliis inaequaliter serratis, petalis orbicularibus.

ι. ROSEOLUS; R. roseolus P.-J. Müll. in Boul. Ronc. Vosg. p. 25 (1866); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 73, p. p.; R. purpureus Holuby O. B. Z. (1873), XXIII, 374! R. incertus (pr. candicans × sulcatus) Hal. in Verh. z.-b. Ges. Wien (1885) p. 658, non Boul. et Pierr. (1878). — Exsicc. : Ronc. Vosg. n° 4^{bis}, 22; Assoc. rub. n° 421, 423, 882, 1165; Rub. gall. n° 30; Baenitz Hb. eur. n° 9934, 10357; Sud. Bat. eur. n° 370! — Differt a var. β. turione minus canaliculato; foliis grosse serratis; ramo gracili, aculeis parvis, falcatis; petalis roseis; inflorescentia ut in var. β.

κ. INTAMINATUS Sud. in Bouvet Rub. Anjou p. 40 (1907). — Foliolum terminale breve, ovatum, acutum, longe petiolatum; flores albi. Inflorescentia ut in var. β.

λ. ACUTISERRATUS Spribille. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 371! — Turio canaliculatus, parce pilosus; folia grosse, inaequaliter et acute serrata, foliolis longe acuminatis; inflorescentia laxa, aculeis crebris armata, pedunculis mediis longis, patulis; petala late rosea. Forma vergens in R. pubescentem.

In nemoribus et sepiibus. — Typus et β. EUROPA TOTA. — γ. GALLIA : Toulouse (Timbal). — δ. ζ. θ. GERMANIA : Alsacia, Weissenburg (Müller). — ε. GALLIA; GERMANIA : Alsacia, Bavaria, Saxonia, etc.; HUNGARIA. — η. SCANDINAVIA; GERMANIA : Silesia (Kinscher). — ι. GALLIA, GERMANIA, BELGIA. — κ. GALLIA : Languedoc, Anjou; GERMANIA OCCIDENTALIS. — λ. GERMANIA : Silesia, Trebnitz (Spribille).

HYBRIDÆ

R. CANDICANS × MACROPHYLLUS Sud. Diagn. p. 23 (1906); R. MALACODON Sud. l. c. — Differt a R. candidante foliis ramealibus parum discoloribus, inflorescentia dense hirsuta, aculeis debilioribus. Sterilis.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg (P.-J. Müller).

R. CANDICANS × SCHLECHTENDALII Sud. Rub. tarn. p. 24 (1909); R. HIRSUTIPES Sud. l. c. — Differt a R. candidante turione parce piloso, foliis parum discoloribus foliolis obovatis, inflorescentia latiore. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Carmaux.

R. CANDICANS × LASIOTHYRSUS Sud. Rub. tarn. p. 24 (1909); R. ADMIXTUS Sud. l. c. — Habitus R. candidantis sed turio pilosus, inflorescentia aphylla, hirsuta, ramosa, folia acute serrata.

GALLIA : Tarn, Vabre, via Castres.

R. CANDICANS × ULMIFOLIUS Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 143 (1905); R. SUBSTERILIS Sud. l. c.; R. albescens (Boul. et Gill.) var. extensus Assoc. rub. n° 272. — Differt a R. candidante turione minus sulcato, interdum subpruinoso, foliis albo-tomentosis, inflorescentia parum pilosa, multiflora, floribus roseis. Sterilis.

GALLIA, HUNGARIA, GERMANIA, etc

OBS. — Certains spécimens distribués par Holuby sous le nom de R. podhradiensis Hol. O. B. Z. (1873) 374 semblent être des R. candidans × ulmifolius, d'autres, déterminés par lui et distribués par M. S. Kupcok, sont d'origine différente. Le n° 9587 de l'Herb. eur. de M. Baenitz paraît rentrer dans le R. substerilis. Le R. longistachys Sud. in hb. Müller n'est apparemment qu'une variation de ce même hybride, qui est très polymorphe.

R. CANDICANS × PROPINQUUS; R. THYSOIDEIFORMIS Sud. — Turio sulcatus, pubescens; foliola infima petiolulata; flores rosei, petala lata ut in R. propinquus.

GALLIA : Sarthe, Précigné (Henry).

R. CANDICANS × BIFRONS Sud. Rub. tarn. p. 24 (1909); R. SUBOBLONGUS Sud. l. c. — Differt a R. candidante foliis appresse albo-tomentosis, argute serratis, inflorescentia multiflora, parum pilosa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Lacrouzette, via Burlats.

OBS. I. — Le R. Szaboi Borbas in Vasvar. novenyl. p. 288 (1887-88); Sabrs. O. B. Z. (1891); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 512; R. chnoostachys A. Kerner, non M. et Wirtg., tient des R. thysoides Wimm. et bifrons Vest et en dérive peut-être. Je n'en ai pas vu de spécimens authentiques. — Turio canaliculatus, parce pilosus, glandulis sessilibus obsitus; folia supra glabra, argute serrata; foliolum terminale acuminate; inflorescentia multiflora, hirsuta; flores albi. — AUSTRIA, Stangensteig prope Innsbruck (A. Kerner); St-Gothard et Güns, com. Castriferrei (Borbas); Presbourg (Sabransky).

OBS. II. — Le R. falcatus Kalt. Fl. Aach. Beck. p. 266 (1845) dérive apparemment du R. candidans. Je n'en ai pas vu de spécimens.

R. CANDICANS × CUSPIDIFER var. grossidentatus Sud. ap. Gdg. Nov. Conspl. p. 143 (1905); R. RHODOBATUS Boul. et Motelay Assoc. rub. n° 468 (1875); R. ulmifolius × thysoides N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 79, ex pte. — Differt a R. candidante aculeis majoribus, petalis ovatis, roseis, staminibus stylisque roseis. Sterilis.

GALLIA : Gironde, Sabourin, prope Lamothe (Motelay).

OBS. — M. Focke rapproche cette plante de son R. frangans, mais ce dernier ne paraît pas avoir la même origine.

R. CANDICANS × PROCERUS; R. ROBUSTCAULIS Sud. hb.; R. candidans × ulmifolius Utsch ap. Baenitz Hb. eur. n° 9520; R. rusticanus Focke l. c., non Merc. — Turio foliaque ut in R. procero, inflorescentia ut in R. candidante. Sterilis.

HERCEGOVINA : Mostar (Baenitz).

R. CANDICANS × TOMENTOSUS; R. COARCTATIFLORUS Sud. — Habitus R. candidantis sed folia grosse serrata, albo-tomentosa, supra pilis stellutatis. Inflorescentia angusta; fructus male evolutus.

GALLIA : Haute-Garonne, Gers, Vienne; HELVETIA : Aïre, prope Genève (Schmidely).

R. CANDICANS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. Bat. p. 24 (1904); R. POLYANTHUS P.-J. Müll. ap. Wirtg. Hb. rub. rhen. ed. 1 n° 76 (1858), ed. 2 n° 7, non in Vers. n° 30 (1859); Sud. Bat. p. 24 et exsicc. n° 71; R. podhradiensis Hol. ex pte.; R. montanus × tomentosus Hal. Oest. bromb. p. 239, p. p.; R. Jonicus Utsch. ap. Baenitz Hb. eur. n° 9034 [s. bifrons × tomentosus (1897)]. — Exsicc. : Wirtg. l. c.; Bat. eur. n° 71, 372. — Differt a R. candidante foliis grosse serratis, subtus albo-tomentosis, inflorescentia multiflora, bracteis latis, floribus lutescenti-albidis. Sterilis vel parum fertilis.

GALLIA, GERMANIA, AUSTRIA, HUNGARIA.

R. CANDICANS × VESTITUS Hal. in Verh. z.-b. Ges. Wien (1883), 665; R. VILLIFER Sud.; R. villosulus Hal. l. c. et Oest. bromb. p. 249, non Rip.; R. montanus × leucostachys Hal. Oest. bromb. p. 249. — Differt a R. candidante turione piloso, inflorescentia sparsim glandulosa.

AUSTRIA, prope Purkersdorf (Halacsy); GALLIA : Cantal, Chaliac-de-la-Chapelle-Laurent (Charbonnel).

R. CANDICANS × GREMLII Hal. Oest. bromb. p. 260 (1891); R. OBORNYANUS Hal. l. c. — Folia subtus viridia, inflorescentia sparsim glandulosa. AUSTRIA : Rosskopf, prope Wien (Halacsy).

R. CANDICANS × HIRTUS Hal. in Verh. z.-b. Ges. Wien (1885) p. 659; R. DEBILIFORMIS Sud.; R. debilis Hal. l. c., non Boul.; R. montanus × hirtus Hal. Oest. bromb. p. 275. — Glandulæ crebrae ut in R. hirta. Mihi novus est.

AUSTRIA, prope Payerbach (Halacsy).

b. — (T. XCV) — *R. fragans* Focke *Syn.* p. 172 (1877); *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 489.

Exsicc. — Focke *Rub. sel.* n° 59; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 2 (*forma*).

Differt a *R. candicans*: foliis supra obscure viridibus; foliolo caul. terminali (10) obovato vel rhomboideo-elliptico, basi fere integro, cuspidato; foliolis infimis petiolulatis; floribus vive roseis, suaveolentibus, germinibus pilosis.

GERMANIA occidentalis: Minden, Rinteln, Burgsteinfurt, Horstmar, etc. (Focke).

c. — (T. XCV) — *R. goniophyllum* M. et Lef. *Vers.* n° 11 (1859); *R. Grenieri* Lef. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1877) p. 221 (*nomen*); *R. candicans* v. *goniophyllum* N. Boul. *Rub. disc.* p. 540 (1898).

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 702, 704; Sud. *Rub. rar.* n° 52! G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 46, 124, 125 b.

Differt a *R. candicans*: foliolis caulinis terminalibus (12) obovato-rhombeis, basi cuneatis; dentibus acutis, inaequibus, majoribus patulis. Petala (13) magna, ovata, dilute rosea. Inflorescentia pauciflora, angusta pedunculis ascensibus, aculeis sparsis, raris munitis.

β. *LATERUM* Sud. *Rub. tarn.* p. 24 (1909). — Petala angusta, alba.

γ. *SUBELLIPTICUS*. — Foliolum terminale ellipticum.

δ. *MACILENTUS*; *R. candicans* var. *macilentus* Sud. *Rev. Rub. Hb. eur.* n° 8554. — Folia ut in var. γ sed tenuia, subvirescentia.

ε. *FLACCIDIFORMIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 24 (1909). — Discolor; folia flaccida, dentibus latis; inflorescentia multiflora; flores rosei. *R. collicolo* similis.

GALLIA: *Oise*, bois de Cuvergnon, de Chavres, de Tillet (Lefèvre, Questier), *Seine-Inferieure*, *Vendée*, *Tarn*, *Haute-Garonne*, *Haute-Vienne*, etc.; GERMANIA: *Silesia* (Kinscher), *Bavaria* (Progel); *Guestphalia* (G. Braun); HUNGARIA. — β, ε. GALLIA: *Tarn*. — δ. GERMANIA: *Badenia*. — γ. GALLIA: *Occitania*.

HYBRIDA

R. GONIOPHYLLUS v. ε. × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* p. 24 (1909); *R. ANGUSTITHYRSUS* Sud. l. c. — Differt a *R. goniophyllum* v. ε. foliis grosse serratis, inflorescentia hirsuta, multiflora, floribus albis, sterilibus.

GALLIA: *Tarn*, Tonnac, via Vaour.

d. — (T. XCII) — *R. goniophylloides* Sud. *Fl. Toul.* p. 73 (1907); *R. vulgaris* var. *sulcatus* Lej. *hb.*

Exsicc. — Sud. *Eat. eur.* n° 345!

Habitus *R. goniophylli* M. et Lef. sed inflorescentia laxe pilosa, multiflora, pedunculis ± patulis, aculeis falcatis crebris munita. Foliolum terminale late rhombeum vel ellipticum; petala dilute rosea; germina glabra. Forma vergens in *R. geniculatum* Kalt.

β. *SEPIVAGUS*; *R. sepivagus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 58 (1900). — Serratura grossa; aculei inflorescentiae pervalidi.

HYBRIDA

R. GONIOPHYLLOIDES × *TOMENTOSUS* Sud.; *R. EPIDASYS* Focke (*pr. sp.*) *Nat. Ver. Brem.* XX, I, (excl. *syn.*); *R. macrostemon* × *tomentosus* G. Sampaio *Rub. Port.* 82. — Habitus *R. goniophylloides* sed folia supra pilis stellutatis obsita. Parum fertilis.

LUSITANIA: Vinhaes, Macedo de Cavaleiros (G. Sampaio).

Subsectio D. — Subtomentosi Sud.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Turio glaber vel pilis rarioris instructus.

A. — Foliolum caulinum terminale latum, cordatum; turio canaliculatus.

a. — Folia supra glabra vel pilis rarioris munita.

1. — Inflorescentia laxa, bracteis angustis; foliola ramealia terminalia basi non cuneata.

a. — Foliolum caul. terminale suborbiculare; turio parce pilosus.....

b. — Foliolum caul. terminale suborbiculare; turio glaber; petala alba.....

c. — Foliolum caul. terminale ovatum; turio glaber.....

2. — Inflorescentia conferta, bracteis lati; foliola ramealia terminalia basi cuneata; petala rosea.

b. — Folia superiora supra pilis stellutatis obsita.

1. — Validus; folia caulina 5-nata.....

2. — Gracilis; folia caulina 3-nata; petala rosea.....

B. — Foliolum caul. terminale angustum, basi rotundatum, raro emarginatum; turio vulgo planus; Rubi parum validi, foliis caulinis 3-5-natis.....

II. — Turio manifeste pilosus; foliolum caul. terminale ovatum vel rhombeum.

A. — Folia supra glabra vel pilis rarioris munita.....

B. — Folia superiora supra pilis stellutatis obsita.....

R. arduennensis Lib.

R. VICARIUS Sud. b.

R. MALACUS Sud. c.

R. OBTUSATUS P.-J. Müll. B.

R. MAESTUS Holuby C.

R. SERICEUS Sud. Cb.

R. COLLICOLUS Sud. D.

R. SUBVILLOSUS Sud. E.

R. RIPARTII Gen. Eb.

59 — (T. XCVI) — *R. ARDUENNENSIS* Libert in *Lejeune Fl. Spa* II, 317 (1813); Ser. *ap.* D.C. *Prod.* II p. 568; Focke *Syn.* p. 157; *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 492; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 74; *R. brachiphyllum* M. et Wirtg. *exsicc.*; *R. fruticosus* var. *arduennensis* Lej. *exsicc.* 412!; *R. collinus* Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II 167, non D.C.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 13 (*R. pubescens* f. II), 128; *ed.* 2 n° 61 (*R. brachiphyllum*); *Hb. pl. select. fl. Rh.* n° 474; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 83; *Assoc. rub.* n° 616, 1166; *Rub. gall.* n° 75, 76.

Turio (1) arcuatus, inferne faciebus planis, superne sulcatis, parce pilosus; *aculei* compressi, basi dilatati, recti vel leviter reclinati; *folia* 5-nata (2, 3), flaccida, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, molliter pubescentia, inaequilatera duplicito-serrata, dentibus brevibus, mediocribus; *foliolum* terminale suborbiculare vel late ovato-rhombeum, basi cuneatum, truncatum vel subemarginatum, acutum vel cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius, infima brevissime petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares; *ramus* florifer angulatus, pilosus, aculeis falcatis, brevibus, foliis 3-natis foliolis terminalibus ovatis, leviter emarginatis; *inflorescentia* (4) elongata, pyramidalis, subaphylla, hirsuta, aculeis debilibus instructa; *pedunculi* (5) patuli vel patulo-ascendentes, ± multigata, pedicellis brevibus; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia; *petala* (6) late elliptica, ovata vel suborbicularia, alba vel flori, pedicellis brevibus; *stamina* inaequalia, alba, stylos virescentes superantia; *germina* glabra; *receptaculum* villosum! *Pollen* valde imperfectum (7); drupeolarum nucleus siccatus oblongus. — Julius.

Ad sepes, silvarum margines et viarum limites. — BELGIA; GERMANIA OCCIDENTALIS; GALLIA: Sarthe, Yvré-l'Evêque (Henry).

OBS. — M. Focke l'indique en Lorraine et dans le Piémont; je ne l'ai pas vu de ces localités; il est très rare en France, où on l'a confondu avec des hybrides de *R. thyrsoideus* et de *R. tomentosus*. Peut-être est-ce un hybride fixé de *R. phyllostachys* P.-J. Müll. et de *R. Lloydianus* Gen.? Mais alors on devrait le rencontrer dans le midi de la France, où il est remplacé par le suivant, abondant dans le Tarn, et qui conserve tous ses caractères par la culture!

b. — (T. XCVI) — *R. vicarius* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 287 (1902); *Fl. Toul.* p. 74.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 373, 374!

Habitus *R. arduennensis* sed robustior et fertilior. *Turio* (8) glaber, canaliculatus; *folia* supra obscure viridia; *foliolum* caulinum terminale (9) cordatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* (10) brevis, lata; *petata* (11) alba. — Educ. e seminibus.

GALLIA: Tarn, in regione montosa frequens; Arfons, Anglés, Brassac, Vabre, Grandval, etc.; Haute-Garonne, Fronton.

HYBRIDÆ

R. VICARIUS × *LASIOHYRSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 24 (1909); *R. LASIOTHYRSOIDES* Sud. l. c. — Differt a *R. vicario* foliolis minus latis, inflorescentia elongata. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Vabre, via Caucaillières.

R. VICARIUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. VIANENSIS* Sud. l. c. — Foliis albo-tomentosis, inflorescentia multiflora, floribus roseis a *R. vicario* facile distinguitur. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Viane, via Espérausses.

R. VICARIUS × *TOIMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. SEMIVICARIUS* Sud. l. c. — A *R. vicario* dignoscitur: foliis 3-5-natis, grosse serratis, foliolis angustatis. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Montcouyoul, vallée du Dadou.

c. — *R. malacus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 126 (1901); *Fl. Toul.* p. 74; Bouvet, *Rub. Anj.* p. 680; *R. undulatus* et *albidus* Mercier *Rub. gen.* (*salt. ex pte.*)

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 167.

R. arduennensi similis a quo differt: turione minus sulcato, foliolis minus latis, terminali vulgo ovato, cordato, breviter petiolulato. Flores albi vel pallide rosei; fertilis; pollen parum admixtum.

α. *ALBIFLORUS*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 375. — Petala alba; inflorescentia subinermis.

β. *ROSEIFLORUS*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 376. — Petala rosea; inflorescentia ± aculeata.

γ. *RAMIFLORUS*; *R. arduennensis* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 216, non Libert. — Dentes lati; inflorescentia magna, foliosa, multiflora; stamina stylos æquantia.

δ. *MINUTISPINUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909). — Aculei parvuli, brevissimi; foliola marginibus sese tegentia.

ε. *GRACILENTUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 127 (1901); *R. malacoides* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* p. 86 (1899). — Gracilis; dentes lati; habitus *R. Lloydiani* Gen.

ζ. *DUMULOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. flavidus* Boul. et Luc. *Assoc. rub.* n° 273. — Foliola angusta; inflorescentia aculeis crebris, falcatis, pedunculis patulis. *R. collicolo* similis.

GALLIA MEDIA ET MERIDIONALIS. — δ. Tarn, Saint-Martin-Laguépie.

HYBRIDÆ

R. MALACUS × *ULMIFOLIUS* Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 68 (1907); *R. PRÆLONGUS* Sud. et Bouv. l. c. — Differt a *R. malaco* foliis appresse tomentosis, rachide parum pilosa, floribus vive roseis. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Saint-Martin-Laguépie; Maine-et-Loire, Thouarcé (Bouvet).

R. MALACUS × *PROPINQUUS* Sud. et Bouvet in Bouv. *Rub. Anj.* p. 68 (1907); *R. AMBLYTHYSUS* Sud. et Bv. l. c. — Habitus *R. malaci* sed turio pruinosis; sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, Thouarcé (Bouvet).

R. MALACUS × *PROCERUS* Sud. et Bouv. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 68 (1907); *R. PROCERIFORMIS* Sud. hb. — Validus, aculei robusti, petala magna. Sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, Thouarcé (Bouvet).

R. MALACUS × *TOIMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. et Bouv. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 72 (1907); *R. HEMIMALACUS* Sud. et Bouv. l. c. — Habitus *R. malaci* sed folia grosse serrata, bracteæ latæ. Sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, Saint-Christophe-du-Bois (Bouvet).

B. — (T. XCVII) — *R. OBTUSA TUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 29 (1859); Genev. *Mon.* p. 305, *ex pte*; Sud. *Bat. p. 44*; *R. consobrinus* × *Lloydianus* Sud. *prius*, *Rub. Hb. Bor.* p. 25; *R. anglesensis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1904) p. 18.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 130 ! 131.

Differt a *R. arduennensi* Lib.: foliolis caulinis terminalibus (1) basi minus latis, breviter petiolulatis; foliis ramealiibus sœpe 5-natis, foliolis terminalibus rhombéis vel obovato-cuneatis (2), basi integris, breviter petiolulatis; rami aculeis validioribus, crebrioribus; inflorescentia densissima, bracteæ latis ut in *R. tomentoso* munita. Petala (3) rosea, ovata; stamina alba vel dilute rosea stylos virescentes superantia. Fertilis.

GALLIA: Vienne, l'Age-Gacin, prope Montmorillon (Chaboisseau); Haute-Vienne, Sarthe, Maine-et-Loire, Cantal, Puy-de-Dôme, Tarn.

HYBRIDA

R. OBTUSATUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. MALACOCAULON* Sud. l. c. — Folia ut in *R. obtusato* sed turio pruinosis, parce pilosus.

GALLIA: Tarn, Mézérac, prope Anglés.

C. — (T. XCVII) — *R. moestus* Holuby *O. B. Z.* XXIII (1873) p. 375; Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 511; *R. undulatus* var. *cineraceus* Merc. p. p.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 2244 !

Validus; *turio* (4) glabrescens, faciebus leviter excavatis, aculeis robustis; *folia* 5-nata, superiora supra tomentella, dentibus inæqualibus, mediocribus; *foliolum* caulinum terminale (5) late ovato-suborbiculare, emarginatum, acuminatum.

tum, petiolulo proprio duplo longius; rami folia 3-5-nata, superiora supra tomentella; inflorescentia mediocris, hirsuta, parum foliosa, pedunculis (6) subascendentibus; petala elliptica; stamina alba stylos virescentes superantia; germina parce pilosa. Fertilis. An *R. procerus* × *tomentosus*? — Hæditus *R. proceri* sed folia supra tomentosa.

β. PULVEREUS Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. pulvereus* Sud. *Bull. Assoc. pyr.* n° 242 (1899). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 377. — Turio glaber, foliolum terminale breviter petiolatum, infima subsessilia; dentes obtusi; rachis parum pilosa; petala rosea. Pollinis gradus puritatis 9/10.

HUNGARIA : Com. Trencin (Haluby); Orsova (Borbas), Presbourg (Sabransky); HELVETIA : Mont de Gourze (Schmidely); GALLIA : *Tarn*, Valdériès. — β. *Tarn*, Saint-Benoit-de-Carmaux, Albi.

HYBRIDA

R. MOESTUS var. β × *GILLOTII* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. CINEREIVIRENS* Sud. l. c. — Differt a *R. moestus* var. β turione piloso, faciebus planis, aculeis majoribus. Parum fertilis.

GALLIA : *Tarn*, Saint-Benoit-de-Carmaux.

b. — (T. XCVII) — *R. sericeus* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr. t. XLVI* p. 87 (1899).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 53!

Gracilis; folia caulinata (7) 3-nata, argute denticulata, supra manifeste tomentosa; foliolum terminale ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; ramus et inflorescentia ut in *R. tomentoso*; petala (8) rosea, ovata; stamina alba stylos virentes superantia. Pollen purum. — Aculeis æqualibus, glandulis nullis, petalis latis, roseis, a *R. tomentoso* Borkh. dignoscitur.

Ad sepes. — GALLIA : *Tarn*, Sillac, prope Moularés.

D. — (T. XCVII) — *R. COLLICOLUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* (1899) p. 87; *Rub. Pyr.* p. 127; *Bat. p. 25*; *Fl. Toul. p. 74*; Bouv. *Rub. Anj.* p. 42; *R. bellulus* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 215, non Müll. et Timb.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 227, 228, 229 (ex pte), 274 (*R. angustatus*), 424, 495; Baenitz *Hb. eur.* n° 9992; Sud. *Bat. eur.* n° 72, 378.

Differt a *R. arduennensi* turione debiliore, faciebus planis vel leviter concavis, foliolis angustioribus, terminali (9) ovato-elliptico vel obovato, basi rotundata, subacuminata; inflorescentia (10) minus pilosa, aculeis falcatis; polline perfectiore, saepe subpuro. Fertilis et polymorphus.

β. EROSULUS Sud. in Bouvet *Rub. Anj.* p. 43 (1907). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 379. — Foliola angusta, acuminata, dentibus latis, valde inæqualibus.

γ. ANGUSTATUS : *R. angustatus* Chaboiss. et Müll. in P.-J. Müll. *Vers.* n° 24 (1859). — Foliolum terminale angustatum, obovato-ellipticum, basi cuneatum; inflorescentia magna, multiflora; flores albi; fructus imperfectus. — An *R. ulmifolius angustifolius* × *tomentosus* Lloydianus?

δ. PATULUS Sud. *Rub. Bor.* p. 88 (1902); *R. patulus* Chaboiss.; Genev. *Mon.* p. 294, non P.-J. Müll. et Lef. — Folia ut in var. γ sed inflorescentia minus pilosa, pedunculis valde patulis.

ε. SUBERTII Sud. l. c. p. 38; *R. Subertii* Rip. ap. Genev. *Ess. mon.* p. 281 (1869); *Mon.* p. 293 p. p. — Petala rosea; stamina stylis breviora.

ζ. TENUIFLORUS Sud. l. c. p. 39; *R. tenuiflorus* Rip. in Genev. *Ess. mon.* p. 205 (1869); *Mon.* p. 241 p. p. — Turio glaber; inflorescentia parva, densa, pedicellis gracilibus; petala parva, alba; stamina brevia.

η. REDUNCUS Sud. l. c. p. 38; *R. reduncus* Rip. in Genev. *Ess. mon.* p. 211 (1869); *Mon.* p. 253, p. p.; *R. ulmifolius* × *tomentosus* glabratus N. Boul., ex pte. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 230. — Ramorum aculei uncinati; petala rosea; stamina brevia.

GALLIA, ITALIA, HUNGARIA, etc.

HYBRIDÆ

R. COLLICOLUS × *ULMIFOLIUS* Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 68 (1907); *Fl. Toul.* p. 74; *R. AMPLIFLORENS* Sud. l. c. — Differt a *R. collicolus* foliis appresso tomentosis, inflorescentia parum pilosa, floribus sterilibus.

GALLIA : *Tarn*, Haute-Garonne, Maine-et-Loire.

R. COLLICOLUS × *LACERTOSUS*; *R. Sudrei* Giraudias *Bull. Assoc. Pyr.* n° 179 (1897). — Habitus *R. collicoli* sed turio canaliculatus, pedunculi patuli, petala magna. — Parum fertilis.

GALLIA : *Tarn*, Albi, Pampelonne, Moularés.

R. COLLICOLUS × *TOMENTOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 25 (1909); *R. PSEUDOCANESCENS* Sud. l. c.; *R. gracilescens* f. *tomentosa* Chabois. — Differt a *R. collicolus* foliis supra tomentosis. Sterilis.

GALLIA : Vienne, Pindray (Chaboisseau); *Tarn*.

R. COLLICOLUS × *TOMENTOSUS* Lloydianus; *R. CANDENS* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr. t. XLVI* (1899), p. 85; *R. polyanthus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 30 (1859), non ap. Wirtg. exsicc. (1853); *R. hololeucus* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 217 p. p., non Genev.; *R. albomicans* Rip. in Genev. *Mon.* p. 309 (1880) p. p. — *R. collicolus* admodum similis a quo differt inflorescentia multiflora, bracteis latioribus, fructu male evoluto.

GALLIA : Vienne, Concyze (Chaboisseau); Cher, *Tarn*, etc.

E. — (T. XCVII) — **R. subvillosus** *Rub. Pyr.* p. 127 (1901); *Fl. Toul.* p. 74; *R. collinus*? Focke in hb. Sud., non DC.

Turio planus vel leviter canaliculatus, dense pilosus; folia 5-nata (12), supra glabra vel parce pilosa, grosse serrata; foliolum terminale ovato-ellipticum, oblongum vel obovatum; inflorescentia multiflora, hirsuta; flores albi vel rosei. Fertilis.

α. ALBIFLORUS Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 380. — Petala alba, stamina alba stylos virentes superantia.

β. ROSEIFLORUS Sud. l. c. — Petala rosea; stamina alba vel rosea stylos virentes superantia.

γ. LACERATUS Sud. in hb. Müller. — Folia inciso-serrata; petala rosea, stamina rosea stylos carnosus superantia.

δ. SCHULTZII; *R. Schultzii* Rip. ap. P.-J. Müller, *Pollich.* (1859) p. 289; *Arch. Fl.* p. 197; Genev. *Mon.* p. 323 p. p.; Sud. *Rub. Bor.* p. 39; *R. ulmifolius* × *tomentosus* glabratus N. Boul. *Rub. disc.* p. 566 p. p.; *R. tomentosus* × *vestitus* vel *Radula* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 498 p. p. — Exsicc. : F. Schultz *Hb. norm.* n° 39; *Assoc. rub.* n° 23. — Turio sulcatus; pubes densa, coactilis in turione, ramo inflorescentiaque; pedicelli tenues, fasciculati, parum armati; petala rosea; stamina pallide rosea stylos virentibus breviora. Pollen parum admixtum. Fertilis.

ε. VENDEANUS Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909); *R. vendeanus* Genev. *Ess. Rub. M.-et-L.* p. 88 (1861); *Mon. p. 320 (excl. syn.)*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 381 ! — Turio leviter canaliculatus, pilis densis, appressis; foliolum terminale angustum, elongatum; inflorescentia multiflora, pedunculis brevibus, tenuiter aculeatis; petala alba, stamina alba stylos virentes superantia. Pollen parum vel parum admixtum.

ζ. TENUIPETALUS; *R. tenuipetalus* Sud. in hb. Müll. — Gracilis; turio dense pilosus; folia parva, foliolis angustis, rhomboides, grosse serratis; petala parva, angusta; stamina stylis breviora; flores albi.

η. PILEOTHYRSUS Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909); *R. sericicauis* M. et Timb. ! *Bonpl. nomen* (1861). — Turio planus, pubescentia multiflora, pedunculis dentibus parum profundis; inflorescentia armatissima, bracteis latis; petala alba, stamina stylis parum superantia.

θ. MOLLIS. — Folia 3-nata, coriacea, subtilis molliter pilosa; inflorescentia dense hirsuta, conferta, inermis, subaphylla.

Passim : GALLIA MERIDIONALIS et MEDIA, Corsica (Burnat); SICILIA. — γ. Loire-Inf., Auvergne (de l'Isle). — δ. Cher, Auron, prope Bourges (Ripart, Déséglise). — ε. Deux-Sèvres, Puy-Saint-Bonnet (Genevier); Tarn, les Salvages. — ζ. Cher, Culan (Déséglise). — η. Tarn, Haute-Garonne. — θ. Alpes-Maritimes, Antibes (Jaquet).

HYBRIDÆ

R. SUBVILLOSUS v. *vendeanus* × *CLETHROPHILUS*; *R. CHOLETENSIS* Sud. in hb. *Bor. et ap. Bouv. Rub. Anj.* p. 686 (1903). — Inflorescentia ut in *R. clethrophilo*, sepala patula; cetera ut in *R. subvillosus* v. *vendeano*.

GALLIA : Maine-et-Loire, Le May, via Cholet (Genevier).

R. SUBVILLOSUS × *ULMIFOLIUS* Sud. in hb. Müller; *R. PSEUDOSUBVILLOSUS* Sud. l. c. — Habitus *R. subvillosi* sed folia magna, fructus male evolutus.

GALLIA : Haute-Garonne, Toulouse (Timbal); Buzet.

R. SUBVILLOSUS × *LACERTOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909); *R. PILEORAMUS* Sud. l. c. — Habitus *R. subvillosi* sed folia magna, flores maiores ut in *R. lacertoso*. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Albi, bois des Issarts.

R. SUBVILLOSUS × *COLLICOLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909); *R. PATENTIRAMUS* Sud. l. c. — Intermedius inter parentes; sterilis.

GALLIA : Tarn, inter Saint-Affrique et Escoussens.

R. SUBVILLOSUS × *TOMENTOSUS*; *R. COACTILICAULIS* Sud. — Differt a *R. subvillosus* foliis supra tomentosis; flores albi.

GALLIA : Haute-Garonne, Pibrac (Timbal).

b. — *R. Ripartii* Genev. *Ess. mon.* p. 300 (1869); *Mon. p. 335, p. p.*; Sud. *Fl. Toul.* p. 74; *R. ulmifolius* × *tomentosus canescens* N. Boul. *Rub. disc.* p. 557, p. p.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 96.

Differt a *R. subvillosus* foliis supra piloso-tomentosis. Petala rosea, stamina alba stylos carnosus parum superantia; germina pilosa. Pollen fere purum. Fertilis.

β. *GUILHOTII*; *R. Guilhotii* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 40 (1902). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 54. — Turio appresse pilosus; inflorescentia laxe pilosa, aculeis falcatis, validis armata. *R. collicolo* similis.

γ. *UNCIFER* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909); *R. subvillosus* v. *uncifer* Sud. in hb. Müller; *R. redundus* M. et Timb. *Bonpl.* (1861) (*nomen*), non Rip. — Rami inflorescentiae aculei falcatissimi vel uncinati; styli virides.

δ. *TOMENTOSIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — Turio canaliculatus, piloso-coactilis; rachis dense hirsuta; petala pallide rosea; stamina stylos virentes æquantes; germina glabra.

ε. *CEDRORUM*; *R. cedrorum* Kotschy exsicc. — Turio pubescentia; folia ramealia plerunque 5-nata, foliolis terminibus brevissime petiolatis; inflorescentia subinermis pedunculis tenuibus, breviter pilosis; flores albo-virides; stamina brevia. Pollen purum.

GALLIA MEDIA ET MERIDIONALIS. — β. Tarn, Ariège. — γ. Haute-Garonne, Tarn. — δ. Tarn, Laboutarié. — ε. AUSTRIA, Pannonia.

OBS. — Le *R. Linkianus* Ser. in DC. *Prod.* II, 560 (1825); Focke *Syn.* p. 202 et *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 491; N. Boul. *Rub. disc.* p. 547; Sud. *Fl. Toul.* p. 74; *R. paniculatus* Schlecht. in Link. *Enum. hort. Berol.* 2, II, 61 (1822), non Sm. (1819); *R. Thüillieri* var. *pomponius* Bor. *Fl. cent.* 3^e éd. p. 203. — Exsicc. : G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 102; *Assoc. rub.* n° 544; *Rub. gall.* n° 124; Sud. *Bat. eur.* n° 165 — est une plante culturelle de patrie inconnue et naturalisée sur un grand nombre de points. C'est peut-être un hybride de la forme *R. PROCRERUS* var. *robustus* × *TOMENTOSUS* *Lloydianus*.

Validus; turio arcuatus, angulatus, faciebus leviter concavis, parce pilosus, aculeis subæqualibus armatus; folia 5-nata, supra pallide viridia, glabra, subtilis albo-tomentosa, pubescentia, grosse et inæqualiter duplicato-serrata; foliolum terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acutum, infima subsessilia; ramus pubescens, aculeis validis, foliis 3-natis; inflorescentia pyramidalis, parum foliosa, pilosa, armatissima; flores albi vel palliis rosei, pleni, hyacinthi odore; petala lata, magna; stamina alba stylos virentes parum superantia; germina glabra. Fructus abortivus vel male evolutus. — Junius-Julius.

GALLIA : Gironde, Indre, Maine-et-Loire, Sarthe, Marne, Loiret, Haute-Garonne, Indre-et-Loire, Seine-et-Oise, etc.; GERMANIA; BELGIA.

Sect. IV. — APPENDICULATI Genev.

Characteres subsectionum

SUBSECT. A. — *TOMENTOSI* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. 2, fasc.* I (1858); *Syn. p. 225*; Sud. *ap. Gdg. Nov. Consp.* 144; *R. tomentosi* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 494 et *R. grandifolii* ej. l. c. p. 540 p. p. — Turio angulatus, parce glandulosus, sœpe glaber, aculeis inæqualibus, majoribus compressis; folia caulina 3-5-nata, subtilis albo-tomentosa, grosse serrata; inflorescentia piloso-hirsuta, eglandulosa vel glandulosa; sepala cinereo-tomentosa, post anthesin patula vel plerumque reflexa; petala lutescenti-albida; pollen perfectum; drupeolarum nucleus siccatus oblongo-ellipticus. — Crescunt in locis apertis.

SUBSECT. B. — *VESTITI* Focke *Abh. N. V. Bremen* I, 276 (1868); *Syn. Rub. germ.* p. 285; *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 544, *ex pte*; Sud. *Rub. Pyr.* pp. 7, 198; *ap. Gdg. Nov. Consp.* p. 145. — Turio angulatus vel interdum subteres, plerumque pilosus, eglandulosus vel sparsim glandulosus, faciebus lœvibus; aculei subæquales, majores basi compressi, ad angulos dispositi; aciculi nulli; folia 3-5-nata, subtilis cinereo-tomentosa vel virentia, plerumque pilosa; inflorescentiae rachis vulgo pilosa, sparsim glandulosa, glandulis sœpe brevibus. — Crescunt in nemoribus et in locis apertis.

SUBSECT. C. — *RADULÆ* Focke *Abh. N. V. Bremen* I, 276 (1868); *Syn. pp.* 78, 317; *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 558 (*pr. max. p.*); Sud. *Rub. Pyr.* pp. 7, 198; *ap. Gdg. Nov. Consp.* p. 148. — Turio angulatus, glaber vel pilosus, sparsim glandulosus, faciebus exasperatis; aculei manifeste inæquales, majores basi compressi, minores papulæformes; folia

plerunque 5-nata, sœpe discolora; inflorescentiae rachis pilosa, glandulosa; glandulae sub indumento tomentoso-villoso occultæ, diametro rachidis vix longiores, vulgo breviores; sepala sœpe reflexa. — Crescunt in sepiibus et nemoribus.

SUBSECT. D. — RUDES Sud. *Rub. Pyr.* pp. 7, 199 (1898); *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 151; *R. Radulae* Focke l. c. (*pr. min. p.*) — *Turio angulatus* vel interdum subteres, glaber vel raro parce pilosus, sparsim glandulosus, faciebus exasperatis; aculei manifeste inæquales, majores basi compressi, minores papulæformes; folia 3-5-nata, subtus sœpe viridia; inflorescentiae rachis tomentoso puberula vel brevissime et laxe pilosa, glandulosa; glandulae tomentum superantes, diametro rachidis vix longiores vel breviores; sepala sœpe patula vel erecta, interdum reflexa. — Crescunt in nemoribus.

SUBSECT. E. — HYSTRICES Focke *Syn. Rub. germ.* p. 342 (1877); Sud. *Rub. Pyr.* pp. 8, 199; *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 152; *R. Kœhleriani* Bab. *Brit. Rub.* p. 198, *ex pte* (1869); Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 593; *R. Radulae* Bab. *Brit. Rub.* p. 167, *p. p.* — *Turio arcuato-prostratus*, angulatus, aculeis crebris, valde inæqualibus, majoribus compressis, minoribus acicularibus, setis et glandulis variae longitudinis instructus; folia caulina plerumque 5-nata; inflorescentiae rachis vulgo armatissima, glandulis crebris, inæqualibus munita; glandulae stipitatæ majores diametro rachidis multo longiores; sepala reflexa, patula vel interdum erecta. — Crescunt in nemoribus.

SUBSECT. F. — GLANDULOSI P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 163; *Pollich.* (1859) p. 192; N. Boul. *Ronc. vosg. tab. III*; *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLII* p. 395; Focke *Syn. p. 355 et ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 602; Hal. *Oest. bromb.* p. 263 *ex pte*; Sud. *Rub. Pyr.* p. 8; *ap. Gdg. Nov. Consp.* p. 154; *R. Bellardianae* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 6 (1900). — *Turio arcuato-prostratus*, plerumque subteres, sœpe pruinosis, aculeis valde inæqualibus, mediocribus, plerumque subulatis, setis glandulosisque variae formæ et longitudinis instructus; folia caulina sœpe 3-nata, subtus vulgo viridia; sepala appendiculata, in fructu sœpe erecta; inflorescentia valde glandulosa, glandulis majoribus diametro rachidis multo longioribus, raro brevioribus. *Rubi humiles*, sarmentosi. — Crescunt in silvaticis montosis humidis.

OBS. I. — Babington (*Brit. Rub.* pp. 198-230) range dans ses *R. Kœhleriani* Wh. et *fusco-ater* Wh., le *R. diversifolius* Lindl., qui appartient aux *R. trividae* P.-J. Müll.; de plus (pages 173 et suivantes), il met les *R. Hystris* Wh., *rosaceus* Wh. et *pygmæus* Wh. dans les *R. Radulae*. Son groupe ne correspond donc pas exactement à celui de M. Focke et au mien, et c'est bien à tort que le savant batologue de Brême adopte, dans sa récente publication, le terme de *R. Kœhleriani* pour désigner ses *R. Hystrices*.

OBS. II. — Les espèces de la série des *R. apiculatae* Focke [*ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 451, 576 (1902)] rentrent la plupart dans la sous-section C (*R. uncinatus* P.-J. Müll., *R. apiculatus* W. N., *R. acanthodes* Hofm., *R. corymbosus* P.-J. Müll., etc.); quelques-unes dans la sous-section B (*R. Caflischii* F., *R. Borreri* Belz Salt., *R. podophyllum* P.-J. Müll., *R. salisburgensis* F., etc.), et d'autres dans la sous-section D (*R. melanoxylon* M. et W.). M. Focke groupe sous le nom de *R. grandifolii* (*ap. Asch. et Gr. l. c. p. 540*) les *R. incanescens* Bert. et *R. Lejeunei* W. et N. Ces deux espèces me paraissent sans rapports; de plus, la première est reliée au *R. tomentosus* Borkh. par des intermédiaires embarrassants et non hybrides, tandis que la seconde confine de très près au *R. rosaceus* W., qui appartient aux *R. Hystrices*. C'est dans ce groupe que je place le *R. Lejeunei* W. et N.

Subsect. A. — Tomentosi Wirlg.

Conspectus specierum

I. — Gracilis; turio epruinosus; folia caulina 3-5-nata dentibus latis.....	<i>R. tomentosus</i> Borkh. 60
II. — Validus; turio pruinosis; folia caulina plerumque 5-nata	<i>R. incanescens</i> Bert. 61

60 — (T. XCVIII) — **R. TOMENTOSUS** Borkh. in *Rœm. N. Magaz. f. Bot. I*, 2 (1794); Focke *Syn. p. 226, et ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 495; Ser. *ap. DC. Prod.* II p. 561; W. et N. *Rub. germ.* p. 27 t. VIII; Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 14; Willk. et Lange *Prodr. Fl. Hisp.* III p. 221; Hal. *Oest. bromb.* p. 237; N. Boul. *Rub. disc.* p. 549; Sud. *ap. Gdg. Nov. Consp.* 144; *R. triphyllus* Bellardi *App. Fl. Pedem.* p. 24 (1792), *non Thunb.* (1784); *R. canescens* DC. *Cat. Hort. Monsp.* p. 139; *R. cinereus* Reichb. *Fl. excurs.* 607 (1832); *R. Weitenweberi* Ortm. in *Opiz Nom. bot.* p. 16; *Flora* (1835) p. 491; *R. Hanryi* Gandg. *Rub. nouv.* p. 68 (1884).

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 105; Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 7; ed. 2 n° 6, 13; Favrat *Rub. Helv.* n° 18^a; Billot *Fl. gall. et germ. exsicc.* n° 3074; G. Braun *Hb. rub. Germ.* n° 127; *Assoc. rub.* n° 98, 375; *Rub. gall.* n° 31; Sud. *Bat. eur.* n° 166, 382.

Turio (1) arcuato-prostratus vel suberectus, debilis, angulatus, faciebus concavis, epruinosus, vulgo glaber, glandulis stipitatis sparsis instructus; *aculei* debiles, inæquales, ad angulos dispositi, majores recurvi; *folia* 3-5-nata (2, 3), supra pilis minutis stellutatis, cinereo-tomentosa, subtus albo-tomentosa, grosse et inæqualiter serrata, dentibus latis, triangularibus; *foliolum* terminale rhombeum vel obovato-rhombeum, basi integrum vel subemarginatum, acutum vel subacuminatum, breviter petiolatum; *petiolus* supra sulcatus, aculeis aduncis armatus; *stipulae* linearis; *ramus* gracilis, canaliculatus, aculeis debilibus, uncinatis, foliis 3-natis supra tomentosis, foliolis obovato-cuneatis; *inflorescentia* (4) angusta, elongata, subaphylla, piloso-hirsuta, vulgo eglandulosa; *pedunculi* ascendentes, tenues, aculeis parvis, subulatis, flavescentibus, recurvis muniti; *bractæ* lanceolatae, inferiores trifidæ; sepala cinereo-tomentosa, interdum aculeata, in flore et fructu reflexa; *petala* (5, 6) obovato-oblonga, lutescenti-albida; *stamina* alba stylos virides fere æquantia; *germina* glabra. *Fructus* mediocris; drupeolarum nucleus siccatus oblongo-ellipticus. *Pollen* purum (8). — Junius.

R. MEHDIONALIS A. Kern. *ap. Focke Syn.* p. 237 (1877); Halacsy *Oest. bromb.* p. 233; *R. australis* Kern. *Nov. pl. sp.* III p. 32, *non Forster Flor. ins. austr. Prod.* p. 40 (1786). — *Turio* pilis stellutatis brevibus, sparsis, pilis elongatis rarissimis instructus.

γ. ERRONEUS Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — *Turio* parce pilosus; folia inferiora supra glabra, superiora tomentosa; inflorescentia eglandulosa.

δ. ARVICOLUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 383. — *Turio* glaber, dense glandulosus; foliola lata (9), marginibus sese tegentia; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum, acutum, breviter petiolatum; ramus fere glaber, breviter glandulosus; inflorescentia angusta, densa, pedunculis ascendentibus, petala late (10) ovata vel suborbicularia; pollen admixtum.

ε. DENSUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 384. — *Turio* parce pilosus, heteracanthissimus; foliola lata, marginibus sese tegentia; *foliolum* terminale suborbicularare, cordatum, acutum, breviter petiolatum; ramus laxe pilosus, eglandulosus; inflorescentia brevis, densa, hirsuta; petala ovata; pollen fere purum.

ζ. STENOZYRSUS Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — Folia inferiora supra glabra, superiora tomentosa; dentes acuti; rachis epilosa, parce glandulososa.

In locis saxosis apertis, collibus calcareis, etc. — EUROPA CENTRALIS, OCCIDENTALIS ET MERIDIONALIS. Prætereæ in PERSIA, SYRIA, ASIA MINORE, etc. — Abest in BRITANNIA, DANIA, BELGIA, SCANDINAVIA. — δ. GALLIA: Haute-Garonne, Brax, propre Bégué. — ε. GALLIA: Haute-Garonne, Laramette. — ζ. Tarn, Rosières.

HYBRIDÆ

R. TOMENTOSUS × OPOLOTHYRSUS; *R. OPOLOTHYRSOMORPHUS* Sud. — Differt a *R. tomentoso* turione validiore, aculeis æqualibus, glandulis raris, rachide minus pilosa, petalis majoribus, late ovatis. Folia supra tomentella foliolis terminalibus late ovato-rhombeis.

GALLIA : Sarthe, Changé-les-Le Mans (Henry).

R. TOMENTOSUS × ULMIFOLIUS; *R. TOMENTELLIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 128 (1901); *ap. Gdg. Nov. Cons.* p. 144 (*hyb. coll.*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 385. — Plantæ variæ foliis superioribus supra tomentosis *R. tomentosum* revocans, sed inflorescentia minus pilosa, flores rosei. Vulgo steriles.

Passim, cum parentibus. — GALLIA, ITALIA, LUSITANIA, etc.

OBS. — Dans ce groupe rentrent : *R. TOMENTELLUS* Rip. *ap. Genev. Ess. mon.* p. 301 (1869), *Mon. p. 333*; exsicc. *Assoc. rub.* n° 234, forme fertile faisant retour au *R. ulmifolius* Schott; — *R. ERIOPHYLLUS* Rip. *ap. Genev. Mon. p. 337* (1880), à feuilles 3-nées, finement dentées; — *R. COLLINUS* DC. *Hort. Monsp.* p. 139 (1813); exsicc. : *Assoc. rub.* n° 97; *Rub. gall.* n° 125, à turion robuste, pubescent, à foliole caul. terminale obovée-suborbiculaire; — *R. PELLITUS* Rip. *ap. Genev. Ess. Mon. p. 297* (1869), *Mon. p. 330*; exsicc. *Assoc. rub.* n° 24, à turion glabre, à dentelure grossière; — *R. SEMIPELLITUS* Rip. *ap. Genev. Mon. p. 336* (1880), à feuilles la plupart 3-nées, à fleurs pourpres; — *R. PROXIMELLUS* Rip. *ap. Genev. t. c. p. 330*; exsicc. *Assoc. rub.* n° 232, à foliole terminale obovée-rhombeé, à dents fines — *R. ACROLEUCOPHORUS* Rip. *ap. Genev. Ess. mon. p. 290* (1869) et *Mon. p. 332*; exsicc. *Assoc. rub.* n° 427, 552, 553; — *R. TUEZKIEWICZII* N. Boul. *exsicc.* : *Assoc. rub.* n° 277; — *R. PETROPHILUS* O. Debeaux in *Bull. Soc. Pyr. or. t. XXII* (1874); — *R. BALDENSIS* A. Kerner *Noe. pl. spec. III* p. 21; *Ber. N. V. Innsbr. II*, 144 (1871) ?, et autres que je crois inutile de décrire.

R. TOMENTOSUS × GILLOTTII Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 46 (1902); *R. MIXTUS* Rip. in *Genev. Ess. mon.* p. 260 (1869) et *Mon. p. 301*, *p. p.* — Folia supra tomentosa. Aculei magni, petala orbicularia, rosea, *R. Gillottii* revocant.

GALLIA : Cher, Bourges (Ripart).

R. TOMENTOSUS × PROCERUS lacertosus Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 48 (1902); *R. AMICTIFOLIUS* Rip. in *Genev. Ess. mon.* p. 298 (1869); *Mon. p. 328*, *expte.* — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 233, 708. — Turio validus, canaliculatus, glaber ut in *R. lacertoso*; cetera ut in *R. tomentoso*.

GALLIA : Cher, Bourges, chemin des vignes du Puy-St-Bonnet (Ripart); Haute-Garonne, Tarn, Loiret, Saône-et-Loire, etc.

R. TOMENTOSUS × VESTITUS Sud. *ap. Gandg. Nov. Cons.* p. 143 (1905); *R. SERICOPHYLLUS* M. et Wirtg. *ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I* n° 422 (1860). — Turio planus, pubescens, aculeis subæqualibus; dentes tenuiores quam in *R. tomentoso*; folia 5-nata, foliolis latis; petala ovata.

GERMANIA : *Prov. rhenana*, Bertrich (Wirtgen); HELVETIA : Marly, prope Fribourg (Jaquet).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia, saltem superiora, supra tomentosa.

- | | |
|--|---------------------------------|
| A. — Turio glaber vel parce pilosus, canaliculatus; inflorescentia vulgo eglandulosa..... | R. <i>tomentosus</i> Borkh. |
| B. — Turio dense pilosus, faciebus planis. | |
| a. — Inflorescentia eglandulosa; foliolum caulinum terminale suborbiculare..... | R. <i>TOMENTOSIFRONS</i> Sud. c |
| b. — Inflorescentia glandulosa. | |
| 1. — Folium caulinum terminale angustum, rhombeum, basi integrum; inflorescentia parce glandulosa. | R. <i>TOMENTICAULIS</i> Sud. b |
| 2. — Folium caulinum terminale latum, basi cordatum; inflorescentia dense glandulosa | R. <i>VALESPIRENSIS</i> Sud. B |

II. — Folia omnia supra glabra, nitida.

- | | |
|--|------------------------------|
| A. — Gracilis; folia caulinata plerumque 3-nata, foliolis angustis, rhombeis vel obovatis. | R. <i>LLOYDIANUS</i> Gen. C |
| a. — Turio glaber vel pilis rarissimis munitus | R. <i>SUBPARILIS</i> Sud. Cb |
| b. — Turio dense pilosus..... | R. <i>ANCOPHILUS</i> Sud. D |
| B. — Validus; folia caulinata plerumque 5-nata; foliolum terminale ovatum..... | |

- b. — *R. tomenticaulis* Sud. *Diagn. p. 23* (1906); *Fl. Toul. p. 74*.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 386 !

Habitus *R. tomentosi* sed turio dense piloso-hirsutus, glandulosus, aculeis tenuibus; ramus dense pilosus, tenuiter glandulosus; inflorescentia glandulis brevibus munita. Folia caulinata plerumque 3-nata, foliolis terminalibus angustis, rhombeis, basi integris, dentibus parum profundis. Fertilis.

GALLIA : Haute-Garonne, bois de la Ramette; Var, Sallies-Toucas (Albert); ITALIA : Liguria, m^o Abellotto (G. Bicknell).

- c. — (T. XCIX) — *R. tomentosifrons* Sud.; *R. tomentosiformis* Sud. *Fl. Toul. p. 74* (1907), non Spribille. (1906).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 387 !

Habitus *R. tomentosi* sed turio (1) planus, dense piloso-hirsutus, glandulosus, aculeis majoribus; folia caulinata (2) 5-nata, foliolis latioribus, obtusioribus; folium terminale late ovatum vel suborbiculare, basi ± emarginatum, acutum; inflorescentia eglandulosa; petala (3) suborbicularia. Fertilis.

GALLIA : Haute-Garonne, La Ramette, Tournefeuille, etc.; Var, Ampus (Albert).

- B. — (T. XCIX) — *R. valespirensis* Sud. *Rub. Pyr. p. 128* (1901).

Differt a *R. tomentoso* Borkh: turione validiore, plano, dense piloso-hirsuto, glandulosus; foliis caulinis (4) plerumque 5-natis, foliolis terminalibus late ovato-cordatis, acutis; inflorescentia (5) piloso-hirsuta, abunde glandulosa. Fertilis. Flores ?

GALLIA : Pyrénées-Orientales, in rupibus graniticis; Amélie-les-Bains.

C. — *R. LLOYDIANUS* Genev. *Ess. Rub. M.-et-L.* (1861) p. 10; *Mon. p. 227*; de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 217; Sud. *Rub. Pyr.* p. 60, 128; *R. tomentosus* v. *glabratus* Godr. *Mon. Rub. Nancy*, 27 (1843); N. Boul. *Rub. disc.* p. 550 et *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 76; Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI* p. 496; Hal. *Oest. bromb.* p. 238.

Exsicc. — N. Boul. *Rub. voss.* n° 105^{bis}; Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. II* n° 14, 15; *ed. I* n° 78, *p. p.* (*R. tomentosus* v. *setosoglandulosus* p. p.; *Assoc. rub.* n° 99, 426, 624, 710, 1014; *Rub. gall.* n° 32; Baenitz *Hb. eur.* n° 9962; Sud. *Bat. eur.* n° 26 !

Characteres *R. tomentosi* sed folia supra nitida, glabra vel pilis rarissimis munita. Turio glaber vel glabrescens, glandulosus; inflorescentia eglandulosa, hirsuta.

β. *HYPOLECUS*; *R. hypoleucus* West in *Syll. pl. Ratisb.* I p. 235 (1824); *R. obtusifolius* Tratt. *Ros. Mon.* III p. 46, non Willd.; *R. tomentosus* var. *hypoleucus* Hal. *Oest. bromb.* p. 238 (1891). — Turio glandulis rarissimis; ramus eglandulosus.

γ. *COLORATUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — Planta rubra; flores ± carnei.

δ. *GLANDULIRAMUS* Sud. in *hb.* Müller. — Rachis parum pilosa, glandulosa quemadmodum ramus.

ε. *OBOVATIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 26 (1909). — Foliola brevia, lata, obovato-cuneata, obtusa; inflorescentia parce glandulosa.

EUROPA MEDIA ET MERIDIONALIS. Præterea in ASIA ORIENTALI.

OBS. — Se rencontre très pur, dépourvu de poils à la face supérieure des feuilles sur de grands espaces, particulièrement dans les terrains siliceux, où le *R. tomentosus* (*canescens*) manque ou végète mal. Il est constant dans ses principaux caractères.

HYBRIDÆ

R. LLOYDIANUS × ULMIFOLIUS (*Hyb. coll.*) ; *R. ROSEIFETALUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 60 (1900) ; *ap. Gdg. Nov. Consp.* p. 145. — *Exsicc.* : Sud. *Bat. eur.* n° 388. — Turio glaber vel parce pilosus; dentes lati *R. Lloydiani* revocant, sed rachis minus pilosa, flores rosei, petala lata. Vulgo sterilis.

Passim, cum parentibus.

Obs. — Comprend : *R. UNCINELLIFER* Rip. in *Genev. Ess. Mon.* p. 280 (1869) et *Mon.* p. 321; exsicc. : *Assoc. rub.* n° 321, à rameau muni de petits aiguillons crochus; — *R. SPLENDENS* Chabois. in *Gen. Essai.* p. 266 (1869) et *Mon.* p. 307; Sud. *Bat.* n° 3891, à fleurs d'un rose vif; — *R. HIRTELLUS* Rip. in *Genev. Mon.* p. 318 (1880), à rameau pollu-hérisse; — *R. VICINUS* Rip. in *Genev. Ess. mon.* p. 283 (1869) et *Mon.* p. 322, non distinct du précédent; — *R. VILLOSULUS* Rip. in *Genev. l. c.* 250 et *Mon.* p. 290, à inflorescence large, multiflore; — *R. SPIDNOSTACHYS* Rip. in *Genev. l. c.* 275 et *Mon.* p. 310, à inflorescence serrée, fournie; — *R. SERRIDENS* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 91, 92; — *R. OBTUSIDENS* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 22; — *R. SUBVELUTINUS* Boul. et Rip. in *Genev. Mon.* p. 319 (1880); *Assoc. rub.* n° 93; — *R. COMATULUS* Boul. et Fouc. *Assoc. rub.* n° 325; — *R. SUBNUDUS* Boul. et Fouc. *Assoc. rub.* n° 326. — *R. FALLACINUS* Rip. in *Genev. Ess. Mon.* p. 263 (1869), *Mon.* 304? — *R. PROLECTIBILIS* Rip. et *Gen. Mon.* p. 315 (1860), et autres.

R. LLOYDIANUS × GODRONII Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *Diagn.* p. 24; *R. ALSATICUS* Sud. *l. c.* — Serratura et tomentum ut in *R. Lloydiano*, sed robustior, aculei æquales, glandulæ nullæ, rachis laxe pilosa, petala ovata. Pollen valde imperfectum.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg, vers la chapelle de Weiler (Müller).

R. LLOYDIANUS × PROPINQUUS Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 18; *R. PERCONFERTUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. Lloydiano* turione validiore, eglanduloso, aculeis subæqualibus, foliis 5-natis, floribus roseis. Sterilis.

GALLIA : Cantal, Ytarac.

R. LLOYDIANUS × BIFRONS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909); *R. CURTIDENTATUS* Sud. *l. c.* — Tomentum *R. Lloydiani* sed folia minute serrata; flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Tarn, La Cabane, prope Tanus.

R. LLOYDIANUS × GILLOTTII Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1901) p. 19; *R. BRACHYANCHUS* Sud. *l. c.* — Dentes lati *R. Lloydiani* sed robustus, aculei subæquales, folia 5-nata, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Cantal, Veiraguet, prope Aurillac; Tarn, La Bouysse, prope Valdériès.

R. LLOYDIANUS × PROCERUS Sud.; *R. TRACHYPS* Boul. et Gill. *Assoc. rub.* n° 235, 278 (1877); *R. POLYANTHOIDES* Sud. in hb. Mülller et ap. *Gandg. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *R. ulmifolius × tomentosus glabratus* N. Boul. *Rub. disc.* (p. p.) p. 563. — Serratura *R. Lloydiani* sed folia ampla, folioli latiora, inflorescentia multiflora, foliosa, aculei subæquales.

GALLIA : Rhône, Quincret, montagne du Télégraphe; Tarare; GERMANIA : Prov. rhenana (Wirtgen).

R. LLOYDIANUS × PROCERUS lacertosus Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 48 (1902); *R. PILETOSUS* Rip. in *Genev. Ess. mon.* p. 278 (1869); *Mon.* p. 316; *R. ulmifolius Saulii × tomentosus glabratus* N. Boul. *Rub. disc.* p. 564. — Serratura et tomentum *R. Lloydiani*, sed turio validus, folia ampla ut in *R. lacertoso*.

GALLIA : Cher, Bourges (Ripart); Puy-de-Dôme, inter Boulards et Ebreuil (Lamotte); Tarn, Lacabarède.

R. LLOYDIANUS × VESTITUS Sud. *Bull. Acad. géogr. bot.* (1904) p. 153 (*hyb. coll.*); *R. SIMILIGENUS* Sud. *l. c.*; *R. bertricensis* Wirtg. *Hb. rub.* *rh. éd.* I n° 134 (1860), 174, 175; *ed.* II n° 65; *R. pycnostachys* P.-J. Müll. *Vers.* n° 35 (1859) et *ap. Wirtg. l. c.* n° 124; *R. acidacanthus* M. et *rh. éd.* I n° 171, non *Hb. Fl. rhen.*; *R. chnoostachys* M. et *Wirtg. Hb. rub. rh. ed.* I n° 170; *R. macrophyllus hypoleucus* Focke *Wirtg. Hb. rub. rhen. ed.* I n° 171, non *Hb. Fl. rhen.*; *R. Khekii Holuby.* in *hb.* Sud.: *R. tomentosus × vestitus* *Assoc. rub.* n° 730; *R. super-Syn.* p. 218 (1877), non *R. hypoleucus* *Vest nec L.* et *M.*; *R. Khekii Holuby.* in *hb.* Sud.: *R. tomentosus × vestitus* *Assoc. rub.* n° 561; *R. villicaulis* *Assoc. rub.* n° 556. — Aculei majores quam in *R. Lloydiano*, subæquales; turio pubescens; folia supra non tomentosa, subtus pilosa; inflorescentia multiflora. Sterilis.

Passim, cum parentibus. — GERMANIA OCCIDENTALIS, GALLIA, HELVETIA, HUNGARIA.

R. LLOYDIANUS × OCCITANICUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909); *R. FLAVISPINUS* Sud. *l. c.* — Tomentum et serratura *R. Lloydiani* sed validus, folia 5-nata, flores rosei, inflorescentia glandulosa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Cambon.

b. — (T. XCIX) — *R. subparilis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* (1899) p. 85; *R. Schultii* var. Holuby, *exsicc. non Rip.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 390. — *Turio* ut in *R. subparili*; *folia* ut in *R. lacertoso*. Petala alba. Sterilis.

Habitus *R. Lloydianus* sed turio dense pilosus (6); ramus pilosus et glandulosus quemadmodum inflorescentia (7); pollen purum, petala ovata (8).

HYBRIDÆ

R. SUBPARILIS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909); *R. PSEUDOVENDEANUS* Sud. *l. c.* — Pubes et tomentum *R. subparilis* sed folia 5-nata, flores rosei, germina pilosa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, in collibus, propre Mézens.

R. SUBPARILIS × PROCERUS lacertosus Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909); *R. MARNACEUS* Sud. *l. c.*; *R. vendeanus* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 217, non *Genev.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 391. — *Turio* ut in *R. subparili*; *folia* ut in *R. lacertoso*. Petala alba. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Lisle, Mézens.

R. SUBPARILIS × COLLICOLUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909); *R. HIRSUTISPINUS* Sud. *l. c.* — Diflert a *R. subparili* aculeis æqualibus, glandulis nullis. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Albi, in collibus calcareis, prope La Drèche.

D. — (T. XCIX) — *R. ancophilus* Sud. *Diagn.* p. 24 (1906).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 392!

Turio robustior quam in *R. tomentoso* et *R. Lloydiano*; aculei majores. *Folia* (9) vulgo 5-nata, argute serrata; foliolum terminale ovatum vel obovatum, emarginatum, leviter acuminatum; inflorescentia (10) laxa, hirsuta, valde glandulosa, pedunculis patulis; petala flavescenti-albida (11). Pollen purum. — *Intermedius* fere inter *R. Lloydianum* Gen. et *R. incanescens* Bert. Diflert a planta Bertolonii : turione epruinoso, sepalis reflexis. Planta flavescenti-viridis, foliis supra glabris.

β. *DENTOSUS*. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 55! — *Turio* heteracanthissimus; folia grosse et inæqualiter dentata; foliolum caul. terminale (12) ovatum, basi subintegrum; inflorescentia laxe pilosa, parce glandulosa, pedunculis patulis. Serratura

R. Lloydiani revocat, sed foliis caulini semper 5-natis diversus est.

γ. *BICKNELLII*; *R. BICKNELLII* Burnat et Greml., *ined.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 393! — *Folia* ampla, grosse serrata, subtus molliter pubescenti-velutina; inflorescentia multiflora, aculeis debilibus, sparsis, glandulis longis dense obsita; petala elliptica. Forma vergens in *R. incanescens*.

δ. *CURTISPINUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909). — *Foliolum* caul. terminale suborbicularare; aculei breves; inflorescentia eglandulosa; stamina stylos æquantia. Habitus *R. incanescens*.

In locis montosis siliceis. — GALLIA : Tarn, Lacabarède, Albine, Peyramos, Espérausses. — δ. Tarn, Escoussens, sylva Hautaniboul.

γ. ITALIA : Liguria, val Nervia, prope Bordighera (Cl. Bicknell). — δ. Tarn, Burlats, via Lacrouzette.

HYBRIDÆ

R. ANCOPHILUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909) ; *R. PSEUDO-ANCOPHILUS* Sud. *l. c.* — Inflorescentia *R. ancophili* sed glandulae rarissimæ, foliola longe petiolulata, dentes tenues, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Albine, St-Amans.

R. ANCOPHILUS × LLOYDIANUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909) : *R. OBUNCUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. ancophilo* : foliolis angustioribus, dentibus latis, inflorescentia parum glandulosa. Pollen admixtum. Semifertilis.

GALLIA : *Tarn*, Lacabarède.

R. ANCOPHILUS × SUBPARILIS Sud. *l. c.* ; *R. ANCOPHILOIDES* Sud. *l. c.* — Habitus *R. ancophili* sed turio pilosus ; pollen admixtum.

GALLIA : *Tarn*, Lacabarède.

61 — (T. C.) — **R. INCANESCENS** Bertoloni *Fl. Ital.* V. 223 (1842) ; E. Burnat *Fl. Alp. mar.* III 14 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 84 ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 540 ; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 145 ; *R. glandulosus* var. *incanescens* DC. *Fl. Fr.* V p. 544 ; *R. maritimus* de Not. *Mém. Ac. sc. Turin.* 2 ser. IX, 183 (1848) ; *R. numidicus* Focke *Abh. NV. Bremen* IV, 175 (1874) ; *R. atlanticus* Pomel *Nouv. mat. Fl. Atl.* II, 314 (1875) ; Batt. et Trab. *Fl. Alg.* II, 302.

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 166 ; Sud. *Bat. eur.* n° 27, 394.

Validus ; turio (1, 2) angulatus, faciebus planis vel convexis, glaber, pruinosus, vulgo erubescens ; aculei subinaequales, mediocres, majores compressi, recti vel reclinati, sparsi, minores papulæformes vel setaceo-glanduliferi ; folia plerumque 5-nata, ampla, supra glabra, nitida, subtus appresse albo-tomentosa, subsimpliciter serrata, dentibus mediocribus, latis, parum profundis ; foliolum terminale (3, 4) ovatum vel breviter obovatum, emarginatum, abrupte acuminatum vel cuspidatum, longe petiolatum, infima petiolulata ; petiolus pruinosus, glaber, aculeis falcatis uncinatis armatus ; stipulae lineares, glandulosæ ; ramus angulatus, glabrescens, glandulosus, foliis 3-natis, supra glabris ; inflorescentia (5) elongata, subaphylla, piloso-hirsuta, glandulis crebris, purpurascens, aculeis debilibus vel mediocribus instructa (6) ; pedunculi medii patuli, multiflori ; bractæ angustæ ; pedicelli tenues ; sepala tomentosa, hirsuta, parce glandulosa, interdum aculeata, in fructu laxe reflexa (7) ; petala vulgo lutescenti-albida, oblonga vel ovata, unguiculata (8, 9) ; stamna alba stylos virescentes parum superantia ; germina glabra ; receptaculum glabrescens. Pollen purum (10). — Junius-julius.

β. BREVISTAMINEUS. — Aculei parvi ; stamna brevissima.

In collibus siliceis et nemoribus. — GALLIA : *Tarn*, Aude, Montagne-Noire, Var, Alpes-maritimes, Marne, bois de Verzy (Levent) ; ITALIA : Liguria, Etruria ; HISPANIA ORIENTALIS. Præterea in ALGERIA. — β. GALLIA : Aude, Mas-Cabardès (Ozanon).

HYBRIDÆ

R. INCANESCENS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 27 (1909) ; *R. BERTOLONII* Sud. *l. c.* — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 395. — Habitus *R. incanescens* sed inflorescentia glandulis nullis vel brevissimis, flores rosei. Pollen valde imperfectum.

GALLIA : Aude, Mas-Cabardès (Ozanon) ; Tarn, Escoussens, Massaguel ; ITALIA : Liguria, Paraggi, prope Portofino (Focke).

R. INCANESCENS × LLOYDIANUS Sud. *Rub. tarn.* p. 28 (1909) ; *R. DICHROUS* Sud. *l. c.* — Turio glaucescens ; foliola late rhombica, dentibus latis ut in *R. Lloydianus*. Pollen imperfectum.

GALLIA : Tarn, Escoussens ; ITALIA : Liguria (Cl. Bicknell).

OBS. I. — Le *R. vagus* Focke ap. Burnat *Fl. Alp. mar.* III (1899) p. 11 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 591 comprend plusieurs hybrides dérivés du *R. incanescens*, dont l'un, voisin de la var. *origanorum* Greml ap. Burnat *l. c.*, paraît être un *R. incanescens × hirtus*. (Cf. H. Sudre *Bull. Soc. Bot. Fr. t. L* p. 46).

OBS. II. — Le *R. incanescens* Bert., dont j'ai vu de nombreux spécimens de Ligurie et que j'ai observé en abondance dans la Montagne-Noire (Tarn), est une espèce très polymorphe ; il se présente quelquefois avec des pétales roses. Il est relié au *R. tomentosus* Borkh. Ssp. *R. Lloydianus* par le *R. ancophilus*, dont le turion n'est pas glauque. Son pollen étant parfait on ne saurait admettre qu'il dérive du *R. tomentosus* par croisement.

Subsect. B. — *Vestiti* Focke

Characteres serierum

a. — *HYPOLEUCI* Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 45 (1907). — Sepala in fructu reflexa ; folia, saltem superiora, subtus cinereo vel albo-tomentosa ; folia caulina vulgo 5-nata. Rubi validi.

b. — *VIRESCENTES* Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 47 (1907). — Sepala in fructu reflexa, raro patula ; folia subtus viridia, caulina plerumque 5-nata. Rubi vulgo validi, turionibus angulatis.

c. — *HEBECAULES* Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 47 (1907). — Sepala in fructu patula vel erecta ; folia subtus vulgo viridia, caulina 3-5-nata. Rubi mediocres vel debiles, turionibus angulatis vel subteretibus.

Series a. — *HYPOLEUCI* Sud.

Conspectus specierum

I. — Petala suborbicularia, raro late ovata ; folia minute serrata ; foliola lata, caulinum terminale breviter obovatum vel suborbicularia..... *R. vestitus* W. N. 62.

II. — Petala ovata, elliptica vel obovata.

A. — Folia minute vel mediocriter serrata ; turio parce pilosus.

a. — Folia inæqualiter, mediocriter vel grosse serrata.

1. — Turio parum heteracanthus, faciebus non asperis : stamna stylos superantia ; inflorescentia pyramidalis.....

2. — Turio leviter heteracanthus, faciebus subasperis ; stamna stylos vix superantia ; inflorescentia brevis, subinermis ; flores vive rosei.....

b. — Folia æqualiter et minute mucronato-denticulata.....

B. — Folia ± grosse et inæqualiter serrata ; turio dense pilosus, pubescentia obsita ; inflorescentia vulgo piloso-hirsuta aculeis debilibus vel mediocribus instructa.....

R. macrostachys P.-J. Müll. 63

R. Boreuanus Gen. 65

R. podophyllum P.-J. Müll. 64

R. adscitus Gen. 66

62 — (T. CI) — **R. VESTITUS** Wh. ap. Bluff et Fing. *Comp. Fl. germ.* I p. 684 (1825) ; W. et N. *Rub. germ.* p. 81 t. XXXIII ; G. et G. *Fl. Fr.* I p. 545 ; Focke *Syn.* p. 291 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 546 ; P.-J. Müll. *Vers.* n° 61 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 88 (var. *roseiflorus*) ; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 145 ; *R. leucostachys* Schleich. ap.

Sm. Engl. Fl. 2 p. 403 (*ex pte*) (1824); *Hal. Oest. bromb.* p. 249; *Rogers Handb. Brit. Rub.* p. 50, *ex pte*; *R. vinetorum* Holandre *Fl. Mos.* ed. 1 p. 267 !; *R. lanatus* Focke *Abh. N. V. Bremen* I p. 294.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 84, 85; *ed.* 2, n° 22; *Assoc. rub.* n° 723, 725, 728, 729, 895, etc.; *Rub. gall.* n° 35; Sud. *Bat. eur.* n° 132; F. Schultz *Hb. norm.* n° 785.

Turio (1, 2) arcuato-prostratus vel scandens, obtusangulus, epruinosus, fusco-ruber, pilis brevibus stellulatis aliisque longis, fasciculatis, dense onustus, glandulis nullis vel raris munitus; *acutei* subæquales, majores compressi, recti, longi; *folia* (3) 5-nata, coriacea, supra obscure viridia et parce pilosa, subtus mollia, cinereo-tomentosa vel velutino-cinerascens (in umbrosis viridia), pilis crebris, longis, ad nervos pectinatis; *serratura* tenuis, parum profunda, dentibus plurimque simplicibus, mucrone diverse patulo; *foliola* margine undulato-crispa, terminale late obovatum vel plerumque suborbiculari, basi rotundatum vel subemarginatum, breviter acuminatum, infima petiolulata; *petiolus* supra planus aculeis falcati armatus; *stipulae* linear-lanceolatae, tenuiter glandulosæ; *ramus florifer* obtusangulus, pilosus, aculeis subæqualibus, longis, reclinatis; *folia* 3-nata, argute mucronato-serrata, supera subtus cinereo-tomentosa; *inflorescentia* (4) pyramidalis, basi foliosa, obtusa, longe piloso-hirsuta, glandulis longis, sparsis, aculeis validis, elongatis, rectis vel reclinatis instructa (5); *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori, bracteis plurimis trifidis; *sepala* tomentosa, pilosa, sparsim glanduloso-aciculata, in flore et fructu reflexa (6); *petala* suborbicularia (7, 8), lète rosea; *stamina* numerosa, alba vel rosea, stylis virescentes vel roseos superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollen* admixtum (9). — Junius-julius.

In locis montosis siliceis, ad sepes et silvarum margines. — EUROPA MEDIA TOTA.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia supra parce, subtus molliter pilosa, cinerascentia.

- A. — Petala vive rosea.....
- B. — Petala alba; stamina alba, styli virescentes.
 - a. — Validus; inflorescentia parce glandulosa; fertilis.....
 - b. — Debilis; inflorescentia eglandulosa; parum fertilis.....

II. — Folia supra fere glabra, subtus cinereo-tomentosa, breviter pilosa.

- A. — Turio pruinosus; folia minute mucronato-denticulata; rachis dense hirsuta.....
- B. — Turio epruinosus; rachis vulgo laxe hirsuta.
 - a. — Petala rosea, suborbicularia.
 - 1. — Inflorescentia glandulis raris, brevibus munita.
 - a. — Folia coriacea; foliolum caul. terminale suborbiculari; pedunculi breviter pilosi.
 - b. — Folia tenua; foliolum caul. terminale obovatum; pedunculi longe et dense hirsuti.
 - 2. — Inflorescentia glandulis longis munita, aculeis validis, crebris armata; sepala acuteata; rachis laxe pilosa.....
 - b. — Petala alba, ovata.....

R. vestitus Wh.

R. LEUCANTHEMUS P.-J. Müll. b.
R. PILIFER Sud. c.

R. ANDEGAVENSIS Bouv. C.

R. PERCONSPICUUS Sud. D.
R. LEUCOTRICHUS Sud. B.

R. CONSPICUUS P.-J. Müll. E.
R. ACUTIDENS B. et Gill. F.

b. — *R. leucanthemus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 60 (1859); *N. Boul. Ronc. vosg.* p. 26; Sud. *Bat.* p. 10; *R. vestitus* × *albiflorus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 89; *R. leucostachys* Auct. angl. p. p.

Exsicc. — *N. Boul. Ronc. vosg.* n° 12, 12^{bis}; Billot n° 2450; *Assoc. rub.* n° 27, 280, 724; *Rub. gall.* n° 34, 131; Sud. *Bat. eur.* n° 29 ! 396.

Habitus *R. vestiti* sed flores albi, pollen minus imperfectum.

EUROPA MEDIA TOTA. In solis calcareis vel siliceis.

OBS. — Je l'ai observé sur de grands espaces, dans le *Tarn*, le *Cantal* et ailleurs, et sur des terrains très divers, là où le *R. vestitus* (rosea-florus) manque totalement. C'est donc une forme bien fixée, qui du reste se maintient par la culture avec tous ses caractères, et qui constitue plus qu'une simple variété du type.

HYBRIDÆ

× è Suberectis.

R. VESTITUS × *AFFINIS*; *R. AFFINOIDES* G. Braun *Hb. rub. germ. exsicc.* n° 103. — Folia coriacea, utrinque manifeste pilosa; ramus pilosus; cetera fere ut in *R. affinis* W. N.

GERMANIA occidentalis: prope Goslar (G. Braun).

OBS. — J'avais d'abord rattaché cette plante au *R. affinis* (*Cf. p. 21*) mais il me paraît aujourd'hui qu'elle dérive du *R. vestitus* par croisement.

× è Silvaticis.

R. VESTITUS × *SPRENGELII* Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *R. INFRAPILOSUS* Sud. l. c.; *R. supervestitus* Boul. et Quincy *Assoc. rub.* n° 561 (1883), non n° 502. — Pubes *R. vestiti* sed gracilis, glandulis brevibus; petala angusta. Pollen valde imperfectum.

GALLIA : *Saône-et-Loire*, Mont Beuvray (Quincy).

R. VESTITUS × *PYRAMIDALIS* Sud. *in hb. Mus. Paris*; *R. SERICATUS* M. et Lef. *Vers.* n° 62 (1859); *R. vestitus* × *fuscus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 109. — Pubes *R. vestiti* Wh. sed folia grosse serrata, foliola minus lata, inflorescentia multiflora. Parum fertilis, subvirescens.

GALLIA : *Oise*, forêt de Retz, à Bourgfontaine (Lefèvre, Questier).

R. VESTITUS *leucanthemus* × *ALBIFLORUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LI (1904) p. 19; *R. LEUCANTHEMOIDES* Sud. l. c. — Differt a *R. leucanthemo* turionibus angulatis, eglandulosis, foliis minus pilosis, inflorescentia minus armata. Sterilis.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Ambert; *Saône-et-Loire*, Mont, Grury (Basset).

× è Discoloribus.

R. VESTITUS × *ULMIFOLIUS*; *R. VESTITIFRONS* Sud. hb.; *R. vestitiformis* Sud. ap. Gdg. *Nov. Consp.* p. 145, non Rogers. — Pubes et seratura *R. vestiti* Wh. sed turio pruinosus, foliola angustiora, obovata. Sterilis.

GALLIA : *Valois*, Le Plessis-au-Bois (Questier); *Eure-et-Loir*, Boissy-le-Sec, Dampierre-sur-Avre (Jourdes); *Vienne*, Pindray (Chaboisseau); *Nord*, Saint-Acaire (B. de Lesdain); *Haute-Savoie*, Les Voirons, Bon Saint-Didier (Schmidely); HELVETIA: Aire, propre Genève (Schmidely); BELGIA : Crainhem (du Pré); Boitsfort (Durand).

R. VESTITUS × *PROPINQUUS*; *R. SIMILIFLORUS* Sud. hb. — A præcedente dignoscitur inflorescentia densiore, pilosiore, foliis supra non obscure viridibus.

GALLIA : *Orne*, Beaulieu (Jourdes).

R. VESTITUS *leucanthemus* × *WINTERI*?; *R. LASIOCLADUS* Focke *Syn.* p. 198 (1877), ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 548; *Rogers Handb. Brit. Rub.* p. 52. — Differt a *R. leucanthemo* turionibus glaucescentibus, aculeis validioribus. Mihi novus est.

GERMANY, prope Aachen; BRITANNIA, Kent, Berks, Brecon (sec. Rogers).

OBS. — On a confondu vraisemblablement plusieurs formes sous le nom de *R. lasiocladus* Focke; mes spécimens des Provinces rhénanes appartiennent au *R. Winteri* P.-J. Müll. La var. *angustifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 52 (non *R. angustifolius* M. et L.) m'est inconnue.

R. VESTITUS × *BIFRONS* Sud. *Bull. Acad. int. géog. bot.* (1904) p. 154; *R. PILOSULUS* Sud. l. c.; *R. macroacanthus* Cott. et Cast. *Guide Frib.* p. 96 p. p., non W. et N. — Differt a *R. vestito* foliis subtus parum pilosis, rachide laxe pilosa; serratura *R. bifrontem* revocata.

HELVETIA: *Valois*, forêt de Retz (Questier); BELGIA: *Ensival* (Halin), Etterbeck (du Pré); Linkenbeck (Lejeune); Watermael (Durand).

R. VESTITUS × *CUSPIDIFER* Sud. ap. *Ganig. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *Diagn.* p. 24; *R. APICATUS* Sud. l. c. — Minus pilosus quam *R. vestitus*; discolor, eglandulosus; inflorescentia laxa.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Lefèvre, Questier).

× ex *Appendiculatus*.

R. VESTITUS × *TOMENTOSUS* Sud. ap. *Gandg. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *R. MOLLIFOLIUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 211 (1859); — *R. Courtoisianus* Lej. ! hb.; *R. vestitus* var. β. Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II, 170. — Pubes *R. vestiti* Wh.: aculei tenuiores, dentes latiores; folia supra tomentosa. Sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Cusel (Müller); LUXEMBURG (Lejeune).

R. VESTITUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI*, p. 20 (1904); *R. DISPARATUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 42 (1859); *R. rectispinus* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I*, n° 172. — A *R. vestito* distinguitur: dentibus latioribus, petalis albis, angustioribus. Sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Cusel (Müller); *Prov. rhénane*, St-Johan (Winter); GALLIA: *Cantal*, Yolet, Leynhac; *Ain*, Sergy (Schmidely); HELVETIA: Chexbres (Schmidely).

R. VESTITUS × *FUSCUS*; *R. SEMIFUSCUS* Sud. hb.; *R. sericatus* var. Sud. in hb. Müller. — Pubes *R. vestiti* Wh. sed folia subtus viridia, inflorescentia glandulosior, petala ovata, pallide rosea.

GALLIA: *Vosges*, Ménil, propre Rambervillers (N. Boulay).

R. VESTITUS × *MENKEI* Sud. ap. *Gdg. Nov. Consp.* p. 145 (1905); *R. MULTIDENTATUS* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 249 (1877); *R. fuscus* × *hirtus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 129, ex pte. — Pubes et serratura ut in *R. vestito*, sed foliis viridibus, glandulis numerosis diversus est.

GALLIA: *Vosges*, Gerbamont, aux Plateaux (Pierrat).

R. VESTITUS leucanthemus × *SCITULUS* v. *pumilus* Sud. *Rub. tarn.* p. 28 (1909); *R. SCLEROTRICHUS* Sud. l. c. — Pubes *R. vestiti* sed aculei debiliores, rachis laxe pilosa, flores vive rosei. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Le Pont de la Mouline, propre Murat.

R. VESTITUS × *SERPENS* (non Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 128); *R. LINGUIFER* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 63 (1868) et *exsicc.* n° 63. — Pubes et serratura ut in *R. vestito* sed folia 3-nata, inflorescentia dense glandulosa, petala alba, angusta. Sepala reflexa; fructus male evolulus.

GALLIA: *Vosges*, Coinches (Boulay).

Le suivant semble avoir la même origine :

R. VARIANS N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 95 (1868) et *exsicc.* n° 76. — Validus; aculei robusti; folia grosse serrata; rachis parum pilosa; petala lata, alba; stamina stylis excurrentia; sepala erecta. Parum fertilis. — GALLIA: *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

R. VESTITUS × *HIRTUS* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 128, ex pte.; *R. JACQUELI* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 68 (1867) et *exsicc.* n° 50. — Foliola lata, argute serrata, pilosa ut in *R. vestito*; inflorescentia glanduloso-aciculata ut in *R. hirto*; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA: *Vosges*, Coinches (Jacquel).

c. — (T. CII) — *R. pilifer* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* (1899) p. 90; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 550; *R. conspicuus* de Martr.-D. *Fl. tarn.* p. 210, non P.-J. Müll.; *R. vestitus* Holuby, non W. N.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* nos 397! 398.

Differt a *R. leucanthemo*: turione (1) debiliore, foliis discoloribus, satis grosse serratis; foliolis minoribus, angustioribus (2), glandulis nullis (3, 4), petalis (5) minoribus. Parum fertilis.

GALLIA: *Tarn*, Lacabarède, Anglés, Carmaux, Cambon, etc.; *Hautes-Pyrénées*, Arreau; *Puy-de-Dôme*, Arlanc, la Bourboule; *Cantal*, Garabit, Brousse (Charbonnel); GERMANIA: Bertrich (Wirtgen sub. *R. discolor* v. *velutinus* Hb. rub. rh. ed. I, n° 38); HUNGARIA: Podhrad (Holuby).

Obs. — Cette plante dérive peut-être du *R. leucanthemus* P.-J. Müll. par croisement; toutefois elle n'est pas rare dans le Tarn, dans de nombreuses localités où le *R. leucanthemus* manque. Elle est beaucoup plus rapprochée du *R. vestitus* que du *R. pyramidalis* Kalt., à la suite duquel la place M. Focke. Müller l'avait du reste rapportée avec toute à son *R. leucanthemus*. Elle se rapproche aussi du *R. adscitus* Gen.

HYBRIDÆ

R. PILIFER × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 28 (1909); *R. PSEUDOPILIFER* Sud. l. c. — Differt a *R. pilifero* turionibus pruinosis, foliis supra obscure viridibus.

GALLIA: *Tarn*, Lacabarède, Teulet.

R. PILIFER × *PRÆTEXTUS*; *R. CONSEQUENS* Sud. hb. — Differt a *R. pilifero* foliis subtus viridibus, foliolis acuminatis, inflorescentia parce glandulosa, staminibus stylis brevioribus. Substerilis.

GALLIA: *Tarn*, Labastide-Rouairoux, loco dicto « Pont de la Peyre ».

R. PILIFER × *SCHLEICHERI* var.; *R. VALDEPUBENS* Sud. — Differt a *R. pilifero* foliolis rhomboidales, grosse serratis, inflorescentia glandulosa. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Les Fournials, propre Saint-Amans.

B. — (T. CII) — ***R. leucotrichus*** Sud. *Bat. p. 55* (1906).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 167!

Differt a *R. vestito*: aculeis subæqualibus (6), glandulis nullis vel rarissimis, brevibus; foliis non coriaceis, tenuibus, supra glabris vel pilis rarissimis munitis; foliolo terminali (7) obovato, basi rotundato, cuspidato. Inflorescentia (8, 9) pilis densis, longis, albis, glandulis sparsis obsita, aculeis pallidis, reclinatis instructa; sepala hirsuta, parce aculeata; petala (10) staminaque vive rosea; stylus vulgo rosei; germina glabra; pollen admixtum.

β. *SUBEGLANDULOSUS* Sud. *Bat. p. 55* (1906) et *exsicc.* n° 168! — Inflorescentia subeglandulosa, turiones angulati, laxe pilosi. Habitus *R. silvaticorum*.

GALLIA: *Sarthe*, Le Mans, Traugé (Gentil, Henry). — β. BRITANNIA: *Dorset*, Edmonsham (Linton).

HYBRIDÆ

R. LEUCOTRICHUS × *PROPINQUUS*; *R. AMBLYSTEMON* Sud. et Gentil. — Turio glaucescens; folia discolora foliolis latis. Eglandulosus; petala orbicularia. Sterilis.

GALLIA: *Sarthe*, Amné, parc des Bordeaux (Chenon); Crê-sur-Loir (Launay).

R. LEUCOTRICHUS × *PYRAMIDALIS*; *R. CORNAVIENSIS* Sud. in hb. Wolley-Dod. — Habitus *R. leucotrichi* sed foliola minora, subtus pilis ad nervos pectinatis; petala oblonga, pallide rosea. Eglandulosus steriliisque.

BRITANNIA: *Cheshire*, Pennsylvania (Wolley-Dod).

C. — (T. CII) — **R. andegavensis** Bouvet Rub. *Anj.* in *Assoc. fr. av. sc.* (1903) p. 682; *Rub. Anj.* (1907) p. 45; Sud. *Bat.* p. 25; *R. vestitus* Genev. *salt. ex ple*; *R. gymnostachys* Genev. *Ess. mon.* p. 201 (1869); *Mon.* p. 228 (*vr. max. p.*); *R. umbrosus* Bor. ! *Fl. cent. ed.* 3 p. 200; *R. ulmifolius* \times *hypoleucus* vel *Boræanus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 107.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 319 (1879); *Rub. gall.* n° 129; Sud. *Bat. eur.* n° 73.

Turio (11) pruinosa, faciebus planis, aculeis validis, subæqualibus, rectis armatus; *folia magna*, supra glabra vel pilis raris, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, tenuiter mucronato-denticulata; *foliolum terminale* (12) late obovatum, submarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* (13, 14) elongata, subaphylla, densa, piloso-hirsuta, parce glandulosa, aculeis crebris, validis, reclinatis armata; *pedunculi* multiflori; *pedicelli* breves; *sepala* hirsuta, glandulosa sparsis, brevibus munita; *petala* suborbicularia, vive rosea; *stamina* pallide rosea stylis parum superantia; *germina* pilosa. *Pollen* valde imperfectum. Fertilis.

GALLIA : Maine-et-Loire (Bouvet), Sarthe (Gentil), Loire-Inf. (de l'Isle), Eure (Jourdes).

HYBRIDÆ

R. ANDEGAVENTIS \times **CRYPTADENES** v. *flexicaulis* Sud. et Bouv. in Bouvet Rub. *Anj.* p. 72 (1907); **R. GRANDISPINUS** Sud et Bouv. *l. c.* — Differt a *R. andegavensi* aculeis æqualibus, glandulis nullis, foliolis minus latis, grosse serratis, petalis angustioribus, pallidis.

GALLIA : Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy (Bouvet).

R. ANDEGAVENTIS \times **PROPINQUUS**: R. ADRIENII Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 399 ! — Differt a *R. andegavensi* foliis subtus albo-tomentosis, dentibus leviter inæqualibus, \pm divaricatis, glandulis nullis, floribus sterilibus. *Foliolum caul. terminale* basi emarginatum, antheræ parce pilosæ.

GALLIA : Sarthe, Précigné, route de la gare, au carrefour (Adrien Henry).

R. ANDEGAVENTIS \times **ADSCITUS**; **R. EURYTHRHOIDES** Sud. *hb.* — Virescens; aculei inæquales, glandulæ frequentes, dentes lati; cetera ut in *R. andegavensis*.

GALLIA : Maine-et-Loire, Angers.

D. — (T. CII) — **R. perconspicuus** Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 207 (1901) et exsicc.

Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 400 !

Turio (16) obtusus, epruinosus, pilis appressis, glandulis rarissimis, aculeis brevibus, leviter inæqualibus inservit; *folia coriacea*, supra glabra, subtus albo-tomentosa, pubescentia, subtiliter et inæqualiter denticulata; *foliolum terminale* (17) suborbiculare, emarginatum, abrupte et breviter acuminatum, omnia lata, marginibus sese tegentia; *ramus* pilosus, aculeis debilibus, reclinatis falcatis; *inflorescentia* (18, 19) elongata, basi foliosa, breviter hirsuta, aculeis debilibus, glandulis nullis vel raris, brevissimis instructa; *sepala* tomentosa, laxe pilosa, inermia, glandulis subsessilibus sparsis; *petala* (20) orbicularia, rosea; *stamina* pallide rosea stylis \pm carneos superantia; *germina* parce pilosa; *pollen* parum admixtum. — Intermedius fere inter *R. argenteum* Wh. et N. et *R. vestitum* Wh. Habitus *R. discolorum*.

GALLIA : Tarn, Cambon, prope Albi.

E. — (T. CII) — *R. CONSPICUUS* P.-J. Müll. in *Flora B. Z.* (1858); *Vers.* n° 59; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 86; Gremli *Beit. Fl. Schw.* p. 39; Focke *Syn.* p. 296 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 548; *R. vestitus* P.-J. Müll. (*prius*) in *Flora* (1858) p. 149; *R. bifrons* \times *vestitus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 108.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 9, 84; ed. 2 n° 23, 24; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 66; *Assoc. rub.* n° 1167; Baenitz *Hb. eur.* n° 9940; Sud. *Bat. eur.* n° 401.

Differt a *R. vestito* Wh. turionibus (21) angulatioribus aculeis valde compressis; foliis supra glabris, subtus albo-tomentosis, pubescentibus, acute et inæqualiter serratis, dentibus sœpe refractis; foliolis minus latis, acuminatis; ramis inflorescentia laxe pilosis, aculeis longioribus, tenuioribus, glandulis longis valde apparentibus (23, 24). *Sepala* hirsuta, parce glandulosa, aculeata, appendiculata; *petala* (25) suborbicularia, corrugata, lâte rosea; *stamina* basi rosea stylis superantia. *Pollen* valde imperfectum.

β. **MINUTIDENS** Sud. *Rub. tarn.* p. 28 (1909). — Folia minute et inæqualiter denticulata; *stamina* stylis breviora.

γ. **MAGNIFICUS**; *R. magnificus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861), *nomen*; Genev. *Mon.* p. 171 (1880) *ex ple*; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 50; *Bat. p. 10*; *R. conspicuus* \times *Mercieri* Schmid. *Cat. p. 62, p. p.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 30 ! — Differt a *R. conspicuo*: foliis amplioribus, foliolo caulino terminali suborbiculari, serratura inæqualiore, inflorescentia majore, hirsutiore, petalis minus latis, polline perfectiore.

GALLIA : Vosges, Marne, Ardennes, Meuse, Aisne, Oise, Eure, Vendée, Tarn, etc.; HELVETIA, GERMANIA OCCIDENTALIS. — β. GALLIA : Tarn, Saint-Amans. — γ. GALLIA : Marne, bois de Mersy ! (Levent), Sarthe, Eure; HELVETIA : Vaud.

Obs. — Le type et la var. γ croissent ensemble dans les bois de la Marne, où ils sont très abondants. J'ai rencontré dans les récoltes de Questier et de Levent des intermédiaires entre ces deux formes, ce qui me conduit à les subordonner l'une à l'autre.

HYBRIDÆ

R. CONSPICUUS \times **MERCIERI** Schmid. *Cat. p. 62, p. p.*; **R. PSEUDO-CONSPICUUS** Sud. *ap. Gandg. Nov. Cusp. p. 145* (1905). — Planta pallide viridis; inflorescentia parce glandulosa; flores pallidi.

GALLIA : Haute-Savoie, M^t Salève (Schmidely).

R. CONSPICUUS \times **ULMIFOLIUS** Schmid. in *hb.* Sud; **R. RHODANTHEMUS** Sud. *ap. Gandg. l. c. p. 146* (1905); *R. Mercieri* \times *ulmifolius* Schmid. *Cat. p. 60 p. p.* — Habitus *R. conspicui* sed folia appresso tomentosa, glandulæ nullæ vel rares; flores vivè rosei. Sterilis.

GALLIA : Haute-Savoie, M^t Salève, au N. de Mornex (Schmidely); Tarn, Saint-Amans.

R. CONSPICUUS var. γ \times **ULMIFOLIUS** *serriculatus* Sud. *ap. Gandg. Nov. Cusp. p. 146* (1905); **R. MATRONENSIS** Sud. *l. c.* — Folia ut in *R. conspicuo* sed minute serrata; glandulæ sessiles.

GALLIA : Marne, bois de Mersy (Levent).

R. CONSPICUUS \times **TOMENTOSUS** *Lloydianus* Sud. *ap. Gdg. Nov. Cusp. p. 146* (1905); *R. CONSPICUIFORMIS* Sud. *l. c.*; *R. conspicuus* \times *tomentosus* Schmid. *Cat. p. 121*; *R. Mercieri* \times *tomentosus* ? ej. *Cat. p. 62*. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 718, 721. — Discolor, folia grosse serrata, rachis hirsuta, flores pallidi.

HELVETIA : Aire, prope Genève; Bonmont, Gourze, Divonne (Schmidely).

E. — (T. CII) — **R. acutidens** Boul. et Gillot *Rév. Rub. Spect.* p. 7 (1892); N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 89.

Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 281, 431, 432, 557, 627; *Rub. gall.* n° 79; Sud. *Rub. rar.* n° 56.

R. conspicuo admodum similis a quo differt (26-30) : serratura profundiore, dentibus erectis, sepalis parum aculeatis, petalis minus latis, ovatis vel late obovatis, albis; staminibus albis stylis virescentes superantibus. Fertilis. Intermedius fere inter *R. vestitum* et species *gregis sequentis*.

GALLIA : Saône-et-Loire, Montheron, Autun (Gillot); Puy-de-Dôme, Rochefort (Lamotte); Corrèze, Bort.

HYBRIDA

R. ACUTIDENS × BIFRONS Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 146 (1905); *R. ARGYRANTHUS* Boul. et Lucand Assoc. rub. n° 377 (1880). — Glandulæ brevissimæ; folia subappresso tomentosa, tenuiter serrata ut in *R. bifronti*. Parum fertilis.

GALLIA : Saône-et-Loire, parc de Montjeu (Lucand).

OBS. — Le *R. flavivirens* Geuev. Mon. p. 180 dérive peut-être aussi du *R. vestitus*. Il m'est inconnu. — GALLIA : Puy-de-Dôme, bois du Bouchat, près Ménat (Lamotte); Haute-Vienne, Ambazac, Saint-Sulpice-les-Feuilles (Lamy).

63 — T. CIII) — *R. MACROSTACHYS* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 150; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 567? (excl. syn.); Sud. ap. Gdg. Nov. Conspp. p. 147.

Exsicc. — Sud. Herb. rub. rar. n° 38.

Turio (1, 2) obtusangulus, epruinosus, fusco-rubens, parce pilosus, glandulis sparsis, brevibus munitus; *aculei* subæquales, basi compressi, recti vel reclinati; *folia* ampla, 5-nata, tenuia, supra glabrescentia, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pilosa, inæqualiter et subsimpliciter serrata, dentibus mediocribus, parum profundis, mucronibus diverse patulis vel refractis; *foliolum* terminale ovatum (3) vel late ellipticum (4), basi integrum vel subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, parce glandulosus, aculeis falcatis; *stipulae* linear-lanceolatae glandulis brevibus prætextæ; *ramus florifer* obtusangulus, pilosus, glandulosus, aculeis falcatis; *inflorescentia* (5) pyramidalis, basi foliosa, pilosohirsuta (6), glandulis brevibus satis crebris, aculeis gracilibus, sparsis, reclinatis falcativis instructa; *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia, glandulis subsessilibus obsita, apice breviter acuminata, in flore et fructu reflexa (9); *petala* magna (7, 8), elliptica, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa; *receptaculum* glabrum. *Pollinis* (10) gradus puritatis: 5/6 circiter. — Junius-julius.

β. SCABRIDUS; *R. scabridus* P.-J. Müll. in Flora Z. u. B. (1858); Vers. n° 97 (1859); *R. Radula* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 155 non Wh.; *R. anisacanthus* G. Br. exsicc.; *R. thyrsanthus* × *Radula* Utsch. — *Foliolum* caul. terminale basi manifeste cordatum; *pedunculi* valde patuli; *petala* pallide rosea.

γ. SEPINCOLUS; *R. sepincolus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 132 (1869). — Exsicc. Ronc. vosg. n° 116; Sud. Rub. rar. n° 57. — aculei crebri, mediocres; *turio* faciebus planis vel concavis, pilosus; *foliolum* caul. terminale late ovatum, cordatum; *inflorescentia* magna, dense glandulosa, pedunculis valde patulis; flores albi.

δ. ADENANTHUS; *R. adenanthus* Boul. et Gillot Assoc. rub. n° 429 (1881); *R. Radula* var. *coloratus* Holuby exsicc., ex pte.; *R. Gillotii* × *Menhei* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 108; *R. decipiens* var. *confertus* Schmid. Cat. 131; *R. decipiens* var. *juratensis* ej. — Differt a typ.: *turione* pilosiore, *inflorescentia* foliosa, aculeis crebris, sed debilibus; *foliolum* caul. terminale basi parum emarginatum, subobovatum.

ε. MICRADENES; *R. micradenes* N. Boul. Ronc. vosg. p. 90 (1868) et exsicc. n° 70. — *Turio* faciebus concavis; *foliolum* caul. terminale late rhombéum, basi subintegrum; *inflorescentia* angusta, conferta, foliosa, pedicellis brevibus, dense glandulosis; flores albi.

In memoribus et sepiibus. — GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, « lignes du Pigeonnier » (Müller); GALLIA: *Valois*, enclave du Cuvret (Questier). — β. GERMANIA: *Alsacia*, Sobenthal (Müller); *Bavaria*, Waging, Gessenberg (Progel); *Hercynia*, Okerthal (Utsch). Harzburg (Bertram); GALLIA: *Tarn*, Labastide-Rouairoux. — γ. GALLIA: *Vosges*, Saint-Michel (N. Boulay); BRITANNIA: *Herefordshire*, Caplar (A. Ley). — δ. GALLIA: *Saône-et-Loire*, Autun, à Monthelon (Gillot); *Puy-de-Dôme*, le Pariou (Lamotte); *Gard*, Dombies; *Oise*, forêt de Retz (Questier); HELVETIA: Bonnmont (Schmidely); HUNGARIA: com. Trencin (Holuby). — ε. GALLIA: *Vosges*, Ban-de-Sapt, au Fraiteux (Didier et Lemaire).

HYBRIDÆ

R. MACROSTACHYS × *BIFRONS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 146 (1905); *Diagn.* p. 25; *R. STENOBELUS* Sud. l. c. — *Folia* minute serrata, aculei angusti, glandulæ brevissimæ. Sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg « chemin occidental de la Hasselbach, après le chemin creux de la Steinegrüb » (Müller).

R. MACROSTACHYS × *LEPIDUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 146 (1905); *R. HARPAGO* P.-J. Müll. Vers. n° 34 (1859). — *Discolor*; glandulæ breves, rarissimæ; *foliola* terminalia rhombea; *inflorescentia* aculeis geniculatis armata. Sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Remigiusberge, prope Cusel (Müller).

R. MACROSTACHYS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 146 (1905); *Diagn.* p. 25; *R. EQUABILIS* Sud. l. c. — *Discolor*, glandulæ rarae, multiflorus, sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, circa Weissenburg (Müller).

R. MACROSTACHYS × *SERPENS* Sud. ap. Gdg. l. c. 146 (1905); *R. CERINOSTYLUS* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 156. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 400! — *Gracilis*; aculei debiles; glandulæ crebræ in *inflorescentia*; subvirescentes.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg « carrefour, au grand val, derrière le Pigeonnier » (Müller).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentiae rachis distincte piloso-hirsuta.

A. — *Inflorescentia* glandulis rarior, parum apparentibus, inermis vel aculeis rarior, debilibus, munita.

- a. — *Turio* parce pilosus, epruinosus vel subglaucescens; *inflorescentia* magna, laxa; flores rosati.
- b. — *Turio* glaber, epruinosus; *inflorescentia* conferta; *stamina* stylique pallida.....
- c. — *Turio* pilosus, pruinosus; *inflorescentia* densa.....

B. — *Inflorescentia* manifeste glandulosa, sœpe armata.

- a. — *Foliorum* caulinorum dentes tenues vel mediocres, parum profundi, plerique simplices.

1. — *Turio* parce pilosus, epruinosus; *inflorescentia* aculeis debilibus instructa.....

2. — *Turio* pilosus, sœpe pruinosus; *inflorescentia* aculeis crebris, validis armata.

a. — *Flores* albi; *folia* supra parce pilosa, parum discolora.

Turio epruinosus; *germina* glabra.....

Turio pruinosus; *germina* pubescentia.....

b. — *Flores* rosei; *turio* pruinosus.

Folia supra pilosa, obscure viridia.....

Folia supra glabra, flavescens-viridia.....

3. — *Turio* glaber, pruinosus; *flores* albi.....

- b. — *Foliorum* caulinorum dentes acuti, profundi, inæquales, compositi.

1. — *Folia* subtus moliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis.....

2. — *Folia* subtus pubescentia, pilis ad nervos non manifeste pectinatis.

a. — *Aculei* petiolares reclinati vel facati.

Turio faciebus planis; *folia* caulinæ supra glabra.....

Turio faciebus convexis; *folia* caulinæ supra parce pilosa.....

b. — *Aculei* petiolares adunci; *turio* faciebus leviter concavis.....

R. CHABOISSEAU P.-J. Müll. B.

R. SEPTORUM P.-J. Müll. Bb.

R. CLETHROCHARIS Sud. Bc.

R. macrostachys P.-J. Müll.

R. WOLLEY-DODII Sud. b.

R. INFRARUGOSUS Sud. c.

R. PRUINIFER Sud. d.

R. CHLORIFOLIUS Sud. et Sab. Dd

R. LAURENTINUS Sud. e.

R. FIMBRIFOLIUS M. et W. C.

R. CAFLISCHII Focke D.

R. BASALTICARUM Sud. Db.

R. STYRIACUS-Sabrs. Dc.

II. — Inflorescentie rachis tomentosa, breviter et laxe pilosa.

R. SCHLICKUMII Wirtg. E.
R. RUBELLUS P.-J. Müll. F.

- A. — Folia subtus pilosa, pilis ad nervos manifeste pectinatis.....
B. — Folia subtus breviter pubescentia, pilis ad nervos non manifeste pectinatis.....

b. — (T. CIV) — R. Wolley-Dodii; R. criniger (Linton) Rogers Handb. Brit. Rub. p. 52 (pr. min. p.).

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 89 (ex pte, leg. Wolley-Dod); Sud. Bat. eur. n° 403 !

Turio angulatus, pilosus, epruinosus, glandulis sparsis; *folia* 5-nata, inaequaliter et mediocriter serrata, subtus pubescentia, parum discolora; *foliolum* terminale (1) late ellipticum, basi subemarginatum, satis abrupte acuminatum; *inflorescentia* (2, 3) inferne foliosa, dense piloso-hirsuta, glandulosa, aculeis crebris, rectis vel reclinatis armata; *pedunculi* medii breves, patuli, 2-3-flori; *sepala* pilosa, parce glandulosa; *petala* (4) alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra; *pollen* parum admixtum, fere purum.

BRITANNIA : Cheshire, Edge Park (Wolley-Dod).

- c. — (T. CIV) — R. infrarugosus Sud.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 404 !

Turio angulatus, faciebus planis, pruinosus, dense pilosus, glandulis rarissimis; *folia* parum discolora, supra parce pilosa, subtus dense pubescentia, inaequaliter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale (5) late ovato-rhombeum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* (6, 7) pyramidalis, saepe usque ad apicem foliosa, hirsuta, glandulosa crebris, longis, aculeis reclinatis falcatis instructa; *pedunculi* medii patuli; *sepala* glandulosa aculeataque; *petala* elliptica (8), alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pubescentia. — R. fimbriifolio M. et W. similis.

BELGIA : Namur, circa Louette-Saint-Pierre (Gravet).

- d. — (T. CIV) — R. pruinifer Sud. Diagn. p. 26 (1906); R. epipsilos (Focke) f. *folitis supra pilosis* Progel, p. p.

Validus; *turio* (9) obtusangulus, valde pruinosus, pilosus, parce glandulosus, aculeis crebris, validis armatus; *folia* supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* terminale (10) late rhombeum, integrum, acuminatum; *inflorescentia* laxa, foliosa, hirsuta, parce glandulosa (11, 12), aculeis validis armata; *sepala* hirsuta, parce glandulosa; *petala* vive rosea; *germina* pilosa; *stamina* stylos aequantia.

GALLIA : Seine-Inférieure, Aumale (Questier); BAVARIA : Waging, Dlossauer Berg (Progel).

- e. — (T. CIV) — R. laurentinus Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. LVII (1910).

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 58 !

Turio glaber, glaucescens, faciebus planis, glandulis sparsis; *folia* magna, 5-nata, supra glabra, subtus albo-tomentosa, subsimpliciter et inaequaliter dentata; *foliolum* terminale (13) ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio 2-4-plo longius; *ramus* pilosus; *inflorescentia* foliosa, pilosa (14), manifeste glandulosa, aculeis rectis vel reclinatis, crebris munita; *pedunculi* medii 2-3-flori, patulo-ascendentes; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa, in fructu reflexa; *petala* (15) elliptica, alba; *stamina* alba stylos roseos superantia; *germina* pilosa.

GALLIA : In Pyrenæis aurigeranis, inter Rouze et Mijanés, regione « Laurenti ».

- B. — (T. CIV) — R. Chaboisseau P.-J. Müll. Vers. n° 95 (1859); Mon. p. 216; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 86.

Exsicc. — F. Schultz Hb. norm. n° 647; Sud. Bat. eur. n° 28 !

Turio (16) debilis, prostratus, subteres, parce pilosus, aculeis sparsis, mediocribus, inaequalibus, glandulis rarissimis, brevibus munitus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus albo-tomentosa, breviter pubescentia, subsimpliciter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale ellipticum (17), basi integrum, acuminatum; *ramus* gracilis, pilosus, aculeis tenuibus, brevibus, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* magna, laxa, subaphylla, pyramidalis, piloso-hirsuta, glandulosa brevissimis, aculeis tenuibus, rarissimis instructa (18, 19), pedunculis mediis patulis; *sepala* tomentosa, inermia; *petala* (20) rosea; *stamina* basi rosea stylos basi roseos superantia; *germina* pilosa. Fertilis.

GALLIA : Vienne, l'Age-Gacine, la Gobidière, Sables-aux-Bois, prope Montmorillon (Chaboisseau).

b. — (T. CIV) — R. septorum P.-J. Müll. Vers. n° 215 (1859); Chaboiss. Et. sp. g. Rub. p. 23; Genev. Mon. p. 219, ex pte; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 51.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 405 !; F. Schultz Hb. norm. n° 650 !

Differt a R. Chaboisseau : turione glabro, glandulis rarissimis; foliis minus discoloribus, subtus pilosioribus, inaequaliter serratis; inflorescentia densa, brevi, floribus pallidis. Petala pallide rosea; stamina alba, styli virescentes. Pollinis gradus puritatis 3/4. Fertilis. — R. pyramidali Kalt. subsimilis sed aculeis debilioribus, foliis discoloribus diversus est.

GALLIA : Vienne, « bords des bois, à Pindray et à Montmorillon, bords de la route de Lussac » ! (Chaboisseau); Saône-et-Loire, Bourg-le-Comte, la Berthaud (Château), Mont (Basset).

- c. — (T. CIV) — R. clethrocharis Sud. Bull. Assoc. pyr. n° 293 (1903).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 406 !

Validus; *turio* faciebus planis, pilosus, glaucus, glandulis rarissimis, aculeis subaequalibus, brevibus munitus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus albo-tomentosa, pubescentia, mucronato-denticulata; *foliolum* terminale (21) ovatum vel breviter obovatum, subemarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum; petiolorum aculei uncinati; *ramus* aculeis brevibus, aduncis, glandulosa rarissima, brevibus munitus; *inflorescentia* densa, basi foliosa, piloso-hirsuta, glandulosa rarissima, brevibus, aculeis sparsis, subnulis instructa (22); *sepala* hirsuta, eglandulosa, inermia; *petala* late ovata (23), rubra; *stamina* rubra stylos roseos superantia. Pollinis gradus puritatis 3/4. Fertilis.

GALLIA : Tarn, Salmèges, prope Villefranche.

C. — (T. CIV) — R. fimbriifolius M. et Wirtg. ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 140 (1860); ed. 2 n° 73; R. contractiflorus P.-J. Müll. Assoc. rub. n° 436 (1881).

Exsicc. — Assoc. rub. n° 436, 631 (s. n. R. adenanthi ?); Wirtg. l. c.; Baenitz Hb. eur. n° 9953 (s. n. R. heteracanthi), 9978 (s. n. R. rubellii).

Turio angulatus, faciebus planis, parce pilosus, glandulosa rarissima, aculeis parum inaequalibus, validis munitus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, molliter pubescentia, pilis ad nervos pectinatis, grosse et inaequaliter duplicato-subinciso-serrata dentibus parce glandulosis, praecipuis patulis vel refractis; *foliolum* terminale (24) late rhombéum, basi vulgo integrum, acuminatum; *inflorescentia* pyramidalis, subaphylla, hirsuta, glandulosa crebris,

brevibus, aculeis validis vel mediocribus instructa (26), pedunculis mediis (25) patulis; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa aculeataque; *petala* (27) rosea, post anthesin subalbida; *stamina* alba stylos superantia; *germina* glabra. Pollen admixtum.

β . *EPIPSILUS*; *R. epipsilos* Focke Syn. p. 258 (1877), ex pte; Hal. Oest. bromb. p. 244; *R. Caflischii* B. *epipsilos* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 587 (1902), ex pte. — Folia subtus velutina, petala alba vel rosea, germina pilosa, stamina stylos vix superantia.

γ . *HYPOLEUCOIDES* Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909). — Folia caul. 3-4-nata, subtus molliter niveo-tomentosa; foliolum terminale cordatum; inflorescentia foliosa parum armata; petala alba, lata. An *R. micantiformis* \times ?

GERMANY: *Prov. rhénane*, Coblenz (Wirtgen), Schœneberg-Broelthal (Bodewig); *Badenia*, Schoenber (Goetz); Koenigsberg (Honig); *Bavaria*, Buch (Zinsmeister), Traunstein (Progel); GALLIA: *Vosges*, Saint-Michel, prope Saint-Dié (Boulay); *Seine-Inférieure*, Moulineaux (Letendre). — β . GERMANY: *Bavaria*, Waging (Progel), Traunstein (Kaufmann), Hirst; *Prov. rhénane*, Lenterdorf (Bodewig). — γ . GALLIA: *Tarn*, Marssal.

D. — (T. CV) — *R. Caflischii* Focke Syn. *Rub. germ.* p. 278 (1877); ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 587 (eu-*Caflischii*); Hal. Oest. bromb. p. 245, non Baenitz exsicc.

Turio (1) faciebus planis, parce pilosus, glandulis sparsis, longis, aculeis crebris, rectis, parum inæqualibus instructus; *folia* plerumque 5-nata, supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, inæqualiter et acute duplicito-serrata; *foliolum* terminale (2) ovatum, basi emarginatum, acuminate; *petiolorum* aculei reclinati vel falcati; *folia* ramealia 3-nata, grosse serrata, subdiscolora; *inflorescentia* basi foliosa, laxa hirsuta (3, 4), glandulis longis, aculeis validis, crebris, rectis instructa, pedunculis mediis patulis; *sepala* tomentosa, hirsuta, glanduloso-aculeata; *petala* late elliptica, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa. — Differt a *R. Radula* Wh. aculeis subæqualibus, turionibus laevibus, foliis supra glabris, etc.

BAVARIA MERIDIONALIS, TIROLIA; GALLIA: *Indre-et-Loire*, forêt de Chinon (Tourlet).

OBS. — Le *R. Caflischii* Baenitz Hb. eur. et ceux du Harz distribués par M. Vocke représentent le type *R. Radula* Wh.

β . — (T. CV) — *R. basalticarum* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* LI (janv. 1904) p. 20.

Turio (5) obtusangulus, pilosus, glandulis rarissimis munitus; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, subtus pubescentia, superiora leviter discolora, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (6) late ovatum, basi rotundatum, breviter acuminate; *ramus* pilosus, glandulosus; *inflorescentia* basi foliosa, pilosa (7), glandulosa, aculeis validis armata; *sepala* tomentoso-viridia, glanduloso-aculeata; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra. *Pollinis* gradus puritatis 5/6. Fertilis.

β . *AVARICUS* Sabrs. ap. Sud. *Bat.* p. 26 (1904) et exsicc. n° 75! — Foliolum caul. terminale basi emarginatum, longe acuminate.

γ . *SURDIFRONS* Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909). — Folia supra glabra, obscure viridia; flores albi.

GALLIA: *Corrèze*, Bort; GERMANY: *Badenia*, Siegelau (Goetz). — β . STYRIA, Söchau, prope Ebersdorf (Sabransky). — γ . GALLIA: *Tarn*, La Cabane.

HYBRIDA

R. BASALTICARUM v. γ \times *ARGENTEUS* gneissogenes Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909); *R. PALLIDIFLORENS* Sud. l. c. — Differt a var. γ foliis minus grosse serratis, inflorescentia magna, multiflora. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, La Cabane.

c. — (T. CV) — *R. styriacus* Hal. O. B. Z. (1890), 432; Oest. bromb. p. 247; *R. harpactor* Sabrs. O. B. Z. (1905) 386!

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 407.

Turio (8) faciebus planis vel leviter concavis, glabrescens, glandulis sparsis, aculeis creberrimis, falcatis armatus; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (9) ovatum, cordatum, longe acuminate; *petiolorum* aculei uncinati; *ramus* aculeis validis, crebris, falcatis uncinatis; *inflorescentia* elongata, usque ad apicem foliosa, aculeis crebris (10, 11), brevibus, falcatis vel subuncinatis armata; *pedunculi* ascendentes, glandulis brevibus muniti. Flores (12) ut in *R. basalticarum*. — Differt a *R. Gremillii* Focke foliis subdiscoloribus, aculeis curvatis, floribus roseis.

STYRIA ORIENTALIS: Ebersdorf (Sabransky).

d. — (T. CV) — *R. chlorifolius* Sud. et Sabrs.

Turio angulatus, glaucescens, dense pilosus, glandulosus; *folia* 3-4-5-nata, flavescens-viridia, supra glabra, subtus appressa cinereo vel albo-tomentosa, subsimpliciter serrata; *foliolum* caul. terminale ovatum (14), basi cordatum, acuminate, breviter petiolatum; *ramus* dense pilosus, aculeis falcatis armatus; *inflorescentia* pyramidalis, inferne foliosa, dense pilosa, glandulosa (15, 16), aculeis crebris, mediocribus, pallidis instructa; *sepala* parce aculeata; *petala* (17) rosea; *stamina* alba stylos virentes parum superantia; *germina* glabra; *pollen* fere purum. — Differt a *R. Caflischii* F. turione dense piloso, serratura subsimplici.

STYRIA ORIENTALIS: Söchau (Sabransky); BAVARIA: Regensburg (Loritz).

E. — (T. CV) — *R. Schlickumii* Wirtg. Hb. rub. rh. (1858); Focke Syn. p. 255; *R. argenteus* B. Schlickumii Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 480 (1902); *R. punctulatus* P.-J. Müll. in hb. Wirtgen.

Exsicc. — Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I n° 95, 95 bis; ed. II n° 70.

Turio (18) angulatus, faciebus planis, parce pilosus, glandulis rarissimis, compressis, subæqualibus, minibus sparsis, papulæformibus; *folia* 5-nata, supra glabrescentia, subtus cinereo-tomentosa, molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis, profunde et acute duplicito-serrata; *foliolum* terminale ellipticum vel obovatum (19), basi integrum vel submarginatum, acuminate, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *ramus* gracilis, pilosus, glandulosus, aculeis debilibus munitus; *inflorescentia* laxa, foliosa, laxa pilosa (20, 21), aculeis debilibus, falcatis instructa; *pedunculi* ascendentes, pilis nullis vel rarissimis, glandulis brevibus, sparsis muniti; *sepala* inermia, glandulis subsessilibus obsita; *petala* oblonga (22), pallide rosea; *stamina* stylos superantia; *germina* parce pilosa.

β . *MILITARIS*; *R. militaris* Lef. Assoc. rub. n° 111 (1874). — Aculei validiores in ramo inflorescentiaque; *stamina* pallide rosea; *stylis* carnei.

γ . *LÆVIFACTUS*; *R. lœvifactus* P.-J. Müll. in F. Schultz Arch. Fl. (1866) p. 353. — Exsicc. : F. Schultz Herb. norm. n° 849. — Foliolum caud. terminale rhombicum; inflorescentia subinermis, tomentosa, glandulis brevissimis munita; petala vive rosea; *stamina* rosea stylos roseos superantia; *germina* glabra.

♂. GOETZIANUS ; *R. Goetzianus* Sabrs. ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 7431 (1893). — Foliolum caul. terminale orbiculare, cordatum ; dentes tenues, inaequales ; inflorescentia pauciflora, pedunculis patulis ; germina pilosa.

GERMANY : *Prov. rhenana* ; Coblenz, Bingen, St-Goar (Wirtgen) ; *Bavaria*, Waging (Progel). — ♂. GALLIA : *Oise*, forêt de Retz, champs d'Ivors (Lefèvre), enclave du Cuvret (Questier). — ♀. BAVARIA, Palatinat. prope Medelsheim (F. Schultz) ; GALLIA : *Tarn*, Grésigne, prope Yaour. — ♂. GERMANY : *Badenia*, Siegelau (Goetz).

F. — (T. CV) — **R. rubellus** P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 156 ; *R. cunctator* Focke Syn. p. 281 (1877) ; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 537 ; *R. monticolus* Focke in Hal.-Wohl.-Koch Syn. I p. 760 (1891) ; Gremli in O. B. Z. XXI (1871) p. 127, non N. Boul. (1868).

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8564 (s. n. *R. monticoli*).

Turio (23) obtusangulus, pube appressa, pilis patulis sparsis et glandulis raris obsitus ; *aculei* mediocres, parum compressi, subaequales, recti vel reclinati ; *folia* 3-nata vel interdum 4-5-nata, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, argute et subsimpliciter serrata ; *foliolum* terminale (24) elliptico-ovatum, integrum, abrupte acuminatum ; ramus gracilis, pubescens, glandulis brevibus, aculeis debilibus munitus ; *inflorescentia* subaphylla, breviter et parum pilosa (25, 26), tenuiter glandulosa, aculeis debilibus armata ; *sepala* pilosa, parce glandulosa ; *petala* parva, late rosea ; *stamina* stylos pallidos superantia.

♂. CALICHROUS Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909) ; *R. calichrous* Sud. *Rub. Pyr.* p. 62 (1900). — Validus et discolor ; foliolum terminale cordatum, inaequaliter serratum.

♀. STRIGOSISSIMUS Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909). — Gracilis ; turio glaber, pruinosus ; foliolum terminale rhombeum ; petala pallide rosea ; stamina stylique pallida ; germina glabra.

♂. PUMILIFORMIS Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909). — Turio glaber, glaucescens ; foliolum terminale ovatum ; petala, stamina stylique purpurea.

♀. INDOLATUS Sud. *Rub. tarn.* p. 29 (1909). — Folium caul. terminale late obovatum ; aculei conici ; stamina alba stylos rubros aequantia.

♂. GRANITICOLUS ; *R. graniticolus* Hal. exsicc. — Validus ; folia 5-nata ; foliolum terminale ovatum, acuminatum ; flores albi ; germina glabra.

♀. POLYPHYLLUS ; *R. laevifactus* (P.-J. Müll.) var. *polyphyllus* Progel hb. — Folia grosse et inaequaliter subinciso-serrata ; foliolum terminale ovatum ; inflorescentia usque apicem foliosa ; petala parva, rosea ; stamina stylos aequantia ; germina pilosa.

♂. REPUGNANS ; *R. repugnans* Progel hb. — Aculei graciles ; glandulae subnullae ; serratura inaequalis, parum profunda ; foliolum terminale cordato-ovatum, acuminatum ; petala alba ; stamina alba stylos roseos vix aequantia ; germina glabra.

GERMANY : *Alsacia*, « lignes du Pigeonnier et carrefour de Lauterbach » (Müller) ; *Badenia* (Goetz) ; *Bavaria* ; GALLIA : *Meuse*, bois de Bouxieres (Salle) ; HELVETIA BOREALIS : *Zürich* (Keller). — ♂. GALLIA : *Tarn*, Cambon, Grésigne ; *Ariège*, Trein. — ♀. GALLIA : *Tarn*, Grésigne, Montirat. — ♂. GALLIA : *Tarn*, Labastide Rouairoux. — ♂. GALLIA : *Tarn*, Salmèges. — ♂. AUSTRIA, St-Nikola (Topitz). — ♀. BAVARIA : Waging, prope Taching (Progel). — ♀. BAVARIA : Zell, prope Waging (Progel).

64 — (T. CVI) — **R. PODOPHYLLUS** P.-J. Müll. in Bonpl. (1861) p. 281 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 61 ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 586 ; *R. bistrans* × *hirtus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 127, ex pte.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 44 !

Turio (1, 2) angulatus, faciebus planis, epruinosus, parce pilosus, glandulis sparsis, subnullis munitus ; *aculei* subaequales, compressi, recti vel reclinati, minores breves, aciculares, rarissimi ; *folia* tenuia, plerumque 5-nata (3, 4), supra parce pilosa, subtus pilosa, superiora cinereo-tomentosa, minute, subaequaliter et simpliciter mucronato-serriculata ; *foliolum* terminale ovatum vel leviter obovatum, basi emarginatum vel subintegrum, acuminatum, petiolulo proprio fere triplo longius, infima breviter petiolulata ; *petiolus* aculeis reclinatis falcativis ; *stipulae* lineares glandulis brevibus obsitae ; *ramus* obtusangulus, pilosus, aculeis debilibus, inaequalibus, glandulis brevibus munitus ; *folia* 3-nata, argute mucronato-serriculata, superiora ± discolora, foliolis terminalibus rhomboides obovatissime, basi integris, acutis ; *inflorescentia* (5) ovata, obtusa, subaphylla, laxe hirsuta, glandulis crebris, longis, inaequalibus, rubris, aculeis (6) tenuibus, longis, rectis reclinatis instructa ; *pedunculi* medi i patuli, 2-3-flori ; *sepala* tomentosa, pilosa, parce aculeata, glandulosa, in flore et fructu reflexa (7) ; *petala* angusta (8, 9), obovata vel ovata, alba ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabra. *Pollen* admixtum (10) ; *receptaculum* glabrum. — Junius-julius.

♂. VETTERI ; *R. Vetteri* Favrat exsicc. (1883) n° 30 (cum descript.) ; Cat. 1885 p. 14 ; Cott. et Cast. Guide Frib. p. 89. — Habitus typi sed vix heteracanthus, inflorescentia foliosa glandulis raris munita.

♀. PARVIFLORENS ; *R. parviflorens* Sud. Bull. Soc. bot. Fr. (1905) p. 325. — Exsicc. : Baenitz *Hab. eur.* n° 9502 (s. n. *R. aspericaulis*). — Gracilis ; folia caulina plerumque 3-nata, discolora, foliolis angustis, acuminatis ; inflorescentia parva, densa, pauciflora, glandulus brevibus ; flores parvi, rosei ?

♂. BOTRYANTHUS ; *R. botryanthus* Sabrs — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* (ann. 1895). — Foliola lata, terminalia suborbicularia ; inflorescentia ut in typo ; flores rosei.

♂. FOLIOLATUS Sud. in hb. Müller ; *R. podophyllum* × *foliosus* ? — Foliolum caulinum terminale acuminatum ; inflorescentia elongata, usqua ad apicem foliosa, parce pilosa. Parum fertilis.

♂. VESTITIFORMIS ; *R. vestitiformis* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 58 (1900) (s. *R. anglosaxonicus* Sbsp. *vestitiformis*). — Turio glaucescens ; folia coriacea, discolora, dentibus divaricatis ; foliolum terminale obovatum, cuspidatum ; inflorescentia parum foliosa, aculeis crebris, validis armata ; petala roseola ; germina parce pilosa.

♂. DICHROACANTHUS ; *R. dichroacanthus* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 ; *R. horridicaulis* var. N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 133 et exsicc. n° 14^{bis}, non P.-J. Müll. — Turio obtusus ; aculei validi, densi, rameales valde falcati vel uncinati ; folia discolora ; petala alba.

♂. LUTETIANUS Sud. Bat. eur. p. 56 (1906) et exsicc. n° 169 ! — Turio glaucescens, glandulis crebris ; folia subtus albo-tomentosa ; foliolum terminale obovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum ; inflorescentia ampla, subaphylla, parum armata, rachide valde piloso-hirsuta, pedunculis patulis ; petala elliptica, alba ; germina hirsuta ; pollen parum admixtum. *R. apiculata* Wh. similis.

♂. TERRIBILIS ; *R. terribilis* Lef. Assoc. rub. exsicc. (1874) ; *R. fuscus* × *hypoleucus* ? N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 107. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 110 ; Sud. Rub. rar. n° 59. — Validus, aculeis robustis, compressis ; foliolum caul. terminale late obovatum vel suborbicularare, submarginatum, cuspidatum, longe petiolulatum ; inflorescentia elongata, usque apicem foliosa, aculeis validis armata ; petala rosea ; stamina alba stylos virescentes parum superantia.

Ad sepes et margines silvarum. — GALLIA : Vosges, Saint-Dié, forêt du Camberg (Boulay); Gérardmer, extrémité N.-O. du lac (Müller); Celles (Madiot); Allier, bois de Veauce; Puy-de-Dôme, bois de Durthol (Lamothe); BAVARIA : Waldmünchen (Progel); HELVETIA : « sommet du m^o Pélerin, au-dessus de Chexbres, cant. de Vaud, alt. 1000m » (Favrat, Schmidely). — γ et δ. GERMANIA : Badenia, Siegelau, propre Waldkirch (Goëtz). — ε. GALLIA : Vosges « vallée de Granges, non loin de la glacière » (Boulay). — ζ. BRITANNIA : Gloucestershire, Hereford (M. Rogers). — η. GALLIA : Vosges, Saulxures-sur-Moselle, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat). — θ. GALLIA : Seine, Clamart (B. de Les Iain); Seine-et-Oise, Montfort, forêt de Rambouillet (M^{ie} Bélèze), forêt de Marly (Biau). — ι. GALLIA : Oise, forêt de Retz, chemin du Charmeau (Lefèvre); le Fournet, entre Villars et les champs d'Ivors (Questier); Tarn, La Sarrade, Saint-Amans.

HYBRIDÆ

R. PODOPHYLLUS × VESTITUS Sud. ap. Gan lg. Nov. Conspl. p. 146 (1903); R. BRACHYDONTUS M. et Boul. Assoc. rub. n° 366 (1879); R. vestitus × podophyllum ? N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 110. — Serratura R. podophyllum revocat, sed folia pilosiora, foliola latiora, inflorescentia multiflora, petala orbicularia, rosea. Parum fertilis.

GALLIA : Vosges, « Gérardmer, route de Saint-Dié, avant Martimpré » (Boulay).

R. PODOPHYLLUS × MENKEI vel SERPENS ? ; R. PILOTOPHYLLUS Sud. in hb. Müller; ap. Gdg. Nov. Conspl. p. 146 (1903). — Turio et serratura ut in R. podophyllum; folia 3-nata, subtus viridia, valde pilosa, foliolis latis; inflorescentia conferta, dense glandulosa; petala angusta, alba.

GALLIA : Vosges, « pont sur la Vologne, à Gérardmer » (Boulay).

R. PODOPHYLLUS × FOLIOSUS ? ; R. LONGITHYRSUS P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 96 (1868); R. vestitus × hirtus N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 128, p.p. — Exsicc. : Ronc. vosg. n° 77; Assoc. rub. n° 284. — Folia ut in R. podophyllum sed inflorescentia angusta, elongata, valde foliosa, dense glandulosa; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA : Vosges, « vallée de la Vologne, entre Granges et Gérardmer » (Boulay).

R. PODOPHYLLUS × ... ? ; R. CHENENSIS Schmid. Bull. Hb. Boiss. 2^e sér. (1903) p. 77 (70). — Folia ut in R. podophyllum sed turio pilosior; inflorescentia pyramidalis, subaphylla, laxa; sepala patula. Parum fertilis.

HELVETIA : Fribourg, Chenens, bois de Kaichnerie (Schmidely).

R. PODOPHYLLUS (grex) ? ; × ... ? ; R. BRACHYTRICHUS Sabrs. Oest. b. Zeit. (1891) tir. à p. p. 7. (pr. spec.) — Folia et serratura ut in R. podophyllum sed folia subtus viridia, foliolis longe acuminatis; inflorescentia laxa, glandulis brevibus: flores albi, steriles.

HUNGARIA OCCIDENTALIS : Bodinggraben (Sabransky).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia subtus parce pilosa, pubescentia.

A. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta.

a. — Folia subtus subvirescentia, interdum albo-tomentosa, sed tum inflorescentia armata.

1. — Turio faciebus lœvibus, glandulis saepissime rarissimis; foliolum caul. terminale ovatum vel obovatum, basi integrum vel subemarginatum; petala alba, raro rosea.....

2. — Turio faciebus quasi lœvibus, parum glandulosus, foliolum caul. terminale suborbiculare, cordatum.....

3. — Turio glandulis crebris; foliolum caul. terminale anguste ovatum; inflorescentia valde foliosa, parum armata; flores rosei.....

b. — Folia subtus albo-tomentosa; inflorescentia parum glandulosa, aculeis tenuibus munita; petala lata.....

B. — Inflorescentiae rachis tomentosa vel breviter et laxe pilosa; turio leviter scaber.....

II. — Folia supra sparsim, subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis; inflorescentia foliosa..

b. — (T. CVII) — R. holochlorus Sabrs. ap. Sud. Bat. eur. p. 26 (1904); R. epipsilos var. holochlorus Sabrs. Verh. Zool.-bot. Ges. Wien (1904).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 74 !

Serratura tenuis ut in R. podophyllum, sed turio manifeste glandulosior, aculei inaequales, foliolum caul. terminale suborbiculare (2), cordatum, abrupte acuminatum, inflorescentia (3, 4) dense pilosa, aculeis debilibus munita. Petala (5) pallide rosea; stamina alba vel dilute rosea styllos pallidos parum superantia. Fertilis.

AUSTRIA : Styria orientalis, Sœchau, prope Ebersdorf (Sabransky).

HYBRIDA

R. HOLOCHLORUS × e glandulosis; R. HAYEKII Sabrs. in hb. Sud. — Differt a R. holochloro inflorescentia glandulosiore, staminibus brevibus, sepalis patulis.

AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky).

c. — (T. CVII) — R. parviserrulatus Sud. Bull. Soc. bot. Fr. (1905) p. 340.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 10361 (s. n. R. exalbati non L. et M.)

Gracilis et discolor; aculei (6) debiles, subconici; folia argentea mucronato-denticulata, subtus valde pubescentia; foliolum terminale (7) ovatum, emarginatum; ramus subteres, aculeis parvis; inflorescentia (8, 9) pyramidalis, aphylla, hirsuta, glandulosa sparsis, brevibus, aculeis tenuibus instructa; sepala hirsuta, inermia, glandulis subsessilibus munita; petala (10) late ovata, pallida; stamina styllos pallidos superantia.

GERMANIA : Badenia, Siegelau, prope Waldkirch (Goëtz).

B. — (T. CVII) — R. erythrostylus P.-J. Müll. Vers. n° 96 (1859).

Differt a R. podophyllum: turionibus (11) tenuiter glandulosis, aculeis debilioribus; foliis inaequaliter et duplo-serratis, foliolo terminali (12) anguste ovato, emarginato, acuminato, longe petiolulato, insimilis distincte petiolulatis; inflorescentia (13, 14) usque ad apicem foliosa, glandulosiore, pedunculis ascendentibus, parum armatis; sepals inermibus glandulis crebris, rubris obsitis; petalis (15) roseis, angustis; staminibus roseis styllos roseos superantibus. Germina pilosa. Pollinis gradus puritatis 3/4. — R. folioso W. N. affinis, sed parum heteranthus.

GERMANIA : Alsacia, Alschbach, prope Weissenburg (Müller).

C. — (T. CVII) — R. saxigenus Sud. Diagn. p. 26 (1906); R. separinus de Martr.-D. Fl. Tarn p. 211, non Gen.; R. inaequalis Hal. v. pannonicus Sabrs. in hb. Sud.

Serratura tenuis ut in R. podophyllum, a quo differt: turionibus (16) glabrescentibus, glandulosioribus, subscabris, aculeis debilioribus, inaequalibus; foliolis caulinis terminalibus (17) emarginatis, acuminatis; inflorescentia (18, 19) parce pilosa. Flores pallidi (20); germina glabra; fertilis.

? β. DENTICULATIFORMIS; R. denticulatus Sabrs. Oest. b. Z. (1905), non Kerner. — Turio parce pilosus; foliolum caul. terminale subintegrum; rachis tomentosa, glandulis rarissimis, brevibus munita; petala rosea; stamina rubra. Fertilis.

γ. BELOSTACHYS ; *R. belostachys* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 152 (1905) ; *R. coriaceus* Chab. et Müll. hb., non Poir. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 408 ! — Discolor ; aculei validi ; foliolum caul. terminale ellipticum vel elliptico-ovatum, integrum ; inflorescentia laxa, multiflora, aculeis crebris, validis ; petala pallide rosea ; stamina alba stylis superantia ; fructus imperfectus. An *R. Chaboisseau* × *ulmifolius* ?

GALLIA : Tarn, Pont-de-Cirou, Lacabarède ; Seine-Inf., Aumale (Questier) ; AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky). — β. AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky). — γ. GALLIA : Vienne, « taillis du Fort et du Poirat, près de Pindray » (Chaboisseau).

HYBRIDÆ

R. SAXIGENUS × *DURIMONTANUS* ; *R. BELLISSIMUS* Sabrs. in hb. Sud. — A *R. saxigeno* differt foliis inæqualiter serratis, rachide parce glandulosa, petalis roseis. Sterilis.

STYRIA ORIENTALIS : Sœchau (Sabransky).

R. SAXIGENUS × *ULMIFOLIUS* Sud. Rub. tann. p. 29 (1909) ; *R. LATITHYRSUS* Sud. l. c. — Validus ; glandulæ rare ; folia obscure viridia ; inflorescentia magna. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Pont-de-Cirou.

D. — (T. CVII) — *R. hypopectus* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 147 (1905) ; *R. insericatus* × *vestitus* Schmid. ; *R. sanguineus* Schmid. Bult. Hb. Boiss. (1904), non Friv.

Turio *R. podophylli* sed pilosior ; folia 3-4-5-nata, coriacea ut in *R. vestito* Wh., supra parce, subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis, argute serrata ; foliolum terminale (22) suborbiculare vel obovato-orbiculare, cordatum, cuspidatum ; ramus aculeis validis, reclinans falcatis, foliis 3-natis, subtus cinerascentibus, foliolis latissimis ; inflorescentia sepe usque ad apicem foliosa, laxe hirsuta (23, 24), pedunculis brevibus, ascendentibus, multifloris, aculeis validis vel mediocribus instructa ; sepala pilosa, parce glandulosa, interdum aculeata ; petala ovata (25), alba ; stamina alba stylis virescentes superantia ; germina glabra. Pollinis gradus puritatis 5/6.

β. SERICIFLORUS ; *R. sericiflorus* N. Boul. prius ; *R. pileocaulon* P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. n° 43 (1867), non in Bonpl. (1861). — Exsicc. : Ronc. vosg. n° 43 ! — Foliola minus lata ; pubes densior ; rachis dense hirsuta aculeis debilibus, lutescentibus ; turio ramusque pilosiores.

GALLIA : Haute-Savoie, « M^{es} Voiron, au-dessous de Bon Saint-Didier » (Schmidely) ; Vosges, forêt de Rambervillers (Boulay) ; Oise, forêt de Retz (Questier) ; HELVETIA : Bulle, sur Botterens (Jaquet). — β. GALLIA : Vosges, Saint-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

OBS. — Je n'ai pas vu, dans l'herbier P.-J. Müller, le *R. pileocaulon* P.-J. Müll. (Bonpl. 1861, p. 281) que ce botaniste avait récolté à l'extrême N.-O. du lac de Gérardmer (Vosges), et qui, d'après Genevier et N. Boulay, est distinct de celui des Ronces vosgiennes.

65 — (T. CVIII) — *R. BOREAUANUS* Genev. Mém. Soc. Ac. M.-et-L. VIII p. 87 (1860) ; Mon. p. 170 ; Arrond. Pl. Morbih. p. 25 ; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 87 ; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 54 ; Corb. Fl. Norm. p. 205 ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 552 ; Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 ; Bouvet Rub. Anj. 1907 p. 47.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 174, 560 ; Rub. gall. n° 130 ; Set of Brit. Rub. n° 61 ; Sud. Bat. eur. n° 409.

Turio (1, 2) angulatus, faciebus planis vel convexis, parce pilosus, pilis ± appressis, glandulis rarissimis munitus ; aculei inæquales, majores compressi, recti vel subfalcati, minores conici, papulæformes ; folia plerumque 5-nata, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, valde pilosa, pilis ad nervos pectinatis, grosse, inæqualiter et profunde serrata ; foliolum terminale (3) late obovatum, ovato-rhombeum vel suborbiculare, submarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima subsessilia ; petiolus supra planus, aculeis brevibus, falcatis vel aduncis munitus ; stipulae angustæ, glandulosæ ; ramus angulatus, pilosus, glandulis brevibus, aculeis debilibus, inæqualibus, majoribus falcatis uncinatis, folia 3-nata, grosse serrata, supera subtus cinereo-tomentosa ; inflorescentia (4) brevis, ovata, obtusa, basi foliosa, dense hirsuta (5), glandulis brevibus, sparsis, aculeis tenuibus, rarissimis munita ; pedunculi medii patullo-ascendentes, elongati, 2-3-flori, pedicellis brevibus ; sepala tomentosa, pilosa, inermis, glandulis sessilibus sparsis obsita, post anthesin patula, in fructu reflexa (6) ; petala (7, 8) obovata, parva, rosea ; stamina dilute rosea stylis basi roseos parum superantia ; germina pilosa ; receptaculum hirsutum. — Junius-julius.

In collibus nemorosis et sepibus. — GALLIA OCCIDENTALIS ; BRITANNIA.

OBS. — Est beaucoup plus hétérocanthe que les autres espèces de cette série. L'abbé N. Boulay l'a rattaché comme microgène au *R. adscitus* Gen. mais je n'ai pas vu d'intermédiaires entre ces deux espèces, qui me paraissent bien tranchées, et, avec MM. Focke et Rogers, j'estime qu'il y a lieu de considérer le *R. Boreauanus* comme une bonne espèce. Il est intermédiaire entre les *R. clethrophyllos* et *adscitus* Gen. et croit dans les mêmes lieux ; peut-être en est-il un hybride fixé ? Il semble toutefois se comporter comme une espèce pure.

HYBRIDÆ

R. BOREAUANUS × *QUESTIERI* Sud. et Bouv. ; Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 (1905) ; *R. FURCIPETALUS* Sud. et Bouv. ap. Bouv. Rub. Anj. (1907) p. 73. — Subvirescens ; aculei subæquales ; inflorescentia laxe pilosa ; petala bifida. Sterilis.

GALLIA : Maine-et-Loire, Montreuil-sur-Maine (Bouvet).

R. BOREAUANUS × *CONSOBRINUS* ; *R. STERILIFLORUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 (1905). — Habitus *R. Boreauani* sed aculei subæquales, glandulæ rarissimæ, folia discolora. Sterilis.

GALLIA : Maine-et-Loire, Angers, en Reculée (Bouvet)

R. BOREAUANUS × *PROLONGATUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 (1905) ; Diagn. p. 28 ; *R. HEMATOSTYLUS* Lebel ! Bonpl. (1861) p. 308, nomen. — Habitus *R. Boreauani* sed glandulæ rarissimæ et sterilis. Petala alba, stamina alba stylis rubris breviora.

GALLIA : Manche, Saint-Germain-de-Tournebut (Lebel).

R. BOREAUANUS × *ULMIFOLIUS* Sud. et Bouv. ap. Bouv. Rub. Anj. (1903) p. 687 ; *R. PSEUDO-BOREAUANUS* Sud. et Bouv. l. c. — Turio pruinosis ; discolor, eglandulosus, substerilis ; inflorescentia inermis.

GALLIA : Maine-et-Loire, Angers, bois de la Haie (Bouvet et Sudre).

66 — (T. CIX) — *R. ADSCITUS* Genev. Mém. Soc. Acad. M.-et-L. VIII p. 88 (1860) ; Mon. p. 134 ; Arrond. Pl. crit. Morb. p. 27 ; Bouvet Rub. Anj. p. 682 (1903) ; p. 46 (1907) ; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 52 ; ap. Gdg. Nov. Cons. p. 146 ; *R. hypoleucus* Lef. et M. Vers. n° 80 (1859), non Vest (1824) ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 545 ; *R. hypoleucus* et var. *adscitus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 85 ; *R. micans* Questier in Billot exsicc. ; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 48, non Gr. et G. ! *R. infrarugosus* Gandg. Rub. nouv. p. 112 (1884) ; *R. rosaceus* Bor. ! Fl. cent. éd. 3 p. 192, non W. et N.

Exsicc. — Billot Fl. gal. et germ. n° 2542 (s. n. *R. micans*) ; Assoc. rub. n° 376, 430, 558, 727 ; Set of Brit. Rub. n° 13 ; Sud. Bat. eur. n° 133.

Turio (1, 2) mediocris, angulatus, faciebus planis, pilis crebris patulis et pube crispata densa, appressa, glandulis tenuibus, rarissimis ; aculei leviter inæquales, pallidi, majores mediocres, parum compressi, recti vel leviter reclinati, minores rari, papulæformes ; folia (3, 4) mollia, plerumque 5-nata, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pilosa, grosse et inæqualiter serrata ; foliolum terminale late obovatum, submarginatum, abrupte

acuminatum, infima petiolata; *petiolus* pilosus, parce glandulosus, aculeis debilibus, reclinatis munitus; *stipulae* anguste, parce glandulosae; *ramus florifer* obtusangulus, flexuosus, dense pilosus, parce glandulosus, aculeis tenuibus, reclinatis; *folia* 3-nata, grosse serrata, supera vulgo discolora; *inflorescentia* (5) ovata, lata, obtusa, raro apice attenuata, basi foliosa, dense piloso-hirsuta, glandulosa (7), glandulis elongatis, sub indumento occultis, aculeis debilibus, pallidis, reclinatis munita; *pedunculi* medii valde patuli, in apricis divaricati, elongati, multiflori; *sepala* tomentosa, hirsuta, inermia, parce glandulosa, apice saepe appendiculata, post anthesin reflexa (6); *petala* (8, 9) ovata, in unguem attenuata, pallide rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylos virescentes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen valde imperfectum (10). — Junius-julius.

In collibus nemorosis siliceis et silvis frigidis. — GALLIA BOREALI-OCCIDENTALIS: BRITANNIA.

OBS. — Le *R. adscitus* Gen. n'est pas une variété du *R. hypoleucus* L. et M., ainsi que l'a admis l'abbé N. Boulay, mais très exactement la même plante, qui est nettement discolore et à inflorescence un peu pyramidale dans les lieux découverts, subvirescent et à inflorescence plus courte et diffuse dans les endroits ombragés. Le *R. asservatus* Riph. et Gen. ap. Gen. Mon. p. 136 (1880) n'est probablement qu'une variation à éamines roses et à calice aciculé du *R. adscitus*. Le *R. despectus* Gen. l. c. p. 132, à fleurs blanches, styles roses et carpelles velus, dérive peut-être aussi de cette espèce. Ces deux formes, trouvées dans le Cher par le Dr Ripart, me sont inconnues.

HYBRIDÆ

× e Silvaticis.

R. ADSCITUS × *SPRENGELII* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 53 (1902); *R. CHEDEAUANUS* Sud. l. c.; *R. Mercieri* Gen. Mon. p. 314, p. p.; *R. villicaulis* Bor. Fl. cent. ed. 3, p. p., non Koechlin; *R. graciliscaulis* Müll. et Lebel Bonpl. (1861) nomen. — Differt a *R. adscito*: turionibus subteteribus, foliis 3-natis, glandulis subnullis, staminibus brevibus. Sterilis.

GALLIA: Mayenne, « chemin de la Croix, près de Mayenne » (Chéreau); Manche, Négreville « en face le moulin de Planchon » (Lebel).

R. ADSCITUS × *QUESTIERI* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 (1905); *R. SIMILIFACTUS* Sud. l. c. — Turio glabrescens; folia subtus viridia, parum pilosa; inflorescentia parum pilosa, parce glandulosa.

GALLIA: Loire-Inférieure, Nantes (de l'Isle).

R. ADSCITUS × *DEBILISPINUS* v. *tigerinus* Sull. et Bouv. ap. Bouvet. Rub. Anj. (1907) p. 72; *R. PSEUDO-ADSCITUS* Sud. et Bouv. l. c. — Gracilis. Habitus *R. adsciti* sed glandulae breves, aculei aequalis, rachis minus pilosa, flores albi. Sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, St-Christophe-du-Bois (Bouvet).

R. ADSCITUS × *CRYPTADENES* v. *bipartitus* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 146 (1905); *R. DEPRESSIDENS* Sud. l. c. et ap. Bouv. Rub. Anj. (1907) p. 72; *R. mucronulatus* Boul. et B. de Lesdain Rub gall. exsicc. no 437, non Bor. — Differt a *R. adscito* turione minus piloso, aculeis subæqualibus, validioribus, foliolis longe acuminatis, dentibus latis, parum profundis, inflorescentia laxa, glandulis raris munita, fructu male evoluta.

GALLIA: Maine-et-Loire, « plateau de la rive droite de l'étang Saint-Nicolas, à Angers » (Boulay).

R. ADSCITUS × *ALTERNIFLORUS*; *R. GENTILIS* Sud. hb. — Serratura et glandulæ ut in *R. adscito*; aculei et turiones ut in *R. alterniflora*. Parum fertilis.

GALLIA: Finistère, Quimper.

R. ADSCITUS × *IMBRICATUS* Sud. Diagn. p. 27 (1906); *R. HYPOLEUCOPHYLLUS* Sud. l. c. — Glandulæ rarissimæ; aculei subæquales; folium terminale suborbicularis, cordatum; rachis parum pilosa. Sterilis.

GALLIA: Valois, Fleury, l'Epinette (Questier).

× e Discoloribus.

R. ADSCITUS × *ULMIFOLIUS* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 53 (1902); *R. TOUSSANTII* Sud. l. c.; *R. thyrsiflorus* Bor. Fl. Cent. ed. 3 no 746, p. p. non W. et N.; *R. alterniflorus vestitus*, atrovirens Gen. Mon. p. p.; *R. rusticana* var. *emarginatus* Toussaint Fl. Vern. p. 163. — Exsicc. Sud. Bat. eur. no 434 — Aculei subæquales, glandulæ rare; folia discolora, supra obscure viridia; rachis laxe pilosa; flores rosei, interdum stamina stylique purpurea (*R. purpleiflora* Boul. et Malbr. exsicc. Assoc. rub. no 263). Sterilis.

GALLIA: Eure, Seine-Inf., Oise, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Indre-et-Loire, etc.

OBS. — Le *R. VULNERITHYRSUS* Sud. in hb. Bor., considéré d'abord comme un *R. adscitus* × *propinquus*, n'est apparemment qu'une forme du *R. Toussantii*; il correspond au *R. giganteus* Gen. Ess. mon. p. 222, non Bory; il est distinct du suivant.

R. ADSCITUS × *PROPINQUUS* Sud. Diagn. p. 27; *R. SEMIADSCITUS* Sud. l. c. (1906). — Turio pilosus; aculei debiles ut in *R. adscito* sed glandulæ subnullæ, aculei subæquales.

GALLIA: Oise, Waligny (Questier); Sarthe, Précigné (Henry), Amné (Chenon).

R. ADSCITUS × *CUSPIDIFER*; *R. MALBRANCHEI* Sud. hb.; *R. hypoleucus* Assoc. rub. no 330 non Lef. et M. — Differt a *R. adscito*: turione foliisque minus pilosis, foliolis obovatis, tenuiter et abrupte cuspidatis, glandulis raris. Sterilis.

GALLIA: Seine-Inf., Rouen (Malbranche).

× ex Appendiculatis.

R. ADSCITUS × *VESTITUS* Sud. Diagn. p. 27 (1906); *R. SERICATIFORMIS* Sud. l. c. — Folia grosse serrata et glandulæ ut in *R. adscito*; foliola lata, aculei validi ut in *R. vestito*; habitus *R. sericati* M. L. sed glandulosior.

GALLIA: Valois, de Billemont à Bourgfontaine (Questier). — Le *R. insericatus* Assoc. rub. no 749 (non Müll.) du parc de Grigneuseville (Seine-Inf.) semble avoir la même origine.

OBS. — Le *R. formosus* M. et Lef. Vers. no 64 (1859) semble dériver aussi du *R. adscitus* Gen. N. Boulay le considère comme un *macrophyllus* × *adscitus* (ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 107). Il manque dans l'herbier Müller et m'est inconnu. — Oise, buisson de Waligny et Cuvergnon (Lefèvre).

R. ADSCITUS × *PULCHER* Sud. Diagn. p. 28 (1906); *R. SEMIPULCHER* l. c. — Pubes *R. adsciti* sed glandulosior, foliola latiora, inflorescentia densa, sepala patula.

GALLIA: Valois, route de Faverolles (à ?) (Questier).

R. ADSCITUS × *SERPENS*; *R. HUELGOATENSIS* Sud. Ronc. bret. p. 17 (1904); *R. adscitus* × *corymbosus* Sud. prius. — Virescens, inflorescentia dense glandulosa, petala rosea, sepala patula. Parum fertilis.

GALLIA: Finistère, au pont de Huelgoat.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia grosse et inæqualiter serrata, supra pilosa.

A. — Folium caulinum terminale obovatum, emarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia brevis, lata..

R. adscitus Gen.

B. — Folium caulinum terminale rhombicum, submarginatum, sensim acuminatum; inflorescentia elongata, foliosa,

R. SCUTULIFOLIUS Sud. b.

C. — Folium caulinum terminale ovatum vel ellipticum, longe acuminatum; inflorescentia pyramidalis.

a. — Inflorescentia dense piloso-hirsuta.

1. — Flores pallidi, stylis virescentibus

R. DASYCLADUS Kern. c.

2. — Flores late rosei, stylis carneis.....

R. SECEDENS Sud. d.

b. — Inflorescentia parce et breviter pilosa

R. CONTINENS Sud. e.

II. — *Folia supra fere glabra; inflorescentia pyramidalis.*

- A. — *Foliolum caul. terminale obovatum; dentes parum profundi; folia subtus breviter pubescentia..... R. DENSIPILUS Sud. B.
B. — Foliolum caul. terminale ovatum; dentes acuti; folia subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis. R. MACROTHYRSUS Lange C.*

b. — (T. CX) — *R. scutulifolius* Sud. *Diagn. p. 26* (1906).

Validus et subvirescens; turio (1) *leviter canaliculatus; foliolum caul. terminale* (2) *late rhombeum, leviter emarginatum, sensim acuminatum; serratura valde inaequalis; folia utrinque pilosa; inflorescentia* (3, 4) *elongata, foliosa, densa, pedunculis ascendentibus; germina pilosa; flores?*

GALLIA : *Seine-Inf.*, Aumale (Questier).

c. — (T. CX) — *R. dasycladus* A. Kerner *Nov. pl. sp. III p. 38* (1871); Focke *Syn. p. 298*; Halacsy *Oest. bromb. p. 250*; *R. vestitus* Sbsp. *dasycladus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 547*.

Differt a R. adscito: foliis subcoriaceis, subtus dense tomentosis, foliolo terminali ovato vel elliptico, longe acuminato, inflorescentia pyramidalis; petala alba vel pallide rosea.

BAVARIA MERIDIONALIS, TIROLIA, Innsbruck (Kerner).

*Obs. — D'après M. Focke (l. c. p. 548), le *R. Gisellae* Borbas *Vest. nov. 327* (1887-88), de Hongrie, n'est qu'une forme du *R. dasycladus* Kern. M'est inconnu.*

d. — (T. CX) — *R. secedens* Sud. *hb.*; *R. vestitus* Gen. *Mon. p. p. ! non W. et N.*

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 410!

Differt a R. adscito Gen. : *aculeis* (5) *majoribus, densioribus; foliolo caul. terminali* (6) *ovato vel late rhombeo, breviter acuminato; inflorescentia* (7, 8) *angusta, elongata, saepe usque apicem foliosa, aculeis crebris, mediocribus armata; petalis* (9) *majoribus, vive roseis; staminibus late roseis styllos carneos superantibus. Germina glabrescentia; sepala dense aculeata; turio pruinosus.* — *Educ. e seminibus.*

GALLIA : *Vendée*, Mortagne, dans le village, près du pont.

e. — (T. CX) — *R. continens* Sud. *Rub. Pyr. p. 62* (1900).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 411!

Habitus R. adsciti sed turio (10) *appresse pilosus, foliolum terminale* (11) *ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia* (12, 13) *elongata, flexuosa, parce pilosa; petala* (14) *staminaque rosea; styli virescentes; germina pilosa.*

GALLIA : *Ariège*, Foix, vallon de Gariac.

B. — (T. CX) — ***R. densipilus*** *Diagn. p. 25* (1906); *Flor. Toul. p. 75.*

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 412.

Turio (15) *et flores ut in R. adscito a quo differt: aculeis obliquioribus; foliis supra glabris, subsimpliciter serratis, dentibus parum profundis; foliolo caulino terminali* (16) *manifeste obovato, basi rotundato, integro vel vix emarginato, abrupte acuminato; aculeis petiolaribus valde falcatis uncinatis; inflorescentia* (17, 18) *elongata, apice attenuata, glandulis brevibus munita. Petala dilute rosea* (19).

GALLIA : *Haute-Garonne*, Balma, Aigrefeuille, Eaunes, etc.; *Tarn*, Bellegarde, Grandval; *Vienne*, Le Rond, allée de Dauzé (de Lacroix).

HYBRIDÆ

R. DENSIPILUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn. 29* (1909); *R. PSEUDO-CONFORMIS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr. n° 311* (1904); *R. glaucinus* P.-J. Müll. *inedit. p. p.*; *R. erasfolius* Sud. *in hb.* Müller. — *Exsicc. : Sud. Hb. rub. rar. n° 28 !; Bat. eur. n° 443.* — *Aculei æquales, glandulæ sessiles, turio pruinosus, rachis parce pilosa, petala lata. Sterilis.*

GALLIA : *Haute-Garonne*, Balma (Timbal): *Tarn*, la Sarrade.

R. DENSIPILUS × LACERTOSUS; *R. SEMIDENSIPILUS* Sud. — *Exsicc. : Bat. eur. n° 414 !* — *Differt a R. densipilo: turione parce piloso, inflorescentia laxa, minus pilosa, parce glandulosa, petalis latioribus; parum fertilis.*

GALLIA : *Haute-Garonne* : Balma, bois de Saint-Clair.

C. — (T. CX) — ***R. macrothyrsus*** J. Lange *Fl. Dan. fasc. 18 p. 6* (1870) *et icon. t. 2832*; Focke *Syn. p. 297*; *R. gymnostachys* (Genev.) Sbsp. *macrothyrsus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 561*.

Turio (20) *dense villosi, folia grosse serrata ut in R. adscito a quo differt: aculeis paulo validioribus, foliis supra glabris, subtus velvetino-cano-pubescentibus, dentibus acutioribus; foliolo caul. terminali* (21) *ovato, emarginato, sensim acuminato; inflorescentia* (22, 23) *angusta, elongata, foliosa, pedunculis minus patulis. Petala* (24) *rosea, stamina styllos vix superantia; germina parce pilosa.*

GERMANY : *Schleswig-Holstein*, Kiel (Lange); Harz (Focke).

*Obs. — Genevier ayant confondu sous le nom de *R. gymnostachys* (*Mon. p. 223*) au moins quatre formes différentes, ce nom ne saurait convenir pour désigner un groupe spécifique quelconque.*

Series b. — *VIRESCENTES* Sud.

Conspectus specierum

- | | |
|--|-------------------------------|
| I. — <i>Folia tenuiter mucronato-denticulata; inflorescentia parum armata; flores albi vel pallide rosei..</i> | <i>R. mucronifer</i> Sud. 67 |
| II. — <i>Folia grosse vel mediocriter serrata; inflorescentia vulgo armata.</i> | |
| A. — <i>Flores vive rosei.....</i> | <i>R. Muelleri</i> Lef. 68 |
| B. — <i>Flores albi vel pallide rosei; stamina stylique pallida.....</i> | <i>R. Colemannii</i> Blox. 69 |

67 — (T. CXI) — ***R. MUCRONIFER*** Sud. *Rub. Hb. Bor. p. 56* (1902); *ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 147*; *R. mucronatus* Bloxam *in Kirby Fl. Leicest. p. 43* (1850); *Rogers Handb. Brit. Rub. p. 55*; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 538, non Seringe ap. DC. Prod. II p. 585* (1825); *R. mucronulatus* Bab. *Brit. Rub. p. 159, non Bor.*

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 88.

Turio (1, 2) *angulatus, faciebus planis vel leviter convexis, epruinosus, parce pilosus glandulosusque; aculei subinæquales, majores compressi, recti, breves, minores tenues, aciculares, interdum papulæformes; folia* (3) *plerumque 5-nata, nonnulla 3-4-nata, supra obscurè viridia et parce pilosa, subtus viridia, breviter pilosa, minute, simpliciter*

et subæqualiter mucronato-denticulata; *foliolum* terminale orbiculare vel breviter obovato-orbiculare, basi emarginatum, cuspidatum; petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima breviter petiolulata; *petiolus* supra planus, parce glandulosus, aculeis debilibus, falcatis munitus; *stipulae* lineares, glandulis brevibus praetextæ; *ramus florifer* subteres, pilosus, aculeis sparsis, debilibus, reclinatis falcatisve, glandulis tenuibus raris instructus; *folia* 3-nata, subtus viridia, subtiliter serrulata, foliolis terminalibus latis, emarginatis, cuspidatis; *inflorescentia* (4) saepe usque ad apicem foliosa, laxe hirsuta, tenuiter glandulosa (5), aculeis debilibus, reclinatis falcatisve munita; pedunculi elongati, ascendentes, 2-3-flori; *sepala* tomentoso-viridia, pallide marginata, breviter pilosa, glandulosa, parce aculeata, in fructu laxe reflexa (6), interdum in floribus terminalibus patula; *petala* (7, 8) elliptica, pallide rosea; stamina basi rosea stylos parum superantia; *antheræ* pilosæ (9); *germina* glabra; *receptaculum* hirsutum; *pollinis* (10) gradus püritatis 4/5. — Julius.

β. DREJERIFORMIS K. Frider. *Bot. Cent. bl.* LXX, 407 (1877); Focke *l. c. p.* 539. — Exsicc.: *Rub. gall.* n° 171. — Serratura minus tenuis, aculei rameales validiores.

γ. ATRICHANTHERUS E. H.-L. Krause in Prahl *Krit. Fl. Scht.-Holst.* II 61 (1889); Focke *l. c.* — Antheræ glabré; germina glabra vel pilosa.

δ. MUCRONATOIDES; *R. mucronatoides* A. Ley ap. Rogers *Handb. p.* 55 (1900), *Journ. of Bot.* (1907) *p.* 446. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 60! — Turio eglandulosus, aculeis subæqualibus munitus; inflorescentia (11) aculeis validis, glandulis elongatis instructa; flores albi, staminibus post anthesin purpurascens; antheræ glabré; sepala reflexa.

BRITANNIA. — β. GERMANIA: *Schleswig-Holstein*; DANIA: *Jutland, Fionia* (K. Friderichsen). — γ. GERMANIA BOREALIS; BELGIA: Groenendaal (Crépin), entre Auderghem et Stockel (du Pré). — δ. BRITANNIA: New Radnor (A. Ley).

Obs. — La var. *nudicaulis* Rogers appartient aux *R. silvatici* (Cf. n° 15). — Les formes de l'Allemagne du nord s'éloignent sensiblement du type et se rapprochent du *R. Drejeri* Jens. La var. *atrichantherus* de Belgique se rapproche du *R. Prei*, mais est plus robuste et a les feuilles caulines 5-nées.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia caulina pleraque 5-nata.

- A. — Folium caulinum terminale suborbiculare vel ovatum, basi emarginatum.
 - a. — Folium caulinum terminale latum, suborbiculare; antheræ vulgo pilosæ.
 - 1. — Turio glabrescens; folium terminale cuspidatum.....
 - 2. — Turio pilosus; folium terminale acuminatum.....
 - b. — Folium caulinum terminale ovatum, cordatum, acuminatum.
 - 1. — Turio glabrescens, rachis tomentosa, antheræ pilosæ.....
 - 2. — Turio rachisque pilosa, antheræ glabres.....
- B. — Folium caulinum terminale obovatum, inflorescentia subinermis.....

II. — Folia caulina pleraque 3-nata.

- A. — Turio dense pilosus, glandulis raris munitus.....
- B. — Turio glaber, glandulis raris munitus.....
- C. — Turio parce pilosus, manifeste glandulosus.
 - a. — Folia minute denticulata; germina glabra.....
 - b. — Folia mediocriter dentata; germina pilosa.....

b. — (T. CXII) — *R. latiorifolius* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1905) *p.* 342.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10385 (s. n. *R. leucanthemi*).

Gracilis; *turio* (1) pubescens, subeglandulosus, aculeis debilibus munitus; *folia* 5-nata, acute denticulata, subtus pallida vel leviter cinerascentia; *foliolum* terminale (2) late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum; *ramus* aculeis debilibus, glandulis raris, brevissimis munitus; *inflorescentia* laxe pilosa (3), subinermis, sparsim glandulosa; *sepala* reflexa; *flores* albi (4); *antheræ* pilosæ; *germina* pilosa.

GERMANIA: *Badenia*, Roescheneck, prope Waldkirch (Goetz).

c. — (T. CXII) — *R. Prei* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910), *p.* 205.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 415!

Differt a *R. mucronifero*: turionibus (5) debilibus, obtusangulis, dense pilosis; foliis 3-natis, subtus pilosioribus; folioli terminali (6) minus lato, minus abrupte acuminato; antheris glabris. Rachis pilosa (7); flores albi (8), sepala reflexa, germina glabrescentia. *R. corymboso* P. J. M. similis.

BELGIA: In solis argilloso-sabulosis. Boitsfort, chemin des Trois-Tilleuls; lisière de la forêt de Soignes, à Auderghem; Etterbeck (du Pré); Waterloo.

d. — (T. CXII). — *R. griseocalyx* N. BouI. *Ronc. vosg.* *p.* 82 (1868).

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 62!

Turio (9) glabrescens, parum heteracanthus glandulosusque; *folia* 5-nata, minute serrata, subtus glabrescentia; *foliolum* terminale (10) ovato-cordatum, acuminatum; *ramus* parum pilosus, glandulis rarissimis, aculeis debilibus munitus; *inflorescentia* angusta, foliosa, parce pilosa, glandulis sparsis, aculeis tenuibus instructa (11); *pedunculi* breves, ascendentes; *sepala* viridia, parum glandulosa aculeataque, reflexa; *petala* (12) angusta, pallide rosea; *antheræ* parce pilosæ; *germina* glabra.

GALLIA: *Vorges*; Saint-Dié (N. Boulay).

e. — *R. riparum* Sud. in hb. Müller; *Rub. tarn.* *p.* 30 (1909).

Serratura ut in *R. mucronifero*; *turio* pilosus, glaucescens, aculeis debilibus; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* elongata, pyramidalis, pedunculis patulis, glandulis crebris; *sepala* pilosa, glandulosa, parce aculeata, reflexa; *antheræ* glabré; *germina* vulgo pilosa.

GERMANIA: *Alsacia*, circa Weissenburg (Müller); GALLIA: *Tarn*, Burlats; *Nievre*, Allegny-en-Morvan, bois de la Chaux (Gillot).

B. — (T. CXII) — *R. cenomanensis* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* *p.* 27 (1904); *Bat. p.* 56; *R. oigocladus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* *p.* 65, non M. et L.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 92; Sud. *Bat. eur.* n° 170!

Turio (13) angulatus, faciebus planis, pruinosus, pilosus, parce glandulosus, aculeis crebris, leviter inæqualibus, subconicus armatus; *foliorum* serratura pubesque ut in *R. mucronifero*; *foliolum* terminale (14) obovatum, leviter emarginatum, longe cuspidatum, infima brevissime petiolulata; *petiolorum* aculei crebri, reclinati falcative; *ramus*

R. mucronifer Sud.

R. latiorifolius Sud. b.

R. griseocalyx N. BouI. d.

R. riparum Sud. e.

R. cenomanensis Sud. b.

R. Prei Sud. é.

R. fuscicortex Sud. c.

R. parcepilosus Sud. d.

R. truncifactus Sud. db.

angulatus, foliolis obovatis ; *inflorescentia* ut in *R. mucronifero*, sed glandulis brevibus (15) ; *sepala* tomentosa, laxe pilosa, glandulis sessilibus obsita, interdum parce aculeata, reflexa ; *petala* (16) alba, anguste ovata ; *stamina* alba stylos virentes superantia ; *antheræ* glabræ ; *germina* pilosa.

β. SERRATIFOLIUS ; *R. serratifolius* M. et L. *Vers.* n° 179 (1859) ; *R. corymbosus* × *foliosus* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 129. — Turio epruinosus, aculeis sparsis, glandulis rarissimis munitus ; *inflorescentia* breviter pilosa, parum glandulosa, interrupta ; petala pallide rosea, *stamina* stylos vix æquantia. *R. corymboso* P.-J. Müll. affinis sed minus heteracanthus glandulosusque.

γ. CUNEATUS. — Turio epruinosus, parce pilosus ; foliolum terminale basi cuneatum ; glandulæ crebræ, styli pallide rosei.

GALLIA : Sarthe, circa Le Mans (Gentil) ; BRITANNIA : Devon, Somerset, Hants, Berks, Warwick, Hereford, etc., Hibernia (Rogers). — β. GALLIA : Aisne, Buisson de Waligny (Lefèvre). — γ. Finistère, St-Herbot (Henry).

C. — (T. CXII) — **R. fuscicortex** Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 26 (1904) ; *R. podophyllus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 67, non P.-J. Müll.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 91 !

Gracilis ; *turio* (17) glaber, epruinosus, glandulis rarissimis, aculeis parum inæqualibus munitus ; *folia* 3-nata, supra glabrescentia, subtus viridia, pubescentia, minute et inæqualiter denticulata ; *foliolum* terminale (18) obovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *petiolus* glabrescens, sparsim glandulosus, aculeis reclinatis falcativis munitus ; *ramus* pilosus, teres, aculeis debilibus, subconicis, glandulis raris instructus ; *inflorescentia* parva, densa, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis tenuibus munita (19) ; *sepala* ut in *R. mucronifero*, reflexa ; *petala* (20) alba, *stamina* alba stylos virentes superantia ; *antheræ* glabræ ; *germina* glabra ; *receptaculum* glabrescens.

BRITANNIA : Festiniog, Merioneth (R. Linton), Kent, Suffolk, Monmouth, Warwick, Salop, Denbigh, Yorks, etc. (Rogers).

D. — (T. CXII) — **R. parcepilosus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 13 (1898).

Exsicc. — Sud. *Bat. éur.* n° 135 !

Turio (21) subteres, epruinosus, parce pilosus, glandulis crebris, brevibus, aculeis parum inæqualibus, rectis reclinatis munitus ; *folia* 3-nata, supra glabrescentia, subtus pubescentia, acute denticulata ; *foliolum* terminale (22) amplum, late ovatum vel breviter obovatum, emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio quadruplo vel quintuplo longius ; *ramus* teres, pilosus, dense glandulosus ; *inflorescentia* subaphylla, laxe hirsuta, valde glandulosa, aculeis debilibus munita (23), pedunculis mediis patulis ; *sepala* glandulosa, parce aculeata, reflexa ; *petala* (24) obovata, roseola ; *stamina* alba stylos virentes superantia ; *germina* glabra ; *antheræ* glabræ ; *receptaculum* pilosum.

β. ELLIPTICUS ; *R. Gremlii* Progel *hb.*, p. min. *p.* — Foliolum terminale ellipticum, acuminatum ; *germina* pilosa.

GALLIA : In Pyrenæis centralibus, Cauterets ; Tarn, Saint-Amans. — β. BAVARIA : Waging (Progel).

HYBRIDA

R. PARCEPILOSUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 14 (1898) ; *R. BREVIDENS* Sud. l. c. — Turio angulosus ; glandulæ raræ ; *folia* 3-5-nata, supera discolora. Sterilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Pauze-Nouveau, prope Cauterets.

b. — (T. CXII) — *R. truncifactus* Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 147 (1905) ; *R. mucronulatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 109 (1859), non Bor. nec Bab.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10402 (s. n. *R. truncifolii*) ; Sud. *Bat. eur.* n° 416 !

R. parcepilosus similis a quo differt : foliis minus tenuiter serratis, foliolo terminali suborbiculari (26), cordato, cuspidato, rachide (27) pilosiore, petalis (28) pallide roseis, germinibus pilosis. Turio (25) obtusangulus, pilosus.

GALLIA : Aisne, bois de Craisne (Lefèvre, Questier) ; Seine-Inf., Canteleu (Malbranche) ; GERMANIA : Badenia, prope Waldkirch (Goetz).

68 — (T. CXIII) — *R. MUELLERI* Lef. *ap.* Müll. *Vers.* n° 118 (1859) (*sensu amplio*) ; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 101 ; Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 147 !

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 181 ! 752 (s. n. *R. podophylli*) ; Sud. *Bat. eur.* n° 417 !, 418 ; G. Braun *Herb. rub. germ.* n° 161 (*R. melanoxyton*).

Turio (1) angulatus, faciebus planis, epruinosus, laxe villosus ; *aculei* parum inæquales, majores compressi, recti, reclinati vel subfalcati, minores rarissimi, aciculares vel glanduliferi ; *folia* 5-nata (2), supra pallide viridia, fere glabra, subtus viridia, appresse pilosa, minute et subsimpliciter serrata, mucronibus patulis ; *foliolum* terminale breviter obovatum, subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolulata ; *petiolus* supra planus, tenuiter glandulosus, parum pilosus, aculeis obliquis, falcatis munitus ; *stipulae* lineares, glandulosæ ; *ramus* florifer, gracilis, angulosus, pilosus, glandulis tenuibus, pallidis, aculeis obliquis, falcatis geniculatisve instructus ; *folia* 3-nata, minute serrata, subtus pilosa, viridia, foliolis terminalibus obovatis, latis, acutis vel cuspidatis ; *inflorescentia* (3) lata, obtusa, basi foliosa, laxe piloso-hirsuta (4), glandulis crebris, inæqualibus, diametrum rachidæ fere æquantibus, aculeis mediocribus, reclinati falcativis instructa ; *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori ; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, tenuiter glandulosa, inermia vel parce aculeata, in flore et fructu reflexa (5) ; *petala* (6) late ovata, obtusa, roseo-purpurea ; *stamina* purpurea stylos carnosos superantia ; *germina* glabra ; *receptaculum* glabrum. Pollen parum admixtum (7). — Julius.

β. DISJECTUS ; *R. disjectus* M. et Lef. *Vers.* n° 68 (1859). — Turio dense pilosus ; *folia* 5-nata, foliolis terminalibus ovatis ; *inflorescentia* pyramidalis, valde piloso-hirsuta, pedunculis valde patulis, pedicellis divaricatis ; flores ut in typo.

γ. EDITUS Sud. *Rub. tarn.* p. 30 (1909). — Turio ut in typo ; *folia* 5-nata, inæqualiter et acutissime dentata ; *foliolum* terminale late ellipticum, basi fere integrum ; *folia* ramealia subtus valde pubescentia, pallida, subcinerascentia, foliolis acuminatis ; *inflorescentia* valde foliosa ; *petala* rosea, *stamina* rubra, styli virescentes. Pollen fere purum.

δ. SPHENOPHYLLUS ; *R. sphenophyllus* L. et M. *Vers.* n° 153 (1859). — Turio planus, pilosior quam in typo, glandulis sessilibus densis, aculeis crebrioribus ; *folia* 5-nata, inæqualiter mucronata-serrata ; *foliolum* terminale cuneato-rhombeum, basi integrum, abrupte acuminatum ; *folia* ramealia supera grosse vel subinciso-serrata ; *inflorescentia* angusta, foliosa ; flores rosei.

ε. OBCUNEATUS ; *R. obcuneatus* L. et M. *Vers.* n° 132 (1859). — Turio parce pilosus ; *folia* plerumque 3-nata, foliolis terminalibus late obovato-cuneatis, basi integris, cuspidatis ; dentes mediocres ; *inflorescentia* brevis, aculeis raris, tenuibus, pedunculis patulis ; *petala* rosea, *stamina* rosea, styli dilute rosei ; *germina* receptaculumque pilosa.

ζ. HANOVRENSIS ; *R. hanovrensis* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1905) p. 325 ; *R. tereticaulis* f. *purpurea* F. Kretzer ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9083 (1898). — Gracilis; turio ut in typo; folia caulina 3-nata, profunde serrata; foliolum terminale latum, breviter obovatum, subemarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia foliosa, laxe pilosa, pedunculis ascendentibus; flores purpurei.

η. STRICTISPINUS ; *R. strictispinus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 327 ; *R. scabripes* Arond. *Mon. non Gen.*; *R. carneiflorus* f. *vestita* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9522. — Turio ut in typo; folia 3 nata; foliolum terminale angustum, acuminatum; inflorescentia laxa var. β. revocat; germina glabra.

θ. BOUDOTII ; *R. Boudotii* Sud. *Diagn.* p. 30 (1906); *R. hirtus* v. *elegans* Godr. in *hb.* Müller. — Gracilis; turio subteres, sparsim pilosus, aculeis subaequalibus; folia 3-5-nata, mediocriter serrata; inflorescentia laxa, brevis, armatissima, pedicellis valde patulus; petala angusta.

In nemoribus montosis silicicis. — GALLIA : *Oise*, forêt de Retz, route de Vez (Lefèvre, Questier); *Meurthe-et-Moselle*, Pont-à-Mousson (Salle); *Tarn*, Sorèze : BELGIA : Spa (Durand); GERMANIA : *Guestphalia*, Freudenberg (Ütsch); *Bavaria*, Waging (Progel), Augsburg (Caflisch); HELVETIA : *Vaud*, Ecublens prope Lausanne (Schmidely). — β. GALLIA : *Aisne*, Buisson de Waligny (*Oise*, Cuvergnon (Lefèvre)). — γ. GALLIA : *Tarn*, Trévien. — δ. GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz, au Chêne-l'Officier, Queue de Ham, Rond-des-Dames (Lefèvre, Questier). — ε. GALLIA : *Aisne* et *Oise*, forêt de Retz, au Rond-des-Dames, Buisson de Waligny (Lefèvre, Questier). — ζ. GERMANIA, Hanover, Deister, Steinkrug (F. Kretzer). — η. GALLIA : *Morbihan*, Vannes (Arrondeau); GERMANIA : *Badenia*, Rösschenec (Goetz). — θ. GERMANIA : *Lothringia*, Sarrebourg (Boudot); BELGIA : Grand Rechain (Halin); GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Courpières (Charbonnel).

Obs. — Le *R. Muelleri* Lef. est bien moins hétéracanthe que les *R. intercatus* Müll. et *obscurus* Kalt., qui ont aussi des fleurs d'un rose vif.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Turio angulatus.

- | | |
|---|---------------------------|
| A. — Foliolum canlinum terminale obovatum vel ellipticum, raro ovatum, integrum vel subemarginatum; turio epruinosus. | |
| a. — Sepala inermia vel parce aculeata; aculei petiolares sparsi, debiles..... | R. Muelleri Lef. |
| b. — Sepala dense aculeata; aculei petiolares crebri, validi, adnunci..... | R. GRYPOACANTHUS L. M. b. |
| B. — Foliolum caulinum terminale late ovatum vel suborbiculare, basi emarginatum. | |
| a. — Turio epruinosus; inflorescentia ± armata. | |
| 1. — Aculei rameales tenues vel mediocres; foliolum caulinum terminale cordatum..... | R. CALLAYI P.-J. M. B. |
| 2. — Aculei rameales validi; foliolum caulinum terminale basi leviter emarginatum..... | R. SPLENDIDUS M. et L. C. |
| b. — Turio pruinosus; inflorescentia subinermis..... | R. JACTUOSUS Sud. D. |

II. — Turio teres vel obtusangulus.

- | | |
|---|--------------------------|
| A. — Folia caulinum 5-nata; turio pilosus. | |
| a. — Foliolum caulinum terminale ovatum vel suborbiculare, acuminatum; inflorescentia subinermis..... | R. TREMULUS L. M. Bb. |
| b. — Foliolum caulinum terminale angustum, oblongum; inflorescentia armata..... | R. OBLONGIFACTUS Sud. c. |
| B. — Folia caulinum 3-nata; turio glaber..... | R. ARGUTIRAMUS Sud. d. |

b. — (T. CXIII) — *R. grypoanthus* Lef. et Müll. *Vers.* n° 69 (1859).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 419 !

R. Muelleri Lef. similis a quo differt : aculeis validioribus, densioribus, in petiolis valde falcatis uncinatis, in ramis valde obliquis, falcatis geniculatis, foliis grosse et acute serratis. *Foliolum* terminale oblongo-obovatum, leviter emarginatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *inflorescentia* elongata, foliosa, laxe pilosa, aculeis validis, numerosis (8), longis, falcatis, glandulis brevibus munita; *sepala* dense aculeata, glandulis sessilibus obsita; *petala* (9), stamina stylisque rosea. *Pollen* parum admixtum.

GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz, Arganson (Lefèvre), le Cuvret, route de Châvres (Questier).

HYBRIDA

R. GRYPOACANTHUS × SCHLECHTENDALII; R. GRYPOACANTHOIDES Sud. *hb.* — Aculei crebri, curvati ut in *R. grypoantho* sed breviores; turio pilosior, folia ampliora, foliolum terminale breviter obovatum, glandulæ breves, raræ, sepala parce aculeata.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Questier).

c. — (T. CXIV) — *R. oblongifactus* Sud. *Diag.* p. 30 (1906).

Gracilis; turio (1) subteres, dense pilosus, subglandulosus, aculeis debilibus, subaequalibus armatus; folia 3-5-nata, subtus dense pilosa, simpliciter mucronato-serrulata; foliolum terminale (2) oblongum, angustum, subemarginatum, longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; ramus gracilis, flexuosus, aculeis mediocribus; inflorescentia (3) ut in *R. Muelleri*; sepala pilosa, glandulosa aculeataque; flores vive rosei (4).

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Questier).

d. — (T. CXIV) — *R. argutiramus* Sud. *Rub. tarn.* p. 30 (1909); *R. laevefactus* (P.-J. Müll.) var. *erythranthus* Progel *hb.*

Gracillimus; turio (5) teres, fere glaber, glandulis rarissimis, aculeis inaequalibus munitus; folia 3-nata *R. Muelleri* revocant; foliolum terminale (6) late ellipticum vel obovatum, integrum, acuminatum; ramus gracilis, glabrescens, glandulis rarissimis, aculeis pallidis, falcatis instructus; inflorescentia parva, pauciflora, laxe pilosa (7), glandulis brevibus, rareficiens, aculeis debilioribus munita; petala rosea; stamina stylisque rubra; germina glabra.

GALLIA : *Tarn*, Grandval; BAVARIA : Freidling, prope Teisendorf (Progel).

B. — (T. CXIV) — *R. Callayi* P.-J. Müll. in Sud. *Diagn.* p. 29 (1906).

Differet a *R. Muelleri* turione (8) pilosiore, foliis grosse serratis; foliololo terminali (9) latissime ovato vel suborbiculari, cordato, acuminato; inflorescentia dense piloso-hirsuta (10), aculeis debilioribus munita. Petala (11), stamina stylisque roseo-purpurea.

GALLIA : *Ardennes*, « Le Chêne, à la 1^{re} écluse, terrain calcaire » (Callay); *Valois*, forêt de Retz, bois du Roi (Questier); *Eure-et-Loir*, Bérou-la-Chalotièvre.

b. — (T. CXIV) — *R. tremulus* L. et M. *Vers.* n° 73 (1859).

Turio (12) subteres, pubescens; folia 5-nata, grosse serrata; foliolum terminale (13) late ovatum vel orbiculare, subemarginatum, acuminatum; ramus sparsim aculeatus, foliolis brevibus, latis ut in *Populo tremulo*; inflorescentia hirsuta, subinermis (14); sepala hirsuta, parce glandulosa aculeataque vel inermia; flores vive rosei; germina pilosa; receptaculum glabrescens.

GALLIA : *Oise*, forêt de Retz, près de Boursonne (Lefèvre); Compiègne (Salle).

C. — (T. CXIV) — **R. splendidus** M. et Lef. *Vers.* n° 66 (1859); **R. approximatus** Questier in Billot *exsicc.* non P.-J. Müll. *Vers.* n° 185; **R. Radula** \times **obscurus** N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 110.

Exsicc. — Billot *Fl. gall. et germ.* n° 2454; Sud. *Bat. eur.* n° 420!

Validus; *turio* (15) angulatus, faciebus planis, epruinosus, parce pilosus glandulosusque; *aculei* validi, subæquales, nonnulli papulæformes; *folia* 5-nata, supra glabrescentia, subtus pallidiora, pubescentia, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (16) suborbiculare vel obovato-orbiculare, basi rotundatum, leviter emarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum; *ramus* angulatus, validus, parum pilosus, sparsim glandulosus, aculeis falcatis armatus; *inflorescentia* laxe pilosa, basi foliosa, glandulis crebris, inæqualibus, aculeis validibus (17, 18), reclinatis falcatisve instructa; *pedunculi* medii patuli; *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa aculeataque; *petala* (19) ovata, vive rosea; *germina* pilosa. *Pollen* valde imperfectum. — An *R. rufa* \times *formidabilis*?

GALLIA : Aisne, « forêt de Retz, près de la ferme d'Arganson » (Lefèvre, Questier). Rarus.

HYBRIDÆ

R. SPLENDIDUS \times **SPRENGELII** Sud. *Diagn.* p. 30 (1906); **R. SPLENDIDIFRONS** Sud. *l. c.*; *an R. formidabilis* \times *Sprengelii*? — *Exsicc.* : Sud. *Rub. rar.* n° 61! — Turio, aculei foliaque ut in *R. splendido* sed glandulæ subnudæ. stamna stylis breviora; fore parvi, vive rosei.

GALLIA : Valois, « forêt de Villers-Cotterets, chemin familier de Guise » (Questier).

R. SPLENDIDUS \times **OIGOCLADUS** Sud. *Diagn.* p. 30 (1906); **R. PSEUDOSPLENDIDUS** Sud. *l. c.* — Turio pilosior, serratura minus grossa, inflorescentia hirsutior, glandulosior quam in *R. splendido*. Flores rubri.

GALLIA : Valois, Virlet (Questier).

D. — (T. CXIV) — **R. jactuosus** Sud. *Rub. tarn.* p. 30 (1909).

Turio (20) angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, pruinosus, pilosus, glandulis subsessilibus, aculeis parum inæqualibus, compressis, nonnullis brevibus, acicularibus instructus; *folia* 5-nata, ampla, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, dentibus mediocribus, triangularibus, acutis, subæqualibus; *foliolum* terminale (21) late ovatum, emarginatum, acuminatum; *ramus* angulosus, dense pilosus, pallidus, glandulis rarissimis, brevibus, aculeis tenuibus, reclinatis falcatisve instructus, foliis 3-5-natis; *inflorescentia* angusta, densa, parum foliosa, dense villosa (22), glandulis pallidis, brevibus, aculeis tenuibus, flavescentibus munita; *pedunculi* breves, ascendentes (23); *sepala* hirsuta, inermia, glandulis subsessilibus onusta, apice acuminata, laxe reflexa; *petala* vive rosea; *stamna* rosea stylis virentes vix æquantia; *germina* glabra.

GALLIA : Tarn, Vabre, via Camalières.

OBS. — Le *R. jactuosus* ressemble un peu au *R. Boreauanus*, mais est virescent; comme ses calices ne se réfléchissent pas nettement, il serait peut-être mieux placé dans le groupe du *R. Schmidelyanus*. Je l'ai rapproché du *R. Muelleri* à cause de ses fleurs d'un joli rose.

HYBRIDA

R. JACTUOSUS \times **SPRENGELII** (grex) Sud. *Rub. tarn.* p. 30 (1909); **R. JACTUOSIFORMIS** Sud. *l. c.* — Gracilis, aculei debiles, glandulæ rarissimæ, folia 3-5-nata, petala pallide rosea, stamna alba stylis breviora, sepala patula; parum fertilis.

GALLIA : Tarn, Vabre, via Camalières.

69 — (T. CXV) — **R. COLEMANNII** Bloxam in Kirby, 38 (1850); Bab. *Brit. Rub.* p. 127; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 46, p. p.; *R. fusco-ater* β *Colemannii* Bab. *Man. ed.* 3, 101.

Exsicc. — Sud. : *Bat. eur.* n° 421.

Validus; *turio* (1, 2) angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, epruinosus, subglaber, glandulis rarissimis munitus; aculei robusti, crebri, subæquales, majores basi dilatati, minores rarissimi; *folia* 5-nata, (3) supra parce pilosa, subtus viridia, appresse pilosa, pilis ad nervos subpectinatis, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* caulinum terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum, breviter petiolulatum, infima petiolata; *petiolulus* supra planus, aculeis falcatis uncinatis armatus; *stipulae* lineari-lanceolatae, glandulis brevibus, raris munitæ; *ramus* florifer angulatus, parum pilosus, sparsim glandulosus, aculeis validis, subinæqualibus, majoribus reclinatis falcatisve, foliis 3-natis, subtus viridibus pilosisque, foliolis terminalibus ovatis; *inflorescentia* (4) pyramidalis, vulgo usque ad apicem foliosa, laxe pilosa, glandulis sparsis, inæqualibus, aculeis pervalidis, reclinatis falcatisve instructa (5); *ramuli* patulo-ascendentes, pedicellis brevibus, dense aculeatis; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, parce glanduloso-aculeata, in flore et fructu reflexa (6); *petala* (7) ovata, basi in unguem attenuata, alba vel pallide rosea; *stamna* alba vel dilute rosea stylis virentes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollen* admixtum. — Julius-augustus.

β . DECLINIS; *R. Colemannii* Rogers *Handb.* p. 46, ex pte. — *Exsicc.* : *Set of Brit. Rub.* n° 12. — Turio pilosus; *foliolum* caul. terminale ovatum, basi integrum vel subemarginatum, petiolulo proprio triplo longius; *inflorescentia* sparsim glandulosa.

y. FEROCISSIMUS. — Turio glaber; folia inæqualiter duplicato-serrata, dentibus divaricatis; *foliolum* caul. terminale late rhombicum vel suborbiculare, basi integrum vel leviter emarginatum, longissime petiolulatum; *inflorescentia* elongata, foliosa, sparsim glandulosa, aculeis crebris, validis, reclinatis armatissima; *pedunculi* patuli; *pedicelli* longi (8), \pm divaricati; *germina* glabra.

BRITANNIA : Coventry (Bloxam); Packington (Babington); Devon, Hants, Surrey, Berks, Chester, Perth, etc., (sec. M. Rogers); GALLIA : Cantal, Garabit, St-Poney, les Margerides, la Chapelle-Laurent (Charbonnel); Ardèche, Labastide-St-Laurent. — β . Surrey, Hamledon Common (Murray), etc.? — y. BRITANNIA : Cheshire, Lafkton Hill (Wolley-Dod).

OBS. — J'ai décrit la plante de Coventry, qui est le type de Bloxam et qui, d'après M. Moyle Rogers, n'existe plus aujourd'hui dans cette localité (« near the Railway Station »). La plante de St-Poney (Cantal) ne me paraît pas en différer sensiblement. La var. *ferocissimus* rappelle le *R. Lindleyanus* Lees par la forme de son inflorescence.

Conspectus speciei, subspiecierum et microgenerum

I. — *Turio angulatus*; *inflorescentiae* aculei validi.

A. — Serratura grossa; *foliolum* caulinum terminale basi latum, emarginatum.

a. — *Folia* subtus viridia, parce pilosa; *turio* epruinosus.

1. — *Inflorescentiae* aculei pervalidi, plerique falcatae vel geniculatae; *turio* vulgo subglaber..... *R. Colemannii* Blox.

2. — *Inflorescentiae* aculei mediocres, reclinati vel leviter falcatae; *turio* vulgo pilosus.

a. — *Foliolum* caul. terminale ovatum, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *turio* pilosus.....

b. — *Foliolum* caul. term. suborbiculare, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *turio* subglaber.....

b. — *Folia* subtus pallida, dense pubescentia; *turio* pruinosus, stamna stylos virentia.....

R. GREMLII Focke B.

R. INOPACATUS M. et L. C.

R. HALACSYI Borb. D.

- B. — Serratura tenuis vel mediocris ; foliolum caul. terminale basi integrum vel vix emarginatum.
- a. — Dentes profundi, acuti ; inflorescentia angusta..... R. LASIAXON-Borb. et W. Bb.
 - b. — Dentes brevissimi, tenues ; inflorescentiae glandulæ subsessiles.
 - 1. — Folium caul. terminale ellipticum, acuminatum ; inflorescentia lata..... R. FLAVESCENS M. et L. E.
 - 2. — Folium caul. terminale obovatum, cuspidatum.. .. R. BECKII Hol. Eb.
- II. — Turio teres vel obtusangulus ; inflorescentiae aculei sparsi, debiles.
- A. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta ; foliolum caul. terminale ovatum vel obovatum.
- a. — Folia caul. 5-nata ; stamina stylos pallidos superantia..... R. ERIOSTACHYS M. et L. F.
 - b. — Folia caul. 3-nata ; stamina stylos roseos æquanta..... R. SPARSUS Sud. Fb.
- B. — Inflorescentiae rachis tomentosa ; foliolum caul. terminale suborbiculare..... R. HELVETICUS Gr. G.
- B. — (T. CXVI) — **R. Gremlii** Focke *Syn. p. 265 (1877)* ; *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 525 (pr. sp.)* ; *Hal. Oest. bromb. p. 258* ; *R. piletostachys* Gremli *Beitr. Fl. Schw. p. 43* ; *O. B. Z. XXI (1871) p. 129, non G. G.* ; *R. hamatus* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos. (1877) p. 43, t. XXXIII, f. 2, 3, 5, p. p.* ; *R. Clusii* Borbas *in Erdesz. Lap. (1885) p. 104* ; *R. rufa et Radula Holuby exsicc., ex pte* ; *R. Gremlii* var. *obovatus* Progel.
- Exsicc. — Sud. *Bat. eur. n° 136*.
- Diffrer a *R. Colemannii* : turionibus pilosis (1), aculeis inæqualioribus ; foliis inæqualiter serratis, subtus parum pilosis, caulinis interdum 3-4-natis ; foliolo caulinio terminali (2) ovato vel ovato-lanceolato, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longiore, infimis subsessilibus (in foliis 5-natis) ; inflorescentiae aculeis (3, 4) minus curvatis, validis vel mediocribus. Petala (5) alba vel dilute rosea, angusta ; stamina alba stylos virescentes parum superantia.
- β. WEICHERI ; *R. Weicheri* Hofmann *Pl. crit. sax. (1896) f. 1 n° 11* ; *R. vulgaris* Weichér, non W. N. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur. n° 9090*. — Folia subtus pilosa ; inflorescentiae glandulæ inæquales, nonnullæ longissimæ.
- γ. MACROCARDIACUS ; *R. macrocardiacus* Sabrs. *Ver. Zool. bot. Ges. Wien (1908) p. 79*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur. n° 422* ! — Turio parce pilosus ; foliolum terminale late ovatum vel suborbicular, basi profunde cordatum, longe acuminatum ; inflorescentia breviter pilosa, glandulis brevissimis obsita ; petala dilute rosea.
- δ. REICHENBACHII ; *R. Reichenbachii* Kœchl. *in Bluff et Fingrh. Comp. Fl. Germ. I p. 685 (1825)* ; W. et N. *Rub. germ. p. 87 t. XXXVII*; Focke *Syn. p. 260*. — Aculei subæquales ; turio subeglandulosus ; inflorescentia parum armata, glandulosa ; petala lata, suborbicularia, alba ; stamina stylos superantia.
- In nemoribus montosis. GERMANIA MERIDIONALIS, AUSTRIA, HUNGARIA, HELVETIA BOREALIS, GALLIA : Vosges. — β. SAXONIA : Chemnitz (Hofmann) ; BAVARIA : Waging, München, prope Futting (Progel). — γ. SILESIA : Schmiedeberg (Kœchl). — δ. STYRIA : prope Soechau (Sabransky) : BAVARIA ; HUNGARIA.
- Obs. — Le type de Gremli est presque entièrement dépourvu de glandes ; il en est de même de la plante des Vosges ; mais mes spécimens de Styrie, de Bohême, de Moravie, de Bavière, etc. sont plus manifestement glanduleux et se rapprochent du *R. Colemannii* d'Angleterre. Je dois faire remarquer que les spécimens distribués par Gremli sont en général très maigres et peu instructifs, ce qui rend l'interprétation des espèces de ce botaniste souvent fort difficile. — Le *R. indotatus* Gremli *Oest. bot. Zeit. XXI (1871) p. 128*, que M. Focke considère comme une variété du *R. Gremlii*, est une plante que son auteur a décrite en quelques lignes, et qui appartient vraisemblablement à une autre espèce : Turio angulatus, pruinosis, glaber, parce glandulosus ; folia 3-nata, subtus cinereo-tomentosa ; flores albi (rosei sec. M. Focke), germina glabra. — Helvetia : Zurich, Lucerne. — Je n'ai pas vu de spécimens authentiques de *R. Reichenbachii* Kœchl. — Le *R. Holubyi* Tocil Mon. *Rub. Boh. p. 17 (1903)*, m'est inconnu ; ce n'est peut-être qu'une variation du *R. Gremlii* F.
- ### HYBRIDÆ
- R. GREMLII × SCHLEICHERI (grex) ? ; *R. Soechaviensis* Sabrs. *Z.-b. Ges. (1904)*. — Turio minus angulatus, aculei debiliores, inæquiores quam in *R. Gremlii* ; ramus aciculatus ; inflorescentia brevis, laxa ; sepala reflexa, germina pilosa. Fructus male evolutus.
- STYRIA ORIENTALIS : Soechau (Sabransky).
- R. GREMLII × PROCERUS ; *R. spurius* Hal. et Braun *Nacht. Fl. Niederäst p. 329 (1882)* ; *Hal. Oest. bromb. p. 232* : — AUSTRIA, prope Wien : — Mihi novus est. — J'ai reçu de M. Sabransky, de Soechau (Styrie), sous le nom de *R. Greithensis* Sabrs., une plante qui semble avoir la même origine.
- β — (T. CXVI) — *R. lasiaxon* Borbas et Waisb. *Oest. bot.-Zeit. (1895) p. 145* ; *R. macrophyllus* v. *acanthosepalus* Borb. et Waisb. ; *R. apum* Fritsch *O. B. Z. (1905)*, p. 85 !
- Exsicc. — Baenitz *Hb. eur. n° 8563* ; Sud. *Bat. eur. n° 423 (R. apum !)*.
- Turio (6) planus, pilosus, aculeis longis, compressis, nonnullis acicularibus munitus ; folia 5-nata, supra glabra, inæqualiter et acute serrata ; foliolum terminale (7) rhombeum, leviter emarginatum, longe acuminatum ; inflorescentia elongata, subaphylla, piloso-hirsuta, aculeis crebris (8, 9), flavescentibus armata ; pedunculi valde patuli, glandulis subsessilibus obsiti ; sepala pilosa, aculeata ; petala (10) ovata ; stamina longa ; germina parce pilosa. — Diffrer a *R. macrophyllum* inflorescentia angustiore, valde armata, turione ± heterocantho, foliolis angustioribus.
- HUNGARIA, prope Güns (Waisbecker) ; STYRIA, Riegersburg (Sabransky), Graz (K. Fritsch) ; BAVARIA : Waging, prope Traunstein (Progel).
- C. — (T. CXVI) — **R. inopacatus** M. et Lef. *Vers. n° 54 (1859)* ; *R. infestus* Questier *in Billot exsicc., non Wh. et N.* ; *R. plicatus* × *pyramidalis* ou *Sprengelii* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. p. 59*.
- Exsicc. — Billot *Fl. Gall. et Germ. n° 2453* ! ; Sud. *Bat. eur. n° 424* !
- Validus ; turio (11) faciebus planis vel leviter concavis, parce pilosus, glandulis nullis vel rariss. ; aculei crebri, basi abrupte dilatati, plerumque reclinati, parum inæquales ; folia 5-nata, magna, supra fere glabra, subtus parce pilosa, viridia, grosse et inæqualiter dentata ; foliolum terminale (12) late ovatum vel suborbicular, cordatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata ; ramus angulatus, foliis 3-natis, grosse serratis, subtus viridibus ; inflorescentia saepe usque apicem foliosa, laxe hirsuta, aculeis validis vel mediocribus, crebris, reclinatis armata (14) ; pedunculi medii (13) patulo-ascendentes, multiflori, parce glandulosi ; sepala viridia, albo-marginata, saepe appendiculata, aculeata et parce glandulosa, reflexa ; petala alba, ovata ; stamina alba stylos virentes superantia ; germina pilosa.
- β. PHYLLOTHYRSUS ; *R. phyllothyrsus* K. Frider. *ap. Rub. gall. exsicc. n° 81 (1896)*. — Folium caul. terminale basi minus latum ; dentes minus grossi ; inflorescentia laxa, petala pallide rosea.
- γ. KRETZERI ; *R. porphyracanthus* f. *fissa* Kretzer *ap. Baenitz Hb. eur. n° 9556 (1898)*. — Serratura tenuior ; inflorescentia glandulosior, aphylla, sepala cinereo-tomentosa.
- δ. ADUSTUS ; *R. epipsilos* Focke var. *adustus* Progel *Ber. bot. Ver. Lands. VIII, 93, ex pte* ; *Hal. Oest. bromb. p. 244*. — Serratura subæqualis ; foliolum caul. terminale basi rotundatum, vix emarginatum, petiolulo proprio triplo longius ; inflorescentia dense glandulosa ; petala pallide rosea, styli rosei. Cetera ut in typo.

GALLIA : Aisne et Oise, Buisson de Waligny, taillis d'Ivors (Lefèvre, Questier). — β. GERMANIA, Schleswig, Husum, forêt de Lemsik (K. Friderichsen). — γ. GERMANIA : Guestphalia, Porta (F. Kretzer). — δ. BAVARIA : Waldmünchen (Progel).

Oss. — N. Boulay l. c., pour expliquer sans doute la virescence des sépales chez cette plante, admet que le *R. inopacatus* M. et L. est un hybride du *R. plicatus* W. et N. et du *R. pyramidalis* Kalt. ou du *R. Sprengelii* Wh. — Il importe de remarquer que ce *Rubus* fructifie normalement et que de plus les *R. Colemanii* Blox. et *Gremii* F. ont les sépales nettement verdâtres dans les boutons, mais ces organes deviennent, après l'anthesis, plus ou moins grisâtres-tomentueux, ce qui arrive aussi chez le *R. inopacatus* et sa var. β.

D. — (T. CXVI). — **R. Halacsyi** Borbas ap. Hal. in Verh. z.-b. Ges. Wien (1885) p. 10; Hal. Oest. bromb. p. 251; *R. decorus* Hal. in Kern. Sched. Fl. Austr.-Hung. III p. 42, non P.-J. Müll.

Turio (15) glaucescens, faciebus planis, appresse pilosus, sparsim glandulosus, aculeis validis, arcuatis, subæqualibus armatus; *folia* 5-nata, supra appresse pilosa, subtus pallidiora, valde pubescentia, inæqualiter et acute serrata; *foliolum terminale* (16) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* aculeis validis, crebris, subuncinatus armatus; *inflorescentia* magna, laxa, multiflora, foliosa, pilosa, parce glandulosa, aculeis crebris, validis, flavescensibus, reclinatis falcatisve armata (17, 18); *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa aculeataque, laxa reflexa; *petala* (19) alba; *stamina* stylis pallidos æquantia; *germina* glabra. Fertilis? — Foliis subtus valde pubescentibus, sepalis subpatulis a *R. Schmidelyano* similis.

AUSTRIA, supra Klamm, prope Schottwien; Sträuchern (Halacsy).

E. — (T. CXVII) — **R. flavescens** M. et L. Vers. n° 131 (1859).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 425!

Turio (1) robustus, obsolete angulatus, parum pilosus, glandulis raris, aculeis subæqualibus, reclinatis instructus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus viridia, glabrescentia, simpliciter mucronato-serrata; *foliolum terminale* (2) ellipticum, integrum vel parum emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius, infima longe petiolulata; *petiolorum* aculei adunci; *ramus* angulatus, aculeis obliquis, foliis argute serratis; *inflorescentia* magna, lata, obtusa, parum foliosa, hirsuta, sparsim glandulosa, aculeis crebris, robustis, reclinatis falcatisve armata (4); *pedunculi* medii (3) elongati, patuli, multiflori, pedicellis longis, divaricatis; *sepala* hirsuta, parce aculeata, laxa reflexa; *petala* anguste ovata (5), albo-rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* parce pilosa; pollen valde imperfectum. Fertilis.

β. DISTERMINUS. — Gracilior; turio subteres, dense villosus, aculeis crebris; inflorescentia parva, glandulis longis. Forma vergens in *R. teretiusculum* Kalt.

GALLIA : Valois, forêt de Retz, près de Coyolles, de Bourgfontaine (Lefèvre), Virlet, champ familial (Questier). — β. BAVARIA : Schoenberg (Scherzer).

HYBRIDÆ

R. FLAVESCENS × *ARGENTEUS*?; *R. INUNCATIFORMIS* Sud. Diagn. p. 28 (1906). — *Turio* angulatus; aculei validi, petiolares adunci; *folia* minute serrata, subtus cinerascentia; *foliola* longe petiolulata, terminale obovatum, cuspidatum. *Ramus* ut in *R. flavescens*; *inflorescentia* foliosa. Sterilis. *R. inuncato* L. M. similis sed heteranthor et glandulosior.

GALLIA : Valois « de Billemont à Bourgfontaine » (Questier).

R. FLAVESCENS × *ULMIFOLIUS*: *R. SEMIFLAVESCENS* Sud. hb. — *Folia* ut in *R. flavescens* sed discolora, aculei æquales, *turio* pruinosus, rachis tomentosa, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Valois, forêt de Retz, au Rond-des-Dames (Questier).

R. FLAVESCENS × *CUSPIDIFER* Sud. Diagn. p. 29 (1906); *R. GRYPOANCHUS* Sud. l. c. — Aculei æquales; *folia* cinereo-tomentosa, glandulæ sessiles.

GALLIA : Valois, Virlet (Questier).

R. FLAVESCENS × *SERPENS*; *R. EXPANSIFORMIS* Sud. — *Habitus* *R. flavescens* sed glandulosior, *inflorescentia* laxa, magna; parum fertilis. *R. expanso* L. M. similis sed *folia* minute serrata, rachis minus hirsuta.

GALLIA : Valois, forêt de Retz (Questier).

b. — (T. CXVII) — *R. Beckii* Hal. in Verh. z.-b. Ges. Wien (1885) p. 663; Oest. bromb. p. 248; *R. laxiflorus* Hal. in Kern. Sched. Austr.-Hung. III, p. 49 non M. et L.; *R. glaucovirens* II Beckii Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 582.

Turio (6) obsolete angulatus, pilosus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia, pubescentia; *foliolum terminale* ellipticum vel obovatum (7), cuspidatum; *inflorescentia* foliosa, laxa, glandulis crebris, longis (8, 9), aculeis validis, reclinatis falcatisve munita; *sepala* reflexa; *petala* alba vel pallide rosea (10); *stamina* longa. — *R. fusco* Sbsp. *apiculatiformis* similis.

AUSTRIA, prope Payerbach (Richter).

F. — (T. CXVII) — **R. eriostachys** M. et Lef. Vers. n° 162 (1859); *R. rudis* × *foliosus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 101; *R. debilis* Gen. Mon. p. 115, non N. Boul.; *R. villipes* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI (1899) p. 92.

Turio (11) debilis, obsolete angulatus, parce pilosus, glandulis raris, aculeis debilibus, leviter inæqualibus, majoribus parum compressis; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, inæqualiter et mediocriter serrata; *foliolum terminale* breviter obovatum vel obovato orbiculare (12), basi integrum vel emarginatum, abrupte acuminatum, infima brevissime petiolulata; *ramus* subteres, aculeis debilibus, reclinatis, foliis 3-natis, subtus manifeste pilosis; *inflorescentia* sœpe usque ad apicem foliosa, piloso-hirsuta, glandulis brevibus, aculeis tenuibus, raris instructa (14); *pedunculi* (13) medi patuli, multiflori; *sepala* hirsuta, inermia, glandulis brevibus, parum apparentibus, reflexa; *petala* ovata (15), alba vel pallide rosea; *stamina* alba stylis virentes superantia; *germina* glabrescentia. *Pollinis* gradus puritatis 3/4.

β. *FERRARIARUM*; *R. ferrariarum* Rip. in Genev. 1^{er} Suppl. Ess. mon. (1872) p. 40; Mon. p. 133; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 54. — *Foliola* angustiora, caulinum terminale elliptico-obovatum vel anguste ovatum, integrum, longe acuminatum; dentes grossi, inæquales; *inflorescentia* laxior, minus hirsuta; *petala* pallide rosea. In umbrosis.

γ. *ACUMINATUS*; *R. ferrariarum* v. *cordatus* Sud. Rub. Pyr. p. 12 (1898). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 426. — *Foliolum terminale* ovato-cordatum, longe acuminatum; *petala* rosea; *stamina* pallide rosea; *germina* pilosa.

GALLIA : Haute-Vienne, Bort, près Limoges (Lamy); Tarn; Valois, Buisson de Waligny (Lefèvre); Orne, Chauday (Jourdes); BELGIA : Watermael (Durand). — β. GALLIA : Cher, « ferrières d'Allogny » (Ripart), Hérault, Valois, Sarthe, Finistère, Maine-et-Loire, etc. — γ. GALLIA : Hautes-Pyrénées, Cauterets; Valois, forêt de Retz (Questier).

Oss. — Le type doit être rare dans la forêt de Willers-Cotterets, car je ne l'ai pas reconnu dans l'herbier Questier, du Muséum de Paris; Müller, du reste, dit : « Ziemlich selten ». Les spécimens de Chauday n'en diffèrent pas sensiblement mais ont les pétales rosés et la foliole caulinaire terminale entière; ils relient le type à la var. β.

HYBRIDA

R. ERIOSTACHYS × PYRAMIDALIS ?; *R. SEMIVESTITUS* M. et Lef. *Vers.* n° 133 (1839). — Validus; aculei debiles; foliolum terminale late ovatum, cordatum, breviter acuminatum, longe petiolatum; inflorescentia angusta; flores albi.
GALLIA: Oise, « forêt de Retz, sur la route du faite, près du carrefour des Planards ». Rarus (Lefèvre).

b — (T. CXVII) — *R. sparsus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 13 (1898).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 62 !

Folia caulina 3-nata; *foliolum* terminale (17) obovatum, integrum vel parum emarginatum, petiolulo proprio quadruplo vel quintuplo longius; *petala* (20) rosea, *stamina* alba stylos rubros æquanta; *germina* pilosa. Interdum subdiscolor (var. *discolor* Sud. l. c.) vel inflorescentia conferta (v. *congestus* Sud. l. c.).

GALLIA: Hautes-Pyrénées, frequens circa Cauterets.

HYBRIDA

R. SPARSUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 13 (1898); *R. PETROGENES* Sud. l. c. — Differt a *R. sparsus* turione pruinoso, aculeis validioribus, foliis subdiscoloribus. Sterilis.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Pauze-Vieux, propre Cauterets.

G. — (T. CXVII) — ***R. helveticus*** Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 36 (1870); Focke *Syn.* p. 267; *R. thyrsiflorus* Sbsp. *helveticus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 606, ex pte; non Hofmann exsicc.

Turio (21) obtusangulus, parce pilosus, glandulis raris, aculeis debilibus, parum compressis, inæqualibus instructus; *folia* 5-nata, ampla, utrinque parce pilosæ et viridia, grosse, acute et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (22) late ovatum, leviter emarginatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius, infima distincte petiolulata; *folia* ramealia 3-nata, grosse serrata; *inflorescentia* (24) laxa, parum foliosa, tomentosa, parce pilosa, sparsim glandulosa, aculeis tenuibus, reclinatis munita; *pedunculi* tenues, ascendentes (23); *sepala* tomentosa, pilosa, parce aculeata, angusta, laxe reflexa; *petala* alba; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia; *germina* pilosa.

GERMANIA: Badenia, vallée de la Wutach, entre Unterhallau et Eberlingen (Gremli); Bavaria, Hohenpeissenberg prope Weilheim (Progel).

Obs. — Les aiguillons sont plus fins que dans les autres sous-espèces de ce groupe, mais la plante est peu glanduleuse et est presque dépourvue d'aiguillons tuberculiformes. La forme de Thuringe rapportée par M. Focke au *R. helveticus* Gr. est mon *R. hebecaulis*.

Series c. — *HEBECAULES* Sud.

Conspectus specierum

I. — *Folia* caulina plerumque 5-nata; *turio* vulgo angulatus.

A. — *Folia* grosse serrata, subtus vulgo pilosa; *inflorescentia* aculeis crebris, validis armata.

B. — *Folia* plerumque minute serrata, subtus glabrescentia vel parum pilosa; *inflorescentia* inermis vel parum armata, pedunculis ascendentibus; flores vulgo rosei.....

II. — *Folia* caulina plerumque 3-nata; *turio* teres vel subteres; flores vulgo albi.....

R. Schmidelyanus Sud. 70

R. gratiosus M. et L. 71

R. hebecaulis Sud. 72

70 — (T. CXVIII) — ***R. SCHMIDELYANUS*** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. LI (1904) p. 21; *Bat.* p. 26; ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 147; Bouvet *Rub. Anj.* p. 48; *R. friburgensis* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) n° 1, non Gandg. *Rub. nouv.* p. 35 (1884); *R. apricus* Wimmer? Schmid. exsicc.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 432 (var.); Baenitz *Hb. eur.* ann. 1895, s. n. *R. contracti* (non G. Br.); Sud. *Rub. rar.* n° 63; *Bat. eur.* n° 427.

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel convexis, dense pilosus, glandulis nullis vel raris; *aculei* subæquales, majores compressi, recti vel reclinati; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, grosse et inæqualiter acuto-serrata; *foliolum* terminale (2) ovatum, vulgo emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis munitus; *stipulae* lineares, parce glandulosæ; *ramus* obtusangulus, dense pilosus, parce glandulosus, aculeis inæqualibus, majoribus compressis, falcatis munitus; *folia* 3-nata, grosse serrata, subtus viridia pilosaque, foliolis terminalibus rhombicis; *inflorescentia* (3) basi interrupta, foliosa, piloso-hirsuta, parce glandulosa, aculeis validis, reclinatis falcatis armata (4); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, 2-3-flori; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa aculeataque, post anthesin patula vel laxe erecta (5); *petala* (6, 7) alba vel dilute rosea, obovata vel oblonga, in unguem attenuata; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* pilosum. Fertilis. — Julius.

β ARVERNENSIS Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LI (1904) p. 21. — Turio obtusior, minus pilosus, heteranthus; foliola cauli terminalia latissima, breviter petiolulata; inflorescentia pallida, hirsutior, foliosa (8, 9); petala pallide rosea; *stamina* stylique pallida.

γ COARCTATUS Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 48 (1907). — Turio parum pilosus; foliolum cauli terminale obovato-cuspidatum; inflorescentia flexuosa, pedunculis ascendentibus, aculeis debilibus; *stamina* stylique pallida; *germina* glabra.

δ BREVIGLANDULOSUS Sud. in Bouv. l. c. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 428. — Turio parum pilosus; foliolum cauli terminale obovatum, basi subintegrum, cuspidatum; inflorescentia glandulis brevibus munita; *stamina* stylique pallida; *germina* parce pilosa.

ε OVATUS Sud. in Bouv. l. c. — *R. epipsilos* v. *adustus* f. *fol. subtus sericeis* Progel. — Turio parum pilosus; foliolum terminale late ovatum, basi rotundatum, breviter acuminatum; inflorescentia parce pilosa; *stamina* stylique pallida; *germina* glabra.

ζ SILVULICOLUS Sud. *Rub. tarn.* p. 31 (1909); *R. epipsilos* F. v. *adustus* f. *dense hirsuta* Progel. — Turio glabrescens; folia subtus glabrescentia; inflorescentia aculeis mediocribus; *petala* ovata, rosea; *stamina* stylique pallida, *germina* glabra.

η LONGIGLANDULOSUS Sud. *Bat. eur.* p. 26 (1904) et exsicc. n° 76. — Turio parce pilosus; folia subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis, dentibus parum profundis; *ramorum* aculei reclinati; *rachis* (10, 11) valde hirsuta, glandulis longis munita; *petala* dilute rosea. Cetera ut in typo.

ι PROPERUS Sud. *Rub. tarn.* p. 31 (1909). — Gracilis; *turio* pubescens; *serratura* æqualis, *rachis* laxe pilosa (12, 13), *petala* lata (14), alba, *stamina* stylos pallidos æquanta.

x. EIFELIENSIS ; *R. eifeliensis* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 94 ; *Flora XLII*, 235 (1859) ; *R. pyramidalis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 549, ex pte. — *Turio* dense pilosus ; folia subtus molliter et dense pilosa ; rachis (15) dense patenter villosa, aculeis debilibus armata, sepala (16) hirsuta, flores pallide rosei.

In nemoribus et sepiibus. — HELVETIA : Villarimboud, Torny-le-Grand ! (Schmidely) ; GALLIA : Sône-et-Loire, St-Emiland : *Valois*, forêt de Retz (Questier) ; Sarthe, St-Symphorien (Chenon) ; Tarn, la Sarrade ; BELGIA : Harzé, Rahier, Brume, etc. (du Pré) ; GERMANIA : Harz, Braunschweig (F. Kretzer) ; Silesia, prope Glatz (Kinscher) ; Bavaria, Traunstein (Progel). — β . GALLIA : Cantal, Mandailles, St-Julien-de-Jordanne. — γ . GALLIA : Maine-et-Loire (Bouvet). — δ . BELGIA : Woluwe (Sonnet) ; GALLIA : Maine-et-Loire, La Jaille-Yvon (Bouvet). — ϵ . GALLIA : Maine-et-Loire (Bouvet) ; BAVARIA : Waldmünchen (Progel). — ζ . GALLIA : Tarn, Massaguès, Foncouverte, Giroussens, Montcounyout. — η . GERMANIA : S-Harz, Sieberthal (F. Kretzer) ; GALLIA : Valois, forêt de Retz (Questier). — θ . GALLIA : Haute-Savoie, Chapelle Rambaud (Schmidely) ; Orne, La Lande-sur-Eure (Jourdes) ; GERMANIA : Prov. rhénane, Elms (Wirtgen). — ι . GALLIA : Tarn, Cambon. — κ . GERMANIA : Prov. rhénane, Eifel (Wirtgen).

HYBRIDA

R. SCHMIDELYANUS \times *SILVATICUS* ? ; *R. PSEUDOPILOCARPUS* Schmid *exsicc.* ; *R. flexuosus* \times *pilocarpus* ? Schmid. — Habitus *R. Schmidelyani* sed glandulae subuillæ, aculei æquales, flores rosei; fructus imperfectus.

GALLIA : Haute-Savoie, « Champelle Rambaud, plateau des Bornes » (Schmidely).

OBS. — Le suivant, dont je n'ai pas vu de spécimens, semble prendre place ici :

R. chlorocladus Sabr. O. B. Z. (1891). — *Turio* parce pilosus glandulosusque, aculeis crebris; *folia* duplicito-serrata; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum, abrupte acuminatum; *sepala* subinermia, patula; *germina* apice pilosa. — HUNGARIA : in silvula Schmachen retro balneolum Eisenbrünnel ad Posonium (Sabransky).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Stamina stylos superantia vel sequantia.

A. — *Turio* angulatus.

- a. — *Folia* grosse et inæqualiter serrata; antheræ glabré, raro parce pilosæ.
 - 1. — *Folia* subtus viridia, pilosa; *foliolum* terminale ovatum, vulgo emarginatum; *inflorescentia* pierumque armata.....
 - 2. — *Folia* superiora subtus cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale obovatum vel rhombum....
- b. — *Folia* minute serrata dentibus parum profundis.
 - 1. — Antheræ glabré; *folia* subtus molliter pubescentia, cinerascentia.....
 - 2. — Antheræ pilosæ; *folia* subtus viridia.....

B. — *Turio* teres; flores albi vel dilute rosei.....

R. Schmidelyanus Sud.

R. Borreri Bell Salt. B.

R. LEYANUS Rogers C.

R. DREJERI Jens. (Cf. n° 82).

R. TERETIUSCUS Kalt. D.

II. — Stamina stylis breviora.

A. — *Turio* angulatus.

- a. — *Inflorescentiae* rachis dense villoso-hirsuta.....
- b. — *Inflorescentiae* rachis tomentosa vel parce pilosa

B. — *Turio* subteres; rachis tomentosa, parce pilosa; serratura tenuis.....

R. AMICTUS P.-J. Müll. E.

R. GRATIFOLIUS Sud. Eb.

R. VIRIDIRAMUS Sud. Db.

B. — (T. CXIX) — **R. Borreri** Bell Salt. Ann. Nat. Hist. ser. I XV, 306 (1845); Rogers Handb. Brit. Rub. p. 61; non Blox. nec. Bab. (sec. Rogers); Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 13; *R. pauciglandulosus* var. *montisparsus* Sud. Rub. tarn. p. 36 (1909).

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 38; Sud. Bat. eur. n° 429.

Differt a *R. Schmidelyano* : turionibus debilioribus, foliis coriaceis, pallidis, subtus dense pilosis, superis leviter cinereo-tomentosis; *foliolum* caul. terminali (2) obovato vel rhombeo-obovato, integro vel parum emarginato, abrupte et breviter acuminato; pedunculis patulis. — *Turio* (1) dense pilosus, aculeis validis, crebris, glandulis sparsis, inæqualibus instructus; *dentes* acutissimi, compositi; *rachis* (3) dense villosa-hirsuta, valde armata, glandulosa; *petala* alba vel pallide rosea; *sepala* patula vel suberecta (4).

β . **DENTATIFOLIUS** Briggs Fl. Plym. 121; Journ. bot. (1894) 46; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 61; Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 19. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 63. — *Turio* angulatus, parce pilosus; *folia* grosse dentata, subtus pilis ad nervos pectinatis; *foliolum* terminale angustum, breviter petiolatum; *inflorescentia* ut in typ.

γ . **SCLEROPHYLLUS**; *R. sclerophyllus* Sud. Diagn. p. 31 (1906). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 64 ! — *Turio* dense pilosus; *folia* coriacea, subtus molliter pilosa, margini crispata; *foliolum* terminale anguste ovatum, subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* parum armata, laxe villosa, usque ad apicem foliosa, pedunculis ascendentibus.

δ . **CONOTHYRSUS**; *R. conothyrsus* Focke Syn. p. 271 (1877); *R. apiculatus* Sbsp. *conothyrsus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 583; *R. pyramidalis* f. *apraca* Kretzer in Baenitz Hb. eur. exsicc. — Exsicc. : Baenitz Hb. eur. 9035. — *Turio* angulatus; *folia* sœpe 3-nata, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum; *rachis* laxe hirsuta, parce glandulosa; flores rosei; *inflorescentia* conica.

ϵ . **CRINIGER**; *R. criniger* Linton Journ. bot. (1894), 108 (*R. Gelertii* v. *criniger*) ; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 52 (1900). — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 89. — *Folia* inæqualiter duplicito-serrata, dentibus parum profundis; *foliolum* caul. terminale anguste ovatum, sensim acuminatum, breviter petiolatum, antheræ glabré vel pilosæ in uno ramo ! flores rosei. *Inflorescentia* ut in typ.

ζ . **DISCRIPTIFORMIS**. — *Turio* parce pilosus; *folia* inæqualiter duplicito-subinciso-serrata; *foliolum* terminale rhombicum vel elliptico-obovatum, acuminatum; *inflorescentia* subinermis, pedunculis ascendentibus, laxe pilosis; flores albi vel dilute rosei.

η . **MOLLIS**. — *Turio* ramusque dense pilosi; *folia* subtus molliter pilosa ut in *R. pyramidalis*, subsimpliciter serrata; aculei debiles; *rachis* dense hirsuta.

BRITANNIA: Devon, Somerset, Dorset, Gloucester, Hereford, Hibernia, etc. (Rogers); **GALLIA**: Maine-et-Loire, Juigné (Bouvet); Tarn, Lacaune, la Montelarié. — β . **BRITANNIA**: Devon, Dorset, etc. — γ . **GALLIA**: Valois, forêt de Retz (Questier); Orne, le Mage (Jourdes). — δ . **GERMANIA**: Guestphalia, Hausberge, Vlotho, Rinteln (Focke); Hanover (F. Kretzer). — ϵ . **BRITANNIA**, HIBERNIA. — ζ . **GALLIA**: Sarthe, Crê-sur-Loir (Launay); Finistère, Huelgoat (Henry). — η . **GALLIA**: Gard, torrent des Ondes (Martin).

C. — (T. CXIX) — **R. Leyanus** Rogers Journ. bot. (1895) p. 81; *R. Drejeri* G. Jens. Sbsp. *Leyanus* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 62; *R. Augustinit* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. p. 540* (1902).

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 64.

Turio (5) angulatus, parce pilosus, aculeis inæqualibus; *folia* inæqualiter et argute mucronato-serrata, subtus pallida, valde pubescentia; *foliolum* caulimum terminale (6) ovatum, leviter emarginatum, acuminatum, infima subsessilia; *ramus* aculeis debilibus armatus, foliis superis subtus cinereo-tomentosis; *inflorescentia* densa, piloso-hirsuta (7, 8), valde glandulosa, aculeis pallidis, mediocribus, rectis reclinatis munita; *pedunculi* breves, patuli; *germina* glabra. Forma vergens in *R. granulatum* M. L.

BRITANNIA, HIBERNIA: Devon, Wilts, Bucks, Monmouth, etc. (Rogers).