

D. — (T. CXIX) — **R. teretiusculus** Kaltenb. *Fl. v. Aachen Beck.* 282 (1845); Focke *Syn. p. 300, p. p.*; Sud. *Rub. Hb. Bor. p. 55*; R. Menkei D. *teretiusculus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 557* (1902); *R. pallidiformis* Clavaud *exsicc.* (1886).

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rhen. ed. I, n° 101*; *Assoc. rub. n° 746 (R. pallidiformis)*, 904 (*R. subcanus*).

Turio teres (9), laxe pilosus, glandulis rarissimis, aculeis falcatis munitus; *folia* plerumque 5-nata, subtus viridia, pilosa, pilis ad nervos pectinatis, mediocriter et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (10) ellipticum vel rhombicum, subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *ramus* teres, aculeis falcatis, foliis subtus valde pubescentibus; *inflorescentia* elongata, foliosa, laxe hirsuta, glandulis sparsis, brevibus, aculeis crebris, brevibus, reclinatis falcatis instructa (11, 12); *sepala* tomentosa, parce aculeata, glandulis nullis vel rarissimis, sessilibus onusta, post anthesin patula; *petala* parva, obovata, alba; *stamina* alba stylis virescentibus aequantia; *germina* glabra.

β. GLAUCOVIRENS; *R. glaucovirens* Maas *Verh. B. V. Brandg.* XII, 162 (1871); Focke *Syn. p. 270*; *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 581*. — Aculei recti vel reclinati in turione inflorescentia, longiores; *sepala* tenuiter glandulosa; *petala* majora, angustiora, pallide rosea; *stamina* stylis superantia; *germina* glabra.

γ. LINGUIFORMIS Spribille. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur. n° 430*! — *Folia* caulinata 3-5-nata, acute serrata; *foliolum* terminale rhombicum, basi integrum, acuminatum; *inflorescentia* pauciflora, parum armata; *stamina* stylis superantia; *germina* pilosa; cetera ut in var. β. — Vergens in *R. hebecaulum*.

δ. OBLONGIFOLIATUS Sud. *Rub. tarn. p. 31* (1909). — Aculei ut in var. β.; *foliola* oblonga, minute serrata; *inflorescentia* aphylla.

ε. PULLUS; *R. pullus* Sud. *Rub. Pyr. p. 66* (1900). — *Turio* leviter asper; *inflorescentia* valde hirsuta, aculeis rectis; *sepala* hirsuta, glanduloso-aculeata; *stamina* stylis superantia.

GERMANIA: *Prov. rhenana*, Aachen, Bergheim; GALLIA: *Gironde*; BELGIA: Spa. — β. GERMANIA: *Posen, Saxonia, Brandenburg, Harz*, etc. (Focke). — γ. GERMANIA: *Silesia*, Trebnitz (Spribille). — δ. GALLIA: *Tarn, La Condamine*. — ε. GALLIA: *Ariège, Aulus*.

OBS. — Le suivant, dont je n'ai pas vu de spécimens, semble se placer à côté du *R. teretiusculus* Kalt. :

R. Lingua Wh. ap. Bluff et Fing. *Comp. Fl. germ.* 1 p. 686; W. et N. *Rub. germ. p. 88, t. XXXVIII*. — *Foliolum* terminale obovatum, basi cuneatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* laxa, brevis, corymbosa; *petala* lata, ovata. — GERMANIA: Minden (Weihe).

b. — (T. CXIX) — **R. viridiramus** Sud. *Rub. tarn. p. 31* (1909).

Turio (13) obsolete angulatus, glaucescens, parce pilosus, glandulis nullis vel rarissimis, aculeis debilibus, reclinatis munitus; *folia* magna, utrinque parce pilosa, subtus viridia, simpliciter et subaequaliter serrata; *foliolum* terminale (14) late obovatum vel suborbicularare, cordatum, cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia* angusta, tomentosa (15), subaphylla, parce aculeata, glandulis rarissimis, brevibus, pedunculis ascendentibus (16); *sepala* inermia, subglandulosa, in fructu laxe erecta; *petala* (17) lata, alba; *stamina* alba stylis virescentibus breviora; *germina* glabrescentia. Fertilis. Forma vergens in *R. glaucellum* Sud.

GALLIA: *Tarn, Lacabarède, Mazamet*.

E. — (T. CXIX) — **R. amictus** P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 308 (*nomen*); Genev. *Ess. Mon. p. 156* (1869); *Mon. p. 179, ex pte*; Sud. *Rub. Hb. Bor. p. 55*.

Exsicc. — *Assoc. rub. n° 749 (var.)*; Sud. *Bat. eur. n° 431*!

Turio (18) obsolete angulatus, dense piloso-hirsutus, glandulis rarissimis, aculeis brevibus, parum inaequalibus, leviter compressis, reclinatis; *folia* 3-5-nata, tenuia, supra parce pilosa, subtus viridia, molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis, subsimpliciter mucronato-serrata; *foliolum* terminale (19) ovato-orbicularare, subemarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *ramus* dense pilosus, aculeis debilibus, sparsis, obliquis munitus; *inflorescentia* brevis, foliosa, dense villoso-hirsuta (20), subinermis, glandulis sub indumento occultis, ramulis ascendenteribus, pedicellis (21) brevibus; *sepala* hirsuta, tenuiter glanduloso-aciculata, patula; *petala* (22) alba, ovata; *stamina* alba stylis breviora; *germina* parce pilosa.

β. HIRSUTIFLORENS; *R. hirsutiflorens* Sud. *Rub. Pyr. p. 65* (1900). — *Turio* angulosior, aculei validiores, folia minus pilosa, *sepala* inermia, *petala* rosea, *germina* glabra.

γ. AVIVAGUS Sud. *Rub. tarn. p. 31* (1909). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar. n° 65*! — *Turio* minus pilosus; *foliola* terminalia ovata, serratura inaequalis, *inflorescentia* angusta, minus hirsuta, *sepala* inermia, *petala* pallide rosea, *germina* glabra.

δ. GRANDIFRONS Sud. *Rub. tarn. p. 31* (1909). — *Turio* parce pilosus; aculei validi, recti; *foliola* longe cuspidata; *inflorescentia* brevis, laxa, aculeis validis, crebris, flavescentibus armata; flores albi.

GALLIA: *Marne, bois de Mersy (Levent); Seine-Inf., parc de Grigneuseville (Letendre)*. — β. GALLIA: *Ariège, Ercé; Tarn, Alban*. — γ et δ. *Tarn*.

HYBRIDA

R. AMICTUS var. δ. × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn. p. 31* (1909); *R. NECOPINUS* Sud. l. c. — Habitus var. δ. sed glandulæ raræ, folia discolora, flores rosei. Sterilis.

GALLIA: *Tarn, Marssal, prope la Sirventié*.

OBS. — Je n'ai pu trouver le *R. amictus* P.-J. M. à la Bourboule (Puy-de-Dôme), où l'a indiqué Genevier.

β. — (T. CXIX) — *R. gratifolius* Sud. *Rub. Pyr. p. 64* (1900); excl. var. β. p. 148 l. c.; *R. saltivicus* Kinscher *Reperf.* (1909) 341; *R. brachythrysus* Progel *hb. p. p.*

Turio obsolete angulatus (23), epruinosus, parce pilosus, aculeis validis; *folia* 5-nata, subtus viridia, parum pilosa, inaequaliter serrata; *foliolum* caul. terminale ovatum vel obovatum (24), acuminatum; *inflorescentia* (25) tomentosa, glandulis rarissimis, aculeis validis instructa; *sepala* (26) patula vel erecta; *petala* (27) alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis breviora; *germina* glabra vel parce pilosa.

β. PARVIFLORUS; *R. parviflorus* Figert *ap. Spribille Beitr. Rub. Prov. Schles.* (1904) p. 343, non Nutt. — *Foliolum* terminale basi rotundatum; *inflorescentia* subinermis, glandulosior; flores parvi. Hybrida?

γ. CAPRICOLLENSIS; *R. capricollensis* Spribille *in hb. Sud.*; *R. Löhri* Progel *exsicc. n° 613*. — *Foliolum* terminale emarginatum, longe acuminatum; *inflorescentia* foliosa, parum armata; *germina* pilosa.

8. RHODANENSIS. — Validus ; folia grosse et inæqualiter serrata, superiora subtus cinerascentia ; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, acuminatum ; inflorescentia subaphylla, pyramidalis ; stamna stylos æquantia, germina pilosa.

9. marginiculus. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 66 ! — Gracilis et pallide viridis ; aculei parvi ; folia subsimpliciter serrata, subtus manifeste pilosa ; foliolum terminale ovatum vel late obovatum, emarginatum, acuminatum ; inflorescentia angusta, elongata, parum armata, glandulis raris, brevissimis munita, pedunculis ascendentibus ; flores albi ; germina pilosa.

GALLIA : in Pyreneis centralibus, Luchon, Aulus ; BAVARIA : prope Kamer (Progel) ; SILESIA : prope Herrnsdorf (Kinscher). — β. SILESIA : Bolhenhain (Figert). — γ. SILESIA : Neustadt (Spribille) ; Frankenstein (Kinscher) ; BAVARIA : Waldmunchen (Progel). — δ. GALLIA : Rhône, St-Germain-en-Montagne (Gillot) — ε. GALLIA : Haute-Garonne, Eaunes.

HYBRIDA

R. GRATIFOLIUS × ULMIFOLIUS Sud. Rub. Pyr. p. 148 (1901) ; R. PLANICAULIS Sud. l. c. — Validus ; aculei æquales, glandulæ rarae ; discolor ; flores rosei. Sterilis.

GALLIA : in Pyreneis centralibus, Luchon.

OBS. — La forme suivante, dont je n'ai pas vu de spécimens, semble appartenir au groupe du *R. Schmidelyanus* :

R. Gremblachii Hal. O. B. Z. (1890) 433 ; Oest. bromb. p. 251. — *Turio* angulosus, glaucescens ; *folia* 3-5-nata ; *foliolum* terminale cordato-ovatum ; inflorescentia parum armata glandulis rubris munita ; *petala* parva, elliptica, alba ; *stamina* brevia ; *germina* pilosa. — TIROLIA, prope Hall (Gremblach).

71 — (T. CXX) — R. GRATIOSUS M. et Lef. Vers. n° 92 (1859) ; Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. 148.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 432.

Turio (1) angulatus, faciebus planis, glaber vel glabrescens, parce glandulosus ; *aculei* subæquales, compressi, recti, nonnulli parvi, aciculares, sparsi ; *folia* 5-nata (2, 3), tenuia, supra parce pilosa, subtus viridia, glabrescentia, argute mucronato-denticulata, dentibus simplicibus, inæqualibus, mucrone patulo vel refracto ; *foliolum* terminale ellipticum vel oblongum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolula ; *petiolus* aculeis reclinatis falcativis munita ; *stipulae* lineares, parce glandulosæ ; *ramus* obtusangulus, sparsim pilosus, aculeis longis, reclinatis instructus ; *folia* 3-nata, minute serrulata, subtus viridia, foliolis terminalibus obovato-cuspidatis, basi integris ; *inflorescentia* (4) brevis, obtusa, foliosa, laxe pilosa, glandulis crebris, aculeis raris, tenuibus, rectis reclinatis instructa (5) ; *pedunculi* medii ascendentes, 2-3-flori ; *pedicelli* tenues, subfasciculati ; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, tenuiter glandulosa, fere inermia, angusta, post anthesin fructum laxe amplectentia (6) ; *petala* (7, 8) elliptica vel obovata, parva, saepè bifida, vive rosea ; *stamina* rosea stylos basi roseos æquantia ; *germina* glabra ; *receptaculum* pilosum. Pollen admixtum (9). — Julius.

β. SORICINENSIS Sud. Rub. tarn. p. 31 (1909). — Serratura inæqualis ; foliola rhombeo-obovata ; stamna rubra stylos roseos superantia, sepala subreflexa. Pollen parum admixtum ; inflorescentia parce glandulosa.

γ. MISELLUS. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 433 ! — Folia caulinæ 3-4-nata, superiora subtus cinereo-tomentosa ; foliolum terminale obovatum, cuspidatum ; inflorescentia subaphylla, densa ; sepala tomentosa ; petala ovata ; stamna alba vel roseola stylos virentes æquantia ; germina pilosa.

In memoribus. — GALLIA : Aisne, bois de Lévignen (Lefèvre, Questier) ; BELGIA : Louette-St-Pierre (Gravet) ; Spa. — β. GALLIA : Tarn, Sorèze. — γ. GALLIA : Haute-Garonne, in silva Bouconne, prope Brax ; Buzet.

HYBRIDÆ

R. GRATIOSUS × MUELLERI (grex) ; R. GRATIOSIFORMIS Sud. Diagn. p. 32 (1906). — Differt a *R. gratioso* foliolis latioribus, mediocriter serratis, terminalibus late ovatis, cordatis, inflorescentia densa. Parum fertilis.

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

R. GRATIOSUS × SCHMIDELYANUS ? ; R. SEMIGRATIOSUS Sud. Diagn. p. 31 (1906). — Inflorescentia *R. gratiosum* revocat ; serratura *R. Schmidelyanum*. Sterilis.

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier),

R. GRATIOSUS × TERETICAULIS ?: R. GRATIOSIFRONS Sud. Diagn. p. 31 (1906). — Habitus *R. gratiosi* sed *turio* dense pilosus, foliolis obovatis, dentes minus patulisi. Flores ?

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia subtus viridia, raro cinereo-tomentosa et tum flores rosei.

A. — Folia mucronato-denticulata ; foliolum terminale obovatum vel ellipticum.

- a. — Petala vive rosea ; turio glabrescens.....
- b. — Petala pallide rosea ; turio pilosus, pruinosis

R. gratiosus M. et L.
R. EBROVICENSIS Sud. b.

B. — Folia mediocriter et acute serrata ; foliolum caul. terminale emarginatum.

- a. — Stamina alba stylos vulgo superantia ; foliolum terminale ovatum.....
- b. — Stamina rubra stylos breviora ; foliolum terminale suborbiculare.....

R. SERRATULIFOLIUS Sud. B.
R. NAPOCHARIS Sud. Bb.

II. — Folia discolora ; foliolum terminale ellipticum ; flores albi.....

R. ELLIPTICIFRONS Sud. C.

b. — (T. CXXI) — R. eburovicensis Sud. hb.

Turio (1) glaucescens, pilosus ; *folia* subtus pubescentia ; *foliolum* terminale (2) oblongo-obovatum, emarginatum, abrupte acuminatum ; *rachis* (3) breviter pilosa, aculeis validis, reclinatis falcativis armata ; *pedunculi* patulo-ascendentes ; *sepala* in fructu erecta (4) ; *petala* (5) dilute rosea ; *stamina* alba stylos virentes parum superantia ; *germina* hirsuta. — Habitus *R. Drejeri* Jens. sed *turio* pilosior, foliola angusta, glandulæ breviores, antheræ glabrae, germina pilosa.

GALLIA : Orne, Le Mage (Jourdes).

B. — (T. CXXI) — R. serratulifolius Sud. in hb. Mus. Paris. ; Rub. tarn. p. 31 (1909).

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 67.

Differt a *R. gratioso* foliis acute et mediocriter serratis, foliolo terminali (7) ovato, cordato ; inflorescentia (8, 9) laxiore, parce aculeata, floribus pallide roseis. Stamina alba stylos virentes superantia.

$\beta.$ INFLEXUS ; *R. inflexus* Assoc. rub. n° 435 (1881) ; *R. corymbosus* v. *inflexus* N. Boul. — Stamina stylis breviora.

GALLIA : Tarn, Valois, Rhône, Cher ; BELGIA : Vresse (Gravet) ; GERMANIA : Prov. rhenana, Erdorf-Eifel (Bodewig). — $\beta.$ GALLIA : Saône-et-Loire, St-Prix, bois du Haut-Folin.

HYBRIDÆ

R. SERRATULIFOLIUS \times *ULMIFOLIUS* ; *R. NEGOTIOSUS* Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909). — Glandulæ raræ ; discolor ; aculei æquales ; flores rosei ; sterilis.

GALLIA : Tarn, Marssal, Saint-Martin-Laguépie.

R. SERRATULIFOLIUS \times *TOMENTOSUS* *Lloydianus* ; *R. OBLONGICARPUS* Sud. hb. — Discolor ; dentes lati. Substerilis.

GALLIA : Rhône, Tarare (Jordan).

R. SERRATULIFOLIUS \times *AMICTUS* v. *grandifrons* ; *R. FRIVOLUS* Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909). — Differt a *R. serratulifolio* inflorescentia armata, laxa, staminibus brevibus.

GALLIA : Tarn, Marssal.

R. SERRATULIFOLIUS \times *TERETICAULIS* ? ; *R. OBTUSICAULIS* Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909). — Turio obtusus, foliola obovata, rachis pilosa, petala alba, stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Crespinet.

b. — (T. CXXI) — *R. napocharis* Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909).

R. serratulifolio similis a quo differt : turione (11) glabrescenti, foliolo caul. terminali (12) suborbiculari, cordato, inflorescentia (13, 14) aculeis validioribus, lutescentibus armata. Petala (15) rubra, stamina rubra stylis breviora.

GALLIA : Tarn, Travanet, via Arifat.

C — (T. CXXI) — *R. ellipticifrons* Sud. Fl. Toul. p. 75 (1907).

Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 484 !

Turio (16) glabrescens, faciebus planis, aculeis subæqualibus, compressis, rectis vel reclinatis, nonnullis reductissimis, glandulis rarissimis instructus ; *folia* 5-nata, ampla, supra parce pilosa, subtus pilosa, cinereo-tomentosa, argute mucronato-denticulata ; *foliolum* terminale (17) ellipticum, subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis reclinatis, glandulis rarioribus, foliis discoloribus, minute denticulatis ; *inflorescentia* (18, 19) aculeis sparsis armata ; *petala* angusta (20), alba vel roseola ; *stamina* alba stylis superantia ; *germina* glabra ; *sepala* in fructu patula vel erecta. Fertilis.

GALLIA : Haute-Garonne, Balma (Timbal), St-Geniès.

72 — (T. CXXII) — *R. HEBECAULIS* Sud. Rub. Pyr. p. 63 (1900) ; ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 148 ; *R. inectus* Genev. Mon. p. 105, p. p., non P.-J. Müll. ; *R. helveticus* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 606, ex pte ; *R. leptocaulon* (B. et Let.) var. *aciphyllus* Progel Fl. Amtsb. Wald. p. 6 (1889).

Gracilis ; *turio* debilis, prostratus (1), obsoletus angulatus vel teres (2), pilosus, vulgo subglaucescens, sparsim glandulosus ; *aculei* subinæquales, maiores compressi, recti vel reclinati, minores rari, aciculares ; *folia* plerumque 3-nata, raro 4-5-nata, supra parce pilosa, subtus pilosa, viridia vel interdum cinerascentia, mediocriter et inæqualiter serrata ; *foliolum* terminale (3, 4) ovatum, interdum late rhombeum vel breviter obovatum, basi subemarginatum, acuminatum ; *petiolus* pilosus, parce glandulosus, aculeis debilibus munitus ; *stipulae* lineares, tenuiter glandulosæ ; *ramus* subteres, pilosus, glandulis brevibus, aculeis debilibus instructus ; *inflorescentia* (5) brevis, obtusa, ± foliosa, laxe pilosa, glandulis brevibus, aculeis tenuibus vel mediocribus munita (6), pedunculis meditis patulæ ; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, parce glandulosa vel aculeata, post anthesin patula vel fructum amplectentia (7) ; *petala* (8, 9) ovata, elliptica vel obovata, alba vel dilute rosea ; *stamina* alba stylis superantia ; *germina* glabra vel pilosa ; *receptaculum* pilosum ; *pollen* (10) vulgo parum admixtum. — Junius-julius.

$\beta.$ SERRATIDENS Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909). — Folia argute serrata, subtus cinereo-tomentosa.

$\gamma.$ CHÆROPHYLLOIDES ; *R. chœrophylloides* Spribille Abh. Bot. Ver. Prov. Brandg. XLI, 212 (1899) ; *R. serpens* \times *vestitus* f. *opaca* Utsch ap. Baenitz Hb. eur. n° 9574. — Exsicc. : Bat. eur. n° 435 ! — Folia subtus pubescentia, dentibus latis, simplicibus, parum profundis, inæqualibus ; foliolum terminale ovatum, cordatum, acuminatum ; germina glabra ; rachis breviter pilosa.

$\delta.$ VILLOSIFOLIUS Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909). — Folia grosse serrata, subtus villoso-velutina, plerumque 5-nata ; germina pilosa.

$\epsilon.$ VERLOTII ; *R. Verlotii* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 68 (1902). — Foliolum terminale late rhombeum, fere integrum ; inflorescentia pyramidalis, lata, parce glandulosa ; germina pilosa.

$\zeta.$ GRAVETII Sud. Bull. Soc. Bot. Belg. (1910) p. 206. — Folia magna ; foliolum terminale sensim acuminatum ; inflorescentia subinermis, pedunculis ascendentibus ; sepala subreflexa. — In umbrosis.

$\eta.$ OBLONGIFOLIUS Sud. Rub. Pyr. p. 64. — Foliolum terminale oblongum, acuminatum ; dentes tenues ; inflorescentia armata, elongata.

$\theta.$ AGGLOMERATUS ; *R. agglomeratus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 119 (1869) et exsicc. n° 103. — Turio dense pilosus ; folia subtus molliter pilosa, dentibus mediocribus ; inflorescentia densa, pedicellis brevibus, glandulis parum evidentibus ; petala dilute rosea.

In nemoribus montosis siliceis. — GALLIA : Tarn, Vendée, Aisne, Oise, etc. — BELGIA : Modave (Aigret). — GERMANIA : Guestphalia, Prov. rhenana, Thuringia, Bavaria. — $\beta.$ GALLIA : Tarn, Alban, Trébas. — $\gamma.$ SILESIA (Spribille). — $\delta.$ GALLIA : Tarn, le Carrelié. — $\epsilon.$ GALLIA : Isère, St-Angel, prope Grenoble. — $\zeta.$ BELGIA : Louette-St-Pierre (Gravet). — $\eta.$ GALLIA : in Pyrenæis aurigeranis, Trein. — $\theta.$ GALLIA : Vosges, St-Dié, forêt du Cambberg (N. Boulay).

HYBRIDÆ

R. HEBECAULIS \times *TARNENSIS* Sud. Rub. *tarn.* p. 32 (1909) ; *R. devius* Sud. l. c. — Differt a *R. hebecauli* glandulis rarioribus, inflorescentia elongata, floribus roseis, sterilibus.

GALLIA : Tarn, Foncouverte, prope Bellegarde.

R. HEBECAULIS \times *ULMIFOLIUS* Sud. Rub. *tarn.* p. 33 (1909) ; *R. GRACILISPINUS* Sud. l. c. — Turio obtusangulus ; folia 5-nata, discolora, glandulæ subnullæ, flores vive rosei. Sterilis.

GALLIA : Tarn, inter Fabas et Foncouverte, la Sarrade, Escoussens.

R. HEBECAULIS × *LACERTOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909); *R. LAXIFRUCTUS* Sud. *hb.* — *Turio* ut in *R. hebecauli*, folia 5-nata *R. lacertosum* revocant; flores albi.

GALLIA : *Tarn*, Cambon, Réalmont.

R. HEBECAULIS var. β . × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909); *R. BRACTEOLATUS* Sud. *l. c.* — *Turio* glaber, folia discolora, grosse serrata, inflorescentia parum glandulosa, bracteis latis; flores albi.

GALLIA : *Tarn*, inter Alban et Trébas.

R. HEBECAULIS × *ERRATICUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909); *R. SEMIERRATICUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. hebecauli* aculeis inaequalioribus, glandulis crebrioribus, floribus roseis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Bellegarde, la Sarrade.

R. HEBECAULIS var. δ . × *OMALUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909); *R. PRÆCORRUPTUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. hebecauli* var. δ . foliis argute serratibus, pilis brevioribus, floribus sterilibus.

GALLIA : *Tarn*, La Calquière.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Foliolum caulinum terminale orbiculare vel obovato-orbiculare.

- A. — Folia superiora subtus cinereo-tomentosa.....
- B. — Folia, etiam superiora, subtus viridia; foliolum caulinum terminale acuminatum.
 - a. — Stamina stylos superantia; serratura grossa
 - b. — Stamina stylis breviora.
 - 1. — Folia caulinata 5-nata, ± grosse serrata.....
 - 2. — Folia caulinata 3-nata, minute serrata.....

II. — Foliolum cauli terminale ovatum, emarginatum, acuminatum.

- A. — Stamina stylos superantia.
 - a. — Turio pilosus; inflorescentia parum armata; sepala patula.....
 - b. — Turio pilosus; inflorescentia aculeis validis, crebris, rectis armata; sepala erecta.....
 - c. — Turio glabrescens, glaucescens.....
- B. — Stamina stylis breviora.
 - a. — Folia superiora subtus viridia; inflorescentia densa.
 - 1. — Flores albi; folia grosse serrata.....
 - 2. — Flores rosei; folia minute et æqualiter serrata.....
 - b. — Folia superiora subtus pallida, ± cinereo-tomentosa; inflorescentia vulgo laxa.....

III. — Foliolum caulinum terminale obovatum.

- A. — Folia minute serrata; Rubi vulgo discolores.
 - a. — Stamina stylos superantia.....
 - b. — Stamina stylis breviora.....
- B. — Folia grosse serrata, subtus viridia.....

IV. — Foliolum cauli terminale angustè rhombeum.....

b. — (T. CXXIII) — *R. Waisbeckeri* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 325; *R. brachyadenes* Waisb. ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9505 (1896), non P.-J. Müll.

Differt a *R. hebecauli* serratura (1) acuta, inaequali; aculeis crebris, validis, in ramo inflorescentiaque subrectis (2); pedicellis valde armatis; sepalis aculeatis, erectis (3).

HUNGARIA occid.: prope Güns (Waisbecker).

c. — *R. scabriformis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 322; *R. helvetica* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9049, non Greml.

Turio glabrescens, pruinosus, aculeis subæqualibus, falcatis, glandulis nullis vel raris munitus; *folia* subtus viridia et parum pilosa, grosse serrata; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* densa, parum glandulosa; *stamina* stylos superantia.

GERMANIA : Badenia, Kastelberg, prope Waldkirch (Goetz).

d. — (T. CXXIII) — *R. condensatus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 39 p. 167; *R. densiflorus* Greml. *Beit. Fl. Schw.* p. 36 (1870); *R. corymbifer* Boul. et Let. exsicc. (1883).

Exsicc. — Focke *Rub. sel.* n° 76; *Assoc. rub.* n° 588, 589; Ch. Magnier *Fl. sel.* n° 822; Sud. *Rub. rar.* n° 68!

Turio (4) subteres, pilosus, epruinosus, glandulis rarissimis, aculeis reclinatis instructus; *folia* 3-nata, subtus viridia et parce pilosa, grosse serrata; *foliolum* terminale (5) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *inflorescentia* foliosa, densa, parum armata, glandulis brevibus (6), pallidis munita; *sepala* in fructu erecta; *petala* alba; *stamina* stylis breviora vel eos vix æquantia (7); *germina* pilosa.

β . DISCRIPTIFRONS; *R. discruptifrons* Sud. *Diagn.* p. 32 (1906). — Folia acute, duplicato-subinciso-serrata; aculei tenues, breves; rachis breviter pilosa; stamina brevissima.

γ . LASIANDER; *R. albicomus* f. *lasiandra* Projel *hb.* — Foliolum terminale breviter obovatum, subemarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia pyramidalis, aculeis crebris munita, rachide tomentosa; sepala dense aculeata; styli rufi, germina glabra, antheræ pilosæ. *R. teretiusculo* Kalt. similis sed folia 3-nata.

δ . COMPTULUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 436! — Foliolum cauli terminale ovato-rhombeum; inflorescentia aphylla, glandulis rarissimis, brevibus.

GERMANIA : *Prov. rhénana*, Saarbrücken (Bodewig); *Alsacia*, la Reissbach, propre Weissenburg (Müller); GALLIA : *Seine-Inf.*, les Moulineaux, forêt de l'Essart (Lefèvre); *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier); HELVETIA : Wilchingen (Greml.). — β . GERMANIA : *Alsacia*, Weissenburg (Müller). — γ . AUSTRIA : *Tirolia*, Kufstein (Progel). — δ . GALLIA : *Tarn*, Grésigne.

HYBRIDA

R. CONDENSATUS? × *MACROPHYLLUS*; *R. CUSPIDIFOLIUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 111 (1859). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 69! — *Turio* planus, hirsutus, aculeis debilibus, parum inæqualibus, glandulis raris instructus; *folia* ut in *R. macrophyllum*; inflorescentia angusta, hirsutior quam in *R. condensato*; flores dilute rosei, staminibus brevibus; *sepala* patula. Parum fertilis.

GERMANIA : *Alsacia*, Lauterbach (Müller).

e. — *R. sorcinensis* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909).

Diffr. a *R. hebecauli* foliis mucronato denticulatis, petalis roseis, staminibus roseis stylis roseis brevioribus. Folia magna; germina glabra. *R. gratioso* similis.

GALLIA : *Tarn*, Sorèze, bois de la ville.

f. — *R. tenuipilus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 131 (1901).

A *R. hebecauli* distinguitur: foliis vulgo subdiscoloribus, inflorescentia elongata, staminibus stylis rubris brevioribus vel eos aequantibus.

g. *HIRSUTISEPALUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 32 (1909). — Foliolum terminale subrhombatum, acutum; inflorescentia aphylla, laxa, sepala hirsuta.

γ. *TENER* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 70 ! — Foliolum terminale subobovatum, cuspidatum; inflorescentia laxa; styli virides.

δ. *MOGGRIDGEI*; *R. Moggridgei* Burnat in hb. Bicknell. — Aculei tenues; folia subtus cinereo-tomentosa, rachis tomentosa, breviter pilosa, glandulis raris, brevibus munita.

ε. *LATIPELATUS*. — Folia subdiscolora, rachis tomentosa, glandulis sparsis, longis; petala lata, rosea, stylis rubri.

GALLIA : in *Pyrenæis centralibus*, val de Burbe; *Tarn*. — β, γ, ε. *Tarn*. — δ. ITALIA : Liguria, Germini di Bajardo, propre San Remo (C. Bicknell).

HYBRIDÆ

R. TENUIPILUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 131 (1901); *R. BURBENSIS* Sud. l. c. — Aculei subæquales, glandulæ nullæ, folia discolora, flores rosei, steriles.

GALLIA : in *Pyrenæis*, val de Burbe, prope Luchon.

R. TENUIPILUS v. ε × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. PERSTERILIS* Sud. l. c. — Validus, discolor, parum heteracanthus, flores rosei, staminibus brevibus; sterilis.

GALLIA : *Tarn*, bois du Cayla.

B. — (T. CXXIII) — *R. salisburgensis* Focke *Syn.* p. 280 (1877); *R. Caflischii* B. *R. salisburgensis* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 588; *R. compactus* Utsch, *p.p. ap.* Baenitz *Hb. eur.*

Exsicc. — Progel *Rub. exsicc.* n° 20, 37, 68, 81, 103, 203; Baenitz l. c. n° 9938, 9939, 9980.

Turio teres vel leviter angulosus (8), parce pilosus; *folia* 3-4-5-nata, subtus molliter pilosa, cinereo-tomentosa, grosse et subæqualiter serrata, dentibus parum profundis; *foliolum* terminale suborbiculare (9), basi cordatum, acutum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia* mediocris, basi foliosa, subinermis, laxa pilosa (10), glandulis brevibus, pedicellis tenuibus; *sepala* tomentosa, breviter glandulosa, imperfecte reflexa; *petala* parva, pallide rosea; *stamina* alba stylos virentes æquantia (11); *germina* glabra.

β. *ACUTIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 437. — Foliola acuta, inflorescentia pyramidalis aculeis pallidis, falcatis armata, stamina stylos superantia; germina pilosa.

γ. *RUBRISTYLOS* Sud. l. c. — Foliola ampliora, parum emarginata; inflorescentia laxa, armata, stamina stylis roseis breviora.

δ. *ORBIFER* Sud. l. c. — Dentes profundi, rami aculei validi; petala orbiculata; stamina stylis virentibus breviora.

BOHEMIA, BAVARIA, SILESIA, AUSTRIA BOREALIS. — β, γ, δ. GALLIA : *Tarn*.

Obs. — Le suivant semble voisin du *R. salisburgensis* F.; je n'en ai pas vu de spécimens:

η. *vestitifolius* Fritsch *ap.* Hal. Oest. bromb. p. 252 (1891). — A *R. salisburgensis* F. dignoscitur: turione pilosore, germinibus pilosis, petalis albis. — AUSTRIA, Gloggnitz (Richter).

C. — (T. CXXIII) — *R. morifolius* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 33, p. 164.

Turio validus, teres, epruinosus, laxe pilosus, subeglandulosus, aculeis debilibus, reclinatis, aciculis rari instructus; *folia* magna, 3-5-nata, subtus viridia et parce pilosa; *foliolum* terminale orbiculare (12), cordatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, omnia marginibus sese tegentia; *inflorescentia* brevis, obtusa, inferne foliosa, densa, hirsuta, aculeis lutescentibus, glandulis crebris, longis munita (13); *sepala* aculeata, erecta; *petala* alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra.

θ. *HYPATER*; *R. hypoater* Sud. *Diagn.* p. 32 (1906). — Turio dense pilosus; folia obscure viridia, subtus valde pilosa; glandulæ raræ, breves, flores rosei. — An *R. morifolius* × *vestitus*?

GERMANIA : Alsacia, de Climbach à Bobenthal (Müller). — β. Alsacia, la Reissbach (Müller).

b. — *R. politulus*; *R. hirsutus* var. *politulus* Progel, hb.

Diffr. a *R. morifolius* P.-J. Müll. turione appresse piloso, rachide tomentosa, epilosa, breviter et parce glandulosa, staminibus stylis brevioribus. Folia caul. 5-nata, foliolum terminale orbiculare, cordatum, sensim acuminatum, petiolulo proprio 3-4-plo longius; flores albi, germina glabra.

GERMANIA : Bavaria, Waldmunchen, Cerchow, Waging, prope Traunstein (Progel).

HYBRIDA

R. POLITULUS × *BIFRONS*; *R. POLITULIFORMIS* Sud. *Bull. Ac. g. bot.* (1911) p. 40; *R. bifrons* × *epipsilos*? Progel. — Diffr. a *R. politulus* foliis discoloribus, floribus roseis, substerilibus, aculeis subæqualibus.

BAVARIA : Waging, prope Petting (Progel).

c. — *R. nanus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 327; *R. condensatus* Goetz *ap.* Baenitz *Hb. eur.* non P.-J. Müll.; *R. pulchellus* Progel, non Hol.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9523.

Diffr. a *R. morifolius* P.-J. Müll.: turione appresse piloso, foliis parvis, minute serratis, caulinis 3-natis; inflorescentia pauciflora, tomentosa, parum pilosa, glandulis brevibus, aculeis debilibus, sparsis munita. — Foliolum terminale late ovatum vel obovato-orbiculare, basi leviter emarginatum; flores albi vel pallide rosei; stamina brevia.

θ. *VOGESIGENUS* Sud. in hb. Müller. — Inflorescentia armata, sepala subreflexa.

GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz); Bavaria, Waging (Progel); GALLIA : Tarn, Grésigne, Sidobre, Travanet, etc. — β. GALLIA : Vosges, bois de St-Gorgon, près de Rambervilliers (Boulay).

HYBRIDA

R. NANUS × MICANS pauciglandulosus Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. MOLLICAUUS* Sud. *l. c.* — Subdiscolor, folia 5-nata, inflorescentia magna. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, forêt de Grésigne.

D. — (T. CXXIII) — **R. podophylloides** Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 57 (1902); *R. podophyllus* v. *gracilis* Schmid. *exsicc.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 438.

Turio subteres, pilosus, parum glandulosus; *folia* 3-5-nata, argute denticulata, subtus piloso-subvelutina, viridia vel cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale obovatum (14), basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum; inflorescentia brevis et flores (15, 16) ut in *R. hebecauli*.

β. *PARVULIDENS*; *R. parvulidens* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905), 327. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9524 (s. n. *R. commixti*, non P.-J. Müll.) — Virescens; inflorescentia angusta, densa, parum armata; stamna stylos æquantia.

γ. *OBORANUS*; *R. oboranus* Spribille *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandg.* (1900) p. 167. — Virescens; aculei caulinii breves, foliola latiora, mucronato-dentata; inflorescentia laxa, parum pilosa, pedunculis patulis, aculeis tenuibus munita.

GALLIA : *Tarn*, *Hte-Garonne*, *Sarthe*, *Cher*, *Aisne*; HELVETIA. — β. GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz). — γ. SILESIA : *Obora*, Ratibor (Spribille).

HYBRIDÆ

R. PODOPHYLLOIDES × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. CUSPIDATIFOLIATUS* Sud. *l. c.* — Validus, turio pruinosis, folia 5-nata, discolora. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Crespinet.

R. PODOPHYLLOIDES? × ... ?; *R. CINERASCENS* Bor. *Fl. Cent. ed. 3* p. 197 (1857), non Wh.; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 58; non *R. cinereus* Godr. — Habitus *R. podophylloidei* sed turio dense pilosus, inflorescentia brevis, foliosa, diffusa, laxa, parum pilosa; stamna stylos vix æquantia: germina dense tomentosa. Sterilis.

GALLIA : *Cher*, forêt d'Allogny (Déséglise).

b. — *R. subjunctus* Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909).

Folia subtus dense pilosa, rachis hirsuta, stamna stylis breviora. Manifeste discolor.

GALLIA : *Tarn*, Crespinet, la Sarrade, Mirandol, St-Amans.

HYBRIDÆ

R. SUBJUNCTUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. SUBJUNCTIFORMIS* Sud. *l. c.* — Habitus *R. subjuncti* sed eglandulosus validusque, flores rosei, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Crespinet, St-Amans.

R. SUBJUNCTUS × PERVAGUS? Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. SUBINTEGERRIMUS* Sud. *l. c.* — Turio angulatus, glandulis rarissimis, aculeis validis; folia 3-4-5-nata, argute serrulata, superiora cinereo-tomentosa; foliolum terminale obovatum; rachis parum pilosa, glandulosa, petala rosea, sepala patula. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, La Calquière.

E. — (T. CXXIII) — **R. Lebelianus** Sud. *Diagn.* p. 32 (1906).

Turio leviter angulatus, dense pilosus; *folia* grosse et acute serrata, subtus dense pilosa; *foliolum* terminale obovatum (17), integrum, acuminatum; *ramus* valde pilosus, parum armatus, foliis subtus viridibus; *inflorescentia* brevis, lata, corymbosa, subinermis, coactili-hirsuta (18), pedunculis (19) longis, patulo-ascendentibus; *petala* (20) ovata, pallide rosea, *stamna* alba stylos basi roseos æquantia; *germina* glabrescentia. Habitus *R. Menkei* Wh. sed parum heteracanthus, turio laevis.

β. *LETENDREI*; *R. Letendrei* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 568 (1883), 727 (s. n. *R. vestiti*); Ch. Magnier n° 824. — Inflorescentia elongata, foliosa, minus piloso-coactilis; turio parum pilosus.

GALLIA : *Manche*, Chiffrevault, Valognes (Lebel). — β. *Seine-Inf.*, Les Moulineaux, forêt de l'Essart.

b. — (T. CXXIII) — *R. curtipetiolulatus* Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909).

Turio leviter angulatus, pilosus; *folia* 3-4-nata, inæqualiter duplicito-serrata, subtus piloso-subvelutina, sœpe cinerascentia; *foliolum* terminale anguste rhombicum (21), acuminatum, petiolulo proprio fere sextuplo longius; *inflorescentia* brevis, lata, corymbosa, laxe pilosa, parum armata (22); *sepala* patula; *flores* albi, petalis latis (23), staminibus brevibus; *germina* glabra.

β. *PESIANUS*; *R. Pesianus* Gremli p. p.; *R. vagus* Pesianus Gremli ap. Burnat *Fl. Alp. Marit.* III (1899). — Folia subtus hirsuti, inflorescentia elongata, germina tomentosa.

GALLIA : *Tarn*, St-Martin-Laguépie. — β. ITALIA : *Liguria*, M^o Bignone (C. Bicknell).

Subsectio C. — Radulæ Focke (pr. max. pte).

Characteres serierum

a. — *MICANTES* Sud. in Bouvet *Rub. Anj.* p. 49 (1907). — Folia, saltem ramealia superiora, subtus cinereo vel alboretomentosa. Rubi vulgo validi, foliis caulinis plerumque 5-natis. Crescent in locis apertis, ad silvarum margines.

b. — *CONCOLORES* Sud. in Bouv. *l. c.* p. 52. — Folia omnia subtus viridia, raro superiora subtus cinerascentia, caulinis 3-5-nata. Crescent in nemoribus.

Series a. — *MICANTES* Sud.

Conspectus specierum

I. — Sepala in fructu reflexa; stamna stylos superantia.

A. — Inflorescentiae aculei validi; folia subtus pubescentia.

a. — *Turio* glaber vel parce pilosus.....

b. — *Turio* dense pilosus; folia inæqualiter serrata.....

R. *Radula* Wh. 73

R. *Genevieri* Bor. 74

R. *apiculatus* Wh. 75

B. — Inflorescentiae aculei debiles, sparsi; folia subtus ± velutina.....

R. *micans* Godr. 76

II. — Sepala post anthesin patula vel erecta; stamna longa vel brevia.....

73 — (T. CXXIV) — **R. RADULA** Wh. in Boenningh. *Prod. Fl. Monast.* p. 152 (1824); W. et N. *Rub. germ.* p. 89 t. XXXIX; Focke *Syn.* p. 320; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 564; Gremli *Beitr. Fl. Sch.* p. 42; Aresch. *Som. Obs. Rub.* p. 125; Hal. *Oest. bromb.* p. 253; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 89, (excl. var.); Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 148; *R. decipiens* P.-J. Müll. *Vers.* n° 98 (1859); *R. Baenitzii* Utsch in Baenitz *Hb. eur. an.* 1896, (non 1897); *R. rufifloris* Bayer *Bot. excurs.* (1869) p. 299, non Genev.; *R. rufis* \times *bifrons* Utsch; *R. leucophyllus* G. Br. *exsicc.*

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 88, 89; ed. 2 n° 26, 27; Lindg. *Rub. exsicc.* n° 23 (f. *microphylla*), 21, 22; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 39, 75, 135; Favrat *Rub. Helv.* n° 25; *Assoc. rub.* n° 738, 897, 898, 948, 1023, 1024, 1025, 1026, 1082, 1083, 1168; *Rub. gall.* n° 36; Baenitz *Hb. eur.* n° 8569, 9578 (p.p.); Sud. *Bat. eur.* n° 81, 439, 440.

Turio arcuatus (1), validus, angulatus (2), faciebus planis vel leviter excavatis, parce pilosus, glandulosus, asper; *aculei* inaequales, maiores validi, compressi, recti, ad angulos dispositi, minores breves, crebri, aciculares vel papulae-formes; *folia* 5-nata (3), supra fere glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, breviter pubescentia, acute et inaequaliter mucronato-serrata, dentibus diverse patulis; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum, basi integrum vel leviter emarginatum, satis longe acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, infima petiolulata, rhomboides; *petiolus* supra planus, pilosus, aculeis falcatis munitus; *stipulae* lineares, glandulosae; *ramus florifer* angulatus, pilosus, asper, aculeis majoribus reclinatis falcatis armatus; *folia* 3-nata, discolora, foliolis terminalibus rhomboides; *inflorescentia* (4) pyramidalis, saepe usque ad apicem foliosa, laxe piloso-hirsuta, glandulis crebris, inaequalibus, aculeis numerosis (5), validis, majoribus reclinatis subrectis armata; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, 2-3-flori; *sepala* cinereo-tomentosa, hirsuta, glandulosa, aculeata, in flore et fructu reflexa (6); *petala* late oblongo-ovovata (7, 8), alba vel dilute rosea; *stamina* alba virescentes superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen admixtum. — Julius.

β. *POLYBELUS*; *R. polybelus* Sud. *Diagn.* p. 34 (1906). — Aculei crebri; folia subtus pilosa; foliolum terminale subemarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia angusta, densa, parum glandulosa.

γ. *INDUSIATIFORMIS*; *R. indusiatus* (Focke) Sabrs. *exsicc.* — Serratura parum inaequalis; folia subtus sericeo-micantia; rachis dense hirsuta.

δ. *RADULIFLORUS*. — Aculei crebri, mediocres; folia magna, grosse et inaequaliter dentata; foliolum caul. terminale late cordato-ovatum, acuminatum; rachis breviter pilosa, aculeis crebris munita. Cetera ut in typo. Foliolum figura *R. pustulatum* revocat.

In virgulis et marginibus silvarum. — DANIA, SCANIA, GERMANIA BOREALI-OCCIDENTALIS, AUSTRIA, HUNGARIA, HELVETIA, GALLIA: *Sarthe*, *Aisne*, *Mayenne*, *Haute-Savoie*: BRITANNIA, BELGIA. — β. GALLIA: *Marne*, bois de Rilly (Levent). — γ. STYRIA: *Soechau* (Sabransky). — δ. STYRIA: Roesenberg prope Soechau (Sabransky).

HYBRIDÆ

R. RADULA \times *SULCATUS*?; *R. BIACANTHUS* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 208. — Differt a *R. Radula* Wh. foliis subtus parum cinerascentibus, floribus sterilibus.

HUNGARIA: Bakabanya, in colle Prielozok (S. Kupcok).

Obs. — Le *R. Sabranskyanus* = *bifrons* \times *Radula* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 308 (non Hayeck) est d'origine douteuse. — *Turio* teres, pubescens, aculeis subaequalibus; glandulæ rarae; folia subtus mollier pubescentia, cinerascentia; inflorescentia breviter pilosa, parce glandulosa, aculeis validis, rectis armata, pedunculis patulis; flores rosei, steriles. — HUNGARIA: Bakabanya, Prielozok (Kupcok).

R. RADULA \times *ULMIFOLIUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 206; *R. RADULIFORMIS* Sud. l. c. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 441! — Differt a *R. Radula* Wh. turione pruinoso, aculeis subaequalibus, glandulæ inflorescentiæ brevioribus, petalis orbicularibus; sterilis.

BELGIA: Bohan Barvaux (du Pré).

R. RADULA \times *BIFRONS* Sud.; *R. INEQUALIS* Hal. in *Verh. z.-b. Wien* (1883), 662; *Oest. bromb.* p. 245; *R. carpaticus* Sabrs. O. B. Z. (1887) non Borb. et Sabrs. l. c. (1886), 92. — Minus heteracanthus quam *R. Radula*, folia minute serrata ut in *R. bifronti*; discolor, sterilis.

AUSTRIA: Gloggnitz (Halacsy); GERMANIA: *Prov. rhen.*, Bullay (Bodewig).

R. RADULA \times *TOMENTOSUS* Lloydianus Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 148 (1905); *R. ANOMALUS* P.-J. Müll. in *Flora* p. 136 (1858); *Pollich.* 16, p. 102; *R. megathamnus* A. Kern. *Nov. pl. spec.* III p. 27; *R. albohirtus* Sabrs. *exsicc.* — Exsicc.: Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 4 n° 40, 125, 126, 127; ed. 2 n° 8, 60; Sud. *Rub. rir.* n° 71! — Glandulæ sparsæ; discolor, dentes lati, inflorescentia laxa, multiflora. Sterilis.

GERMANIA: *Prov. rhenana* (Wirtgen); *Alsacia* (Müller); HUNGARIA, STYRIA, etc.

R. RADULA \times *FUSCUS* (grex) Sud. *Diagn.* p. 34 (1906); *R. PUSTULOSUS* Sud. l. c. — Subvirescens, foliolum terminale ovato-cordatum; serratura grossa. Parum fertilis.

GERMANIA: *Alsacia*, circa Weissenburg (Müller).

R. RADULA \times *REUTERI* Schmidely *Assoc. rub.* n° 931 (1890); *R. REUTERIFORMIS* Sud. — Heteracanthus ut in *R. Radula*, folia ut in *R. Reuteri*; pollen valde imperfectum.

HELVETIA: Genève, près du G^a Sacconex (Schmidely).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Turio* manifeste parce pilosa.

A. — Foliolum caulinum terminale ovatum vel ovato-rhomboideum.

a. — Petala alba vel dilute rosea.

- 1. — Foliolum caul. terminale basi fere integrum; inflorescentia ramuli leviter ascendentes.
- 2. — Foliolum caul. terminale manifeste cordatum; inflorescentia ramuli patentes.....

b. — Flores vive rosei; planta purpureo-obscura.....

B. — Foliolum caul. terminale obovatum; dentes inaequales; inflorescentia armatissima.

a. — Inflorescentia rachis laxe pilosa.....

b. — Inflorescentia rachis dense piloso-hirsuta.....

C. — Foliolum caul. terminale ellipticum; dentes tenues; inflorescentia mediocriter armata.

a. — Inflorescentia rachis dense piloso-hirsuta; petala rosea.....

b. — Inflorescentia rachis laxe pilosa.....

R. Radula Wh.

R. PUSTULATUS P.-J. Müll. b.

R. BAILLETH Sud. c.

R. UNCIATUS P.-J. Müll. B.

R. UNCIATIFORMIS Sud. Cb.

R. ERICETORUM Lef. C.

R. TRACHYCAULON Sud. Bb.

II. — *Turio* fere glaber; foliolum caul. terminale \pm obovatum.

A. — Rami aculei reclinati vel leviter falcati.

a. — Folia minute serrata; petala rosea.

- 1. — Foliolum caul. terminale late obovatum, cuspidatum.....
- 2. — Foliolum caul. terminale acuminatum.....

b. — Folia mediocriter vel grosse serrata; flores albi.

- 1. — Inflorescentia aculeis validis armata, bracteis angustis.

a. — Pedunculi brevissimi, a basi ramosi; pedicelli elongati, patuli.....

b. — Pedunculi elongati, ascendentes.....

- 2. — Inflorescentia mediocriter armata, aculeis flavescentibus, bracteis latis munita.....

B. — Rami aculei manifeste falcati vel geniculati, nonnulli uncinati.....

R. ASPERICAULIS L. et M. D.

R. ECHINATOIDES Rogers Db.

R. PALLIDIFORMIS Sud. E.

R. PAPULOSUS M. et L. G.

R. OREUS Sud. F.

R. TIMENDUS Sud. H.

b — (T. CXXV) — *R. pustulatus* P.-J. Müll. ap. Sud. *Bat.* p. 11 (1903) et *Fl. Toul.* p. 75.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 321, 442 !

Differt a *R. Radula* Wh. : foliolo caul. terminali profunde cordato (1), dentibus longe mucronatis, acutioribus ; inflorescentia (2) magna, laxa, subaphylla, pedunculis (3) elongatis, valde patulis vel deflexis, pedicellis longis, divaricatis ; floribus albis (4). Precox.

GALLIA : Haute-Garonne, Bouconne, Balma, Fronton, Eaunes, Buzet, etc.

c. — (T. CXXV) — *R. Bailletii* Sud.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 443 !

Differt a *R. Radula* Wh. : turione subglabro, foliis (5) grosse et subinciso-serratis, subtus pilosis pilis ad nervos pectinatis, floribus vive roseis, receptaculo glabro. Planta purpureo-obscura, petala (7) rosea, stamina purpurea, styli rosei. — Habitus *discrepti* P.-J. Müll. sed turio glabrescens, flores vive rosei.

GALLIA : Haute-Garonne, forêt de Bouconne, vers Mérenvielle.

B. — (T. CXXV) — *R. uncinatus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 28 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 127 ; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 91 p.p., (excl. syn.) ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 578 ? ; *R. pilocarpus* v. *heteracanthus* Schmid. *Cat.* p. 151 p.p. ; *R. duplex* ej. p.p. v. *superpilocarpus*.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 110 ; Sud. *Bat. eur.* n° 444.

Turio ut in *R. Radula* sed scabrior ; *folia* supra glabra, parum discolora, argute et inaequaliter acuto-dentata, dentum mucronibus erectis ; *foliolum* terminale (8) obovatum, basi vulgo integrum, abrupte acuminatum ; *petiolorum* aculei falcati vel uncinati ; *ramus* heteracanthissimus, parce pilosus, aculeis validis, falcatis armatus ; *inflorescentia* ± foliosa, laxe pilosa (9), armatissima, glandulis crebris, longis, inaequalibus ; *pedunculi* patulo-ascendentes (10) ; *sepala* dense aculeata, glandulosa ; *petala* obovata (11), emarginata, alba vel dilute rosea ; *stamina*, styli germinaute ut in *R. Radula*.

β. *FISSIPETALUS* ; *R. fissipetalus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858), non Genev. — Serratura mediocris, inaequalis ; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum ; *petala* rosea, *stamina* alba, styli virescentes vel basi rosei.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg, la Buchbach, Lauterbach, lignes du Pigeonnier (Müller) ; GALLIA : Vosges, Longemer, vallée de la Granges (Müller), Gerbamont, Rochesson, Rambervillers (Boulay), Rhône, Haute-Savoie, Côte-d'Or, Loire-Inf. — β. GERMANIA : Alsacia, la Buchbach, Bienwald, Heiligenbach prope Weissenburg (Müller).

HYBRIDÆ

R. UNCIINATUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. ap. Gdg. Nov. *Consp.* p. 148 (1905) ; *R. HETERACANTHUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 37 (pr. sp.). — Habitus *R. uncinati* var. β sed discolor et parum glandulosus, flores albi, steriles.

GERMANIA : Alsacia, Remigiusberge, prope Cusel (Müller).

R. UNCIINATUS × *MENKEI* Sud. ap. Gdg. l. c. 148 (1905) ; *R. LITADENES* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 130 (1869) et exsicc. n° 114. — A *R. uncinata* dignoscitur : turione obtusior, pilosior, foliis argute serratis, 3-5-natis, sepalis patulis ; flores albi, steriles.

GALLIA : Vosges, Saulxures-sur-Moselotte, au fond du Bambois-de-Bâmont (Pierrat).

R. UNCIINATUS × *OMALUS* Sud. ap. Gandg. l. c. 148 (1905) ; *R. OENODERMIS* Sud. l. c. ; *R. pilocarpus* v. *heteracanthus* Schmid. *Cat.* p. p. — Aculei ut in *R. uncinata* sed turio glaber, folia subtus viridia, rachis parce pilosa. Sterilis.

GALLIA : Haute-Savoie, Monts Voiron, 3^e chalet (Schmidely).

R. UNCIINATUS × *SERPENS* (grex) ? ; *R. GLAUCIFOLIUS* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) n° 1, 77 (70) ; *R. pilocarpus* v. *heteracanthus* × *serpens* (*lividulus*) Schmid. l. c. — Differt a *R. uncinata* turione glaucescenti, inflorescentia valde armata, glandulis longis munita ; *sepala* reflexa ; parum fertilis.

GALLIA : Haute-Savoie, Monts Voiron (Schmidely).

b. — (T. CXXV) — *R. trachycaulon* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 324 ; *R. uncinatus* var. *ellipticus* l. c. p. 318 ; *R. ischnocladus* Progel hb..

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8558 (s. n. *R. fuscii*), 9078 (s. n. *R. splendidi*) ; Assoc. rub. n° 285 (*R. aspericaulis*).

Gracilis et discolor ; turio glabrescens ; *foliolum* caul. terminale (12) anguste ovatum vel ellipticum, subemarginatum, sensim et longe acuminatum ; *ramus* gracilis, flexuosus, aculeis mediocribus, foliolis angustis, acuminatis ; *inflorescentia* (13, 14) pyramidalis, glandulis brevibus, aculeis mediocribus ; *sepala* inermia ; *petala* (15) elliptica, rosea, integra ; *germina* pilosa.

GERMANIA : Badenia : Siegelau, Oberland, Suggenthal, prope Waldkirch (Goetz) ; Bavaria, Tettenhausen, Waging (Progel) ; GALLIA : Côte-d'Or, Voudenay (Gillot).

Obs. — Le n° 9078 de l'*Herb. eur.* a le turion à peu près glabre, tandis que le n° 8558 l'a un peu velu. Je crois, après nouvel examen, que ces deux plantes ne sont que deux variations d'un même type et qu'il y a lieu de les réunir. Le *R. trachycaulon*, par son inflorescence peu herissée, sa dentelure un peu irrégulière et ses aiguillons pétioires très courbés, se rapproche du *R. uncinatus* Müll., mais par ses folioles étroites il rappelle un peu le *R. ericetorum* Lef. ; il est intermédiaire entre ces deux sous-espèces.

C. — (T. CXXV) — *R. ERICETORUM* Lef. (pr. sp.) *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. XXIV p. 18 (1877) ; Genev. *Mon.* p. 162 ; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 60 ; Bouvet *Rub. Anj.* p. 683 ; *R. linguifolius* P.-J. Müll. ! Bonpl. (*nomen*), (1861) ; *R. uncinatus* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 91, ex pte ; *R. Radula* Sbsp. *anglicanus* Rogers *Journ. bot.* (1894) 47 ; *Handb. Brit. Rub.* p. 63 ; *R. Lejeunei* var. *ericetorum* ej. *Handb.* p. 71 ; *R. fissipetalus* et *atratus* Gen. p. p. ; *R. uncinatus* v. *ericetorum* Corb. *Fl. Norm.* p. 207 (1894).

Exsicc. — Assoc. rub. n° 187 ; C. Magnier *Fl. sel.* n° 246, 3761 ; *Set of. Brit. Rub.* n° 39, 99 p. p. ; Sud. *Bat. eur.* n° 77, 445, 446.

Turio faciebus planis, parce pilosus, glandulis crebris, aculeis majoribus compressis, rectis, minoribus acicularibus ; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, breviter pilosa, argute et inaequaliter serrata ; *foliolum* terminale (16) ellipticum, integrum vel vix emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *petiolus* aculeis falcatis armatus ; *ramus* angulosus, aculeis debilibus, falcatis, foliis 3-5-natis, argute denticulatis, foliolis acuminatis ; *inflorescentia* (17) densa, basi foliosa, dense villosso-hirsuta, glandulis crebris, aculeis mediocribus, subrectis instructa, pedunculis (18) patulo-ascendentibus ; *sepala* hirsuta, parce glanduloso-aculeata ; *petala* (19) ovata, rosea ; *stamina* rosea stylos roseos superantia ; *germina* pilosa vel glabrescentia.

GALLIA BOREALI-OCCIDENTALIS : Vendée, Maine-et-Loire, Sarthe, Creuse, Oise, Manche, etc. ; BRITANNIA : Jersey, Devon, Hants, Sussex, Kent. etc. (Bogers).

HYBRIDA

R. ERICETORUM × PROPINQUUS Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 60 (1902) ; *R. COGNOMINATUS* Sud. l. c. ; *R. gymnostachys* Genev. *Mon. p. 223* (*pr. min. p.*). — Serratura tenuis, aculei æquales, glandulae rarae, inflorescentia laxa. Sterilis.

GALLIA : Loire-Inf., Le Pallet (Genevier).

b. — (T. CXXV) — *R. uncinatiformis* Sud. *Diagn. p. 33* (1906) ; *R. amphichlorus* v. *candidans* N. Boul. exsicc. Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 536 (1883).

Minus heteracanthus quam *R. uncinatus* et *R. aspericaulis* ; aculei papulæformes in turione rari. *Folia* discolora, minute serrata ; *foliolum* terminale (20) breviter obovatum, integrum, cuspidatum ; *aculei* petiolares breves, uncinati vel falcatissimi ; *inflorescentia* dense villosa (21) pedunculis patulis ; *petala* (22) rosea, stamina alba, styli virescentes. *Intermedius* inter *R. uncinatum* P.-J. Müll. et *R. ericetorum* Lef. Foliolorum figura *R. aspericaulem* L. M. revocat.

GALLIA : Tarn, Labastide-Rouairoux ; Valois, forêt de Retz (Questier) ; Saône-et-Loire, le Creusot (Quincy) ; GERMANY : Alsacia, Courcieux (Billot).

HYBRIDA

R. UNCIATIFORMIS × OCCITANICUS Sud. *Rub. tarn. p. 34* (1909) ; *R. PSEUDO-UNCIATIFORMIS* Sud. l. c. — Habitus *R. uncinatiformis* sed inflorescentia parum pilosa, laxa ; stamina stylique rosea. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Labastide-Rouairoux.

D. — *R. aspericaulis* Lef. et M. Vers. n° 78 (1859) ; *R. Radula* v. *apericaulis* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 90 (1900) ; non *R. rufa* v. *aspericaulis* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 561.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 447 !

Turio validus, glaucescens, faciebus planis vel leviter concavis, fere glaber ; *aculei* majores compressi, minores papulæformes, crebri ; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, breviter pilosa, argute et simpliciter denticulata ; *foliolum* terminale (1) obovato-orbiculare, subemarginatum, cuspidatum ; *aculei* petiolares falcati ; *ramus* pilosus, aculeis reclinatis, foliis 3-natis, argute serratis, foliolis obovatis ; *inflorescentia* (2) ut in *R. Radula* ; *sepala* parce glandulosa, sœpe aculeata ; *petala* (3) ovata, rosea ; *stamina* alba stylos virentes superantia ; *germina* glabrescentia.

GALLIA : Valois, Arganson, au Chêne-l'Officier, bois de Lévignen, de Thury (Lefèvre, Questier) ; Cher, Mehun, bois de la Touche (Déséglise) ; Vienne, Le Rond (de Lacroix) ; Tarn, Lacabarède ; Seine-et-Oise, bois de Villemoison (Blau).

HYBRIDA

R. ASPERICAULIS × ULMIFOLIUS Sud. *Diagn. p. 33* (1906) ; *R. SEMIASPERICAULIS* Sud. l. c. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 448 ! — Habitus *R. aspericaulis* sed subhomalacanthus et parum glandulosus ; discolor ; *germina* hirsuta. Sterilis.

GALLIA : Valois, forêt de Retz (Questier), cum *R. aspericauli*.

b. — (T. CXXVI) — *R. echinatoides* Rogers in *Journ. bot.* (1894) 46 ; *Handb. p. 64*.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 65.

R. aspericauli similis, sed dentes acutiores, inæqualiores ; *foliolum* terminale (4) obovatum, sensim acuminatum ; *ramus* glabrescens, inflorescentia (5, 6) armatissima glandulis longis rubrisque munita ; *petala* (7) alba ?

BRITANNIA : S. Derbyshire, frequens (sec. Rogers).

HYBRIDA

R. ECHINATOIDES × APICULATUS Sud. ; *R. RADULOIDES* Rogers in *Journ. bot.* (1892) p. 209 ; *R. angloianicus* Sbsp. *raduloides* Rogers *Handb. p. 58*. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 62. — Differt a *R. præcedenti* foliis subtus pilosioribus ut in *R. apiculato*. Parum fertilis ; inflorescentia medicriter armata.

BRITANNIA : Gloucestershire, Clifton Down, Bristol (White).

E. — (T. CXXVI) — *R. PALLIDIIFORMIS* Sud. *Rub. Pyr. p. 68* (1900).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 449 !

Turio faciebus planis, fere glaber, epuruinosus, scaberimus, aculeis majoribus reclinatis falcatisque armatus ; *folia* supra glabra, late viridia, subtus pubescens, cinereo-tomentosa vel in umbrosis viridia (v. *virescens* Sud. l. c.), argute et inæqualiter serrata ; *foliolum* terminale (8) obovatum, basi leviter emarginatum vel subintegrum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *petiolus* aculeis crebris, pallidis, falcatis uncinatisque armatus ; *ramus* pilosus, foliis 3-5-natis, foliolis terminalibus elliptico-obovatis, longe acuminatis ; *inflorescentia* magna, laxa, parum foliosa, apice truncata, hirsuta (9), armatissima, glandulis brevibus munita ; *pedunculi* brevissimi (10), patuli, e basi ramosi, 2-4 floribus longe pedicellatis ; *sepala* pilosa, aculeata ; *petala* (11) alba, stamina alba stylos virentes superantia ; *germina* pilosa.

GALLIA : Ariège, Ax, Ascou, Orgeix, etc.

HYBRIDÆ

R. PALLIDIIFORMIS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. Pyr. p. 69* (1900) ; *R. THERMARUM* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 72 ! — Aculei subæquales, glandulae rarae, folia supra obscure viridia, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Ax-les-Thermes, haies du Teich.

R. PALLIDIIFORMIS × LUTEOSTYLUS ? Sud. *Rub. Pyr. p. 69* (1900) ; *R. ILLICITUS* Sud. l. c. — *Foliolum* terminale late ovatum, cordatum, rachis parum armata, *sepala* patula, flores rosei. Parum fertilis.

GALLIA : Ariège, Ax, à l'ouest du Teich.

R. PALLIDIIFORMIS × HIRTUS Sud. *Rub. Pyr. p. 70* (1900) ; *R. HORRENDUS* Sud. l. c. — Heteracanthissimus glandulosissimusque ; *sepala* patula, stamna longa. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Ax, via Ascou.

R. PALLIDIIFORMIS × HIRTUS Guentheri Sud. l. c. ; *R. ARGUTIPETALUS* Sud. l. c. ; Sud. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 73 ! — A *R. horrendo* differt staminibus brevibus. petalis angustis, sepalis appressis.

GALLIA : Ariège, Ax, via Orgeix.

F. — (F. CXXVI) — *R. oreus* Sud. *Bat. eur.* p. 11 (1903).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 33 !

Turio (12) faciebus planis vel leviter concavis, glaber, epuruinosus, scaber, aculeis debilibus, glandulis crebris munitus ; *folia* 5-nata, supra glabra, pallide viridia, subtus cinereo-tomentosa, breviter pubescentia, grosse, inæqualiter

et subsimpliciter mucronato-serrata ; *foliolum terminale* late obovatum (11), emarginatum, abrupte acuminatum, petiolo proprio fere triplo longius ; *petiolus* aculeis debilibus falcatis armatus ; *ramus pubescens*, glandulis brevibus, aculeis debilibus, reclinatis falcatisve munitus, foliis 3-natis, foliolis obovatis ; *inflorescentia* basi foliosa, tomentosa, breviter pilosa (14), glandulis brevissimis, aculeis debilibus, lutescentibus, rectis vel reclinatis instructa ; *pedunculi* ± ascendentes, pluriflori, bracteis latis muniti (15) ; *sepala* inermia, glandulis raris vel nullis ; *petala* (16) ovata, in unguem attenuata, alba ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabra. — Subspecies vergens in *R. apiculatum*.

GALLIA : Cantal, Murat, le Lioran, vallée de la Jordanne ; Puy-de-Dôme, Châtel-Guyon (Lamotte) ; Tarn, les Cammazes, la Laugéière, prope Castres.

HYBRIDA

R. OREUS × *VESTITUS leucanthemus* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* t. LI p. 22 (1904) ; *R. JORDANNINUS* Sud. l. c. — A *R. oreo* dignoscitur : turione parce piloso, foliis subtilis pilosis, rachide hirsuta. Sterilis.

GALLIA : Cantal, vallée de la Jordanne, entre St-Julien et Mandailles.

G. — (T. CXXVI) — **R. papulosus** M. et Lef. *Vers.* n° 79 (1859) ; Sud. *Fl. Toul.* p. 75 ; *R. Radula* v. *papulosus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 90 (1900) ; *R. carpaticus* Borb. et Sabrs. *Verh. Z. B. G. Wien XXXVI*, 92 (1886).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 450.

Turio faciebus planis, fere glaber, parce glandulosus, aculeis majoribus validis, rectis, minoribus sparsis ; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus breviter pubescentia, cinereo-tomentosa, grosse et inaequaliter serrata ; *foliolum terminale* (17) obovatum vel rhombo-ovatum, basi emarginatum, longe acuminatum ; *petiolorum* aculei falcati ; *ramus* pilosus, aculeis falcatis, foliis 3-natis, grosse serratis, foliolis terminalibus obovatis ; *inflorescentia* ampla, saepe usque ad apicem foliosa, laxe pilosa, aculeis rectis reclinatis, pedunculis ascendentibus, longis, multifloris (19) ; *sepala* pilosa, parce glandulosa, saepe aculeata ; *petala* (20) ovata, alba vel pallide rosea ; *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* parce pilosa.

GALLIA : Aisne, Montigny-Lallier ; Oise, Antigny (Lefèvre) ; Haute-Garonne, Quint : HUNGARIA OCCIDENT : in convallibus *Carpathorum Minorum*.

OBS. — Je ne vois pas de différence entre le *R. carpaticus* Borb. et Sabrs. tel que je l'ai reçu de M. Sabransky et le *R. papulosus* M. et L. de la forêt de Villers-Cotterets. M. Focke (*ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 589) identifie le *R. carpaticus* au *R. inaequalis* Hal., mais ce dernier me paraît être un *R. Radula* × *bifrons*.

HYBRIDÆ

R. PAPULOSUS × *INCARNATUS* Sud. *Diagn.* p. 33 (1906) ; *R. SEMIPAPULOSUS* Sud. l. c. — A *R. papuloso* distinguitur aculeis subaequalibus, glandulis raris, dentibus acutioribus, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : Valois, route du H-Vison, près de Fleury (Questier).

R. PAPULOSUS × *CUSPIDIFER* ; *R. oxydrepans* Sud. *Diagn.* p. 33 (1906) ; *R. Radula* × *belophorus* Sud. in hb. Müller. — Folia *R. papulosi*, sed aculei subaequales, turio pubescens, flores rosei, steriles.

GALLIA : Valois, aux champs du Cuvret (Lefèvre, Questier).

H. — (T. CXXVI) — *R. TIMENDUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 71 (1900).

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10400 ! ; Sud. *Bat. eur.* n° 451 ! ; *Assoc. rub.* n° 783 (s. n. *R. Genevrieri*).

Turio (21) faciebus planis vel leviter concavis, fere glaber, epruinosus, parum glandulosus ; *aculei* maiores compressi, obliqui, falcati vel geniculati, minores sparsi ; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus pubescentia, cinereo vel albo-tomentosa, acute et inaequaliter serrata, dentibus mediocribus ; *foliolum terminale* (22) ovatum vel obovatum, interdum cuneatum, basi integrum, abrupte acuminatum ; *petiolus* aculeis crebris, aduncis geniculatisve armatus ; *ramus* glabrescens, aculeis crebris, basi dilatatis (23), plerumque geniculatis vel subuncinatis munitus ; *folia* 3-nata, discolora, foliolis terminalibus elliptico-ovatis, acuminatis ; *inflorescentia* elongata, inferne foliosa, laxe pilosa, glandulis inaequalibus, aculeis validis (24), crebris, obliquis, geniculatis aduncisve instructa ; *pedunculi* medii (25) subascendentes ; *sepala* parce glandulosa, aculeata, laxe reflexa ; *petala* (26) ovata alba vel pallide rosea *stamina* alba stylos virescentes superantia ; *germina* glabra. — *R. infesto* Wh. similis.

β. *ROSEIFLORUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 61 (1902) ; *R. subinfestus* Wirgt. exsicc. — Exsicc. — *Bat. eur.* n° 452 ! — Petala rosea ; *stamina* pallide rosea ; serratura grossa.

γ. *DRUDARUM*. — Petala pallide rosea ; *stamina* pallida stylos vix superantia ; *foliolum terminale* basi emarginatum ; turio parum scaber ; serratura grossa.

δ. *BLONDEAUI* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 61 (1902) ; *R. Blondæi* Rip. in Genev. *Ess. mon.* p. 105 (1869) ; *Mon.* p. 189 ; *R. rufus* Bor. *Fl. cent. ed. 3* n° 739 ! non Wh. et N. — *Foliolum terminale* late ovatum, *inflorescentia* densa, *pedunculis* patulis ; flores albi, germina pilosa.

GALLIA : Tarn, Ariège, Rhône, Seine-et-Marne, Cher, Eure. — BRITANNIA : Yorks (Baker). — β. GALLIA : Ariège, Sarthe. — γ. GALLIA : Finistère, Quimerc'h, Quimper, Châteaulin. — δ. GALLIA : Cher, forêt d'Allogny (Ripart) ; GERMANIA : Coblenz (Wirtgen).

HYBRIDÆ

R. TIMENDUS × *CONSOBRINUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 34 (1909) ; *R. SEMITIMENDUS* Sud. l. c. — Differt a *R. timendo* aculeis minus obliquis, foliis subtilis pilosis ; parum fertilis.

GALLIA : Tarn, le Mézérac, prope Anglés.

R. TIMENDUS × *LASITHYRSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 72 (1900) ; *R. ALETINUS* Sud. l. c. — Aculei parum inaequales, turio parce pilosus, folia subtilis pilosa, rachis hirsuta. Parum fertilis.

GALLIA : Ariège, bords de l'Alet, à Escots, près de Trein.

R. TIMENDUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 72 (1900) ; *R. FOLIATUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 10364 ! ; Sud. *Bat. eur.* n° 453 ! — Aculei ut in *R. timendo*, subaequales ; *inflorescentia* foliosa, flores rosei. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Teulet, inter Fréjairolles et Bellegarde.

R. TIMENDUS × *TOMENTOSUS* Lloydianus Sud. *Rub. tarn.* p. 34 (1909) ; *R. JORDANII* Sud. l. c. — Differt a *R. timendo* foliis grosse serratis, subtus albo-tomentosis, rachide hirsuta, bracteis latis. Parum fertilis.

GALLIA : Rhône, Yseron, les Jumeaux, prope Lyon ; Tarn, Arthez.

R. TIMENDUS × *PALLIDIIFORMIS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 72 (1900) ; *R. DERIVATUS* Sud. l. c. — A *R. timendo* dignoscitur : foliis minute serratis, rachide hirsutiore, aculeis minus curvatis. Substerilis.

GALLIA : Ariège, Ascou.

OBS. — Cet hybride étant stérile ou à peu près, les *R. pallidiiformis* et *timendus*, bien que subordonnés ici au *R. Radula* Wh., pourraient être envisagés comme deux espèces distinctes.

Gracilis ; turio (5) obsolete angulatus ; folia argute mucronato-denticulata ; foliolum caul. terminale (6) late ovatum, breviter acuminatum ; inflorescentia longe pilosa (7), apice truncata, glandulis (8) rubris munita ; germina glabra. Parum fertilis.

GERMANIA : Badenia, Siegelau, vallée de l'Elz (Goetz).

B. — (T. CXXVIII) — **R. brevistachys** Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 21 (1904) ; **R. mutabilis** (Gen.) Sbsp. **R. nemorosus** Rogers Handb. Brit. Rub. p. 72 (1900) non Hayne ; **R. obliquus** Blox. (non Wirtg.) sec. Rogers l. c.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 69 ; Sud. Bat. eur. n° 456 !

Gracilis ; turio (10) ut in **R. Genevieri** sed heteracanthior ; folia 3-4-5-nata, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pilosa, dentibus inaequalibus, non patulis ; foliolum terminale (11) ovatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius ; inflorescentia brevis, parva, densa, parum foliosa, breviter pilosa, glandulis inaequalibus, aculeis validis (12, 13), subrectis instructa, pedunculis subascendentibus ; sepala tomentoso-glandulis brevibus, parce aculeata, reflexa ; petala (14) alba, ovata ; stamina alba stylos virides superantia ; germina glabra. Pollen purum vel parum admixtum.

GALLIA : Tarn, in collibus siliceis, Alban, via Trébas ; BRITANNIA : S. Devon, Egg. Buckland (M. Rogers).

HYBRIDA

R. BREVISTACHYS × SPRENGELII immutabilis Sud. Rub. tarr. p. 34 (1909) ; **R. ABORTIVUS** Sud. l. c. — Gracilis, virescens, parum heteracanthus, parce glandulosus ; flores rosei ; stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Alban, via Villeneuve.

C. — (T. CXXVIII) — **R. DISCERPTUS** P.-J. Müll. Vers. n° 84 (1859) ; Genev. Mon. p. 158 ; Corb. Fl. Norm. p. 207 ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 565 ; Bouvet Rub. Anj. p. 683 (1903) et p. 50 (1907) ; Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 149 ; R. Radula Sbsp. discerptus N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 92 ; **R. Radula** Bor. Fl. Cent. ed. 3 n° 740 ! non Wh. ; **R. echinatus** Rogers Handb. Brit. Rub. p. 64, an Lindl. Syn. ed. I 94 (1829) ? ; **R. rufus** Bab. Brit. Rub. p. 189, p. p., non Wh. ; **R. mutabilis** Rogers Handb. p. 71, salt. ex pte, non Genev. ; **R. atratus** Genev. Mon. p. 157, p. p.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 335, 378, 501, 632, 1084 (var.) ; Rub. gall. n° 37 ; Set of Brit. Rub. n° 40, 44 ; Sud. Bat. eur. n° 138 !

Flores (18) ut in **R. Genevieri** Bor., a quo differt : validiore ; turione angulato, dense glanduloso, aculeis validis armato ; foliis (15) minus discoloribus, subtus pilosioribus, saepe subviridibus, grosse serratis, dentibus profundis, angulosis, praecipuis patulis vel refractis ; foliolo caul. terminali ovato vel rhomboideo, integro vel emarginato, breviter acuminato ; foliis ramealibus subincisis ; inflorescentia minus elongata, latiora, apice truncata, dense et longe hirsuta, pedunculis patulioribus, glandulis longioribus (16, 17) ; germinibus glabrescentibus. Variat floribus albis (s.-var. *albiflorus*, Assoc. rub. n° 501), inflorescentia laxa, armatissima (s. var. *hystricopsis* Sud. — Exsicc. : Sud. Rub rar. n° 76).

β. VESTITUS Sud. in Bouvet Rub. Anj. (1907) p. 51. — Folia discolora, subtus molliter pilosa ; foliolum terminale (19) suborbicularis ; inflorescentia densa, parum foliosa.

γ. GRIFFITHIANUS ; **R. Griffithianus** Rogers ap. Griffith Fl. Angl. et Carn. p. 48 (1895) ; Hand. Brit. Rub. p. 68 ; **R. uncinatus** II **G. Griffithianus** Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 579. — Differt a **R. discerpto** : minus heteracantho (20), foliola latiora (21), serratura minus profunda, praesertim in foliis ramealibus ; inflorescentia breviter hirsuta. **R. adscito** similis Gen. sed validior, inflorescentia armatior.

GALLIA BOREALI-OCCIDENTALI, præterea : Nièvre, Haute-Savoie, Gers ; BRITANNIA : LUSITANIA ; BAVARIA : Petting, Waging (Progel). — β. GALLIA : Tarn, Sales, Pont de la Mouline, prope Murat ; Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy (Bouvet). — γ. BRITANNIA : Devon, Carnarvon, Anglesey, Hibernia (Rogers) ; GALLIA : Sarthe, Crê-sur-Loir (Launay).

OBS. — Le **R. discerptus** P.-J. Müll. a la même distribution géographique que le **R. Genevieri** Bor., et on trouve parfois des formes qui oscillent entre ces deux espèces, ce qui me porte à les subordonner l'un à l'autre. Je n'ai pas vu de spécimens authentiques de **R. echinatus** Lindl. et ce nom paraît avoir été appliqué à des espèces diverses, la description qui en a été donnée manquant de précision. Babington (Brit. Rub. p. 201) l'identifie à son **R. Kcelleri verus**, qui, en admettant qu'il soit identique à celui de Weihe, n'est pas comparable au **R. discerptus** P.-J. Müll. ; d'autre part (l. c. p. 189) le même auteur donne comme synonymes de son **R. rufus** : **R. discerptus** P.-J. Müll. !, **R. Genevieri** Bor. !, **R. echinatus** Lindl. !, ce qui prouve surabondamment qu'une grande confusion s'observe dans l'ouvrage de ce botaniste, comme elle existe du reste dans son herbier ainsi qu'un botaniste français l'a constaté récemment. Je crois bon, dans ces conditions, de m'en tenir au terme de Müller, la description du **R. discerptus** de ce catalogue étant très précise et la plante m'étant bien connue par une centurie authentique récoltée par Chabasseau lui-même et que j'ai distribué dans mon *Batitheca* (n° 138) !

HYBRIDÆ

R. DISCERPTUS × CLETHROPHILUS ; **R. SEMIDISCERPTUS** Sud. — Aculei subæquales, glandulæ raræ, inflorescentia laxa pedunculis ascendentibus. Sterilis.

GALLIA : Sarthe, La Hutte (Gentil).

R. DISCERPTUS × ULMIFOLIUS Schmid. exsicc. ; **R. PSEUDO-DISCERPTUS** ej. — Serratura ut in **R. discerpto** ; discolor, parum heteracanthus, glandulæ sparsæ. Sterilis.

GALLIA : Haute-Savoie, Monts Voirons, près de Bon-St-Didier (Schmidely) ; Sarthe, Bazouge (Launay) ; BELGIA : forêt de Soignes (Guelton).

R. DISCERPTUS × RADULA : **R. HENRYANUS** Sud. — Habitus **R. discerpti** sed discolor, turio glabrescens ; sterilis.

GALLIA : Sarthe, Précigné, chemin de Brossilloux (Henry).

75 — (T. CXXIX, CXXX) — **R. APICULATUS** Wh. in Bluff et Fingerh. Comp. Fl. germ. I p. 680 (1825) ; W. et N. Rub. germ. p. 69, t. XXIV ; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 580 (excl. var.) ; Sud. Fl. Toul. p. 75 ; **R. anglosaxonicus** Gelert Bot. Tidssk. XVI p. 81 (1888) ; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 57 ; **R. rubricaulis** Wh. (prius, ad amic.) ; **R. delicatus** var. Holuby exsicc. ; **R. molliaversus** Sud. in hb. Müller ; **R. obscurus** Durand Mon. n° 23 p. 62, non Kalt. ; **R. epipsilos** var. *monticola* Progel, ex pte.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 19 ; Sud. Bat. eur. n° 139, 457, 458 ; Rub. rar. n° 77 ; Assoc. rub. n° 510 (variat.).

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, subglaucescens, parce pilosus ; aculei inaequalissimi, majores compressi, reclinati, leviter falcati vel subrecti, minores crebri, papulæformes, nonnulli glanduliferi ; folia (2) plerumque 5-nata, interdum 3-4-nata, supra glabra vel parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, piloso-sericea, medio-criter et subsimpliciter serrata, dentibus acutis, inaequalibus, mucronis subpatulis ; foliolum terminale obovatum, leviter emarginatum, abrupte et breviter acuminatum ; petiolus supra planus, aculeis debilibus, falcatis, munitus ; stipulae lineares, glandulosæ ; ramus florifer angulatus, pilosus, glandulosus, aculeis debilibus, falcatis, foliis 3-natis, superis discoloribus, foliolis terminalibus obovatis ; inflorescentia (3) mediocris, basi foliosa, piloso-hirsuta, glandulis crebris, aculeis tenuibus vel mediocribus, rectis vel reclinatis, parum vulnerantibus instructa, (4) pedunculis leviter ascendenter, paucifloris ; sepala tomentosa, pilosa, glandulosa, parce aculeata, in flore et fructu reflexa (5) ; petala (6, 7) ovata, pallide rosea ; stamina alba vel dilute rosea stylos superantia ; germina glabra vel parce pilosa. Pollen (8) parum admixtum. — Junius-julius.

R. SUBALBICANS; *R. subalbicans* Sud. *Rub. Pyr.* p. 136 (1901). — Turio scaberrimus; folia magna, supra flavescenti-viridia, subtus albo-tomentosa; inflorescentia elongata, densa; petala alba; germina glabra.

R. DUMETIVAGUS Sud. *Rub. tarn.* p. 35 (1909). — Serratura tenuis, æqualis, foliola lata, terminale ovata; petala, stamina stylique rosea. Pollen fere purum.

R. ABRUPTORUM; *R. abruptorum* Sud. *Rub. Pyr.* p. 139 (1901); *R. inflexus* G. Samp. in *Revista* (1904); *Rub. Port.* p. 70, non Boul. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 78. — Gracilis, parum discolor; folia pleraque 3-nata, minute mucronato-denticulata; foliolum terminale oblongo-ovatum; petala rosea, stamina alba, styli rosei.

R. MOLLIAVERSUS; *R. molliaversus* Sud. in hb. *Mus. Paris.*; *R. epipsilos* var. *raduliformis* et *monticola* Progel. p. p. — Validus; folia argute et acute serrata, subtus molliter et densa pilosa; inflorescentia densa, hirsuta, pedunculis patulis; flores rosei. Rollen fere purum.

R. NEWBOULDII; *R. Newbouldii* Bab. *Journ. bot.* (1886) p. 230; *R. Radula* v. *denticulatus* Bab. *Man. ed.* 5 p. 105 (1862); *R. oegocladius* (M. et L.) var. *Newbouldii* Rogers *Handb.* p. 66 (1900). — Exsicc.: *Set of Brit. Rub.* n° 66; Sud. *Bat. eur.* n° 459. — Turio leviter canaliculatus; serratura et pubes ut in var. ε; foliolum terminale obovato-orbiculare, cuspidatum; rachis dense hirsuta (9); pedunculi (10) brevissimi, patuli, e basi ramosi; flores pallidi.

R. OBSECTIFOLIUS; *R. obsectifolius* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 14 (1864) et *exsicc.* n° 13!; *Genev. Mon.* p. 185; *R. Genevieri* f. *pallidiflora* Progel *Ber. Bot. Ver. Lands.* (1889). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 79. — Turio parum scaber, parce pilosus, faciebus planis, aculeis debilibus; folia mucronato-denticulata (11); foliola obovata ut in typo, parum discolora; inflorescentia laxe pilosa pedunculis tenuibus, elongatis; flores albi.

R. CINEROSUS; *R. cinerosus* Rogers in *B. E. C. Rep.* (1896) p. 513; *Journ. Bot.* (1899) p. 195; *Handb. Brit. Rub.* p. 54; *R. pulcherrimus* v. *setosus* Ley. — Turio subteres, parce pilosus; folia minute serrata; foliolum terminale (1) late obovatum, subemarginatum, acuminatum; inflorescentia parum foliosa, hirsuta, aculeis debilibus, sparsis instructa; petala pallide rosea; germina glabrescentia.

R. GALARDII; Sud. in Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 52. — Turio pilosus; foliolum terminale suborbiculare, emarginatum, abrupte et breviter acuminatum, infima longe petiolulata; inflorescentia laxa, armata; petala rosea; stamina alba, styli basi rosei; germina glabra. *R. Genevieri* similis.

R. WORONOWII Sud. *Rub. Jard. bot. Tiflis.* p. 4 (1909). — Turio glaber; aculei tenues, reclinati; folia ampla, tenuia, simpliciter mucronato-serriculata, supra glabra, subtus breviter pubescentia; foliolum terminale obovato-orbiculare (2), cordatum, cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius, infima distincte petiolulata (pet. = 5-9 mm. longi); inflorescentia angusta, breviter pilosa, pedunculis mediis brevibus, 1-2-floris, patulis; flores?; germina pilosa; fructus bene evolutus.

R. LUSITANICUS; *R. lusitanicus* R. P. Murray *Bol. Soc. Brot.* V (1888); G. Samp. *Rub. Port.* 67. — Differt a typo: graciliore; foliis (3) simpliciter serrulatis, subtus molliter pilosis, foliolis latioribus; inflorescentia (4) pyramidali, multi-flora, pedunculis patulis; floribus (5) minoribus. Subvirescens. Forma vergens in *R. mucroniferum* Sud.

In nemoribus. — GERMANIA: *Guestphalia*, Mennighüffen (Weihe), *Schleswig-Holstein, Bavaria*; GALLIA: *Haute-Garonne, Tarn, Seine-et-Oise, Saône-et-Loire, Maine-et-Loire, Ardèche, Loir-et-Cher, etc.*; HUNGARIA: *Trencin*; BRITANNIA, *Hibernia* (Rogers); BELGIA; CAUCASUS. — β. GALLIA: *Hautes-Pyrénées*, Arreau. γ. GALLIA: *Tarn, Lacabarede*. — δ. GALLIA: *Hauts-Pyrénées, Fréchet-Aure, bois de Hèche, Haute-Garonne, Balma, Eauze*; LUSITANIA: *in montibus Brunheiro* (G. Sampaio). — ε. GALLIA: *Tarn, Burlats: Valois, forêt de Retz* (Questier); BAVARIA: Eisenstein, Waldmünchen (Progel). — ζ. BRITANNIA: *Cheshire, Edge Green* (Wolley-Dod). — η. BAVARIA: *Untergrafenrieder Mühle* (Progel); GALLIA: *Vosges, forêt de St Gorgon, près de Rambervillers* (Boulay); *Puy-de-Dôme*, inter *Corday* et *Roquafort* (Lamotte). — θ. BRITANNIA: York, Hereford, Radnor, *Hibernia* (Rogers). — ι. GALLIA: *Loire-Inf., Ingrandes, la Bégrolles* (GALAR). — ι. ROSSIA: *Caucasus, Abkhazia, Suchum-Kale* (G. Woronoff). — λ. LUSITANIA: *in montibus « Gerez »* (Murray, G. Sampaio).

OBS. — La plante de la Haute-Garonne est celle qui me paraît correspondre le mieux au type de Weihe; celle d'Angleterre (*R. anglosaxonicus*) a les feuilles glabres en dessus, mais ne paraît pas en différer autrement. — Les variétés admises sont nettement caractérisées, mais se relient au type par des intermédiaires embarrassants. La var. *cinerosus* se rapproche du *R. micans* God. mais a la dentelure plus superficielle et le calice réfléchi.

HYBRIDÆ

R. APICULATUS × *ARGENTEUS* *incarnatus*; *R. INCARNATIFLORUS* Sud. — Differt a *R. apiculato* aculeis subæqualibus, turione sublaevi, fere glabro, floribus lâte roseis. Pollen atrophum.

GERMANIA: *Prov. rhénana, St. Wendel* (Ruppert).

R. APICULATUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Fl. Toul.* 75 (1907); *R. AMABILIFLORUS* Sud.; *R. amabilis* Sud. l. c., non Focke. — A *R. apiculato* distinguuntur glandulis rarisi, foliis discoloribus, rachide parum pilosa, floribus vive roseis. Sterilis.

GALLIA: *Haute-Garonne*; Aufréri, prope Balma.

R. APICULATUS v. ε × *HEBECAULIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 35 (1909); *R. NUDIFLORENS* Sud. l. c. — Differt a *R. apiculato* v. ε. aculeis minus inæqualibus, inflorescentia laxa, sepalis patulis, floribus albis, sterilibus.

GALLIA: *Tarn, Burlats, chemin des Fontaines*.

R. APICULATUS var. ε × *GLAUCELLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 35 (1909); *R. PULLATIFRONS* Sud. l. c. — Turio glabrescens, obtusus; aculei conici; folia subtus viridia, inflorescentia diffusa, sepala patula.

GALLIA: *Tarn, Burlats, chemin des Fontaines*.

OBS. — Certains spécimens de *R. Coutinhii* G. Samp., de Guarda et de Bussaco (Portugal), sont probablement des *R. lusitanicus* × *Caldasianus*.

Conspectus speciei, subspeciei et microgenerum

1. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta.

- | | |
|---|---------------------------------|
| A. — Turio glaber vel parce pilosus; <i>Rubi vulgo validi</i> ; foliolum caul. terminale plerūque obovatum..... | <i>R. apiculatus</i> Wh. |
| B. — Turio dense pilosus, pruinosis; <i>Rubi debiles</i> . | |
| a. — Turio obtusus; foliolum caul. terminale oblongum..... | <i>R. MALACOTRICHUS</i> Sud. e. |
| b. — Turio angulatus; foliolum caul. terminale late ovatum..... | <i>P. LAURACENSIS</i> Sud. B. |
| II. — Inflorescentiae rachis tomentosa, parce pilosa..... | <i>R. GRANITOGENES</i> Sud. b. |

b. — (T. CXXX) — *R. granitogenes* Sud. *Rub. Pyr.* p. 140 (1901).

Differt a *R. apiculato*: foliis subtus albo-tomentosis, foliolis caul. terminalibus (10) acuminatis, ramis minus armatis; inflorescentia tomentosa, parce pilosa (11, 12), subinernii, elongata, laxa, ± foliosa, glandulis brevibus munita; sepalis eglandulosis, inermibus. Petala rosea, stamina alba stylos virescentes superantia; germina glabra. — Intermedius fere inter *R. apiculatum* Wh. et *R. foliosum* W. et N.

GALLIA: *Basses-Pyrénées*, inter Gabas et Eaux-Chaudes, in solo granitico.

HYBRIDA

R. GRANITOGENES × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 140 (1901); *R. ERUTUS* Sud. l. c. — Glandulæ subnullæ; aculei subæquales; sterilis.
GALLIA : Basses-Pyrénées, inter Gabas et Eaux-Chaudes.

c. — (T. CXXX) — *R. malacotrichus* Sud. *Diagn.* p. 36 (1906).

Gracilis; *turio* (6) obtusus, pilosus, dense glandulosus, aculeis debilibus; *folia* 5-nata, subtus cinereo-tomentosa, molliter pilosa, simpliciter et subæqualiter serrata; *foliolum* caulinum terminale (7) angustum, oblongum, cordatum, longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *ramus* teres, pilosus, subinermis; *inflorescentia* angusta, hirsutissima, aculeis debilibus (8), raris munita, pedunculis (9) brevibus. *Flores*?

GALLIA : Valois, Bourneville (Questier).

B. — (T. CXXX) — *R. lauracensis* Sud. *Flor. Toul.* p. 75 (1907).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 460!

Differt a *R. apiculato* Wh. : *turione* (13) pruinoso, dense piloso; *foliis* caulinis (14) plerumque 3-natis foliolis terminalibus late cordato-ovatis, acuminatis. *Folia* subtus molliter pilosa; *inflorescentia* brevis, foliosa, hirsuta (15), parum armata; *petala* pallide rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* glabra; *pollen* parum admixtum.

GALLIA : Haute-Garonne, bois du Lauragais, Fonsegrives, Eaunes; Hautes-Pyrénées, Cadéac (Duffort).

76 — (T. CXXXI) — *R. MICANS* God. *ap. Gr. et God. Fl. Fr.* I p. 546 (1848); *Fl. Lorr.* 2^e éd. I p. 239; J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 53 t. XXIII, XXIV, non Billot *exsicc.*, nec Rogers *Handb.* p. 48; *R. Schummeltii* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 465 (*Addit.*), non Wh. *ap. Wimm.* et Grab. *Fl. Sil.* I, v. 2 p. 56 (1829).

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 33; *Assoc. rub.* n° 1019; *Sud. Bat. eur.* n° 461; *Rub. rar.* n° 80.

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, epruinosus, glabrescens, parce glandulosus; *aculei* inæqualißimi, maiores subcompr. ssi, recti vel reclinati, minores papulæformes; *folia* 3-4-5-nata (2), firma, supra parce pilosa, subtus cinereo vel albo-tomentosa, molliter pilosa, grosse et inæqualiter serrata, dentibus angulosis; *foliolum* terminale late ovatum vel subrhombium, basi rotundatum, vulgo integrum, breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* parce glandulosus, aculeis falcatis munitus; *stipulae* lineares, parum glandulosæ; *ramus* florifer pilosus, parce glandulosus, foliis 3-natis, grosse serratis, superis subdiscoloribus; *inflorescentia* (3) brevis, lata, basi foliosa, tomentosa, glandulosus, petala (4) angustae ovatae, pallide rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* pilosum. — Julius.

β. *HASSKARLII*; *R. Hasskarlii* P.-J. Müll. et Wirtg. *ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed.* I, n° 156 (1860) non Miquel. — *Turio* distincte pilosus; *foliolum* caul. terminale petiolulo proprio duplo longius. Cetera ut in typō.

γ. INTERCEDENS. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 81! — *Turio* parce pilosus; *foliolum* caul. terminale late ovatum, rotundatum, acuminatum; *petala* ovata, rosea; *stamina* rosea stylis roseos superantia; *germina* glabrescentia.

δ. SCHISTOPHILUS; *R. schistophilus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 136 (1901). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 462! — *Turio* parce pilosus, aculeis crebris, obliquis; *folia* 3-4-5-nata, subsimpliciter serrata; *foliolum* caul. terminale breviter obovatum, basi subemarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* laxe pilosa; *petala* pallide rosea, *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* pilosa. — *R. apiculato* Wh. similis.

ε. ESTIMABILIS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 463! — *Turio* dense pilosus; *folia* caul. 5-nata; *foliolum* terminale obovatum, emarginatum; *inflorescentia* valde foliosa, pedunculis ascendentibus; *sepala* subinermia; *petala* rosea, *stamina* rubra stylis roseos æquantia. — *Habitus R. clethrophili* Gen.

ζ. AMYGDALOTHYRSUS; *R. amygdalothrysus* Kinscher D. Bot. Monat. (1910) p. 14; *R. posnantensis* × *candicans* var. *roseolus* ej. — Differt a typō: *turione* fere glabro, scabriore, subglaucoscenti; serratura grossiore, *inflorescentia* densa, magis armata, sepalis dense aculeatis.

η. VELUTIFOLIUS. — *Turio* dense pilosus; serratura tenuis; *foliolum* terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; *petala* stamina rosea; *germina* glabrescentia.

GALLIA : Nancy, mur ouest de la Malgrange (Godron); Vosges, Granges (F. Gérard); Tarn, La Croix-Blanche; BELGIA : Woluwe-St-Pierre (du Pré), Vierset (Charlet). — β. GERMANIA : Bertrich (Wirtg.). — γ. et ε. GALLIA : Haute-Garonne, Eaunes. — δ. GALLIA : Hautes-Pyrénées, vallée d'Aure. — ζ. GERMANIA : Silesia, prope Herrnsdorf (Kinscher). — η. GALLIA : Tarn, gorge de Durfort.

HYBRIDÆ

R. MICANS × *ARGENTEUS* (grex) Sud. *Rub. tarn.* p. 33 (1909); *R. HEBETIDENS* Sud. l. c. — Differt a *R. micans* foliis discoloribus, glandulis rarioribus, floribus albis, sterilibus.

GALLIA : Tarn, La Croix-Blanche, prope Alban, via Cambon-du-Temple.

R. MICANS var. δ × *ULMIFOLIUS*; *R. GRACILIDENS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 137 (1901). — Glandulæ raræ, breves; *folia* albo-tomentosa; flores rosei, steriles.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, bois de Bédat.

R. MICANS × *HEBECAULIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 35 (1909); *R. PSEUDOMICANS* Sud. l. c. — Subvirescens, dentes tenues, *inflorescentia* laxa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, La Croix-Blanche, prope Alban, via Cambon-du-Temple.

R. MICANS var. δ × *TERETICAULIS* (grex): *R. BARRANCOENNENSIS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 137 (1901). — *Turio* glanduloso-aciculatus; *folia* 3-5-nata, subdiscolora; *inflorescentia* parva, arcuata; *sepala* erecta. Sterilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, vallée de Barrancoueu.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Rubi validi; *turio* angulatus, faciebus planis vel concavis; *folia* caulinæ vulgo 5-nata.

A. — Folia subtus piloso-velutina; *inflorescentia* vulgo parum armata.

a. — Dentes grossi vel mediocres, inæquales; *foliolum* caul. terminale ovatum vel obovatum.

1. — *Stamina* stylos superantia.

a. — *Turio* epruinosus, ± pilosus; *foliolum* terminale ovatum vel obovatum.....

b. — *Turio* pruinosis, glaber; *foliolum* terminale latum.....

2. — *Stamina* stylis breviora; *inflorescentia* armatissima.....

b. — Dentes tenues, parum profundi; *foliolum* caul. terminale obovatum, cuspidatum.....

R. micans God.

R. MICANTIFORMIS Sud. b.

R. FIRMIOR Sud. c.

R. OBSECTIFRONS Sud. d.

- S. — *Folia subitus appresse tomentosa, parum pilosa.*
- a. — *Turio glaber, epruinosus, flores albi vel pallide rosei.*
 - 1. — *Stamina stylos æquantia vel superantia; petala ovata.....*
 - 2. — *Stamina stylis breviora; petala orbicularia.....*
 - b. — *Turio pilosus, epruinosus; flores albi vel pallide rosei.....*
- C. — *Turio glabrescens vel pilosus, sœpe pruinosus; floris omnes partes vive roseæ; sepala in fructu erecta.*
- 1. — *Foliolum caul. terminale suborbiculare, cordatum; turio pruinosus.*
 - a. — *Validus; folia caul. 5-nata; inflorescentia armatissima.....*
 - b. — *Gracilis; folia caul. 3-4-nata; inflorescentia parum armata.....*
 - 2. — *Foliolum caul. terminale ovatum vel obovatum, basi integrum vel subemarginatum.*
 - a. — *Turio parce pilosus; foliolum caul. term. ovatum, acuminatum.....*
 - b. — *Turio dense pilosus; foliolum caul. term. obovatum, cuspidatum.....*
- II. — *Rubi graciles; turio subteres, raro angulatus; folia subitus pilosa, caulinæ sœpe 3-nata.*

- A. — *Turio pilosus.*
- a. — *Stamina stylos superantia.....*
 - b. — *Stamina stylos æquantia; folia albo-tomentosa, minute serrata.....*
 - c. — *Stamina stylis valde breviora; folia grosse serrata.....*
- B. — *Turio fere glaber; stamna stylis fere æquilanga vel breviora, raro eos superantia.....*

b. — (T. CXXXII) — *R. micantiformis* Sud. *Bat. p. 46* (1905).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur. n° 140* !

Turio (1) glaber, pruinosus, angulatus; serratura et pubes ut in *R. micanti*; *foliolum* caul. (2) terminale magnum, late ovatum vel suborbiculare, cordatum, abrupte et breviter acuminatum; *ramus* denses glandulosus; *inflorescentia* magna, parum armata (3). Cetera ut in *R. micanti*. Pollen parum admixtum; petala (4) pallide rosea.

β. *ALBIFLORUS* Sud. *Rub. tarn. p. 35* (1909). — Folia subitus mollissima; petala alba.

GALLIA : *Tarn*, Marssal, ad ripas Tarnis. — β. *Tarn*, Crespinet, in valle Lezert.

c. — (T. CXXXII) — *R. firmior* Sud. in hb. Bicknell.

Turio (5) glaber, pruinosus, planus; *folia* 5-nata, subitus cinereo-piloso-velutina, argute, acute et inæqualiter denticulata; *foliolum* terminale (6) obovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* foliosa, hirsuta, glandulis brevibus, aculeis pallidis, crebris (7, 8), validis, rectis reclinatisve instructa; *sepala* hirsuta, aculeata; *petala* (9) pallide rosea; *stamina* dilute rosea stylis virescentibus multo breviora; *germina* glabra.

ITALIA : *Liguria*, Perinaldo (C. Bicknell).

d. — (T. CXXXII) — *R. obsectifrons* Sud. in hb. Müller; *R. podophyllum* v. *incaetus* N. Boul. exsicc.

Exsicc. — *Assoc. rub. n° 1172* (var.).

Turio pilosus, faciebus planis; *folia* subitus cinereo-tomentosa, molliter pilosa, minute et subsimpliciter mucronato-denticulata; *foliolum* terminale (10) late obovatum, leviter emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* magna, obtusa, laxe pilosa, parum armata (11); *petala* (12) alba; *stamina* alba stylis virescentibus parum superantia. — An *R. obsectifolius* P.-J. Müll. X ?

GALLIA : *Vosges*, haies, à Jeanménil, près de Rambervillers (Boulay); *Yonne*, Ste-Magnence (Lucand).

B. — (T. CXXXII) — *R. subrotundus* Sud. *Bull. Assoc. pyr. n° 257* (1900); *Fl. Toul. p. 75*.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur. n° 464* !

Turio angulatus, faciebus planis, fere glaber, epruinosus, scaberrimus; *folia* 5-nata, supra glabra, subitus cinereo-tomentosa, parum pilosa, mediocriter, inæqualiter et subsimpliciter serrata; *foliolum* terminale (13) suborbiculare vel obovato-orbiculare, cordatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio fere triplo longius; *petiolorum* aculei geniculati; *ramus* parum pilosus; *inflorescentia* brevis, lata, apice truncata vel rotundata, parum foliosa, laxe pilosa, aculeis debilibus, crebris (14), pedunculis elongatis, subascendentibus (15); *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, parce aculeata, appendiculati, patula vel fructum amplectentia; *petala* (16) alba vel dilute rosea, obovata, emarginata; *stamina* alba stylis virescentibus superantia; *germina* pilosa. Praecox.

β. *PUGIUNCULIFER* Sud. *Rub. tarn. p. 35* (1909). — Folia albo-tomentosa, foliolis acuminatis; dentes acuti; *inflorescentia* elongata, armatissima.

γ. *GRANULATIFRONS*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur. n° 465* ! — Subvirescens; *foliolum* caul. terminale obovatum, cuspidatum; *inflorescentia* angustior; *germina* glabra. Forma vergens in *R. granulatum* M. L.

GALLIA : *Tarn*, Albi, Barat, Giroussens; *Haute-Garonne*, Bouconne, Buzet; *Gers*, Pujaudran. — β. *Tarn*, La Sarrade. — γ. *Sarthe*, St-Povace, à la Hammerie (Henry).

HYBRIDÆ

R. SUBROTUNDUS × *TARNENSIS* Sud. *Rub. tarn. p. 35* (1909); *R. VALIDIFRONS* Sud. l. c. — Parum heteranthus, glandulæ raræ, *inflorescentia* angusta, subracemosa, flores rosei, parum fertiles.

GALLIA : *Tarn*, in silva Giroussens, apud Rieu-Vergnet.

R. SUBROTUNDUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. l. c. 35; *R. SUBVENUSTUS* Sud. l. c. — Frons pallida, flavescens, discolor; dentes lati; *foliola* rhombæa, rachis parum glandulosa.

GALLIA : *Tarn*, in silva Giroussens, prope Parisot.

b. — (T. CXXXII) — *R. garumnicus* Sud. *Bull. Assoc. Pyr. n° 417* (1910).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur. n° 466* !

Gracilis; *turio* glaber, epruinosus, faciebus concavis; *folia* 3-4-5-nata, supra glabra, subitus pilosa, superiora ± discopora, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale (7) suborbiculare vel late ovatum, basi emarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio quadruplo longius; *inflorescentia* inferne foliosa, aculeis tenuibus, pallidis munita; *sepala* post anthesin patula, in fructu laxe reflexa (18); *petala* (19) suborbicularia, pallide rosea; *stamina* alba stylis virescentibus breviora; *germina* glabra.

GALLIA : *Haute-Garonne*, in collibus silvosis Garumnae, prope Eaunes.

R. *SUBROTUNDUS* Sud. B.

R. *GARUMNICUS* Sud. Eb.

R. *PAUCIGLANDULOSUS* Sud. C.

R. *SUBSIMILIS* Sud. D.

R. *RECTENSIS* Waisb. Ec.

R. *PULCHER* M. L. E.

R. *ABRUPTIFOLIUS* Sud. Eb.

R. *SUBCANUS* P.-J. Müll. F.

R. *LACTEICOMUS* Sud. Fb.

R. *ALBICOMUS* Greml. Fe.

R. *HETEROCHROUS* Sud. G.

C. — (T. CXXXII) — **R. pauciglandulosus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 67 (1900); *R. Radula* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 209, non Wh.; *R. delicatulus* ej. l. c. p. 206 (1864), non N. Boul.; *R. argenteus* ej. l. c. p. 214, non W. et N.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 467 !

Validus; *turio* obtusangulus, epruinosus, parce pilosus, glandulis raris, aculeis reclinatis falcatis munitus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus albo-tomentosa, breviter pilosa, inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (10) obovatum, subemarginatum, acuminatum; *petiolorum* aculei breves, falcati; *ramus* pilosus, parce glandulosus, aculeis brevibus, falcatis uncinatis armatus, foliis 3-5-natis, foliolis terminalibus obovatis, acuminatis; *inflorescentia* magna, laxa, parum foliosa, pilosa, parce glandulosa, aculeis mediocribus, reclinatis falcatis munita, pedunculis mediis (22) patulocaudentibus, multifloris; *sepala* tomentosa, hirsuta, glandulis brevibus, raris, aculeis nullis vel raris munita, post anthesin patula; *petala* (23) alba vel dilute rosea, ovata; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

β. **TENEBRICOSUS**; *R. tenebricosus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1899) p. 88; *R. Radula* f. *pubescens* *Rub. gall.* n° 132 ! — Exsicc. Sud. *Bat. eur.* n° 468 ! — Turio pilosior; *folia* supra obscure viridia, parum discolora; *foliolum* caul. terminale ovatum, emarginatum; dentes acutiores.

γ. **ELLIPTICUS**. — Exsicc.: *Bat. eur.* n° 469 ! — Minus discolor; *foliolum* caul. terminale late ellipticum, basi rotundatum; dentes acutissimi; *inflorescentia* densa, glandulosior; *petala* pallide rosea.

δ. **SABRANSKYI**; *R. macrostachys* Sabrs. *O. B. Z.* (1905); *tir. à p. p.* 6, non P.-J. Müll.; *R. scrupulus* Progel, p. p. — Differt à typus: glandulosiore, heteracanthio; *inflorescentia* armatissima, aculeis flavescentibus, falcatis geniculatis, glandulis longis munito; staminibus stylos vix superioribus; germinibus pilosis.

ε. **ABCHAZIENSIS** Sud. *Rub. Jard. Tiflis.* p. 5 (1909). — Turio debilis, aculeis parvis, reclinatis; *folia* ampla, tenuia, inaequaliter mucronato-serrata; *foliolum* terminale suborbicularare, basi emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima longe petiolulata (pet. = 6-9 mm. longi); *inflorescentia* angusta, inferne foliosa, dense hirsuta, aculeis flavescentibus, glandulis crebris munita, pedunculis superioribus patulis; *sepala* in fructu erecta; *stamina* stylos vix aequantia; *germina* pilosa; flores ?

GALLIA: *Tarn*, in silva Grésigne frequens; *Ariège*, Ax; *Haute-Garonne*, Eaunes. — β. *Tarn*, inter Carmaux et Monestiés, Téillet, le Bez, Sidobre. — γ. *Sarthe*, Le Mans (Coilliot, Henry). — δ. **STYRIA**: Söchau (Sabransky); **BAVARIA**: Waging, prope Traunstein (Progel). — ε. **ROSSIA MERIDIONALIS**: Abchazia, Suchum-Role (G. Woronow).

HYBRIDÆ

R. PAUCIGLANDULOSUS var. ε. × **ULMIFOLIUS sanctus**; *R. TZEBEDENSIS* Sud. — Differt a *R. paucigl.* var. ε. aculeis subæqualibus, foliis coriaceis, supra pilosis, subtus albo-lomentosis, inaequaliter serratis; rachis tomentosa, breviter pilosa, subglandulosa, floribus latè roseis. *Stamina* stylos vix aequantia; antheræ parce pilosæ; *germina* pilosa.

CAUCASUS: Abchazia, Tzebelda, prope Furjeroskoje (G. Woronow).

R. PAUCIGLANDULOSUS v. δ. × **PODOPHYLLUS holochlorus**; *R. MATOUSCHEKII* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) p. 356. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 470 ! — Differt a var. δ. foliis minute denticulatis, foliolo terminali obovato-orbiculari, cuspidato. Substerilis.

STYRIA: Söchau (Sabransky).

OBS. — Le *R. delicatulus* de Martr.-D. provient de pieds jeunes et peu normaux du type de la forêt de Grésigne. — Le *R. pilocephalus* Gremli *O. B. Z.* (1871) 126, décrit trop sommairement par l'auteur, semble se placer dans le groupe du *R. micans* God. — **HELVETIA**: Zurichberg (Gremli). — Il en est de même du suivant :

R. carinthiacus Hal. *Oest. bromb.* p. 254 (1891). — Flores albi, *stamina* purpurea. — **AUSTRIA**: Villack, St-Ruprecht (Witting). Mihi novus est.

D. — (T. CXXXII) — **R. subsimilis** Sud. *Rub. Pyr.* p. 141 (1901).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 471 !

Validus; *turio* faciebus planis vel leviter excavatis, pruinosus, glaber vel parce pilosus, scaber, glandulosus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, minute et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (24) suborbicularare, cordatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio fere duplo longius; *ramus* heteracanthissimus, aculeis validis, subfalcatis, foliis 3-5-natis, minute serratis; *inflorescentia* magna, subaphylla, hirsuta, glandulis crebris, longis, aculeis validis (25, 26), numerosis, reclinatis falcatis munita; *sepala* glandulos-aculeata, fructum laxe amplectentia; *petala* pallide rosea; *stamina* dilute rosea stylos superantia; *germina* glabra; *pollen* imperfectum. Fertilis.

β. **OPLOCLADUS** Sud. *Rub. Tarn.* p. 36 (1909). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 472 ! — Turio obtusus, glaber; foliorum ramealium foliola terminalia obovato-orbicularia; *stamina* stylque pallida. — Intermedius inter *R. subsimilem* et *R. pauciglandulosum*.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, valle Lastie, apud Ys, Pouy, Gèdre-de-Bareilles; *Tarn*, Montcouyoul. — β. *Tarn*, Tonnac, via Vaour.

HYBRIDA

R. SUBSIMILIS × **MICANS** v. *schistophilus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 141 (1901); **R. INTECTIFORMIS** Sud. l. c. — Turio pruinosus; *foliolum* terminale ovatum vel suborbicularare, *inflorescentia* brevis, *sepala* laxe erecta. Parum fertilis.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Ys.

OBS. — Le *R. trachydermis* Focke *Syn.* p. 324 (1877); *R. apiculatus* B. *trachydermis* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 581, appartient vraisemblablement au *R. micans* God.. M'est inconnu. — **GERMANIA**: Rüdesheim (Focke).

E. — (T. CXXXIII) — **R. pulcher** M. et Lef. *Vers.* n° 86 (1859); *R. Radula* v. *pulcher* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 90 (1900); *R. pilocarpus* Holuby *O. B. Z.* XXV (1875), 313, non Grl. nec Braun.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 183; Sud. *Bat. eur.* n° 473 !

Turio (1) faciebus planis, epruinosus, parce pilosus, glandulis crebris, aculeis reclinatis armatus; *folia* vulgo 5-nata, supra glabrescentia, subtus cinereo-tomentosa, breviter pilosa, dentibus mediocribus, acutis, subæqualibus; *foliolum* terminale (2) ovatum, subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolorum* aculei falcati; *ramus* aculeis debilibus, falcatis, foliis 3-natis, superis discoloribus; *inflorescentia* parva, subaphylla, laxe pilosa (3), glandulis rubris, crebris, aculeis debilibus munita; *sepala* tomentosa, dense glandulosa, parce aculeata, fructum laxe amplectentia (4); *petala* (5) vive rosea; *stamina* rosea stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia. *Pollen* parum admixtum.

β. **SUBELEGANS**; *R. subelegans* Sud. *Rub. Pyr.* p. 201 (1903); *R. elegans* Sud. l. c. p. 18 non P.-J. Müll. — Turio glabrescens, glaucescens; serratura inaequalior; *inflorescentia* armatior; *petala*, *stamina* stylque rubra.

GALLIA: Valois, forêt de Retz (Lefèvre, Questier); Ardennes, le Chesne, à Maison-Rouge (Callay). — β. *Tarn*, Lacaune, le Sidobre; Hautes-Pyrénées, Cauterets.

HYBRIDÆ

R. PULCHER × VESTITUS Sud. *Diagn.* p. 37 (1906); *R. ASPERIFOLIUS* Sud. — *Habitus R. pulchri* sed *turio pilosus*, parum heteracanthus; *folia utrinque pilosa* ut in *R. vestito*; *foliola lata*, *sepala patula*; *parum fertilis*.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Questier).

R. PULCHER × ADSCITUS Sud. in *hb. Mus. Paris.*; *R. ACUTATUS* M. et Lef. *Vers.* n° 81 (1859), *pr. sp.*; *R. adscitus v. acutatus* Sud. in *hb. Müller*; *R. hypoleucus* × *vestitus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 109, *p. p.* — *Diffr. a R. pulchro* glandulis sparsis, *turione inflorescentia* que pilosioribus, *foliis subtus pilosis*, *inflorescentia magna*, *multiflora*, *sepalis patulis*. *Parum fertilis*.

GALLIA : *Oise*, Cuverguen (Lefèvre, Questier).

b. — (T. CXXXIII) — *R. abruptifolius* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 322.

Exsicc. — Baenitz *hb. eur.* n° 9053 (s. n. *R. innecti f. rubra*).

Turio (6) dense pilosus, glaucescens, aculeis parum inæqualibus; *folia supra glabrescentia*, *subtus cinereo-tomentosa*, minute mucronato-denticulata; *foliolum terminale* (7) obovatum, integrum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* (8) *rubra*, glandulis longis; *sepala* dense glanduloso-aculeata, *patula*? *Flores* vive rosei (9).

β. *SUPERVESTITUS*; *R. supervestitus* Boul. et Quincy *Assoc. rub. exsicc., ex pte* (n° 502) (1882). — *Turio appresse pilosus*; dentes acuti; folia ramealia supra pilosa; inflorescentia ut in *R. pulchro* sed armatior; stamina stylique pallida.

GERMANYA : *Badenia*, Siegelau (Goetz). — β. GALLIA : *Saône-et-Loire*, Le Creusot, à Vaumartin; Mont (Basset).

c. — (T. CXXXIII) — *R. Roetensis* Waisbecker *Oest. bot. Z.* p. 6 (1897); Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 331.

Exsicc. — Baenitz *hb. eur.* n° 9567.

A proximo *R. pulchro* differt: *foliis 3-natis*, *argute denticulatis*; *foliolo terminali* (10) *orbiculato*, *cordato*, *breviter acuminato*; *ramorum aculeis longioribus*; *inflorescentia* (11) *laxa*, *sepalis* (12) *in fructu patulis*.

HUNGARIA OCCIDENTALIS : Rottendorf (Waisbecker).

F. — (T. CXXXIII) — **R. subcanus** P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 34 (1866); *R. Menkei* E. *subcanus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 557; *R. vestitus* × *hirtus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 128 *p. p.*

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 27!, non *Assoc. rub.*

Turio (13) debilis, obsolete angulatus, glaucescens, pilosus, glandulosus; *aculei* majores leviter compressi, reclinati; *folia* 3-5-nata, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa, pilosa, inæqualiter et subsimpliciter mucronato-serrata; *foliolum terminale* (14) late obovatum vel subobovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* pilosus, *foliis 3-natis*, subdiscoloribus, *foliolis terminalibus* late rhomboides; *inflorescentia* angusta, foliosa, breviter hirsuta (15), aculeis medio-cribus, reclinatis, pedicellis (16) brevibus; *sepala* tomentoso-viridia, breviter pilosa, dense glandulosa, *patula*; *petala* (17) ovata vel obovata, alba vel pallide rosea; *stamina* alba, stylos basi roseos superantia; *germina* glabra.

β. *SUPINUS* Sud. *Bat. p. 44* (1905); *R. supinus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) n° 8, *tir. à p. p. 7*; *R. cunctator* Sabrs. *Z.-B. Ges.* (1904), 542, non Focke. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 141. — *Turio pruinosisssimus*; *folia 3-nata*, *subtus molliter pilosa*; *sepala* aculeata, stylos virescentes.

γ. *ALBOCALYX* Sud. *Rub. tarn.* p. 36 (1909). — *Turio* parum pilosus; *folia 3-nata*, *subtus molliter pilosa*, acute serrata; *foliolum terminale* obovatum, acuminatum; *petala* staminaque rosea; *calyx* erectus, hirsutus.

δ. *LITODON* Sud. *Rub. tarn.* p. 36 (1909). — *Folia tenuiter mucronato-denticulata*, *caul. 3-nata*; *foliolum terminale* breviter obovatum, emarginatum, abrupte acuminatum; *petala* rosea, *stamina alba* stylos basi roseos superantia; *germina* pilosa.

ε. *AURIGERANUS*. — *Folia 3-nata*, inæqualiter et acute serrata; *rachis* parum pilosa; *petala* stylique rosea; *stamina* rubra.

ζ. *PILETONEURUS* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 474! — *Turio* dense pilosus, angulatus; *folia 3-nata*, acute serrata, subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis; *foliolum terminale* obovatum, acuminatum; *flores albi*; *germina* glabra.

η. *BASSETII*. — *Turio pruinosisssimus*, dense pilosus; *folia 5-nata*, acute et *duplicato-serrata*, subtus molliter pilosa; *inflorescentia magna*, dense hirsuta; *petala* pallide rosea; *stamina* alba stylos pallide roseos superantia; *germina* glabra.

GERMANYA : *Bavaria*, Waging (Progel); GALLIA : *Vosges*, vallée de la Mortagne, au-dessus d'Autrey (Boulay); *Haute-Garonne*, Eaunes; *Puy-de-Dôme*, St-Rémy-s.-Durole (Chassagne). — β. STIRIA : Ebersdorf, prope Soechau. — γ. GALLIA : *Tarn*, Crespinet, moulin de la Bastide. — δ. *Tarn*, Le Gô, prope Albi. — ε. ARIEGE, Foix. — ζ. HELVETIA : *Fribourg*, La Joux Dumas (Jaquet). — η. GALLIA : *Saône-et-Loire*, Mont, à Chaut (Basset).

b. — (T. CXXXIII) — *R. lacteicomus* Sud. *Rub. tarn.* p. 36 (1909); *R. denticulatus* (Kerner) Focke *Syn. 282, pr. min. p.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 475! ; Progel n° 227 (*pr. p.*).

Turio (18) subteres, pruinosis, dense pilosus, aculeis leviter compressis; *folia 3-nata*, supra parce pilosa, subtus albo-tomentosa, pilosa, minute et subsimpliciter serrata; *foliolum terminale* (19) late obovatum, leviter emarginatum, acutum vel subacuminatum; *ramus* dense pilosus, *foliolis terminalibus* obovatis; *rachis* (20) tomentosa, breviter pilosa, aculeis tenuibus munita; *sepala* parce glandulosa, *patula* vel erecta (21); *petala* alba vel dilute rosea: *stamina* alba stylos virides vix æquantia; *germina* glabra. Fertilis.

β. *ISOPHYLLUS* Sud. l. c. — *Folia* caulinæ et ramealia omnia similia, discolora, *foliolis terminalibus oblongis*, *cordatis*, *acuminatis*; *petala* alba, *styli* rosei.

γ. *SALTUIFORMIS* Sud. l. c.; *R. acutatus* Progel *hb. non Lef. et M.* — *Folia grosse serrata*; *inflorescentia elongata*, *foliosa*; *styli* rosei.

δ. *GLOSSOPHYLLOIDES*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 476! — *Turio* angulatus, epruinosus; *foliolum terminale* oblongo-obovatum, abrupte acuminatum, basi subemarginatum; *inflorescentia* pyramidalis, armata, pedunculis patulis; *flores* albi; *germina* apice pilosa.

GALLIA : *Tarn*, Cambon; GERMANYA : *Bavaria*, Waging, prope Traunstein (Progel). — β. GALLIA : *Tarn*, inter Fabas et Foncouverte. — γ. GALLIA : *Tarn*, Crespinet; *Haute-Garonne*, Eaunes; GERMANYA : *Bavaria*, prope Weilhem (Progel). — δ. GALLIA : *Haute-Garonne*, Eaunes.

OBS. — M. Focke a groupé sous le nom de *R. denticulatus* (Kerner) des formes très diverses. Le n° 32 de Progel est un mélange de deux plantes dont l'une paraît être un hybride de *R. hirtus*; le n° 39 est mon *R. rubriglandulosus* (gr. n° 99); le n° 227 correspond (*pr. max. p.*) au type *R. lacteicomus*; enfin le n° 228 est un *R. hirtus* × *bifrons*.

c. — (T. CXXXIII) — *R. albicomus* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 30 (1870); Focke *Syn.* p. 335; *R. foliosus* C. *albicomus* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 575 (1902).

Turio (22) obtusangulus, pilosus, glanduloso-aciculatus, aculeis parum compressis; *folia* 3-5-nata, supra glabrescentia, subtus cinereo-tomentosa, molliter pilosa, grosse et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (23) ellipticum, basi integrum, longe acuminatum, breviter petiolatum; *folia* ramealia grosse dentata; *inflorescentia* subaphylla, pilosa, glandulis brevibus, aculeis rarissimis, tenuibus munita (24); *sepala* tomentosa, breviter glandulosa, in fructu erecta; *petala* rosea; *stamina* (25) stylis breviora; *germina* glabra.

β. *CHLOROPSIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 36 (1909); *R. rumorum* Sabrs. *exsicc.* — Serratura tenuior; inflorescentia multiflora glandulis longioribus; petala alba vel dilute rosea.

γ. *NIGROVIRIDIS*; *R. nigroviridis* Sabrs. *Verh. Ver. Nat. Presburg* (1888). — Foliolum caulinum terminale latum; petala alba.

HELVETIA: in regione Schaffhouse (Gremli); GALLIA: Tarn, Crespinet, in valle Lézert. — β. Tarn, Crespinet; STYRIA: Söchau. — γ. HUNGARIA: in convallibus Carpathorum Minorum ad Posonium (Sabransky).

G. — (T. CXXXIII) — **R. heterochrous** Sud. *Rub. Pyr.* p. 132 (1901) (*sensu ampliori*).

Turio (26) subteres, ± glaucescens, fere glaber, parum glandulosus, aculeis debilis, inaequalissimis munitus; *folia* 3-5-nata, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa et pilosa, inaequaliter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale (27) ovatum vel breviter obovatum, cordatum, acuminatum; ramus teres, pilosus, foliis subdiscoloribus; *inflorescentia* (28) multiflora, hirsuta, glandulis longis, aculeis tenuibus, pedunculis (29) patulis; *sepala* tomentosa, glandulosa, parce aculeata, angusta, fructum amplectentia; *petala* ovata, rosea; *stamina* dilute rosea stylos virescentes æquantia; *germina* pilosa. Fertilis.

β. *NITIDIPILUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 36 (1909). — Folia 3-nata; foliolum terminale obovatum; inflorescentia brevis, multiflora; petala pallide rosea, stamina alba stylos superantia.

γ. *MICASCHISTOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 37 (1909). — Foliolum terminale anguste obovatum vel oblongum; dentes tenues; stamina alba stylos rubros æquantia.

δ. *SUBCANIFORMIS* Sud. l. c. 37. — Aculei validiores; turio leviter angulatus; foliolum terminale suborbicularis, cordatum, abrupte acuminatum; inflorescentia armata; petala pallide rosea, stamina stylos viridentibus breviora.

ε. *PALLIDULUS* Sud. l. c. 37. — Folia 5-nata, acute, tenuiter et inaequaliter serrata; foliolum terminale ovatum, vix emarginatum, acuminate; inflorescentia subaphylla, aculeis crebris armata; petala alba, stamina alba stylos virides parum superantia; germina glabra.

ζ. *SERRATULINUS* Sud. l. c. 37. — Folia 5-nata, minute serrata; foliolum terminale oblongo-obovatum; inflorescentia parum armata; petala alba, stamina alba stylos rubros vix superantia.

η. *BARBATUS* Sud. *Bat.* p. 56 (1906) et *exsicc* n° 173!; *R. barbatus* Sabrs. *OE. B. Z.* (1905) p. 355. — Folia 5-nata, acute et subæqualiter dentata; inflorescentia elongata, foliosa; petala roseola; stamina stylos breviora.

GALLIA: in Pyreneis centr., Luchon, Superbagnères; Tarn, Montirat. — β. Tarn, Peyrebrune; ITALIA: Liguria, Bajardo (G. Bicknell). — γ. Tarn, Crespinet. — δ. Tarn, Mirandol, Albine. — ε. Tarn, le Sidobre, la Fontasse. — ζ. Tarn, le Croupou, prope Lacabarède. — η. STYRIA: Söchau (Sabransky).

HYBRIDÆ

R. HETEROCHROUS v. η. × *SULCATUS* vel *BIFRONS*; *R. DASYCARPUS* Sabrs. *OE. B. Z.* (1906); *tir. à p. p. 4.* — Differt a v. η. turione glabro, aculeis subæqualibus, glandulis rarissimis. Parum fertilis.

STYRIA: Söchau (Sabransky).

R. HETEROCHROUS v. γ. × *OCCITANICUS* v. *excultus* Sud. *Rub. tarn.* p. 37 (1909); *R. EXCULTIFORMIS* Sud. l. c. — Turio glaber; folia 3-nata, parum discolora, inflorescentia armata, flores vive rosei. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Crespinet, moulin de La Bastide.

R. HETEROCHROUS v. γ. × *SCHLEICHERI* *clivorum* Sud. *Rub. tarn.* p. 37 (1909); *R. LITIGANS* Sud. l. c. — Differt a var. γ. turione piloso, foliis subtus viridibus, staminibus brevibus. Parum fertilis.

GALLIA: Tarn, Crespinet, in valle Lézert.

Series b. — CONCOLORES.

Conspectus specierum

I. — Sepala in fructu reflexa; stamina stylos vulgo superantia.

A. — Turio glaber vel pilis rarissimis munitus; inflorescentia aculei validi.

a. — Flores albi vel pallide rosei.....

b. — Flores latae rosei.....

R. granulatus M. et L. 77

R. Timbal-Lagravei P.-Müll. 78

B. — Turio dense pilosus, interdum parce pilosus, sed tunc inflorescentiae aculei debiles, sparsi.

a. — Flores albi vel pallide rosei.

1. — Inflorescentia aculeis validis, crebris armata.....

2. — Inflorescentia inermis vel parum armata.....

b. — Flores latae rosei; inflorescentia parum armata.....

R. fuscus Wh. 79

R. foliosus W. N. 80

R. insericatus P.-J. Müll. 81

II. — Sepala in fructu patula vel erecta, raro reflexa, sed tunc folia 3-nata.

A. — Turio glaber vel pilis rarissimis munitus.

a. — Sepala extus viridia, albo-marginata; turio parum heteracanthus; flores pallidi.....

R. infestus Wh. 82

b. — Sepala tomentosa; turio valde heteracanthus; inflorescentia parum armata.

1. — Flores albi.....

R. thrysiflorus Wh. 84

2. — Flores latae rosei.....

R. obscurissimus Sud. (Cf. n° 86)

B. — Turio distincte pilosus.

a. — Inflorescentia aculeis validis armata; flores vulgo albi.

1. — Validus; folia caulina 5-nata, subtus pilosa, minute denticulata.....

R. Babingtonii B. S. 83

2. — Parum validus; folia caul. plerumque 3-nata; turio sæpe obtusus.....

R. Menkei Wh. 87

b. — Inflorescentia vulgo parum armata.

1. — Flores albi; folia caulina vulgo 5-nata

R. pallidus Wh. 85

2. — Flores latae rosei.....

R. obscurus Kalt. 86

77 — (T. CXXXIV) — *R. GRANULATUS* M. et Lef. *Vers.* n° 93 (1859); *Sud. Obs. Set of Brit. Rub.* p. 27; *R. Radula* var. *Bloxamianus* Colem. ex Purchas in *Journ. bot.* (1887) p. 102; *R. oigocladus* var. *Bloxamianus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 66; *R. Sprengelii* \times *macrophyllus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 106, p. p.; *R. dubius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 16 (1898).

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 93; *Assoc. rub.* n° 563 (*R. aspericaulis*); *Sud. Rub. rar.* n° 82, 83.

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel subexcavatis, epruinosus, glabrescens, scaber, glandulis brevibus, crebris obsitus; aculei inaequales, maiores compressi, recti vel reclinati, minores papulæformes; *folia* 5-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, appresse et parum pilosa, dentibus mediocribus, inaequalibus, plerumque simplicibus; *foliolum* terminale vulgo breviter obovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio fere triplo longius; *petiolis* supra planus, aculeis falcatis; *stipulæ* lineares, glandulosæ; *ramus florifer* angulatus, pilosus, glandulosus, aculeis debilibus, reclinati falcatis munitus; *folia* 3-nata, subtus viridia, raro supera pallido-subcinerascens, satis argute serrata, foliolis terminalibus obovatis, integris, abrupte et breviter acuminatis; *inflorescentia* (3) mediocris, basi ± foliosa, laxe hirsuta, dense glandulosa, aculeis mediocribus, rectis reclinatis munita (4); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, pauciflori; *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa, aculeataque, in fructu reflexa (7); *petala* (5, 6) obovata vel ovata, distantia, alba; *stamina* alba stylis superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* pilosum. — Junius-julius.

β. *RHENANUS*; *R. rhenanus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 184; *R. thyrsiflorus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 58, 59, ed. 2, n° 37; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 695, ex pte, non W. N. — *Foliolum* caul. terminale obovato-orbiculare, cuspida-tum; *inflorescentia* brevis.

γ. *MELANODERMIS*; *R. melanodermis* Focke *Journ. Bot.* (1890) p. 133; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 69; *Sud. Bat.* p. 28. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 17; *Sud. Bat. eur.* n° 80. — *Inflorescentia* densa, hirsutior, minus glandulosa, petala acuta, alba vel dilute rosea.

δ. *ANGUSTATUS* Sud. *Rub. tann.* p. 37 (1909). — *Foliola* (8) angusta, oblonga, acuminata.

(?) ε. *CICUR*; *R. cicur* Holuby *CE. B. Z.* XXV (1875) 311; *R. apiculatus* Sbsp. *cicur* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 582. — *Turio* glaber, obtusus; *foliolum* caul. terminale ellipticum; rachis breviter pilosa; flores albi.

ζ. *VIRGULTORUM*; *R. Borreri* var. *virgultorum* A. Ley. *Journ. bot.* (1894) p. 143; *R. infestus* v. *virgultorum* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 60 (1900), non *R. virgultorum* P.-J. Müll. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 123. — *Gracilis*; *turio* obtusus, parum glandulosus; *folia* parva foliolis terminalibus obovatis, acuminatis; *inflorescentia* foliosa, aculeis crebris, validis armata (9), pedicellis brevibus.

η. *MENTITUS*; *R. mentitus* P.-J. Müll. et Wirtg. ap. Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 141 (1860), non P.-J. Müll. in *Billot Annot.* p. 293 (1861). — *Turio* foliaque ut in typ.; serratura satis grossa, *inflorescentia* brevis, lata, pedunculis valde patulis, pedicellis divaricatis; *stamina* stylis parum superantia; *sepala* laxe reflexa.

θ. *RUPICOLUS*; *R. rupicolus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 19 (1898). — *Turio* glaber, sublævis, glandulis rarissimis; *folia* ut in typ. sed grosse serrata.; rachis laxe pilosa glandulis brevibus; petala lata, dilute rosea; *R. omalo* similis.

ι. *DEBILICAULIS* Sud. in *hb.* Bouvet. — Exsicc. : *Sud. Rub. rar.* n° 84. — *Folia* caul. 3-nata; *foliolum* terminale obovato-rhombeum; *inflorescentia* laxe, hirsuta; petala pallide rosea. *Planta gracilis*.

κ. *PLATYCEPHALUS*; *R. platycephalus* Focke *Syn.* p. 329 (1877); *R. rudis* II *platycephalus* ej. ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI, 561 (1902). — *Gracilis*; *turio* pilosus; *folia* caul. 3-nata, argute serrata; *foliolum* terminale (10) obovato-rhombeum; *inflorescentia* laxe pilosa. *Forma vergens in R. thelybatum* F.

In memoribus et sepiibus. — GERMANIA: *Bavaria*, Waging (Progel); GALLIA: *Valois*, bois de Lévignen (Lefèvre), St-Martin, à Bouillavre, bois Robin (Questier); Ardennes. Le Chesne, 2^e écluse; *Rhône*, Monsols (Gillot); *Cantal*, Leynac (Lavergne); *Indre-et-Loire*, forêt de Chinon (Tourlet); *Saône-et-Loire*, le Creusot (Quincy); *Sarthe*, Pontlieue (Henry); *Seine-Inférieure*, Aumale (Questier); *Tarn*, Anglés, Lacaze, Margnès-de-Brassac; *Hauts-Pyrénées*, Cauterets; BELGIA: Nafraiture (Gravet); La Hulpe (du Pré); BRITANNIA: *Warwickshire*, Mancetter (Bagnall). — β. GALLIA: *Maine-et-Loire*, Noyal-la-Gravoyère (Henry); GERMANIA: Coblenz (Wirtgen). — γ. BRITANNIA: *S. Hants*, Bournemouth (E. F. Linton); *Dorset* (Rogers), Gloucester, Buckstane (A. Ley). — δ. GALLIA: *Tarn*, St-Amans; *Sarthe*, Sillé-le-Guillaume (Henry). — ι. HUNGARIA: Trencin (Holuby). — ζ. BRITANNIA: Hereford, Salop, Monmouth, Worcester (Rogers). — η. GERMANIA OCCIDENT.: Ems, Coblenz (Wirtgen). — θ. GALLA: *Hauts-Pyrénées*, le Péguy, à Cauterets. — ι. GALLIA: *Maine-et-Loire*, Gennes, au cirque romain (Bouvet); *Tarn*, Lacabarède. — κ. BAVARIA: Waging, prope Traunstein (Progel).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Foliolum* caulinum terminale obovatum vel rhombeum

A. — *Turio* epruinosus; *folia* caulinis 3-5-nata.

a. — *Ramus* pilosus; *inflorescentia* elongata:

1. — Dentes mediocres; aculei petiolares ramealesque falcati

2. — Dentes tenues; aculei petiolares ramealesque uncinati.....

b. — *Ramus* glabrescens; *inflorescentia* brevis, lata.....

R. granulatus M. et L.

R. LACROIXII Sud. b.

R. OBOVATIFRONS Sud. B.

II. — *Foliolum* caulinum terminale ovatum vel suborbiculare, basi latum, cordatum.

A. — *Inflorescentia* conferta, densa, ≠ piloso-hirsuta; *folia* subtus molliter piloso-velutina.....

B. — *Inflorescentia* laxe villosa; *folia* subtus parum pilosa.

a. — *Foliorum* dentes mediocres; pedunculi valde patentes; *foliolum* caul. terminale suborbiculare....

b. — *Foliorum* dentes grossi; pedunculi subascendentes; *foliolum* caul. terminale late ovatum.....

R. HETEROBELUS Sud. c.

R. TRAUNSTEINIENSIS Kaufm. D.

R. MISNIENSIS Hofm. E.

b. — (T. CXXXV) — *R. Lacroixii* Sud. in *hb.* Müller.

A *R. granulato* dignoscitur: *foliis* minute et æqualiter denticulatis, caulinis (2) 3-natis; aculeis petiolaribus ramealesque validioribus, uncinatis; *inflorescentia* elongata, armatissima (3, 4), aculeis curvatis munita. *Flores* albi (5).

GALLIA: *Basses-Pyrénées*, Eaux-Bonnes (de Lacroix).

c. — (T. CXXXV) — *R. heterobelus* Sud. *Obs. Set of. Brit. Rub.* p. 8 1904).

Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 15 ! (*R. præruptorum* non N. Boul.).

Diftert a *R. granulato*: *foliis* grosse serratis, subtus mollier pilosis; *foliolum* terminali (7) late ovato, subemarginato, acuminato; ramo glabrescenti, parum glandulosi, foliolis terminalibus late ovatis; *inflorescentia* conferta, dense hirsuta (8, 9); sepals parum glandulosis, inermibus,

BRITANNIA: Dorset, via Wareham ad Bere (M. Rogers); GALLIA: *Tarn*, Montcouyoul; BELGIA: Modave (Wathelet).

B. — (T. CXXXV — *R. obovatifrons* Sud. *Bat.* p. 27 (1904).

Exsicc. — *Sud. Bat. eur.* n° 79, 477.

A *R. granulato* distinguuntur: *turione* (11) glabro, aculeis crebrioribus, inaequalioribus, minus validis armato; *foliis* minute serratis, foliolis latioribus, terminali (12) breviter obovato vel obovato-orbiculari, leviter emarginato, abrupte

acuminato vel cuspidato; aculeis petiolaribus brevibus, valde falcatis uncinatis; ramo glabrescenti; *inflorescentia* brevi, lata, apice truncata, vulgo armatissima (13, 14); *petalis* (15) ovatis. *Flores* albi, *germina* glabra. In apricis subdiscolor; vergens in *R. timendum* Sud.

GALLIA: Sarthe, La Foréterie, prope Le Mans (Gentil, Henry).

C. — (T. CXXXV) — **R. Lintonii** Focke; Bab. *Journ. Bot.* (1887) p. 331; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 76.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 96.

Turio (16) glaber, pruinosus, glandulis longis, aculeis valde inæqualibus; *folia* caulinata 3-nata, inæqualiter et acute serrata; *foliolum* terminale (17) obovatum vel ellipticum, basi integrum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petala* parva (19), acuta, alba, Cetera ut in *R. granulato*.

BRITANNIA: Norfolk (E. F. Linton), Somerset, Monmouthshire (Rogers).

D. — (T. CXXXV) — **R. traunsteiniensis** Kaufmann ap. Baenitz *Hb. eur.* (1900); Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* p. 343 (1905); *R. epipsilos* Focke *Syn. p. 258* (1877) *ex parte*; *R. epipsilos* f. *concolor* Progel!

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10401!; Sud. *Bat. eur.* n° 478.

Differt a *R. granulato* M. L.: *turione* (20) faciebus leviter concavis, aculeis crebris, validis, obliquis; *aculeis* petiolaribus crebris, valde falcatis; *foliolis* lati, caulinato terminali (21) suborbiculari, cordato, acuminato, petiolulo proprio duplo longiore, omnibus marginibus sese tegentibus; *inflorescentia* laxa, interrupta, flexuosa, pedunculis mediis (23) patentibus, longis, laxe pilosis, aculeis validis (22), glandulis inæqualibus instructa. *Flores* dilute rosei vel subalbi. — *R. omolo* similis.

BAVARIA: Traunstein (Kaufmann); Neuburg-s.-Danube (Zinsmeister); TIROLIA: Landshut (Progel).

E. — (T. CXXXV) — **R. misniensis** Hofmann *Pl. crit. Sax. fasc. VII*, n° 168 (1902); Sud. *Bat. p. 46*; *R. amygdalanthus* B. *misniensis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 491* (1902).

Exsicc. — Hofmann l. c.!; Sud. *Bat. eur.* n° 142!

Turio (24) glaucescens, faciebus planis vel leviter excavatis, glandulis rarissimis, parum heteracanthus; *folia* plerumque 5-nata, ampla, supra glabrescentia, subtus parce pilosa, viridia vel in apricis subcinerascens, grosse serrata: *foliolum* terminali (25) late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *inflorescentia* saepe usque apicem foliosa, laxe pilosa (26, 27), glandulis crebris, longis, inæqualissimis, aculeis validis, reclinatis falcatis instructa, pedunculis leviter ascendentibus; flores (28) ut in *R. granulato*; *germina* glabra.

§. KRASANII; *R. Krasanii* Sabrs. in Hayek *Fl. v. Steierm.* I p. 771. — *Turio* manifeste heteracanthus, glandulosus, parce pilosus, aculeis mediocribus, obliquis munitus; serratura subæqualis; *foliolum* caul. terminale late ovatum vel suborbiculari, petiolulo proprio duplo longius; *stamina* stylos æquantia.

GERMANIA: *Saxonia*, Meissen (Misnia) (H. Hofmann). — §. STYRIA: Sœchau (Sabransky).

OBS — Le groupe spécifique du *R. granulatus* M. L. (sensu ample) est relié au *R. Radula* Wh. par le *R. oborutifrons*, qui est parfois un peu discoloré et a les aiguillons courbés comme le *R. timendum*. Par le *R. traunsteiniensis* il se rapproche des *R. rudes*, dont l'inflorescence est peu ou point poilue. Le suivant semble appartenir à ce même groupe.

R. dryades Sabrs. *Verh. V. f. Natur. u. Heilk. Presb.* (1887), non *R. dryadeus* Rip. in *Gen. Ess. mon p. 28* (1869), *Mon. p. 29*; *R. pallidus* D. *dryades* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 573*. — *Foliolum* terminale obovato-orbiculare. — HUNGARIA: Pressburg (Sabransky). — Mihi novus est. M. Sabransky a aussi signalé un *R. dryades* × *quadicus* [R. *EREMOPHILUS* Sabrs. O. B. Z. XLII (1892) p. 27] que je ne connais pas. — HUNGARIA, propre Pressburg.

78 — (T. CXXXVI) — **R. TIMBAL-LAGRAVEI** P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 309 (*nomen*); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 97 (1900); Sud. *Rub. Pyr.* p. 134.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 30!; Sud. *Bat. eur.* n° 174! 479!; *Herb. rub. rar.* n° 5!

Validus; *turio* (1) obtusangulus, glaber, epruinosus, parum glandulosus, aculeis inæqualibus, majoribus compressis, rectis reclinatis, minoribus papuliformibus, sparsis; *folia* 5-nata (2), magna, supra glabrescentia, subtus viridia, pilosa, mediocriter et subsimpliciter serrata; *foliolum* terminale ovato-suborbiculari, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima petiolulata; *petiolus* aculeis validis, obliquis, falcatis armatus; *stipulae* linearis, glandulosæ; *ramus* florifer subteres, pilosus, glandulosus, aculeis validis, reclinatis falcatis munitus; *folia* 3-nata, subtus viridia, foliolis terminalibus ovatis; *inflorescentia* (3) ± foliosa, laxe hirsuta, glandulosa, aculeis validis, crebris, rectis reclinatis armata (4); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, elongati, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, tenuiter glandulosa, aculeata, in flore et fructu reflexa (5); *petala* magna, ovata, lètè rosea; *stamina* basi rubra stylis virescentes longe superantia; *germina* glabra; *receptaculum* glabrum; *pollinis* (8) gradus puritatis 5/6 circiter. — Julius-augustus.

§. UMBROSUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 135 (1901). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 85! — *Turio* virescens, glandulis subnullis, aculeis subæqualibus; *folia* subtus parce pilosa. — In umbrosis.

γ. APRICUS Sud. l. c. — *Turio* angulatus, scabrior, glandulosior; aculei validiores, creibiores, curvati. — In apricis.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, valle Luchon frequens.

HYBRIDÆ

R. TIMBAL-LAGRAVEI × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 135 (1901); *R. exspectatus* Sud. l. c. — Differt a *R. Timbal-Laggravei* turionibus pruinosis, minus heteracanthis, foliolis terminalibus obovatis, cuspidatis, glandulis subsessilibus. Sterilis.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*; Luchon, via silvestri Superbagnères.

R. TIMBAL-LAGRAVEI × *HIRTUS* *tenuidentatus*; *R. CATARACTARUM* Sud. *Rub. Pyr.* p. 153 (1901). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 86! : *Hb. rub. rar.* n° 17! — Differt a *R. Timbal-Laggravei* glandulis crebris, aculeis inæqualissimis, crebris; foliis minute serratis, foliolis terminalibus obovato-suborbicularibus, cuspidatis; *inflorescentia* glanduloso-aciculata, sepalis patulis, staminibus albis. Parum fertilis.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Montauban, prope Luchon.

Conspicetus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Rubi validi; *folia* caulinata 5-nata.

- | | | |
|--|--|--|
| A. — <i>Turio</i> obsolete angulatus, faciebus convexis; <i>foliolum</i> caulinum terminale latum. | | R. <i>Timbal-Laggravei</i> P.-J. Müll. |
| a. — Styli virescentes; <i>foliolum</i> caul. terminale ovato-suborbicularare | | R. <i>virgatus</i> Sud. b. |
| b. — Styli rubri; <i>foliolum</i> caul. terminale orbiculare..... | | |
| B. — <i>Turio</i> angulatus, faciebus planis vel leviter concavis. | | R. <i>occitanicus</i> Sud. B. |
| a. — <i>Foliolum</i> caul. terminale ovatum vel suborbicularare, cordatum..... | | R. <i>radulicaulis</i> Sud. Bb. |
| b. — <i>Foliolum</i> caul. terminale angustum, oblongum vel ellipticum..... | | |

II. — Rubi graciles; folia caulinata 3-5-nata.

R. VIRGATUS Sud. b.
R. GRACILIOR Sud. c.

- A. — Foliolum cauli terminale suborbiculare
B. — Foliolum cauli terminale ellipticum vel rhombum

b. — (T. CXXXVII) — R. virgatus Sud. Rub. tñrn. p. 37 (1909).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 480 !

Gracilis; aculei (1) debiles; folia caulinata 3-4-5-nata, minute serrata, subtus parum pilosa; foliolum cauli terminale (2) suborbiculare, cordatum, cuspidatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; inflorescentia densa, hirsuta (3); petala (4) staminaque latae rosea; stylus rubri. Pollen quasi purum.

GALLIA : Tarn, Burlats, Marssal, les Faillades; Haute-Garonne, Luchon, Eaunes.

HYBRIDA

R. VIRGATUS × ULMIFOLIUS Sud. Rub. tñrn. p. 37 (1909); R. MALIGNUS Sud. l. c. — Aculei æquales, glandulæ nullæ; discolor; rachis tomentosa; sterilis.

GALLIA : Tarn, Burlats via fantanorum.

B. — (T. CXXXVII) — R. OCCITANICUS Sud. Rub. Pyr. p. 73 (1900); ap. Gdg. Nov. Consp. p. 149.

Exsicc. — Baenitz Hb. dendr. n° 370 !; Sud. Bat. eur. n° 481 !

Diffr. a R. Timbal-Lagravei: turione minus valido, faciebus planis vel leviter concavis; foliis subtus glabrescentibus, grosse et inæqualiter serratis, foliolis longe acuminate (5), caulinio terminali ovato, cordato, petiolulo proprio subtriplo longiore; ramo angulato, glabrescenti, aculeis inæqualissimis, foliolis acuminate; inflorescentia (6) majore, laxiore, pedunculis (7) patulioribus, pedicellis longioribus. Petala (8), stamna stylique vulgo latae rosea; germina glabra vel sparsim pilosa; receptaculum glabrescens. — In apricis folia supera subdiscolora sunt.

β. FEROX Sud. l. c. p. 134. — Folia cauli 3-nata; aculei valde inæquales, glandulæ crebræ, inflorescentia angusta, armatissima.

γ. SQUALIDUS; R. squalidus Genev. Ess. mon. p. 128 (1869); Mon. p. 142; R. Kœhleri C. squalidus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 598 (1902). — Aculei in turione creberrimi (9), inæqualissimi, basi subconici; folia ut in typo sed foliola latiora, caulinum terminale ovatum, cordatum, abrupte acuminatum; inflorescentia angusta, interrupta; petala rosea; stamna alba, styli virescentes; germina parce pilosa.

δ. BELLUS; R. bellus Sud. Bull. Assoc. Pyr. n° 237 (1899). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 482 ! — Folia subtus pubescentia, interdum subcinerascentia; foliolum terminale suborbiculare, abrupte acuminatum; inflorescentia brevis, lata, truncata, valde armata; stamna stylique dilute rosea; sepalum laxe reflexa. — Intermedius fere inter R. occitanicum et R. subrotundum.

ε. CYNOMORUS; R. cynomorus Genev. Ess. mon. p. 138 (1869); Mon. p. 154, ex pte; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 62. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 483 ! — Turio parce pilosus; folia subtus pilosa, foliolis terminalibus late ovatis vel suborbicularibus, subemarginatis, abrupte acuminatis; pedunculi leviter ascendentes; stamna alba vel dilute rosea, styli virescentes; germina pilosa.

ζ. RUDIFORMIS; R. ruditus Arrondeau Mon. n° 24, non W. et N. — Folia subtus pubescentia, grosse et profunde serrata ut in R. rudi W. et N.; foliolum terminale ovatum, cordatum, acuminatum.

η. EXCULTUS; R. excultus Sud. Rub. Pyr. p. 152 (1901). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 87 ! — Foliolum cauli terminale latum, abrupte acuminatum; serratura grossa; inflorescentia aphylla, pyramidalis; petala, stamna stylique rubra; germina parce pilosa. R. Lejeunei Wh. similis.

In locis umbrosis, sepibus et nemoribus. — GALLIA : Tarn, in vallibus Céret, Cérou, Tarnis, etc.; Ariège, Ax; Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes. — β. GALLIA : Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes. — γ. Maine-et-Loire, bois du Couboureau (Genevier), Torfou, à la Colonne (Sudre); Vendée, la Verrine, Chavagnes-en-Paillers (Genevier); AUSTRIA: Wien (Juratzka). — δ. Tarn, Le Peyroulié, prope Cambon. — ε. Vendée, Malievre, St-Laurent-s. Sèvre (Genevier). — ζ. Morbihan, (Arrondeau). — η. Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes; Tarn, Crespinet.

Obs. — La var. cynomorus a un peu le facies du R. melanoxyton M. et Wirtg., mais son inflorescence est un peu poilue et ses sépales se réfléchissent après l'anthèse; la var. squalidus se rapproche des R. Hystricæ par ses aiguillons très inégaux, mais les glandes de l'inflorescence sont relativement courtes; de plus ses fleurs roses l'éloignent du R. Kœhleri W. N.

HYBRIDÆ

R. OCCITANICUS × ULMIFOLIUS Sud. Rub. Pyr. p. 74 (1901); R. INCONDITUS Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 484. — Parum glandulosus heteracanthusque, folia discolora, inflorescentia magna, inordinata. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Pont-de-Cirou, La Sarrade, Fabas, Cambon; Ariège, in valle Mérens.

R. OCCITANICUS var. δ. × ULMIFOLIUS; R. PRÆVENUSTUS Sud. Rub. tñrn. p. 38 (1900). — Turio glaber, heteracanthus; folia 5-nata, subtus cinerascentia; foliolum terminale ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia foliosa, pilosa, glandulosa; flores latae rosei. Steriles.

GALLIA : Tarn, Grèzes, prope Cambon.

R. OCCITANICUS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. Rub. tñrn. p. 38 (1909); R. EVANIDUS Sud. l. c. — Differt a R. occitanico foliis 3-4-5-nata, subtus cinerascentibus, rachide hirsuta, floribus albis. Sterilis.

GALLIA : Tarn, St-Amarans, prope Albi.

β. — (T. CXXXVII) — R. radulicaulis Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 26 (1904); R. squalidus Arond. Mon. n° 20, non Genev.; R. Radula Sbsp. sertiflorus Rogers Handb. Brit. Rub. p. 64, non Genev.; R. Lejeunei var. ericetorum Rogers l. c. p. 71 p. p.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 90, 95 (p. p.)

A R. occitanico distinguitur: turionibus (10) parce pilosis; foliolis angustioribus, caulinio terminali (11) oblongo vel elliptico, parum emarginato; inflorescentia angustior, pilosior (12).

GALLIA : Loire-inf., Morbihan, Tarn; BRITANNIA : Surrey, Hereford; GERMANIA : Alsacia, Bavaria, Traunstein (Progol).

C. — (T. CXXXVII) — R. GRACILIOR Sud. Bull. Soc. Bot. Belg. XLVII (1910) p. 207; R. Lejeunei Focke, in hb. Sud.

Gracilis; turio (13) subteres, fere glaber, parce glandulosus, aculeis compressis, reclinatis falcatis armatus; folia (14) 3-nata, supra glabrescentia, subtus parum pilosa, viridia, inæqualiter mucronato-serrata; foliolum terminale elliptico-obovatum vel rhombum, integrum, acuminatum, breviter petiolatum; ramus parum pilosus, foliis argute serratis, foliolis angustis; inflorescentia aphylla, laxa, parce pilosa, glandulis brevibus, sparsis, aculeis crebris, medio-

cribus, reclinatis falcatisve instructa, pedunculis (15) tenuibus, patulis ; *sepala* viridia, subinermia, glandulis raris vel nullis ; *flores* parvi (16), rosei ; *germina* glabra. — Differt a *R. Lejeunei* Wh. glandulis brevibus, turionibus teretibus, subglabris, foliis 3-natis.

BRITANNIA : Dorset (Focke) ; GALLIA : Lot-et-Garonne, Agen, près de Chaspaut (Pommaret) ; BELGIA : Soiron olne, Carneste (Delrez), Ramelet, Marchin (Wathelet).

Obs. — J'ai décrit la Ronce cultivée à Brême par M. Focke ; je n'ai pas vu de spécimens de la plante sauvage d'Angleterre. Celle de Belgique n'en diffère pas sensiblement ; toutefois ses aiguillons sont plus fins, ses folioles plus larges et moins acuminées.

79 — (T. CXXXVIII) — **R. FUSCUS** Wh. ap. Bluff et Finger. Comp. Fl. Germ. I p. 682 (1825) ; W. et N. Rub. germ. p. 73 t. XXVII ; Focke Syn. p. 839 ; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 94 ; Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 149 ; R. pallidus C. fuscus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 572 (1902).

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 10884 ; Rub. gall. n° 134.

Turio (1) validus, inferne obtusangulus, superne faciebus planis vel leviter excavatis, dense pilosus, parce glandulosus ; *aculei* inaequales, majores compressi, recti vel ± curvati, minores sparsi, papulæformes vel aciculares ; *folia* (2) 5-nata, obscure viridia, supra parce pilosa, subtus viridia, parum pilosa, grosse et inaequaliter serrata ; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *petiolus* pilosus, aculeis validis, falcatis armatus ; *stipulae* angustæ glandulosæ ; *ramus* florifer angulatus, dense pilosus, aculeis falcatis, foliis 3-natis, subtus viridibus, grosse serratis, foliolis terminalibus ovatis, subemarginatis, acutis vel breviter acuminatis ; *inflorescentia* (3) ± foliosa, mediocris, angusta, pilosa, glandulosa, aculeis crebris, mediocribus, rectis reclinatis armata (4) ; *pedunculi* medii leviter ascendentes, pauciflori ; *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa, vulgo aculeata, in flore et fructu reflexa (5) ; *petala* (6, 7) ovata vel obovata, alba vel dilute rosea ; *stamina* alba styllos virescentes vel interdum basi roseos superantia ; *germina* glabra vel parce pilosa ; *receptaculum* pilosum. — Junius-julius.

o. — *Inflorescentiae rachis dense piloso-hirsuta* (4)

β. PATULIPES. — Exsicc. : Rub. gall. n° 172, 136 — Serratura satis æqualis ; pedunculi valde patuli vel deflexi ; *sepala* imperfecte reflexa. Forma vergens in *R. pallidum*.

γ. ADAMSTII Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 28 (1904) ; R. Babingtonii v. *phyllothrysus* (K. Frid.) Rogers Handb. Brit. Rub. p. 70 ; R. discerplus × *fucus* Boul. et B. de Lesd. Rub. gall. exsicc. n° 176. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 94, p. p. — Folia subtus glabrescentia, subæqualiter serrata ; foliolum terminale latum, acutum vel parum acuminatum ; inflorescentia armatissima glandulosissima.

δ. CANESCENS N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 95 (1900) ; R. obscurus P.-J. Müll. in Flora (1858) Z. u. B., non Kalt. ; R. thyriflorus P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 165, non W. et N. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 88 ! — Aculei mediocres, inaequalissimi ; folia supera subdiscolora.

oo. — *Inflorescentiae rachis laxa hirsuta* (8)

η. SCIOPHILUS ; R. sciophilus L. et M. Vers. n° 143 (1859) ; R. Gremlii var. *perglandulosus* Sabrs. exsicc., an Borb. ? — Turio parum pilosus ; folia subtus glabrescentia, dentibus parum profundis ; inflorescentia valde foliosa ; petala alba, angusta.

ζ. LEPTOSTACHYS ; R. leptostachys M. et L. Vers. n° 105 (1859). — Turio parum pilosus ; folia un in typo, grosse serrata ; petala rosea.

η. EURYPHYLLUS ; R. euryphyllus Sud. Diagn. p. 34 (1906). — Turio pilosus, subteres ; folia magna, subtus parum pilosa ; foliolum terminale suborbicularis, abrupte acuminatum ; inflorescentia pauciflora. pedunculis ascendentibus.

θ. PUSTULIFER ; R. pustulifer Sud. Diagn. p. 35 (1906). — Turio parum pilosus, scaberrimus ; folia subtus pubescentia, subcinerascens ; inflorescentia laxa pedunculis patulis.

ι. SALEBROSUS ; R. salebrosus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 568 (1902). — Turio dense pilosus ; folia subtus viridia, pilosa, foliolis longe acuminatis (9) ; aculei rameales recti vel parum curvati.

κ. LEPTACANTHUS ; R. leptacanthus P.-J. Müll. ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I n° 142 (1859). — Turio dense pilosus ; folia subtus pilosa ; foliolum terminale late ovatum, abrupte acuminatum ; flores pallide rosei.

In sepibus et nemoribus. — GERMANIA, BELGIA, GALLIA BOREALIS, BRITANNIA. — β. BELGIA : N.-D. au bois ; Rhode-Ste-Genèse (du Pré) ; Louette-St-Pierre (Gravet) ; GERMANIA : Schleswig, Ostenfeld (Friderichsen). — γ. BRITANNIA : Oxfordshire, Crowell Hill (Adams) ; GALLIA : Seine-et-Oise, forêt de Montmorency (B. de Lesdain). — δ. GALEA : Vosges ; Sarthe, Traugé (Gentil) ; GERMANIA : Alsacia — ε. GALLIA : Aisne et Oise, forêt de Retz, tailles d'Ivors (Lefèvre) ; STYRIA : Seehau (Sabransky). — ζ. GALLIA : Oise, forêt de Retz, Chêne l'Officier, près Cuvergnon (Lefèvre). — η et θ. GERMANIA : Alsacia, Weissenburg (Müller). — ι. BOHEMIA, HUNGARIA, SILESIA. — ι. GERMANIA, Prov. rhenana (Wirtgen) ; GALLIA : Valois, forêt de Retz (Questier) ; Finistère, Huelgoat (Henry).

HYBRIDÆ

R. FUSCUS × *NITIDUS holerythrus* ; R. fuscofolius Sud. hb. — Habitus *R. fuscus* sed turio glaber, glandulæ rarae, breves, flores rosei. GALLIA : Sarthe, Pontlieue, via Pied-Sec (Gentil).

R. FUSCUS × *SPRENGELII* Sud. in hb. Mus. Paris. ; R. expansus L. et M. Vers. n° 429 (pr. sp.) (1859) ; R. hypoleucus × *vestitus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 109. p.p. — Differt a *R. fuscus* turionibus dense hirsutis, inflorescentia brevi, lata, obtusa ; sepalis fructum laxe amplectentibus. Parum fertilis.

GALLIA : Oise, forêt de Retz, au Chêne-l'Officier (Lefèvre), à Bourgfontaine (Questier).

R. FUSCUS × *MACROPHYLLUS* ; R. lemaisonii Sud. — Differt a *R. fuscus* Wh. turione glaucescenti, aculeis subæqualibus, eglanduloso ; inflorescentia glandulis breviriboris. Sterilis.

GALLIA : Vosges, à 1 km. de Gérardmer, sur le bord du lac et de la route de Gérardmer au Tholy (Lemasson).

R. FUSCUS × *VILLICAULIS* v. *stereacanthus* Sud. ; R. placitus P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 58 (1867) et exsicc. n° 42 ! — Turio parum pilosus, aculeis valde compressis, subæqualibus ; inflorescentia armata, glandulis longis, floris albi.

GALLIA : Vosges, Gerbamont, au Bouchot (Pierrat).

R. FUSCUS × *VESTITUS* Sud. Diagn. p. 29 (1906) : R. consocius Sud. l. c. — Aculei parum inaequales, subrecti ; folia pilosa, foliolis terminalibus orbicularibus, flores rosei. Parum fertilis.

GALLIA : Valois, Waligny, Saint-André (Questier).

R. FUSCUS × *FOLIOSUS corymbosus* Sud. ; R. corymbosiformis Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 149 (1906) ; R. multidentatus Boul. et Pierr. Assoc. rub. n° 657 (1884) non n° 249. — Serratura tenuior quam in *R. fuscus* ; inflorescentia minus armata, parum pilosa, glandulis brevibus.

GALLIA : Vosges, Rochesson (Pierrat).

R. FUSCUS × RUDIS ?; *R. ERYTHROCAULON* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 28 (1873); *R. bifrons × hirtus* N. Boul. *p.p.* — Differt a *R. fusco* turionibus pilosioribus, foliis subtus glabrescentibus. Parum fertilis.

GALLIA : Vosges, Saint-Dié (Boulay).

R. FUSCUS × SCHLEICHERI mucronipetalus N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 128 (1900); *R. MULTIBRACTEATUS* Boul. et Pierr. *Assoc. rub.* n° 196 (1875). — Gracilis; aculei parum robusti; foliolum terminale angustum, acuminatum; pedunculi patuli, valde glandulosi; petala parva.

GALLIA : Vosges, aux Plateaux (Pierrat).

R. FUSCUS × RIVULARIS (grey) Sud.; *R. INTRACTABILIS* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 89 (1867) et *exsicc.* n° 51. — Aculei validi, crebri, inaequales; folia grosse serrata, caulina 3-5-nata; inflorescentia dense glandulosa, armatissima, stamina brevia; sepala erecta.

GALLIA : Vosges, Saulxures, à Rupt-de-Bâmont (Pierrat).

R. FUSCUS × CHLOROSTACHYS N. Boul.; *R. GERARD-MARTINII* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 287. — Exsicc.: N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 36. — Turio foliaque ut in *R. fusco*; inflorescentia angusta, pallida, stamina brevia, sepala patula vel erecta. Sterilis.

GALLIA: Vosges, « Gérardmer, vallée de la Vologne, route de Saint-Dié, vis-à-vis le pont! » (Müller); Basse sur-le-Rupt, à Planois (Pierrat).

R. FUSCUS × HIRTUS (grey) Sud.; *R. CONGESTIFLORUS* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. Vosg.* p. 40 et *exsicc.* n° 31 (1866); *R. Schleicheri × hirtus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 131, *ex pte.* — Turio angulatus, pilosus; folia 3-nata, grosse serrata; inflorescentia densa, glandulosa longis, aculeis validis; sepala appressa, stamina brevia.

GALLIA : Vosges, forêt de St-Gorgon, près de Rambervillers (Boulay).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Stamina stylos superantia.

A. — Foliolum caulinum terminale late ovatum vel suborbiculare.

a. — Turio epruinosus vel subepruinosus, vulgo dense pilosus.

1. — Folia grosse et inaequaliter serrata; foliolum caulinum terminale basi emarginatum.....

R. fuscus Wh.

2. — Folia argute et subaequaliter serrata.

a. — Turio dense pilosus; folia mucronato-denticulata.....

R. ACUTIPETALUS L. M. B

b. — Turio laxe pilosus; dentes triangulares; inflorescentia foliosa.....

R. PRIONODONTUS M. L. b

B. — Foliolum caulinum terminale angustum, oblongum, elongatum, basi emarginatum.....

R. ACANTHODES Hofm. C

C. — Foliolum caulinum terminale obovatum vel ellipticum, basi vulgo integrum.

R. ANGUSTIFOLIUS M. L. D

a. — Folia grosse et inaequaliter serrata; inflorescentia magna, foliosa.....

R. RETRODENTATUS M. L. E

b. — Folia argute serrata.

1. — Foliolum terminale obovatum, cuspidatum; aculei validi.....

R. APICULATIFORMIS Sud. F

2. — Foliolum terminale acuminatum; aculei graciles.....

R. PARVISERRULATUS Sud. Db

II. — Stamina stylis breviora.

A. — Aculei caulinis tenues, subconici; inflorescentia densa.....

R. QUINCYI Boul. G.

B. — Aculei caulinis validi, compressi; inflorescentia laxa.....

R. ARMATIPES Sud. Eb.

b. — (T. CXXXVIII) — *R. prionodontus* L. et M. *Vers.* n° 55 (1859); *R. fuscus* v. *prionodontus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 94 (1900).

Turio laxe pilosus; folia subtus viridia, æqualiter et argute serrata; foliolum terminale (10) suborbiculare, vix emarginatum, breviter et abrupte acuminatum; inflorescentia angusta, parce aculeata, pedicellis brevibus, leviter ascenditibus; petala pallide rosea; germina pubescens. *R. folioso* similis.

GALLIA: Aisne, forêt de Retz, Buisson de Waligny, le Fournet (Lefèvre, Questier).

B. — (T. CXXXVIII) — *R. acutipelatus* L. et M. *Vers.* n° 113 (1859); *R. fuscus* v. *acutipelatus* N. Boul. l. c. p. 95.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10375 (*R. Hystric* non W. N.); Sud. *Bat. eur.* n° 485.

Turio ut in *R. fusco*; folia subtus leviter pilosa, tenuiter et æqualiter mucronato-serrata; foliolum terminale (11) obovato-orbiculare vel orbiculare, emarginatum, acutum vel brevissime acuminatum; inflorescentia dense piloso-hirsuta, brevis, parce glandulosa, aculeis pallidis; petala (12) ± acuta, pallide rosea; stamina alba, stylis virescentes. Pollen parum admixtum.

β. *FOLIOLATUS*; *R. hirtifolius* Boul. et B. de Lesd. *Rub. gall. exsicc.* n° 175, non M. et Wirtg. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 90 ! — Turio dense pilosus, sublævis; folia mediocriter serrata; foliolum terminale late ovatum; inflorescentia elongata, valde foliosa; petala alba, obtusa vel acuta.

γ. *MUCRONIDENS*. — Aculei crebri, validi; folia minute mucronato-dentata, supera subtus subcinerascentia; foliolum terminale vix emarginatum, brevi er acuminatum; petala alba, obtusa.

δ. *EURYSTACHYS*; *R. eurystachys* Sud. *Diagn. p.* 35 (1906). — Folia ut in typo, sed subtus pilosissima; inflorescentia magna, lata, subaphylla, hirsuta, pedunculis patulis, pedicellis divaricatis; petala obtusa.

ε. *INSIGNIDENS*; *R. melanoxylon* Richter, *exsicc.*, non M. et Wirtg.; *R. denticulatus* v. *chloroxylon* Hal. *Oest. bromb.* p. 255, p. p. — Turio pallidus, aculeis tenuibus; folia subtiliter mucronato-denticulata; foliolum terminale longe petiolatum, breviter acuminatum, inflorescentia ut in typo sed minus hirsuta.

ζ. *ELLIPTICUS*; *R. fuscus* Rubi gall. *exsicc.* n° 174. — Aculei debiles, pallentes, inaequalissimi; foliolum terminale late ellipticum, basi rotundatum, acuminatum; inflorescentia foliosa, elongata; petala angusta, acuta vel obtusa, pallide rosea.

η. *PAPYRACEUS*; *R. papyraceus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 128 (1869) et *exsicc.* n° 112. — Turio debilis, obtusus, parum pilosus; foliolum caulinum terminale late ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia angusta, elongata, aphylla, parum hirsuta; petala alba. Folia sæpe subdiscolora.

GALLIA: Aisne et Oise, forêt de Retz, Chêne-l'Officier, Ormoy-le-Davien (Lefèvre), Le Plessis-au-Bois (Questier); Finistère, Huelgoat (Henry); BELGIA: Namur, Louette-St-Pierre, Vresse (Gravet); Kinkempois (Aigret), Woluwe-St-Pierre, forêt de Soignes (du Pré); GERMANIA: Badenia, Schoenberg, prope Freiburg (Goetz). — β. BELGIA: forêt de Soignes, Over-Yssche, Groenendaal, Tervueren, Etterbeek, Woluwe-St-Lambert, Waterloo (du Pré). — γ. GALLIA: Sarthe, Traugé (Gentil). — δ. GERMANIA: Alsacia (Müller); GALLIA: Rhône, Mousols (Gillot). — ε. GALLIA: Rhône, Dardilly, prope Lyon (Jordan); AUSTRIA: Gloggnitz (Richter). — ζ. BELGIA: Prov. Namur, Louette-St-Pierre (Gravet). — η. GALLIA: Vosges, Saint-Dié, à la Madeleine (Boulay).

κ. — (T. CXXXIX) — *R. acanthodes* H. Hofmann *Pl. crit. sax. exsicc.* f. v. n° 101 (1900); Sud. *Bat. p. 12*; *R. apiculatus* Wh. Sbsp. *R. acanthodes* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 583; *R. thuringensis* (Metsch) var. *Aresch.* *hb.*; *Focke Syn. p. 324 p.p.*; *R. hybridus* × *sancius* O. Kuntze! *exsicc.*

Exsicc. — H. Hofm. l. c. ! Sud. *Bat. eur.* n° 34 !

A *R. fuscum* Wh. dignoscitur : turione (1) glaucescenti, parum piloso ; foliis subtus pilosis, pilis ad nervos pectinatis. *Foliolum* caul. terminale (2) ovatum, leviter emarginatum, acuminatum ; dentes grossi, plerumque simplices ; folia ramealia subtus viridia ; *inflorescentia* brevis, parum foliosa, pauciflora, laxe hirsuta, glandulis longis (3), erubescensibus ; *petala* (4) alba vel pallide roseola ; *stamina* alba stylos virentes superantia ; *germina* glabra.

SAXONIA, BOHEMIA (H. Hofmann).

D — (T. CXXXIX) — **R. angustifolius** M. et L. *Vers.* n° 57 (1859) ; *R. racemiger* Gremli *O. B. Z.* (1871) p. 128 ; *R. Genevieri* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 563, p. p., non Bor.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 486 !

Turio ut in *R. fuscum* Wh. *Folia* subtus viridia, parum pilosa, grosse serrata ; *foliolum* terminale (5) oblongum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius ; *inflorescentia* (6) parum foliosa, piloso-hirsuta, aculeis validis, crebris armata ; *flores* albi ; *germina* glabra.

GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Lefèvre, Questier) ; HELVETIA : Schaffhouse (Gremli).

b. — (T. CXXXIX) — *R. parviserrulatus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 322 (s. n. *R. parviserrati*) ; *R. formosus*, *serpens* \times *disparatus* Goetz exsicc., in Baenitz *Hb. eur.* n° 9046.

Gracilis ; *turio* (7) dense pilosus, aculeis tenuibus, pallidis munitus ; *folia* argute mucronato-serriculata ; *foliolum* caul. terminale (8) anguste oblongum vel ellipticum, subintegrum, acuminatum, breviter petiolulatum ; *inflorescentia* subaphylla, breviter hirsuta, aculeis debilibus (9), rectis, armata ; pollen parum admixtum.

β . RHOMBOPHYLLUS ; *R. debilis* (Halacsy?) Sabrs. in *hb.* Sud. — *Foliolum* terminale anguste rhombeum, acuminatum ; dentes profundi, inaequales; *inflorescentia* armata.

GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz) — β . STYRIA : Sœchau (Sabransky).

E. — (T. CXXXIX) — **R. retrodentatus** M. et L. *Vers.* n° 107 (1859) ; *R. Sprengelii* \times *fuscus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 107 (1900) ; *R. curvidens* A. Ley *Journ. Bot.* (1891), 143 ; *R. anglosaxonicus* Sbsp. *R. curvidens* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 57 ; *R. Corbieri* N. Boul. ap. Corb. *Fl. Norm.* p. 205 (1894) ; *R. Menkei* f. *R. Corbieri* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 104.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 500 (*R. discerptus*), 894 (*R. Corbieri*) ; *Set of Brit. Rub.* n° 120 (*R. curvidens*) ; Sud. *Bat. eur.* n° 487 !

Turio ut in *R. fuscum* Wh. ; *folia* subtus breviter pilosa, grosse serrata, dentibus profundis, inaequalibus, angulosis, praecipuis \pm refractis ; *foliolum* caul. terminale (10) breviter obovatum, basi integrum vel leviter emarginatum, abrupte acuminatum ; *inflorescentia* magna, laxa, multiflora, aculeis (11) validis, crebris, armata ; *petala* pallide rosea. — Intermedius inter *R. fuscum* et *R. Colemannii* (gr.).

GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz (Lefèvre, Questier) ; *Seine-Inférieure, Eure-et-Loir, Manche, Maine-et-Loire* ; BRITANNIA : *Herefordshire, Carmarthenshire* (Ley) ; BELGIA : Bruxelles.

F. — (T. CXXXIX) — **R. apiculatiformis** Sud. *Diagn.* p. 35 (1906) ; Bouvet. *Rub. Anj.* p. 53 (1907) ; *R. Sudrei* Bouvet *Rub. Anj.* p. 683 (1903) non Giraudias.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 488 !

Validus ; *turio* (12) obtusangulus, glaucescens, pilosus ; *folia* 5-nata, subtus viridia vel interdum superiora subcinerascens, pilosa, pilis ad nervos laxe pectinatis, inaequaliter et subsimpliciter mucronato-serrata ; *foliolum* terminale (13) obovatum, vix emarginatum, abrupte acuminatum vel cuspidatum, infima petiolulata ; *ramus* pilosus, aculeis rectis reclinatis, foliis 3-natis, argute denticulatis, foliolis terminalibus obovatis ; *inflorescentia* magna, piloso-hirsuta, armatissima (14, 15) ; *petala* (16) alba vel pallide rosea ; *stamina* alba stylis virescentes superantia ; *germina* glabra.

β . LASIOTACHYS ; *R. lasiostachys* M. et L. *Vers.* n° 41 (1859) ; *R. vestitus* \times *fuscus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 109, p. p. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 91 ! — *Foliola* brevia, lata, subovata, subtus molliter pilosa ; *inflorescentia* hirsutissima, elongata, foliosa, usque apicem foliosa ; *flores* albi.

γ . FUSCOIDES ; *R. fuscoides* Sud. *Rub. Pyr.* p. 138 (1901). — Aculei caulinis valde inaequales, debiles, suconici ; *inflorescentia* aphylla, multiflora, pedunculis ascendentibus, armatissimis.

δ . MUCRONULATUS ; *R. mucronulatus* Bor. *Fl. Cent. éd. 3* p. 196 (1857) ; *Genev. Mon* p. 151, non Bab. nec M. et L. — *Folia* 3-4-5-nata, minute mucronato-serriculata ; *foliolum* terminale breviter petiolulatum ; *ramus* aculeis mediocribus ; *rachis* parum hirsuta ; *petala* pallide rosea ; *stamina* stylos vix superantia.

ϵ . LINGULATUS ; *R. lingulatus* Lef. ap. *Genev. Mon.* p. 148 (1880). — Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 92 ! — *Folia* subtus fere glabra ; *inflorescentia* laxe hirsuta, parum armata ; *petala* pallide rosea.

ζ . REGILLUS ; *R. regillus* A. Ley *Journ. Bot.* (1896), 217 ; Rogers *Handb.* p. 67 ; *R. debilis* Bab. p. p. ; *R. cognatus* N. E. Br. p. p. — Turio pruinosis ; *folia* plerumque 3-4-nata, subtus parum pilosa ; *flores* albi.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, La Membrolle, Juigné, Montreuil-Belfroy (Bouvet) ; *Sarthe*, Crê-sur-Loir (Launay), Précigné (Henry), Le Mans (Gentil) ; *Valois*, Chavres, Cuvret (Questier) ; GERMANIA : *Alsacia*, Weissenburg (Müller). — β . GALLIA : *Valois*, forêt de Retz (Lefèvre). — γ . GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Barrancoueu. — δ . GALLIA : *Cher*, Allogny (Ripart, Déséglise). — ϵ . GALLIA : *Valois*, Le Fournet, chemin de la Tournelle à Ivors, entre Villers-les-Potiers et Ivors, route des 14-Frères (Questier) ; *Loire-inf.* (sec. Genevier). — ζ . BRITANNIA : *Gloucester, Hereford, Down*.

Obs. — Le *R. erythrocaulon* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 28 (1873), de St-Dié (Vosges), que l'auteur considère (ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 127) comme un *R. bifrons* \times *hirtus*, est très voisin de la var. ϵ .

HYBRIDÆ

R. APICULATIFORMIS var. γ . \times *IMMUTABILIS* v. *vallicularum* Sud. *Rub. Pyr.* p. 138 (1901) ; *R. ASPRETORUM* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 93 ! — *Foliolum* terminale ovatum ; *inflorescentia* parum glandulosa ; *sepala* patula ; *flores* rosei.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Barrancoueu, prope Arreau.

R. APICULATIFORMIS \times *IMBRICATUS* ; *R. SEGREENSI* Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 489 ! — Turio glaucescens, glaber, subeglans, aculeis subaequalibus ; *inflorescentia* hirsuta, parce glandulosa, magna, subaphylla, multiflora ; *flores* substeriles.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, de Segré à Châteaubriant (*Loire-Inférieure*) (Henry).

R. APICULATIFORMIS \times *ULMIFOLIUS* ; *R. MEGABELUS* Sud. et Bouv. in Bouv. *Rub. Anj.* p. 76 (1907). — *Habitus* *R. apiculatiformis* sed aculei aequales, turio pruinosis, glandulæ rarissimæ, folia discolora. Sterilis.

GALLIA : *Maine-et-Loire*, Juigné-sur-Loire (Bouvet) ; *Sarthe*, Chausfours (Henry).

R. APICULATIFORMIS × PROPINQUUS; *R. IMPROVISUS* Sud. et Bouv. in Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 76. — Habitus *R. propinquus* sed glandulæ crebræ, breves; minus discolor. Sterilis.

GALLIA: Maine-et-Loire, St-Christophe-du-Bois, via Mortagne (Bouvet).

b. — (T. CXXXIX) — *R. armatipes* Sud. *Diagn.* p. 35 (1906).

Exsicc. — Sud. : *Rub. rar.* n° 94!

R. apiculatiformis similis, a quo differt: foliolis terminalibus rhomboidibus, integris, acuminatis; inflorescentia elongata, usque apicem foliosa, laxe hirsuta, parum glandulosa, pedunculis (22) armatissimis; staminibus brevissimis. Sepala reflexa; germina pilosa. Fertilis. — Hybrida?

GALLIA: Valois, via Faverolles, supra Bourgfontaine (Questier).

G. — (T. CXXXIX) — ***R. Quinneyi*** N. Boul. *Assoc. rub. ann. et exsicc.* (1886); ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI, p. 98.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 767; *Rub. gall.* n° 139.

Turio (17) obsolete angulatus, debilis, laxe villosum, aculeis crebris, inaequalissimis, subconicis, rectis reclinatis; armatus; *folia* 3-4-5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, parce pilosa, inaequaliter et argute serrata; *foliolum* terminale (18) ovatum vel subobovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* parva, densa, breviter hirsuta (19), aculeis crebris, mediocribus, pedunculis brevibus, ascenditibus; *flores* parvi (21), albi; *sepala* (20) laxe reflexa; *germina* pilosa; *stamina* stylos vix equantia.

GALLIA: Saône-et-Loire, Le Creusot, au découvert de la Croix (Quincy).

SO — (T. CXL) — ***R. FOLIOSUS*** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 682 (1825); W. et N. *Rub. germ.* p. 74 t. XXVIII; Focke *Syn.* p. 330; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 573 (excl. syn.); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 125, ex pte; Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 150; *R. silvestris* Kalt. *Fl. Aach.* p. 288; *R. subrudis* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* (1887) p. 42 t. XXXII.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 508.

Turio (1) arcuato-procumbens, angulatus, faciebus planis, laxe pilosus, scaber, glandulis crebris, brevibus munitus; *aculei* inaequales, majores compressi, reclinati vel leviter falcati, minores aciculares; *folia* 5-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia, inaequaliter, minute et argute serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius, intima petiolulata; *petiolus* supra planus, pilosus, glandulosus, aculeis debilibus, reclinati vel subfalcatis munitus; *stipulae* lineares, glandulosae, alte adnatæ; *ramus* florifer obtusangulus, pilosus, glandulis crebris, inaequalibus, aculeis tenuibus, reclinati instructus; *folia* 3-nata, inaequaliter serrata, subtus pilosa, viridia, foliolis terminalibus ovatis vel rhomboidibus, emarginatis, acutis acuminatis; *inflorescentia* (3) magna, elongata, multiflora, interrupta, usque apicem foliosa, bracteis foliaceis ramulis floriferis equantibus, laxe pilosa (4), dense glandulosa, aculeis sparsis, tenuissimis; *ramuli* ascendentes, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia, tenuiter glandulosa, in flore et fructu reflexa (5); *petala* (6) elliptica, alba; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia; *germina* apice pilosa. — Junius-julius.

GALLIA: Vosges, Aisne, Haute-Saône, Oise, Tarn, etc.; GERMANIA: Guestphalia, Prov. rhenana, etc.; HELVETIA, etc.?

OBS. — Le type de Weihe est mal connu et peut-être n'est-il qu'une forme extrême du *R. corymbosus* P.-J. Müll., qui est beaucoup plus répandu dans l'Europe centrale.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Inflorescentiae rachis laxe pilosa.

A. — *Stamina* stylos superantia.

- a. — *Folia* caulinæ plerumque 5-nata; *foliolum* caul. terminale ovatum, acuminatum.
 - 1. — *Inflorescentia* elongata, pedicellis dense glandulosis; serratura inaequalis.
 - 2. — *Inflorescentia* brevis, obtusa; pedicelli glandulis sparsis, brevibus muniti; serratura sequalis.
- b. — *Folia* caul. plerumque 3-nata, tenuiter mucronato-serrata.

R. foliosus Wh.
R. CORYMBOSUS P.-J. Müll. b.
R. LONGITHYSIGER Bab. c.

B. — *Stamina* stylis breviora vel eequalonga.

- a. — *Inflorescentia* angusta, elongata, foliosa; *sepala* reflexa; *stamina* stylos subequalia.
- b. — *Inflorescentia* brevis, subaphylla; *sepala* patula; *stamina* brevissima.

R. FLEXUOSUS M. L. d.
R. DERASUS L. M. e.

II. — Inflorescentiae rachis dense villosa-hirsuta.

A. — *Turio* pilosus.

- a. — *Stamina* stylos superantia.

- 1. — *Turio* epruinosus; dentes mediocres.
 - a. — *Folia* caul. 5-nata, foliolis terminalibus ovatis, cordatis.
 - b. — *Folia* caul. 5-nata, foliolis terminalibus obovatis, basi integris.
 - c. — *Folia* caul. 3-nata; *inflorescentia* simplex.
- 2. — *Turio* glaucescens; dentes tenues: *foliolum* lata.

R. OMALODONTUS M. et W. B.
R. MICROANCHUS Sud. B.
R. LITIGIOSUS Sud. B.
R. CONSPECTUS Genev. C.
R. PINICOLA Hofm. D.
R. CAVATIFOLIUS P.-J. Müll. E.

B. — *Turio* glaber; *foliolum* caul. terminale latum, cordatum,

- b. — (T. CXLI) — *R. corymbosus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 23; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 30; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 591, ex pte; *R. fuscus* v. *corymbosus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 95 (1900); *R. hispidus* Merc. ! non L.; *R. insericatus* Greml. ! *Beitr.* p. 34, non P.-J. Müll.; *R. emancipatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1904) p. 131; *R. litanthus* Boul. et Vendrelly exsicc. (1875); *R. fasciatus* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.*, p. 43 (1887), pl. XXXV; *R. cinereus* God. exsicc.; *R. humifusus* Wirtg. exsicc.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 25; *Assoc. rub.* n° 179, 569; Baenitz *Hb. eur.* n° 8555 (*R. foliosus*), 9044 (*R. flexuosus*); Sud. *Bat. eur.* n° 490!; *Rub. rar.* n° 95!; Wirtg. *Hb. rub. rh.* n° 61.

Differt a *R. foliosus* Wh.: glandulis (1) in ramo turionequaque sparsioribus, in pedicellis brevibus; foliis eequaliter serratis; foliolo terminali ovato, late rhomboidale vel subobovato; inflorescentia minus elongata, apice rotundato-subcorymbosa; petalis (3) pallide roseis. *Stamina* alba stylos virescentes superantia (2); *germina* pilosa; receptaculum pilosum.

β. *TRICHOCARPUS*; *R. trichocarpus* Timeroy in Billot *Annot.* p. 280 et exsicc. n° 3076; *R. hirtus* v. *trichocarpus* Car. *Etud. Fl. éd.* 5, p. 165. — Exsicc. : Soc. dauph. n° 766; Billot l. c. — Forma contracta, subdiscolor; *folia* minute serrata; *foliolum* caul. terminale suborbicularis vel late ovatum; *R. conspectus* Gen. similis.

γ. *LÆVIPES*; *R. foliosus* v. *lævipes* Sud. in hb. *Mus. Paris.* — *Turio* pilosior; dentes profundi, grossi; inflorescentia elongata, foliosa, glandulis brevibus; *sepala* imperfecte reflexa; *germina* glabra.

δ. *SPARSIPILUS*; *R. sparsipilus* Genov. *Ess. mon.* p. 78 (1869) et *Mon.* p. 84. — *Turio* subteres, glabrescens, glandulis rarissimis; *foliolum* terminale late ovatum; flores albi; *germina* pilosa.

e. FRIGIDULUS; *R. frigidulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 130 (1901). — Turio obtusus, glaucescens; folia minute serrata; foliolum terminale obovatum, longe cuspidatum; inflorescentia glandulis longis; germina glabra.

ζ. EXSOLUTUS; *R. exsolutus* M. et Lef. *Vers.* n° 183 (1859). — Inflorescentia parum foliosa, laxa, pedunculis valde patulis, pedicellis tenuibus, divaricatis, glandulis brevibus; petala rosea, germina glabra. Cetera ut in typo.

η. MONTICOLUS; *R. monticolus* N. Boul. *Ronc. voss.* p. 91 (1869) et *excise.* n° 71; *R. fuscus* × *hirtus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 129, *p. p.* — Turio subteres; dentes tenues; foliolum terminale basi integrum; inflorescentia glandulis crebris, rubris munita; petala stylique pallide rosea; germina glabra.

θ. ABSTRUSUS; *R. abstrusus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 147 (1901). — Turio subteres, aculeis falcatis; folia coriacea, inæqualiter serrata; inflorescentia breviter pilosa, aculeis falcatis, glandulis brevibus instructa; germina glabra.

ι. VISCOUS Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 210; *R. viscosus* Wh. *ap. Lej. et Court. Comp. Fl. Belg.* II p. 170 (1831). — Turio angulatus, laxe pilosus; folia ampla, coriacea, simpliciter serrata, supra sparsim, subtus manifeste pilosa; foliolum caud. terminale late cordato-ovatum; germina glabra. Corolla alba? Pedicelli glandulos-viscosi.

GALLIA: *Vosges*, Haute-Saône, Aisne, Oise, Bretagne, Rhône, Ain, Saône-et-Loire, etc.; **BELGIA**, **GERMANIA**, **HELVETIA**, **BRITANNIA**. — **β. GALLIA**: Rhône, les Tarrets, prope Tassin. — **γ. Valois**, forêt de Retz (Questier). — **δ. Deux-Sèvres**, Châtillon, au Bois-Fichet (Genevier); *Valois*, forêt de Retz (Questier). — **ε. Haute-Garonne**, Luchon. — **ζ. Valois**, forêt de Retz (Lefevre), de Cuvergnon à Ormoy (Questier); **GERMANIA**: **Badenia**, Siegelau (Goetz). — **η. GALLIA**: *Vosges*, Rochebon, à Quentin (Pierrat). — **θ. Pyrénées centr.**, Arreau. — **ι. LUXEMBURG**.

HYBRIDÆ

R. CORYMBOSUS × *VESTITUS* Sud. *Bull. Ac. géog. bot.* (1904) 152; *R. SEMICORYMBOSUS* Sud.; *R. friburgensis* Sud. *l. c. non* Gandg. *nec* Schmid. (1903); *R. sanguineus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1904) p. 131, *non* Friv.; *R. fusco-ater*. Cot. et Cast. *Guide Frib.* p. 74!, *non* W. et N. — Folia pilosissima, minute serrata, foliolis terminalibus suborbicularibus; rachis hirsuta.

HELVETIA: bois de Lentigny, à Villarimboud (Perroud); **GALLIA**: Haute-Savoie Monts Voiron (Schmidely), Conflans, au Stesau (Perrier).

R. CORYMBOSUS × *RADULA*; *R. SABAUDICUS* Sud. — Differt a *R. corymboso* P.-J. Müll. aculeis majoribus, crebrioribus; inflorescentia laxe, pedunculis patuis, aculeis validis munita. Sterilis.

GALLIA: Haute-Savoie, Albertville, route de Beaufort, au-dessus des Adoubes (Perrier de la Bâthie).

R. CORYMBOSUS × *CHLOROSTACHYS*; *R. PSEUDO-CORYMBOSUS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Conspp.* p. 150 (1905); *Diagn.* p. 37. — Turio teres, aculei compressi, inflorescentia angusta, densa, stamina brevia

GALLIA: *Vosges* (Müller).

c. — (T. CXLI) — *R. longithysiger* Bab. *Bot. Gaz.* p. 121 (1849); *Lees Ms.* (1849); *Rogers Handb. Brit. Rub.* p. 77; *R. pyramidalis* Bab. *Bot. Gaz.* p. 121 (1849); *Brit. Rub.* p. 291, *non* Kalt.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 25.

R. corymboso similis, sed: foliis caulinis plerumque 3-natis, serratura tenuissima; foliolo terminali (4) obovato, leviter emarginato, abrupte acuminato; inflorescentia elongata, pubes coactili (5) brevi obsita; floribus albis diversus est. Stamina stylos parum superantia; sepala laxe reflexa (6).

BRITANNIA OCCIDENTALI-MERIDIONALIS.

OBS. — Le *R. corymbosus* de Bretagne se rapproche beaucoup du *R. longithysiger*, mais a la dentelure moins fine et moins superficielle. — Le *R. concinnatus* Boul. et Lucand *Assoc. rub.* n° 392 (1880) semble se rattacher au *R. longithysiger*.

d. — (T. CXLI) — *R. flexuosus* M. et L. *Vers.* n° 182 (1859); Sud. *Bat.* p. 28; *R. saltuum* Focke *ap. Greml. Beitr.* p. 30 (1870); *Syn.* p. 333; *Hal. Oest. bromb.* p. 257; *R. foliosus* et var. *saltuum* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 125, 126 (*pr. max.* p.); *R. foliosus* Rogers *Handb.* p. 78; *R. foliosus* B. *saltuum* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 574.

Exsicc. — Billot Rub. gall. et germ. n° 2058; *Assoc. rub.* n° 120!, 286, 380, 507, 647; *Rub. gall.* n° 47, 48; Favrat *Rub. Helv.* n° 34; *Set of Brit. Rub.* n° 43; Sud. *Bat. eur.* n° 81!, 491!; Ch. Magnier n° 529.

Turio (7) obsolete angulatus vel subteres; *folia* 3-5-nata, supera saepē subtus cinerascentia, dentibus parum profundi; *foliolum* terminale (8) ovatum vel ellipticum; *inflorescentia* angusta, elongata, flexuosa, usque apicem foliosa, bracteis foliaceis flores saepē superantibus; pedunculi breves, pedicellis glandulis brevibus munitis (9, 10); *petala* (10^{bis}) pallide rosea; *stamina* stylos vix æquantia; *sepala* reflexa; *germina* parce pilosa.

ε. NUDIFLORUS; *R. suavifolius* Schmid. *in hb.* Sud., *non* Greml. — Folia subtus cinerascentia, pubescentia; inflorescentia subaphylla.

γ. CARNEISTYLUS. — Ramus aciculatus; inflorescentia glandulis longis munita; stamina stylis purpureis breviora.

BRITANNIA, BELGIA, GERMANIA, AUSTRIA, GALLIA BOREALI-ORIENTALIS, HELVETIA. — **β. HELVETIA**: *Vaud*, Tour de Gourze (Schmidely). — **γ. HELVETIA**: la Folliaz (Jaquet).

OBS. — Le *R. brachystemon* Heimerl *in O. B. Z.* XXXII (1882), 109; *Hal. Oest. bromb.* p. 262; *R. foliosus* B. *brachystemon* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 575 ne semble différer du *R. flexuosus* M. et L. que par ses folioles plus larges et plus grossièrement dentées. M'est inconnu. — **AUSTRIA**: Glöggätz (Heimerl).

HYBRIDÆ

R. FLEXUOSUS × *BIFRONS*; *R. JAQUETII* Sud. — Differt a *R. flexuoso* serratura tenuiore, foliis discoloribus, inflorescentia minus elongata. Sterilis.

HELVETIA: bois de Brenles, sur Estevenens, au sud de Romont (Jaquet); **BAVARIA**: Reichenhall.

R. FLEXUOSUS × *VESTITUS*; *R. FLEXUOSIFORMIS* Sud. — Habitus *R. flexuoso* sed turio foliaque pilosiora, aculei validiores, parum inæquales, inflorescentia leviter armata.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Questier); **HELVETIA**: Le Gibboux, inter Bulle et Romont (Jaquet).

R. FLEXUOSUS × *ADSCITUS* Sud. *Diagn.* p. 36 (1906); *R. GRADATUS* Sud. *l. c.* — Habitus *R. flexuoso* sed folia grosse serrata, subtus pilosa; inflorescentia hirsuta, laxe; flores rosei. Sterilis.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, Châvres, route d'Ormoy (Questier).

R. FLEXUOSUS × *CORYMBOSUS* Sud. *Diagn.* p. 37 (1906); *R. CORYMBOSIFORMIS* Sud. *l. c.* — Stamina brevia, inflorescentia foliosa ut in *R. flexuoso*, sed breviora; foliorum figura, turio angulatus ut in *R. corymboso*. *Fructus imperfectus*.

GALLIA: *Valois*, le Fournet (Questier).

e. — (T. CXLI) — *R. derausus* L. et M. *Vers.* n° 181 (1859) (*pr. max. p.*); *R. foliosus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 125, *ex pte*; *an R. flexuosus* × *tereticaulis*?

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 96!

Turio (11) angulatus, glandulis brevibus, crebris, aculeis debilibus munitus; *folia* 3-nata, grosse serrata; *foliolum*

terminale (12) ovatum vel late rhombeum, leviter emarginatum, acuminatum ; *folia* ramealia supera subdiscolora ; *inflorescentia* brevis, obtusa, parum foliosa, glandulis crebris, (13) brevibus obsita, pedicellis tenuibus (14), subinermibus ; *sepala* imperfecte reflexa, interdum in fructu erecta ; *petala* pallide rosea ; *stamina* brevissima, alba ; *germina* glabra. Fructus male evolutus. — *Inflorescentia R. tereticaulem* revocat, sed turio angulatus.

GALLIA : Valois, Buisson de Waligny (Leffèvre), St-André (Questier).

Obs. — Des spécimens de la Marne appelés *R. derasus* par Müller constituent mon *R. derasiformis*, du groupe du *R. tereticaulis* P.-J. Müll.

B. — (T. CXLI) — R. omalodontus Müll. et Wirtg. ap. Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. 1 n° 146 (1860), ed. 2 n° 70; Focke
Syn. p. 354.

Exsicc. — Wirtgen l. c. n° 146 (1^e), 70 (2^e).

Turio angulatus, pilosus, glandulis sparsis, aculeis compressis ; *folia* 5-nata, subtus viridia, pilosa, simpliciter et subæqualiter serrata ; *foliolum* terminale (15) late ovatum, leviter emarginatum, acuminatum ; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis pallidis, tenuibus, reclinatis munitus, foliis 3-natis, æqualiter serratis ; *inflorescentia* ampla, brevis, inferne foliosa, dense hirsuta (16), glandulis crebris, aculeis sparsis, debilibus, saepe nullis ; *pedunculi* medii (17) longi, patuli, pedicellis divaricatis ; *sepala* glandulosa, vulgo inermia, reflexa ; *petala* oblonga, alba ; *stamina* longa ; *germina* glabra. *Pollinis* gradus puritatis : 5/6.

GERMANIA : Prov. rhenana, Eifel (Wirtgen) ; **GALLIA** : Valois, forêt de Retz (Questier) ; Nord, bois de Verlinghen (Boulay).

b. — R. microanchus Sud. *Diagn. p. 36* (1906) ; *R. Schlickumii* Progel, ex pte, non Wirtg.

Turio angulatus, pilosus, glandulis rarior, aculeis debilibus munitus ; *folia* 5-nata, pallide viridia, argute serrata, subtus viridia et parum pilosa ; *foliolum* terminale obovatum, basi integrum, cuspidatum ; *inflorescentia* subaphylla ; cetera ut in *R. omalodonto*. Aculeis flavescentibus, brevibus, petiolaribus ramealibusque uncinatis insignis est. Pollen parum admixtum.

GALLIA : Vosges (Müller) ; Seine-inf., Dieppeville (Letendre) ; **BAVARIA** : Waging, prope Traunstein (Progel).

c. — (T. CXLI) — R. litigiosus Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1899) p. 93 ; *R. Güntheri* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 205, non W. et N.

Gracilis et pallide viridis ; *turio* planus, dense pilosus ; *folia* plerumque 3-nata, simpliciter serrata ; *foliolum* terminale (18) obovatum ; *ramus* aculeis debilibus, reclinatis, foliis utrinque pilosis, subtus viridibus ; *inflorescentia* parva, dense hirsuta, subaphylla, pauciflora, densa, pedunculis ascendentibus ; *petala* (19) pallide rosea ; *stamina* alba vel dilute rosea stylis virescentes superantia ; *germina* glabra.

β. ILLIPEDUS ; *R. illipedus* Schmid. in *Bull. Hb. Boiss.* (1904) p. 94 (131) ; *R. emancipatus* × *serpens* v. *lividus* ej. l. c. — Pedunculi patuli, 2-3-flori, pedicellis brevibus. Fertilis.

GALLIA : Tarn, St-Urcisse ; Haute-Garonne, Bouconne. — **β. Haute-Savoie**, Monts Voivrons (Schmidely).

HYBRIDA

R. LITIGIOSUS × **TOMENTOSUS** *Lloydianus* ; *R. boconensis* Sud. in *hb.* Müller. — Discolor, foliola rhombea, turio glaber, glandulæ rare ; flores albi.

GALLIA : Haute-Garonne, Bouconne, côté de Pibrac (Timbal).

C. — (T. CXLI) — R. conspectus Genev. *Ess. mon. p. 37* (1869) ; *Mon. p. 72* ; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 64 ; Bouv. *Rub. Anj.* (1903) p. 684 ; (1907) p. 54 ; *R. scaber* Rogers *Handb. p. 75*, non W. et N.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 124 ; Sud. *Bat. eur.* n° 492.

Turio (20) angulatus, pruinosis, pilosus ; *folia* argute mucronato-denticulata, subtus pilosa, caulina 3-5-nata ; *foliolum* terminale (21) late ovatum vel suborbiculare, basi emarginatum, abrupte et breviter acuminatum ; *inflorescentia* minus elongata quam in *R. folioso*, ± foliosa, hirsuta, subinermis, glandulis longis ; *sepala* reflexa ; *petala* (22) alba, oblonga ; *stamina* alba stylis roseos superantia ; *germina* fere glabra. — *R. scabro* W. N. similis.

β. UMBROSUS Sud. *Ronc. bret.* p. 18 (1904). — Turio glaucissimus ; folia subtus viridia ; foliolum terminale obovatum, inflorescentia angusta, densa ; petala rosea ; stamina stylique pallida.

GALLIA : Mains-et-Loire, Angers (Genevier, Bouvet) ; Rhône, Lyon (Jordan) ; **BRITANNIA** : Berkshire, Boar's Hill, Devon, Somerset, Hibernia, etc. (Rogers) ; **GERMANIA** : Prov. rhenana (Bodewig) ; — **β. GALLIA** : Finistère, Toull an Dioull.

HYBRIDA

R. CONSPECTUS × **TOMENTOSUS** *Lloydianus* ; *R. RHODANENSIS* Sud. *hb.* — Habitus *R. conspecti* Gen. sed discolor, parum glandulosus, epruinosus sterilisque

GALLIA : Rhône, Yseron, aux Jumeaux (Jordan).

D. — (T. CXLI) — R. pinicola H. Hofmann *Abh. der Nat. Gesell. Isis.* (1897) p. 98 ; Sud. *Bat. p. 12* ; *R. apiculatus* D *pinicola* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 581 (1902).

Exsicc. — Hofmann *Pl. crit. sax. f. III*, n° 56 ! ; Baenitz *Hb. eur.* n° 9969 ! ; Sud. *Bat. eur.* n° 35 !

Turio subteres, parce pilosus, epruinosus, parum glandulosus, aculeis inæqualibus, majoribus compressis ; *folia* plerumque 3-nata, subtus viridia, pilosa, grosse et subæqualiter serrata ; *foliolum* terminale (23) ovatum, leviter emarginatum, acuminatum ; *ramus* flexuosus, pilosus, glandulis brevibus, aculeis sparsis, reclinatis, foliis superioribus subtus pallidis vel subcinerascens ; *inflorescentia* usque apicem foliosa, piloso-hirsuta ; *sepala* tomentosa, breviter glandulosa, laxe reflexa ; *petala* alba, obovata ; *stamina* alba stylis roseis breviora (24) ; *germina* pilosa.

β. MELANOSTYLUS ; *R. melanostylus* Sud. in *hb. Mus. Paris.* — Serratura minus grossa ; folia subtus molliter pilosa ; foliolum terminale elliptico-obovatum, fere integrum ; pedicelli fasciculati, glandulis fuscis, crebris muniti ; styli atri ; *germina* glabra.

GERMANIA : Saxonia (Hofmann), Thuringia (Focke). — **β. GALLIA** : Valois, forêt de Retz (Questier).

E. — (T. CXLI) — R. cavatifolius P.-J. Müll. ap. N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 67 (1867) ; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 71 ; *R. Kœhleri* v. *cavatifolius* Bab. (sec. Rogers) ; *R. thyrsiflorus* v. *eideranus* K. Frid. exsicc. (1896).

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 49 ! ; *Set of Brit. Rub.* n° 68 ; *Rub. gall.* n° 82 ; Sud. *Rub. rar.* n° 97.

Turio (25) angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, epruinosus, glabrescens, scaber ; *folia* 5-nata, subtus parce

pilosa, viridia vel subcinerascentia, mediocriter et inaequaliter serrata; *foliolum* caul. terminale (26) late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum; *ramus* angulosus, pilosus, aculeis debilibus, glandulis tenuibus, pallidis munitus; *inflorescentia* oblonga, truncata, ± foliosa, breviter hirsuta, glandulis brevibus, aculeis tenuibus, sparsis, pallidis, pedicellis brevibus; *sepala* inermia, reflexa; *petala* (27), oblonga, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia. — *R. pallido* Wh. similis sed *sepala* reflexa, turio glabrescens.

GALLIA: Vosges, Saint-Dié, forêt du Cambert (Boulay); Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson (Salles); Valois, forêt de Retz (Questier); Loire-inf., forêt d'Ancenis (de l'Isle); **BRITANNIA**: Monmouthshire, Beacon Hill (Lej, Linton), Gloucestershire, Herefordshire (Rogers); **GERMANIA**: Schleswig, Husum (K. Friderichsen).

Obs. — Le type des Vosges a les carpelles velus, tandis la plante d'Angleterre les a glabres; mais ces différences me paraissent très légères. Me semble plus rapproché du *R. foliosus* Wh. que de toute autre espèce.

S 1 — (T. CXLII) — *R. INSEICATUS* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 184; Focke Syn. p. 309 et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 552, p. p.; Sud. ap. Gandg. Nov. Consp. p. 151; *R. obscurus* (Kalt.) Focke ap. Asch. et Gr. l. c. p. 552, ex pte; *R. buhnensis* Progel, non G. Braun.

Exsicc.— Wirtgen Hb. rub. rh. ed. I n° 86, 17 (*R. vestitus* v. *umbrosus*), 18 (*R. vestitus* var. *humifusus*), 18^{bis} (*R. Hystrix* f. *umbrosa*).

Turio (1) arcuato-prostratus, angulatus, faciebus planis, dense piloso-hirsutus, parce glandulosus; *aculei* valde inaequales, maiores mediocres, parum compressi, recti vel reclinati, minores aciculares; *folia* (2, 3) 5-nata, tenuia, supra appresse pilosa, subtus viridia, pilosa, pilis longis, ad nervos pectinatis, argute, simpliciter et subaequaliter serrata; *foliolum* terminale rhombeum vel ellipticum, basi integrum, longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolus* hirsutus, aculeis debilibus, reclinatis vel subfalcatis munitus; *stipulae* lineares, hirsutae, glandulosae: *ramus* gracilis, angulatus, dense pilosus, aculeis tenuibus, pallidis, foliis 3-natis, subtus viridibus et pilosissimis; *inflorescentia* (4) parum foliosa, piloso-hirsuta, glandulis tenuibus, aculeis rarisi (5), debilibus, pedunculis mediis 2-3-floris, patulis; *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa, inermia, reflexa (8); *petala* (6, 7) obovata vel elliptica, late rosea; *stamina* stylis superantia; *germina* glabrescentia. Pollinis (9) gradus puritatis 3/4. — Julius.

β. MINUTISERRATUS Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. t. LV (1908) p. 217. — Folia minute mucronato-serriculata, caulinata 3-5-nata; *foliolum* terminale latius; styli virescentes.

γ. GERMANUS; *R. germanus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 129 (1869) et exsicc. n° 13! — *Turio* parum glandulosus, aculeis majoribus; *folia* minus pilosa, mucronato-serrata; *foliolum* terminale leviter obovatum, tenuiter acuminatum; *inflorescentia* angusta; *petala* staminea rosea; styli rosei.

δ. GUESTPHALICUS Focke Syn. p. 310 (1877). — Exsicc.: Focke Rub. sel. n° 19. — *Turio* (10) sublævis, angulatus, aculeis subaequalibus; *folia* caulinata 3-nata, satis grosse serrata, foliolis terminalibus (11) rhomboides; *petala* angusta; *germina* pilosa. Forma pilosissima vergens in *R. pyramidale*.

ε. BUHNENSIS; *R. buhnensis* G. Braun Hb. rub. germ. n° 40, ex pte; T. Braeucker Rub.-Art. p. 60; *R. rubicundus buhnensis* Focke Syn. p. 311 (1877). — *Turio* angulatus, laxe pilosus; *folia* caulinata 5-nata, simpliciter serrata, subtus molliter piloso-volutina; *foliolum* terminale (12) late ellipticum, basi subemarginatum, satis abrupte acuminatum; *sepala* reflexa!; *germina* pilosa. — Forma vergeris in *R. Gravetii*.

In memoribus. — **GERMANIA**: Coblenz (Wirtgen); **BAVARIA**: Morsdorf (Progel), Aschaffenburg; **BELGIA**: Biron (du Pré); **GALLIA**: Meurthe-et-Mos., bois de Mousson (Salle); Rhône, les Juineaux, prope Lyon (Jordan). — **β. GALLIA**: Eure-et-Loir, Sarthe, Seine-et-Oise, Saône-et-Loire, Indre-et-Loire, etc.; **HELVETIA**: Lussy (Jaquet). — **γ. GALLIA**: Vosges, Saulxures-sur-Moselotte, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat). — **δ. GERMANIA OCCIDENT.**: Buchenberg, prope Burgsteinfurt (Banning). — **ε. GERMANIA OCCIDENTALIS**: Buhin, prope Vlotho (G. Braun).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Foliolum* caulinum terminale ellipticum, rhombeum vel obovatum, basi integrum vel vix emarginatum.

A. — *Foliolum* caul. terminale ellipticum vel rhombeum, acuminatum.

a. — *Inflorescentiae* rachis piloso-hirsuta.

- 1. — Serratura tenuis, æqualis; *folia* subtus pilosissima.....
- 2. — Serratura mediocris, inaequalis; *folia* subtus parce pilosa.....

b. — *Inflorescentiae* rachis tomentosa, parce pilosa; *folia* minute serrata.....

B. — *Foliolum* caul. terminale ovatum, cuspidatum; *turio* pilosus.....

R. insericatus P.-J. Müll.
R. RHOMBOPHYLLUS M. L. b.
R. MICROBELUS Sud. c.
R. TRUNCIFOLIUS M. L. b.

II. — *Foliolum* caul. terminale ovatum, basi emarginatum.

A. — *Folia* subtus molliter pilosa; *turio* hirsutus.

- a. — *Folia* subtus viridia; *inflorescentia* subaphylla.....
- b. — *Folia* subtus cinerascentia; *inflorescentia* foliosa.....

R. GRAVETII Boul. C.
R. HYPOSERICEUS Sud. Cb.

B. — *Folia* subtus viridia, parce pilosa; *turio* parum pilosus.

- a. — *Foliolum* caul. terminale latum; *turio* parce glandulosus.....
- b. — *Foliolum* caul. terminale angustum, longe acuminatum.....

R. ADORNATIFORMIS Sud. D.
R. ACUMINIFER Sud. Db.

b. — (T. CXLIII) — *R. rhombophyllum* M. et Lef. Vers. n° 114 (1859); *R. flexuosus* Sbs. *leiogynus* Sabrs. in Baenitz Hb. eur. n° 7430; *R. teretiusculus* f. *debilis* *turfosa* Progel.

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 98.

Differt a *R. insericato* P.-J. Müll.: *turione* (1) validiore, aculeis robustioribus armato; *foliis* crassioribus, subtus parum pilosis, interdum subcinerascentibus, inaequaliter serratis dentibus minus acutis; *foliolо* caulinum terminali (2) late rhomboe, subemarginato. *Inflorescentia* hirsuta, aculeis sparsis (3), reclinatis munita; *sepala* aculeata; *petala* (4) rosea; *stamina* rosea stylis flavescentes superantia; *germina* glabra. Pollen satis imperfectum.

β. SILVIGENUS; *R. silvigenus* Sud. Bat. p. 12 (1903) et exsicc. n° 36!; *R. atrovirens* Gen. Mon. p. 44 ex pte, non P.-J. Müll. — *Turio* laxe pilosus; dentes acuti; pedunculi minus patuli, multiflori, minus hirsuti; *sepala* vulgo inermia; styli pallide rosei; *germina* pilosa.

γ. CINERASCENS; *R. cinerascens* Wh. ap. Lej. et Court. Comp. Fl. Belg. II p. 171 (1831); Sud. Bull. Soc. Bot. Belg. (1910) p. 211; *R. apiculatus* v. *verviensis* Lej. pruis.! — *Turio* laxe pilosus; *foliolum* caulinum terminale angustum, elliptico-oblongum, acuminatum; *inflorescentia* laxa, breviter pilosa, pedunculis mediis elongatis, patulis; *germina* subglabra.

GALLIA: Aisne et Oise, forêt de Retz, bois de Tillet, de Fontaine, près de Neufchelles, route de Vez (Lefèvre, Questier); Saône-et-Loire, Bourg-le-Comte (Château); **GERMANIA**: Badenia, Siegelau (Goetz); **BAVARIA**: Waging (Progel); Prov. rhénana, Alf (Bodewig). — **β. GALLIA**: Puy-de-Dôme, Corrèze, Ardèche, Cantal. — **γ. BELGIA**, circa Verviam (Lejeune).

HYBRIDA

R. RHOMBOPHYLLUS var. β . \times *ULMIFOLIUS*; *R. SEMISILVIGENUS* Sud. — *Turio pruinosis*, eglandulosus, aculeis subæqualibus, compressis; folia subtus cinerascentia; rachis pilosa, parce glandulosa; flores rosei, steriles.

GALLIA: Puy-de-Dôme, Courpières (Charbonnel); Cantal, St-Pouey (Charbonnel).

c. — (T. CXLIII) — *R. microbelus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 341.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10873 (*R. gymnostachys*, non Genev.).

Turio (5) subteres, aculeis crebris, conicis; *folia* caul. 5-nata, minute mucronato-denticulata; *foliolum* terminale (6) leviter obovatum, breviter acuminatum; *ramus* fuscus, parum pilosus, aculeis conicis, reclinatis; *inflorescentia* breviter pilosa (7), aculeis crebris, validis armata; *flores* rosei. Hybrida?

GERMANIA: Badenia, Eckleberg, prope Waldkirch (Goetz); BELGIA: Nyle-Tharoul (Wathelet); STYRIA: Scechau (Sabransky).

B. — (T. CXLIII) — *R. truncifolius* M. et L. *Vers.* n° 76 (1859); *R. Menkei* Questier in Billot *exsicc.* non W. N.; *R. podomorphus* Braeucker *Rub.-Art.* p. 21 (1882).

Exsicc. — Billot *Fl. gall. et germ.* n° 1868!; Sud. *Bat. eur.* n° 493!; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 73.

Turio (8) angulatus, faciebus planis, pilosus, glandulis brevibus, aculeis compressis, rectis reclinatis munitus; *folia* 3-5-nata (9), supra parce pilosa, subtus viridia, parum pilosa, dentibus mediocribus, simplicibus, subæqualibus, parum profundis; *foliolum* terminale obovato-suborbicular, submarginatum vel integrum, abrupte acuminatum vel subtruncato-cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius; *ramus* pilosus, glandulis brevibus, aculeis reclinatis munitus, foliis argute serratis, foliolis terminalibus obovato-cuspidatis; *inflorescentia* ± foliosa, laxa, piloso-hirsuta, parce aculeata (10), pedunculis (11) mediis patulis; *sepala* pilosa, glandulosa, inermia vel parce aculeata, reflexa; *petala* (12) obovata, rosea; *stamina* roseolo stylos æquantia; *germina* glabra.

β . THYRSIGER; *R. thyrsiger* Bab. *Journ. Bot.* (1886) p. 236, non Banning et Focke ap. Focke *Syn.* p. 341 (1877); Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 76; *R. Bloxamii* Fl. Plym. p. 122. — Exsicc.: *Set of Brit. Rub.* n° 97. — *Turio* scabrior; folia caul. plerumque 3-nata, foliolis terminalibus angustioribus, obovatis, ± longe cuspidatis; dentes minus profundi; inflorescentia brevis, lata, laxa; petala rosea; stamina rosea stylos rubros æquantia vel parum superantia; germina glabrescentia.

γ . SERICATIFRONS; *R. sericatifrons* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 336; *R. platycephalus* (Focke) f. *rubriflora* Kaufmann ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9970. — *Turio* glabrescens; folia 3-nata, supra glabra, subtus molliter pubescenti-cinerascentia; *foliolum* terminale obovatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, glandulis longis obsita; petala rosea; stamina rosea stylos superantia; germina pilosa.

δ . ALBEMARLENSIS; *R. albemarlensis* Sud. *Diagn.* p. 40 (1906). — Exsicc.: Sud. *Hb. rub. rar.* n° 39!; Ch. Magn. *Fl. sel.* n° 247. — *Turio* dense pilosus; folia subtus parum pilosa, inæqualiter et argute serrata; *foliolum* terminale obovatum, breviter et abrupte acuminatum; *inflorescentia* densa, folia parum superans, pedicellis brevibus pedunculis ascendentibus; petala rosea; stamina rosea stylos virescentes æquantia; germina tomentosa.

ϵ . CALLISTEMON Sud. *Rub. tarr.* p. 38 (1909). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 494! — *Turio* pilosus; folia subtus pilosissima, superiora subcinerascentia; serratura acutissima; *foliolum* caul. terminale late obovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* laxa, pyramidalis, aculeis sparsis, validis, pedunculis patulis, longis; petala rosea; stamina basi rubra, stylos rubros parum superantia; germina pilosissima. — Habitus *R. vestiti* W. et N.; *R. apiculato* Wh. admodum similis. Hybrida?

ζ . DOURETHI Sud. in *Bull. Soc. bot. Belg.* XLVII (1910) p. 212. — Folia coriacea, supra sparsim, subtus molliter pilosa, argute et simpliciter serrulata; *foliolum* terminale obovato-orbiculare, cuspidatum; *inflorescentia* multiflora, densa, aculeis crebris, mediocribus armata, pedunculis patulo-ascendentibus; germina pilosa; flores? — Forma vergens in *R. Babingtonii*.

η . THYRSIGERIFORMIS; *R. uncinalus* Corb. *Fl. Norm.* p. 206, non P.-J. Müll. — Exsicc.: *Assoc. rub.* n° 1086; Sud. *Bat. eur.* n° 495, 496; Ch. Magn. n° 3761. — Habitus var. β sed folia inæqualiter et acute serrata, superiora subtus ± cinerascentia, inflorescentia magis armata, glandulis crebrioribus. Forma vergens in *R. Menkei*. Stamina stylos æquantia, germina glabra, sepala in fructu laxe reflexa.

θ . ACCLINIS. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 497! — *Turio* obtusangulus; folia satis grosse serrata subtus ± cinerascentia; *foliolum* terminale obovatum; *inflorescentia* aculeis subrectis armata; petala ovata, rosea; stamina alba stylos virentes parum superantia; germina parce pilosa; sepala laxe reflexa. Forma vergens in *R. apiculatum* Wh.

GALLIA: Valois, forêt de Retz, taillis d'Ivors, bois de Thury (Lesfèvre, Questier); BELGIA: Trooz (Aigret); GERMANIA: Bavaria, Waging, Teisendorf, propre Traunstein (Progel); Prov. rhénane, Derschlag (Braeucker). — β . BRITANNIA MERIDIONALI-OCCIDENTALIS: S. Devon, Sussex, Hibernia (Rogers). — γ . BAVARIA: Traunstein (Kaufmann). — δ . GALLIA: Aisne, bois de Savy (Magnier); Seine-inf., Aumale (Questier). — ϵ . GALLIA: Tarn, la Sarrade, prope Bellegarde. — ζ . BELGIA: Woluwe-St Lambert (A. Douret). — η . GALLIA: Manche, Cherbourg, à la ferme du Val et ailleurs (Corbière). — ϑ . GALLIA: Haute-Garonne, Eaunes.

HYBRIDA

R. TRUNCIFOLIUS var. ϵ . \times *ULMIFOLIUS*; *R. SEMICALLISTEMON* Sud. *Rub. tarr.* p. 38 (1909). — Discolor; folia obscure viridia, stamina brevia. Sterilis.

GALLIA: Tarn, la Sarrade, prope Bellegarde.

C. — (T. CXLIII) — *R. Gravetii* N. Boul. *Rub. gall. exsicc.* n° 39 (1895), nomen.

Turio (13) obsolete angulatus, dense et longe pilosus, aculeis compressis; *folia* 5-nata, supra fere glabra, subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis, inæqualiter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale (14) ovatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *rami* folia 3-nata, inæqualiter serrata, subtus viridia; *inflorescentia* subaphylla, hirsuta (15), aculeis tenuibus, pedunculis patulis (16), pedicellis gracilibus; *sepala* pilosa, glandulosa, inermia vel parce aculeata, laxe reflexa; *petala* (17) oblongo-bovata, laxe rosea; *stamina* rubra stylos roseos superantia; *germina* glabra. — *R. obscuro* Kalt. similis.

β . DEVONICUS Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 212; *R. devonicus* N. Boul. *Assoc. rub. exsicc.* n° 1174 (1893). — Folia minute et simpliciter serrata; *foliolum* caul. terminale late ovatum, emarginatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* interne foliosa, aculeis crebris, mediocribus, glandulis ± fuscis, longis munita; cetera ut in typo. — Forma vergens in *R. fusco-atrum* Wh.

BELGIA: Namur, Louette-St-Pierre (Gravet), Frahan (Delogne), Modave (Wathelet); GERMANIA: Prov. rhénane, Adenau (Bodewig). — β . BELGIA: Ardennes, accotements de la route de la Roche à Samrée (du Pré et Dutrannoy); de Roanne à Spa, moulin du Ruy (du Pré).

b. — (T. CXLIII) — *R. hyposericeus* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 36 (1904); *R. fuscus* v. *macrostachys* (non P.-J. Müll.) Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 74 (1900).

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 126.

A. *R. Gravetii* dignoscitur: aculeis (18) parum inaequalibus; foliis pilosioribus, sericeis, subtus leviter cinerascentibus, simpliciter et aequaliter serratis (19); inflorescentia (20) valde foliosa, pedunculis leviter ascendentibus, pedicellis fasciculatis. Flores ut in *R. Gravetii*.

BRITANNIA: Herefordshire, Yatton Wood (A. Ley); Essex, Berkes, Brecon, Chester, Hibernia (Rogers); GALLIA: Valois, le Fournet (Questier).

D. — (CXLIII) — ***R. adornatiformis*** Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 65 (1902); Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 54; *R. rosaceus* Genev. *Mon.* p. 140, non W. et N.; *R. brassicifolius* Sabrs. in *hb. Sud.*

Turio (21) obtusangulus, parce pilosus, aculeis inaequalibus; *folia* plerumque 3-nata (22), interdum 4-5-nata, subtus viridia et parum pilosa vel glabrescentia, inaequaliter et grosse serrata; *foliolum* terminale ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* pilosus, aculeis debilibus, foliis grosse serratis, subtus viridibus; *inflorescentia* hirsuta, brevis, parum armata (23); *petala* (24) rosea, ovata; *stamina* alba stylos vulgo roseos superantia.

β. OREADIFORMIS; *R. oreades* Genev. *Mon.* p. 143, non M. et Wirtg. — *Turionis* aculei subaequales; *foliolum* caul. terminale obovato-orbiculare, abrupte acuminatum, grosse serratum; *inflorescentia* brevis; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

γ. VEPRETILOCUS; *R. vepreticulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 63, 92 (1900). — *Inflorescentia* breviter pilosa, aculeis crebris; *petala* rosea; *stamina* stylique rubra; *germina* glabra.

δ. MACILENTUS; *R. macilentus* Genev. 1^{er} suppl. *Ess. mon.* p. 42 (1872); *Mon.* p. 153; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 66. — *Turio* pilosior, heteracanthissimus; *folia* argute mucronato-serrata; *inflorescentia* breviter pilosa, foliosa, parum armata; *petala* oblonga, laete rosea; *stamina* rosea stylos virescentes superantia.

ε. ORTHOPLODES; *R. orthoploides* Kinsch. ad int. — Aculei per validi, crebri, pallidi, rameales recti vel reclinati; serratura acuta; *folia* caul. 5-nata; *foliolum* terminale longe acuminatum; *petala* staminaque rosea, *germina* glabra. Forma vergens in *R. Hystrix*.

GALLIA: Maine-et-Loire, Bézergues, à Bellefontaine! (Genevier); Loire-Inf., Creuse, Eure, Marne, Tarn, etc. ALSATIA, STYRIA, BAVARIA. — β. GALLIA: Vendée, Chavagne, la Verrie (Genevier). — γ. GALLIA: Ariège, Foix. — δ. GALLIA: Indre-et-Loire, forêt de Loches, près des Chartreux (Genevier); BELGIA: Louette-St-Pierre (Gravet). — ε. GERMANIA: Silesia, Ratibor, Schwarzwald (Kinscher).

b. — (T. CXLIII) — *R. acuminifer* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 343; *R. sphenophyllus* Goetz in Baenitz exsicc. *Hb. eur.* n° 10396, non L. et M.

Turio (25) glaucescens, obtusangulus, dense glandulosus, pilosus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia, glabrescentia, grosse, inaequaliter et duplicato-subinciso-serrata; *foliolum* caul. terminale (26) oblongum, emarginatum, longe acuminatum; *ramus* flexuosus, foliolis angustis, acuminatis; *inflorescentia* oblonga, aphylla, hirsuta (27), parum armata; *flores* (28) rosei; *sepalæ* reflexa.

GERMANIA: Badenia, Siégelau (Goetz).

ε — (T. CXLIV) — ***R. INFESTUS*** Wh. in Boennin. *Prod. Fl. Monast.* 153 (1824); W. et N. *Rub. germ.* p. 77 t. XXX; Focke *Syn.* p. 272; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 471; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 59, non Kalt. nec Questier, nec Waldst. et Kit.

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 122; Sud. *Bat. eur.* n° 37.

Turio (1) arcuato-decurvus, angulatus, faciebus planis vel excavatis, glaber vel parce pilosus, epruinosus, glandulis rarissimis munitus; *aculei* inaequales, maiores e basi compressa, dilatata, validi, recti, reclinati vel leviter falcati, minores aciculares vel papulaeformes; *folia* plerumque 5-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, interdum supera subcinerascentia, inaequaliter, mediocriter et subsimpliciter serrata; *foliolum* terminale ovatum, subemarginatum, acuminatum, infima breviter petiolulata; *petiolus* supra planus, aculeis validis, uncinatis armatus; *stipulæ* linearilanceolatae, glandulis nullis vel sparsis munitæ; *ramus* angulatus, parce pilosus, aculeis validis, falcatis uncinatis, foliis subtus vulgo viridibus; *inflorescentia* (3) saepe usque ad apicem foliosa, laxe pilosa, glandulosa, aculeis validis (4), crebris, plerumque falcatis uncinatis armata, pedunculis ascendentibus, paucifloris; *sepala* virescentia, albo-marginata, breviter pilosa, glandulosa, parte aculeata, post anthesin patula (5) vel fructum laxe amplectentia; *petala* (6) ovata, alba vel pallide rosea, stylos virescentes parum superantia; *germina* pilosa vel glabra; *receptaculum* pilosum. *Pollen* (7) admixtum. — Julius.

β. TÆNIARUM; *R. tæniarum* Lindg. *Nov. Fl. Suec.* p. 5 (1858); *R. infestus* Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 128. — Exsicc.: Lindg. *Hb. rub. scand.* n° 19, 20. — *Foliolum* caul. terminale (8) rhombeum, basi fere integrum; *inflorescentia* laxa.

γ. GNEISSOPHILUS Sud. *Rub. tarn.* p. 38 (1909). — *Folia* grosse serrata; *foliolum* terminale obovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentiae* glandulæ crebræ, longæ; *stamina* rosea stylos virescentes aequalitatem.

In nemoribus et sepiibus — GERMANIA: Harz, Thuringia, Guestphalia, Saxonia; BRITANNIA, BELGIA, HIBERNIA. — β. SUECIA. — γ. GALLIA: Tarn, St-Amans, les Irises.

HYBRIDA

R. INFESTUS × SCHLEICHERI (grex); *R. SEMINFESTUS* Sud. — Habitus *R. infestus* sed heteracanthior et glandulosior, aculeis flavescentibus: *inflorescentia* laxa. Sterilis.

BRITANNIA: Cheshire, Broxton Woods (Wolley-Dod).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Stamina* stylos superantia vel iis aequali longa.

- | | |
|--|-----------------------------|
| A. — <i>Turio</i> manifeste angulatus; <i>inflorescentia</i> aculeis crebris, falcatis uncinatis armata. | <i>R. infestus</i> Wh. |
| a. — <i>Folia</i> grosse serrata; antheræ glabré..... | R. DREJERI Jens. B. |
| b. — <i>Folia</i> minute mucronato-serrata; antheræ pilosæ..... | |
| B. — <i>Turio</i> subteres; <i>inflorescentia</i> inermis vel parum armata. | R. HOLOCHLOUS Sud. b. |
| a. — <i>Folia</i> 3-5-nata, grosse serrata, subtus pilosa; <i>inflorescentia</i> leviter armata..... | R. EUCHLOUS Focke c. |
| b. — <i>Folia</i> 5-nata, mediocriter serrata, subtus glabrescentia; <i>inflorescentia</i> inermis..... | |
| II. — <i>Stamina</i> stylos breviora. | |
| A. — <i>Turio</i> epruinosus; <i>foliolum</i> caul. terminale ovatum. | R. VIRIDISSIMUS Sud. C. |
| a. — <i>Inflorescentia</i> parum armata; <i>germina</i> glabra..... | R. ALTIPRATENSIS Sprib. Cb. |
| b. — <i>Inflorescentia</i> armatissima; <i>germina</i> vulgo pilosa..... | R. PETRAKII Sud. D. |
| B. — <i>Turio</i> pruinosus; <i>foliolum</i> caul. terminale anguste elliptico-obovatum..... | |

b. — (T. CXLV) — R. holochlous Sud. Bat. p. 57 (1906).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 177.

Turio (1) subteres, prostratus, glabrescens; *folia* subtus viridia, pilosa, grosse et inaequaliter serrata, caulinis (2) 3-5-nata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, sensim acuminatum; *ramus* pilosus, aculeis debilibus, pallidis; *inflorescentia* elongata, hirsuta, aphylla, aculeis crebris (3), pallidis, tenuibus vel mediocribus, reclinatis falcatisve munata; *sepala* viridia, angusta (4), acuminata, fructum laxe amplexentia; *petala* (5) alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

BELGIA : Prov. Namur, Louette St-Pierre (Gravet); GALLIA : Tarn, Grandval.

c. — (T. CXLV) — R. euchlous Focke in hb. Gravet; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 470 (1902), ex pte; Sud. Bat. p. 69 et exsicc. n° 229, 230 !

Turio (6) angulatus, scaberrimus, glandulosus, glaber; *folia* (7) subtus viridia, glabrescentia, acute serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; petioli stipulae glandulosa; *inflorescentia* inferne foliosa, laxe hirsuta, tenuiter glandulosa, subinermis (8), pedunculis (9) tenuibus, ascendentibus, paucifloris; *sepala* viridia, pilosa, inermia, fructum laxe amplexentia; *petala* (10) alba, elliptica; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. Fertilis. — A *R. orthoclado* differt: turione angusti-elliptica, scabro, glanduloso; foliis subtus glabrescentibus, foliolis terminalibus basi dilatatis, longe acuminatis, etc.

BELGIA : Prov. Namur, Louette-St-Pierre (Gravet).

B. — (T. CXLV) — R. DREJERI G. Jensen Fl. Dan. f. 51, 7 t. 3023 (1883); K. Frid. et Gel. Rub. Dan. et Slesv. p. 88; Rés. fr. p. 17; Rogers Handb. Brit. Rub. p. 62; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 539.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 498.

Turio (11) angulatus, pubescens, glandulis raris, aculeis validis, compressis, inaequalibus, faciebus sublaevibus vel scabris; *folia* (12) 3-4-5-nata, subtus viridia, parce pilosa, subaequaliter et mediocriter mucronato-serrata; *foliolum* caulinis obovato-orbiculare vel late ovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolorum* aculei falcati vel uncinati; *ramus* pilosus, aculeis validis, foliolis latis; *inflorescentia* elongata, interrupta, basi foliosa, hirsuta, glandulis longis, inaequalibus, aculeis validis, crebris, pallidis, reclinatis falcatis instructa (18), pedunculis ascendentibus; *sepala* virescentia, aculeata, fructum laxe amplexentia; *petala* late ovata (14), pallide rosea; *stamina* stylos superantia; *antheræ* pilosæ; *germina* glabrescentia. — Interdum parum heteranthus est; *R. vestitus* admodum similis

? β. HIBERNICUS Rogers (pr. subsp.) Journ. Bot. (1897), 48; Handb. Brit. Rub. p. 62. — Inflorescentia parum armata, apice attenuata, laxa.

DANIA : Jutland; GERMANIA BOREALIS : Schleswig-Holstein, Harz; BRITANNIA : HIBERNIA (Rogers); BELGIA ? — β. HIBERNIA : Down, Saintfield, Aghaderg, Lionagade (Rogers).

C. — (T. CXLV) — R. viridissimus Sud. Rub. Tarn. p. 39 (1909).

Exsicc. — Sud. Hb. rub. rar. n° 40 !

Turio (15) obtusangulus, fere glaber; *folia* 3-5-nata (16), subtus viridia, parce pilosa, mediocriter serrata; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum, breviter acuminatum; *ramus* parum pilosus, aculeis mediocribus; *inflorescentia* (17) aculeis tenuibus vel mediocribus, rectis reclinatis falcatisve munata; *sepala* patula; *petala* (18) late ovata, alba; *stamina* alba stylis breviora; *germina* glabra.

GALLIA : Tarn, Le Pont de la Mouline, prope Murat; Puy-de-Dôme, la Bourboule, à la Vernière.

b. — (T. CXLV) — R. altipratensis Spribille Beitr. Rub. Prov. Schles. p. 342 (1904).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 176 !

Turio (19) angulatus, glabrescens; *folia* 5-nata (20), subtus viridia, pubescentia; *foliolum* terminale ovatum, acuminatum; *inflorescentia* magna, elongata, foliosa, armatissima (21), aculeis reclinatis falcatisve; *sepala* tomentosoviridia; *petala* (22) alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentibus breviora; *germina* pilosa.

β. MISSBACHII. — Aculei turionis mediocres; folia argute et subsimpliciter serrata, inflorescentia apice aphylla, *germina* glabra. Folia superiora ± cinerascentia.

GERMANIA : Silesia, Schmiedeberg (Spribille); GALLIA : Tarn, Payrolles, prope Brassac; Haute-Garonne, Eaunes. — β. GERMANIA : Saxonia, Dresden, prope Wachwitz (Missbach).

D. — (T. CXLV) — R. Petrikii Sud.

Turio (23) angulatus, pruinosus, pubescens, parce glandulosus, aculeis mediocribus, reclinatis; *folia* 3-4-5-nata (24), utrinque parce pilosa, subtus viridia, subsimpliciter mucronato-serrata; *foliolum* terminale anguste elliptico-ovatum, basi integrum, acuminatum; *inflorescentia* elongata, foliosa, pilosa (25), aculeis mediocribus, glandulis crebris munata; *sepala* extus viridia, albo-marginata, glandulosa, pilosa, ± aciculata, in flore reflexa, in fructa ± patula; *petala* (26) oblonga, alba; *stamina* alba stylis lutescentibus breviora; *germina* pilosa.

AUSTRIA : Moravia, inter Bartchdorf et Olpitz (F. Petrik).

BB — (T. CXLVI) — R. BABINGTONII Bell Salt. in Ann. Nat. Hist. XV, 307 (1845); Rogers Handb. Brit. Rub. p. 69; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 566 p. p. (excl. syn.); R. scaber Bab. Brit. Rub. ed. I, 184 (1846), non W. et N.

Exsicc. — Set of Brit. Rub. n° 94, 42 (p. p.).

Turio (1) angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, dense pilosus, glandulis inaequalibus, crebris obsitus; *aculei* inaequales, maiores compressi, recti vel reclinati, minores conici vel papulæformes; *folia* 5-nata (2), supra fere glabra, pallide viridia, subtus molliter piloso-velutina, pilis longis, ad nervos pectinatis, viridia vel subcinerascentia (in apricis), minute, simpliciter et subaequaliter serrata; *foliolum* terminale anguste ovatum, ellipticum vel leviter obovatum, basi integrum vel subemarginatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *petiolus* supra planus, aculeis falcatis; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer dense pilosus, aculeis reclinatis falcatisve, foliis 3-natis, argute denticulatis; *inflorescentia* (3) magna, lata, vulgo usque apicem foliosa, dense piloso-hirsuta, glandulosa, aculeis crebris, validis (4), plerumque falcatis armata; *pedunculi* medii longi, patuli, 2-3-flori; *sepala* tomentosa, hirsuta, aculeata, crebris, validis (5), in fructu subreflexa; *petala* (6) ovata, alba vel pallide rosea; *stamina* stylos pallidos vix post anthesin patula (5), in fructu subreflexa; *germina* pilosa; *receptaculum* pilosum. — Julius.

β. GALLICUS. — *Stamina* stylos longe superantia; *germina* glabra.

In sepibus et nemoribus. — BRITANNIA. — β. GALLIA : Manche, Cherbourg (Le Jolis); Valois, forêt de Retz (Questier); Sarthe, forêt de Bercé (Gentil).

HYBRIDA

R. BABINGTONII × *FUSCO-ATER* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* p. 14 (1904); *R. MARSHALLII* Focke et Rogers *Journ. Bot.* (1895) p. 103; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 84 (*pr. sp.*); *R. Kuhleri v. hirsutus* Rogers *Journ. Bot.* (1892) p. 340. — *Exsicc.*: *Set of Brit. Rub.* n° 46. — Differt a *R. Babingtonii* Bell Salt. foliis grosse serratis, foliolis latioribus, terminali ovato, cordato, glandulis longioribus, floribus roseis. Sterilis vel parum fertilis.

BRITANNIA : Surrey, Puttenham (E. F. Linton), Colgate (White), etc... ?

OBS. — La var. *semiglaber* Rogers in *B. E. C. Rep.* (1895); *Handb.* p. 84 est peut-être d'origine différente ; je n'en ai pas vu de spécimens.

B. — (T. CXLVI) — ***R. insuetus*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 16 (1898), p. 140.

A *R. Babingtonii* Bell Salt. dignoscitur : *turione* glabrescenti, glandulis crebrioribus, *foliis* minute mucronato-serratis, foliolis terminalibus (7) elliptico-obovatis, basi integris ; *inflorescentia* minus hirsuta, aculeis curvatoribus (8), nonnullis geniculatis ; *petalis* staminibusque roseis. *Sepala* patula (9) ; *germina* pilosa. — *R. micanti* God. similis, sed parum discolor vel virescens.

GALLIA : in *Pyrenæis*, Cauterets, inter Gabas et Eaux-Chaudes ; BELGIA : Bas Oha (Aigret).

R. THYRSIFLORUS Wh. *ap. Bluff et Fing. Comp. Fl. Germ. I* p. 684 (1825) ; W. et N. *Rub. germ.* p. 83, t. XXXIV ; Focke *Syn.* p. 335 et *ap. Asch. et Gr. Syn. VI* p. 605 p. v. (*excl. syn.*) ; *R. rotundatus* Utsch *exsicc.*, non P.-J. Müll. ; *R. heterophyllum* Utsch *ap. Baenitz Hb. eur.* (*ex pte*), non Willd. ; *R. Mikanii f. robustior* G. Braun *exsicc.* n° 114.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8578, 9084, 9531.

Turio (1) procumbens, angulatus, faciebus planis vel leviter convexis, glaucescens, glaber vel parce pilosus, glandulis sparsis munitus ; *aculei* inaequales, majores mediocres, compressi, recti vel reclinati, minores aciculares ; *folia* 3-4-nata (2, 3), tenuia, supra pilis raris, subtus viridia, parce pilosa, inaequaliter et subsimpliciter serrata, dentibus grossis vel mediocribus, patulis ; *foliolum* terminale suborbiculare, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio quadruplo longius ; *petiolus* supra planus, aculeis reclinati falcatis munitus ; *stipulae* lineares, glandulosæ ; *ramus* angulatus, pilosus, aculeis pallidis, tenuibus, plerumque acicularibus, foliis 3-natis, subtus viridibus, parce pilosis, foliolis terminalibus late ovatis ; *inflorescentia* (4) oblonga, parum foliosa, densa, piloso-hirsuta, glandulis crebris, pallidis, diametro rachidæ fere æquivalentibus, aculeis debilibus (5), acicularibus, sparsis munita, pedunculis mediis 2-3-floris, patulo-ascendentibus ; *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, in flore reflexa, post anthesin patula (6) ; *petala* (7, 8) ovata, alba ; *stamina* alba stylis vix superantia ; *germina* glabra vel parce pilosa ; *receptaculum* pilosum. Pollen (9) parum admixtum. — Julius.

β. *MENTITIFORMIS* Sud. in *hb.* Müller. — Folia aequaliter et argute serrata ; foliolum caul. terminale cuspidatum ; inflorescentia laxa, pedicellis tenuibus, longissimis ; stamina stylos superantia.

γ. *PALLIDIPES* ; *R. pallidipes* Sud. *Rub. Pyr.* p. 175 (1901). — *Turio* epruinosus, subteres ; folia tenuiter serrata ; foliolum caul. terminale late ovatum, cordatum, acuminatum ; inflorescentia angusta, elongata, subaphylla, glandulis brevibus ; *sepala* erecta ; *germina* pilosa. — *R. tereticauli* P.-J. Müll. similis.

In locis umbrosis et nemoribus. — GERMANIA : Hannover, Guestphalia, Porta, Volmardingsen, Menninghuffen, Berg Kirchen ; Bavaria, Osterode, Freyung, Waging — GALLIA : Tarn, Paulin. — β. ALSATIA ? (Müller). — γ. GALLIA : in *Pyrenæis centr.*, Luchon, via silvestri Superbagnères.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Stamina stylos superantia.

A. — Folia subtus glabrescentia.

- a. — Folium caul. terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum
- b. — Folium caul. terminale angustum, ellipticum vel obovatum.....

B. — Folia subtus molliter pilosa.....

- R. thrysiflorus* Wh.
- R. CALIGINOSUS* Sud. C.
- R. LAMPROTRICHUS* Sud. c.

II. — Stamina stylis breviora.

A. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta ; turio epruinosus.....

- R. ECHINOCALYX* Erichs. b.

B. — Inflorescentiae rachis tomentosa, parce pilosa.

- a. — Turio angulatus, pruinosis.....
- b. — Turio teres, epruinosus.....

- R. CHLORANTHUS* Sabrs. B.
- R. PRIONATUS* Sud. Bb.

b. — (T. CXLVIII) — *R. echinocalyx* Erichsen *Ver. Nat. Ver. Hamburg* (1900), 3, VIII; *tr. à part* p. 27.

Differt a *R. thrysiflora* Wh. aculeis caulinis majoribus, crebrioribus (1) ; foliolo caul. terminali (2) breviter obovato vel obovato-orbiculare, abrupte acuminato, staminibus stylis brevioribus, sepalis erectis, aciculatis (5). Rachis (3) pilosa, aculeis crebris, curvatis ; petala (4) ovata. — Forma vergens in *R. Chenonii* Sud.

GERMANIA : Lauenburg, prope Hohenfelde, Trittan (Erichsen) ; GALLIA : Tarn, St-Amans, Lacabarè le ; BELGIA : Sartilman, Vyle (Aigret).

c. — (T. CXLVIII) — *R. lamprotrichus* Sud. *ap. Gandg. Nov. Conspl.* p. 151 (1905) ; *R. hirsulus* Rub. gall. *exsicc.* n° 179, non Wirtg.

Differt a *R. thrysiflora* Wh. turione (6) epruinoso, foliis 3-natis, subæqualiter serratis (7), subtus molliter pilosis, inflorescentia minus glandulosa. Sepala in fructu erecta ; petala (9) elliptica, alba ; *germina* glabra.

GERMANIA : Schleswig, Husum, inter Ostenfeld et Rot (Friderichsen et Gelert).

B. — (T. CXLVIII) — ***R. chloranthus*** Sabrs. *O. B. Z.* (1905) ; Sud. *Bat.* p. 47.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 148 !

Turio (10) angulatus, glaucescens, glaber ; folia (11) *R. thrysiflori* Wh. sed subtus pubescentia ; *inflorescentia* foliosa, laxe pilosa, glandulis brevibus (12) munita ; *petala* (14) parva, albo-viridia ; *stamina* (13) stylis pallidis breviora ; *germina* glabra.

β. *HETEROTRICHUS* ; *R. heterotrichus* = *Guentheri* × *mucronatus* Sabrs. *exsicc.* — *Turio* parce pilosus, serratura æqualis, glandulæ longioribus, styli carnei.

STYRIA ORIENTALIS : Grosswiltersdorf (Sabransky). — β. STYRIA : Kohlgraben (Sabransky).

b. — (T. CXLVIII) — *R. prionatus* Sud. *Rub. tarn.* p. 39 (1909) ; *R. hirsulus* f. *glabrescens* Progel *hb.*

Turio (15) subteres, pilis raris munitus ; folia (16) 3-5-nata, subtus parce pilosa, simpliciter serrata ; *foliolum* terminale suborbiculare vel late ovatum, emarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* pauciflora, parum pilosa, glandulis brevibus, aculeis (17) mediocribus munita ; *flores* albi ; *petala* (18) ovata, *stamina* alba stylis rubris breviora.

GALLIA : Tarn, Lacaune, Pont-de-la-Mouline, prope Murat ; BAVARIA : Wasinger See (Progel).

C. — (T. CXLVIII) — *R. caliginosus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1904) p. 24.Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 499 !

Gracilis; *turio* (19) angulatus, faciebus planis, epruinosus, glabrescens, glandulis crebris, aculeis mediocribus, majoribus compressis, rectis; *folia* (20) 3-5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia, inaequaliter serrata; *foliolum* terminale obovatum vel elliptico-obovatum, integrum vel vix emarginatum, longe acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *inflorescentia* parum foliosa, hirsuta (21), aculeis rarissimis, debilibus, pedunculus patulatis (22); *sepala* tomentosa, glandulis brevibus, in fructu patula vel imperfecte reflexa; *petala* angusta (23), alba ± vel roseola; *stamina* alba stylos virescentes vel basi roseos superantia; *germina* glabrescentia. — *R. Schleicheri* Wh. similis.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Collanges, Arlanc, Ambert, Dore-l'Eglise; etc.; *Cantal*, Massiac (Charbonnel); *Tarn*, Les Cammazes.

HYBRIDA

R. CALIGINOSUS × *ALBIFLORUS*; *R. CHASSAGNEI* Sud. — Differt a *R. caliginoso* aculeis majoribus, foliis superioribus discoloribus, inflorescentia multiflora, dense villosa, floribus sterilibus, petalis latioribus.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Rocard (Chassagne).OBS. — Le *R. lacteus* Holuby O. B. Z. XXV (1875), 312 pourrait peut-être prendre place ici; il m'est inconnu.

§5 — (T. CXLIX) — *R. PALLIDUS* Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 682 (1825); Wh. et N. *Rub. germ.* p. 75 t. XXIX; Focke *Syn.* p. 337 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 571; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 74; N. Boul. *ap. R.* et C. *Fl. Fr.* VI p. 93; Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 150; *R. obliquus* Wirtg. *Hb. rub. rh.*; *Flora B. Z.* (1859) p. 235; *R. cernuus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 130 (1859); *R. moravicus* Sabrs. O. B. Z. non Holuby (1887) p. 405.

Exsicc. — G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 56; *Assoc. rub.* n° 641, 951; *Rub. gall.* n° 33; *Set of Brit. Rub.* n° 67; Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. I n° 56 p. p., 98; ed. II n° 102; Sud. *Bat. eur.* n° 500.

Pallide viridis; *turio* (1) arcuato-procumbens, inferne teres, superne angulatus, faciebus planis, dense pilosus, glandulosus; *aculei* inaequalissimi, maiores leviter compressi, recti vel reclinati, minores aciculares; *folia* (2) plerumque 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, glabrescentia, grosse et simpliciter serrata, dentibus parum inaequalibus; *foliolum* terminale ovatum, basi latum, cordatum, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio fere triplo longius; *petiolus* supra planus, aculeis debilibus, reclinati; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* obsolete angulatus, pilosus, glandulosus, aculeis debilibus, plerumque acicularibus, majoribus reclinati; *folia* 3-nata, subtus viridia, grosse serrata, foliolis terminalibus late rhomboides vel ovatis; *inflorescentia* (3) laxa, inferne vel interdum usque ad apicem foliosa, piloso-hirsuta (4), tenuiter glandulosa, aculeis debilibus, pallidis, rectis reclinati; *pedunculi* medii elongati, patuli vel patulo-ascendentes, pluriflori; *sepala* tomentoso-viridia, laxe pilosa, glandulosa, aculeolata, lanceolata, in flore reflexa, in fructu patula (5); *petala* (6, 7) ovata, alba; *stamina* alba stylos vulgo purpurascens parum superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pubescens. Pollen parum admixtum (8). — Julius.

β. *DESEGLISEI*; *R. Deseglisei* Genev. *Ess. mon.* p. 130 (1869); *Mon.* p. 127; *R. Kœhleri* Bor. *Fl. Cent.* éd. 3 t. II, p. 195, non W. et N. — Folia subtus pilis ad nervos pectinatis; inflorescentia dense hirsuta, aculeis crebris, flavescentibus, ± falcatis; sepala tomentosa, hirsuta; stylis virescentes; germina pilosa.

γ. *CRISPULIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 39 (1909). — Turio parum pilosus; folia coriacea, inaequaliter serrata, marginibus crispata; inflorescentia angusta, densa, subaphylla, pedunculis brevibus; sepala erecta; petala obovata, dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

δ. *ADENODON* Sabrs. in *hb.* Sud. — Folia grosse serrata; foliolum caul. terminale basi latissimum, longe acuminatum; rachis brevissime pilosa, breviter glandulosa; *stamina* stylos pallidos æquantia.

ε. *PATULIPES* Sud. *Rub. tarn.* p. 39 (1909). — Turio glaucescens, obtusus, parce pilosus; folia mucronato-serrata; inflorescentia laxissima, subaphylla, pedunculis patulissimis; *stamina* alba stylos æquantia; *germina* glabra.

In nemoribus. — *GERMÂNIA*; *GALLIA*: Savoie, Conflans (Perrier); *BELGIA*; *DANIA*; *BRITANNIA*; *MORAVIA*; — β. *GALLIA*: Cher, Culan, rochers du bois de l'Arnon (Déséglise). — γ. *GALLIA*: Tarn, Montagne-Noire, à Sales. — δ. *STYRIA*: Sœchau (Sabransky). — ε. *GALLIA*: Tarn, Villefranche, Lacabarede.

OBS. — Le *R. cernuus* P.-J. Müll est identifié au *R. Kaltenbachii* Metzsch par M. Focke. Il ne me paraît pas possible de distinguer cette plante (spécimens authentiques d'Albersweiler, Alsace) du *R. pallidus* Wh.; elle est très différente de celle de Metzsch, qui a le turion glabrescent et des glandes rougeâtres beaucoup plus longues. — Le *R. bursonnensis* Genev. *Mon.* p. 110 (1880) (an Lef.?), m'est inconnu; d'après la description de Genevier il semble voisin du *R. pallidus* Wh. — Haute-Vienne, Treuil, près de Limoges, au bord du ruisseau (Lamy). — Lefèvre appliquait ce nom à une forme de Boursonne (*Valoie*) probablement différente de celle de Limoges.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia subtus glabrescentia vel parce pilosa.

- A. — Foliolum caul. terminale late ovatum vel suborbiculare, basi manifeste emarginatum.
 - a. — Foliolum caul. terminale ovatum, cordatum, acuminatum; serratura subsimplex.
 - 1. — *Stamina* stylos superantia vel iis æquilonga.....
 - 2. — *Stamina* stylis breviora.
 - a. — *Turionis* aculei validi; *germina* pilosa.....
 - b. — *Turionis* aculei debiles; *germina* fere glabra.....
 - b. — Foliolum caul. terminale suborbiculare; serratura inaequalis.....
- B. — Foliolum caul. terminale obovatum, ± emarginatum; *stamina* stylos superantia.
 - a. — Serratura tenuis, æqualis, simplex.....
 - b. — Folia grosse et inaequaliter serrata; *germina* pilosa.....
- C. — Foliolum caul. terminale rhombeum vel elliptico-rhombeum, basi integrum vel subemarginatum.
 - a. — *Stamina* stylos superantia; *inflorescentia* ± foliosa.....
 - b. — *Stamina* stylis breviora.....

II. — Folia subtus molliter piloso-velutina.

- A. — Foliolum caul. terminale emarginatum; serratura vulgo tenuis.
 - a. — Foliolum caulinum terminale ovatum; *stamina* stylos superantia.....
 - b. — Foliolum caul. terminale obovato-orbiculare; *stamina* stylis breviora.....
- B. — Foliolum caul. terminale basi integrum; *stamina* stylos superantia.....
- b. — (T. CL). — *R. microstachys* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 92 (1868) et exsicc. n° 73!; *R. hirsutus* v. *tenuiflorus* Progel. Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 73; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 166 (s. n. *R. helvetica*); Sud. *Bat. eur.* n° 501.

Turio (1) obtusangulus; *folia* subtus parce pilosa, simpliciter mucronato-serrata; *foliolum* caul. terminale (2)

R. pallidus Wh.*R. ERIOCaulon* Sud. c.
R. MICROSTACHYS N. Boul. b.
R. DRYMOPHILUS M. L. B.*R. CHLOROCaulon* Sud. c.
R. BLOXAMII Lees. D.*R. LŒHRI* Wirtg. E.
R. CURVISTYLUS Gremli Eb.*R. HIRSUTUS* Wirtg. F.
R. ACERATIDENS Sud. Fb.
R. ACIPHILLUS Sud. Fc.

suborbiculare vel obovato-orbiculare, acuminatum ; *inflorescentia* pauciflora, breviter pilosa (3), glandulis purpureis ; *sepala* inermia, laxe erecta ; *petala* (4) alba vel pallide rosea, ovata ; *stamina* alba stylis virescentibus multo breviora (5) ; *germina* glabra. Fertilis.

β . GRACILLIMUS ; *R. hirsutus* var. *gracillimus* Progel prius ; *R. epipsilus* \times *brachyandrus* ? ej. hb. — Folium caul. terminale ovatum ; *germina* pilosa.

GALLIA : Vosges, Saint-Dié, forêt du Cambert (N. Boulay) ; Saône-et-Loire, Torcy (Gillot) ; GERMANIA : Saxonia, Meissen (Hoffmann) ; Bavaria, Traunstein, Gallenbach (Progel). — β . Baravia, Waging, prope Traunstein (Progel).

c. — (T. CL) — *R. eriocaulon* Sud. *Rub. tann.* p. 39 (1909).

Diffr. a *R. pallido* : turione (6) pilosore, aculeis in petiolis ramisque crebrioribus, validioribus ; foliis (7) subtus pilosis ; staminibus (9) brevissimis. — Rachis pilosa, petala ovata, *germina* pilosa. Fertilis ?

GALLIA : Tarn, Lacapelle-Pinet. subter Lendrevié.

Semblable trouver place ici :

R. macrocalyx (Hal. Oest. bromb. p. 263 (1891) — A *R. pallido* distinguitur : foliolis terminalibus breviter ellipticis, emarginatis, acuminatis, staminibus stylis brevioribus ; sepalis erectis. — AUSTRIA, prope Gloggnitz (Richter). — Mihi novus est.

B. — (T. CL) — *R. drymophilus* M. et Lef. *Vers.* n° 159 (1859) ; *R. dasycaulon* Boul. et Luc. *Assoc. rub.* (1881) ; *R. adornatus* v. *dasycaulon* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 102 (1900) ; *R. fuscus* \times *serpens* N. Boul. l. c. p. 129, p. p.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 502 ; *Rub. rar.* n° 99 ; *Assoc. rub.* n° 433, 901 p. p. (*R. Læhri*), 1178 (*R. serpens*).

A *R. pallido* Wh. distinguitur : foliolis latioribus (12), caulinum terminali suborbiculari, cuspidato vel abrupte et breviter acuminato ; serratura grossa, inaequali ; inflorescentia (13) densiore, valde foliosa, pedunculis brevioribus, crassioribus, glandulossimis, glandulis longis ; sepalis (14) fructum laxe amplectentibus. *Flores* albi vel pallide rosei ; *stamina* alba stylis pallidos superantia ; *germina* vulgo glabra ; turio (11) validus, pilosus, aculeis crebris.

β . GRANDIFORMIS ; *R. grandiformis* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1905) p. 328. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9528. — Folia mediocriter et subaequaliter serrata ; inflorescentia subaphylla, pedunculis tenuibus. *R. thyrsifloro* Wh. similis.

γ . HISPIDIFLORENS Sud. *Rub. tann.* p. 39 (1909). — Folia utrinque pilosa, mediocriter serrata ; folium caul. terminale obovato-orbiculare, abrupte acuminatum ; inflorescentia dense hirsuta, aculeis crebris ; stamna stylos vix aequantia ; *germina* pilosa. *R. hirsuto* Wirtg. similis.

GALLIA : Valois, forêt de Retz, Lévignen (Lefèvre, Questier) ; Doubs, Pontarlier (Déséglise) ; Saône-et-Loire, Roussillon, à la Goutte (Lucand) ; BELGIA : forêt de Soignes (du Pré) ; bois d'Eprunes (Crépin), etc. — β . GALLIA : Tarn, Massaguel, forêt d'Hautaniboul ; Marne, bois de Mersy ; GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz) ; BELGIA : Woluwe-St-Lambert (du Pré). — γ . GALLIA : Tarn, Tanus.

c. — (T. CL) — *R. chlorocaulon* Sud. *Rub. Pyr.* p. 142 (1901).

Diffr. a *R. pallido* : turione (15) obtusangulo ; foliis (16) tenuiter et aequaliter micronato-serratis ; foliolis terminali obovato, abrupte acuminato, basi integro vel leviter emarginato ; inflorescentia (17) densiore ; sepalis tomentosis, subinermibus. — *Petala* (18) alba vel pallide roseola ; *stamina* alba stylis virides superantia ; *germina* pilosa.

β . TRICHOSTACHYS ; *R. trichostachys* Sud. *Diagn.* p. 39 (1906). — Foliola angustiora, caulinum terminale elliptico-obovatum, longe acuminatum ; pedunculi tenues, ascendentes ; sepala virescentia, inermia.

γ . DISSIDENS ; *R. dissidens* Sud. in *hb.* Müller. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 751 (*R. foliosus*). — Serratura subinæqualis ; inflorescentia breviter pilosa, multiflora, sœpe foliosa, laxa, glandulis brevibus munita ; sepala tomentosa, subinermia ; *germina* subglabra. *R. corymboso* P.-J. Müll. similis.

δ . FUSCIFORMIS ; *R. fusciformis* Sud. *Diagn.* p. 38 (1906) ; *R. holochlorus* Sud. in *hb.* Müller ! non Sabrs. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 503 ! — Validus ; aculei robusti ; folium caul. terminale obovatum, cuspidatum ; pedunculi aculeis sparsis muniti ; sepala parce aculeata, patula ; *germina* glabra.

GALLIA : In Pyrenæis centralibus, Luchon ; BELGIA : Remonchamp (du Pré), Modave (Wathelet), Sartilman (Aigret). — β . Valois, forêt de Retz (Questier). — γ . GALLIA : Sein-inf., Les Moulineaux (Letendre) ; ALSATIA (Müller) ; BELGIA, bois d'Eprunes (Crépin). — δ . GALLIA : Valois, forêt de Retz (Questier) ; GERMANIA : Alsacia (Müller) ; BELGIA : Rhionnes (du Pré), Louette-St-Pierre (Gravet).

HYBRIDÆ

R. CHLOROCAULON v. δ \times *ULMIFOLIUS* Sud. *Diagn.* p. 38 (1906) ; *R. LEVINIACUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 100 ! — Diffr. a var. δ . aculeis subæqualibus, glandulis raris, foliis discoloribus, sepalis reflexis. Sterilis.

GALLIA : Valois, bois de Lévignen (Questier).

R. CHLOROCAULON v. δ \times *SERPENS* Sud. l. c. p. 39 (1906) ; *R. SEMIFUSCIFORMIS* Sud. l. c. — Diffr. a var. δ . foliis 3-5-natis, subtus pilosis, inflorescentia brevi, glandulis longis munita. Parum fertilis.

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

D. — (T. CL) — *R. Bloxamii* Lees in Steele, 55 (1847) ; Bab. *Brit. Rub.* p. 169 ; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 72, (excl. syn.) ; non Genev. *Mon.* p. 188 ; *R. thyrsiflorus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 605, ex pte ; *R. propexus* K. Frider. *Bot. Tidssk.*, XVI, 236 (1887) ; *R. Menkei* III *propexus* Focke l. c. p. 558.

Exsicc. — Set of *Brit. Rub.* n° 20 ; *Assoc. rub.* n° 1177 (*R. foliosus*) ; Sud. *Bat. eur.* n° 144.

Turio (19) glaucescens, faciebus planis vel leviter excavatis, pilosus, aculeis validis armatus ; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, grosse et inæqualiter serrata, marginibus undulatis ; *foliolum* terminale (20) breviter obovatum, subemarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius ; *ramus* aculeis sat validis, dense pilosus, foliis 3-natis, subtus viridibus, grosse serratis, foliolis terminalibus obovatis ; *inflorescentia* foliosa, densa, hirsutissima (21), aculeis rectis, pedunculis brevibus ; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, parce aculeata, post anthesin patula (22) ; *petala* (23) alba vel dilute rosea ; *stamina* alba stylis virescentes vix aequantia ; *germina* pilosa. — *R. Menkei* Wh. affinis, sed foliis caul. 5-natis, turionibus angulatis, inflorescentiae aculeis minus validis diversus est.

BRITANNIA ; GALLIA BOREALIS : Seine-inf., Eure, Sarthe ; GERMANIA : Bavaria, Waging (Progel) ; Slesvig, Haltenau ; BELGIA : Waterloo (du Pré).

E. — (T. CL) — *R. Læhri* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 22 (1854) ; *Fl. Rheinpr.* 162 ; Focke *Syn.* p. 328 ; *R. insectifolius* L. et M. *Vers.* n° 115 (1859) ; *R. fuscus* v. *insectifolius* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 93 ; *R. thyrsiflorus* Gen. *Mon.* p. 108 p. p., non W. N. ; *R. ostrovensis* Spribille *Abh. Bot. Prov. Brandbg.* XXXIX p. 49 (1897) ; *R. pallidus* B *Læhri* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 572 (1902).

Exsicc. — Wirtg. l. c. n° 22, 97 ; *Assoc. rub.* n° 339, 642, 643 ; *Rub. gall.* n° 135 ; Sud. *Bat. eur.* n° 175 ; *Rub. rar.* n° 101 ; Set of *Brit. Rub.* n° 18.

Differt a *R. pallido* Wh. : foliis (2) grosse et inaequaliter serratis [interdum subincisis (*R. insectifolius* L. M.)], foliolis terminalibus late ellipticis vel rhombeis, basi leviter emarginatis vel integris, acuminatis; inflorescentia (3) elongata, pyramidalis, vulgo usque apicem foliosa, aculeis debilibus sparsis munita (4), pedunculis \pm ascendentibus. Turio (1) obtusangulus; sepala patula; petala dilute rosea, fere alba; stamina alba stylos saepe roseos vix superantia; germina glabra, raro pilosa [*R. foliolatus* var. *patulispinus* Kinscher *Repert.* VII (1909) p. 80].

β . FOLIOLATUS; *R. foliolatus* L. et M. *Vers.* n° 151 (1859). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 102!; *Bat. eur.* n° 171, 504. — Gracilior, flavescenti-viridis; aculei pallidi, debiliores; turio minus angulatus; folia caulina partim 3-4-nata, serratura minus inaequali; inflorescentia saepe brevior.

γ . ERUBESCENS; *R. erubescens* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 93 (1858), *ed.* II n° 32; *Hb. pl. sel.* n° 182; *in Flora* (1859), 234; Focke *Syn.* p. 313 et *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 585, *ex pte.* — Inflorescentia laxior, armatrix, pedunculis patulis; petala alba, ovata; stamina longa, alba, deinde cum stylis erubescentia.

δ . CHLORONEURUS; *R. chloroneurus* Sud. *Diagn.* p. 37 (1906). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 103! — Folia subtus leviter pilosa; ramus dense pilosus, aculeis rarissimis, tenuibus; inflorescentia dense hirsuta, conferta, subinermis; petala obovata; stamina stylos superantia.

ϵ . EMINENS; *R. eminens* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 63 (1867) et *exsicc.* n° 46!; *R. Menkei* \times *serpens* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 130, *ex pte.*; *R. Menkei* \times *podophyllum* N. Boul. *in hb.* Sud. — Folia ut in typo; inflorescentia laxa, hirsutior, subinermis, pedunculis patulis. Petala obovata, alba; stamina alba stylos pallidos superantia Fertilis.

ζ . CHLORONEUROIDES Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 215. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 505. — Habitus var. δ sed turio minus pilosus, stamina stylos vix superantia; germina pilosa.

GALLIA MEDIA ET BOREALIS, BELGIA, BRITANNIA MERIDIONALIS, GERMANIA BOREALIS ET OCCIDENTALIS. — β . GALLIA : *Valois*, *Pas-de-Calais*, *Cher*, *Saône-et-Loire*, etc.; BELGIA : *Namur*; BAVARIA, Waging (Progel); — γ . GERMANIA : Eifel, Hecken (Wirtgen), inter Dünnpfeifeld et Leimbach (Bodewig); GALLIA : *Ardennes*, le Chesne, aux Quatre-Champs (Callay); *Valois* (Questier); BELGIA : Huy, Barse (Charlet). — δ . GALLIA : *Valois*, *Craisne*, Cuvergnon (Questier). — ϵ . GALLIA : *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Cambre (N. Boulay). — ζ . BELGIA : *Namur*, Louette-St-Pierre (Gravet).

OBS. I. — Après avoir étudié de nombreux spécimens de *R. insectifolius* L. et M. récoltés en Belgique et dans le nord de la France, j'ai acquis la conviction que cette plante étaient inséparable du *R. Luehri* Wirtg. Le *R. insectifolius* a les sépales manifestement étaillés après l'anthesis et l'inflorescence peu armée; il doit donc être détaché du *R. fuscus* Wh., auquel il a été souvent subordonné.

OBS. II. — La forme suivante, qui m'est inconnue, semble se rattacher à cette sous-espèce :

R. Baeumleri Sabrs. O. B. Z. (1891). — Turio parum caulinatus, parce pilosus; folia 5-nata; foliolum terminale obovatum, abrupte acuminatum; inflorescentia angusta, longa, foliosa, parum armata; flores albi; sepala erecta. — HUNGARIA : Pressburg (Sabransky).

b . — (T. CLI) — *R. curvistylus* Gremli O. B. Z. XXI (1871) p. 125; Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 576.

Turio obtusangulus (5), pilosus, aculeis validis, parum inaequalibus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia, pilosa, grosse, inaequaliter et acute serrata; *foliolum* terminale (6) obovato-rhombeum, integrum, acuminatum; *foliola* ramealia terminalia obovato-cuneata, abrupte acuminata; *inflorescentia* subaphylla, tomentosa, breviter pilosa, glandulis brevibus (7). aculeis tenuibus, rarissimis; *petala* parva, angusta, alba vel dilute rosea; *stamina* brevissima; *styli* rosei; *germina* glabra.

β . CURVIPES; *R. curvipes* Sud. *Diagn.* p. 39 (1906). — Foliolum caul. terminale latius, leviter emarginatum; inflorescentia usque apicem foliosa, aculeis armata; glandulæ longiores crebrioresque.

γ . GLAUCESCENS Sud. *Rub. tarn.* p. 39 (1909). — Turio pruinosis; folia 3-nata; stamina stylos fere æquantia.

HELVETIA : Schaffhouse, Welchingen (Gremli). — β . GALLIA : *Valois*, Bourneville (Questier). — γ . *Tarn*, Mazamet.

OBS. — Le *R. stricticalyx* Gremli O. B. Z. (1871) p. 126 appartient probablement aussi au groupe du *R. pallidus* Wh. L'auteur ne parlant pas de la forme des folioles, il m'est impossible d'interpréter cette espèce dont je n'ai pas vu de spécimens.

F. — (T. CLI) — ***R. hirsutus*** Wirtg. *Prodri. Fl. Rheinl.* 413 (1841); Focke *Syn.* p. 297; *R. vestitus* v. *concolor* Auersw. *ap.* Wirtg. *Fl. Rheinl.* p. 158; *R. Menkei* C *hirsutus* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 557 (1902).

Exsicc. — Billot *Fl. gall. et germ.* n° 3603; Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 16, 83; *ed.* 2 n° 21.

Turio (8) dense pilosus, faciebus planis, aculeis parum inaequalibus; *folia* caul. 4-5-nata, supra pilis rarissimis, subtus viridia [interdum subcinerascens = *R. cinerascens* Wh. *ap.* Iej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* p. p. sec., P.-J. Müller (1869)], dense piloso-velutina, argute serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; *ramus* dense pilosus, aculeis subrectis; *inflorescentia* (11) basi foliosa, breviter hirsuta, glandulis fuscis, aculeis tenuibus, rectis, pedicellis brevibus; *sepala* tomentoso-viridia, breviter pilosa, glandulosa, inermia vel parum aculeata, patula; *petala* (12) alba vel pallide rosea; *stamina* stylos parum superantia; *germina* glabrescentia.

? β . PANNOUS; *R. pannosus* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 148 (1860); Focke *Syn.* p. 304; *R. Menkei* IV *pannosus* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 558 (1902); *R. onayensis* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) p. 77; *an R. pyramidalis* \times ? — Folia subtus pilis longis, ad nervos pectinatis; inflorescentia valde hirsuta, laxa, glandulis longis; petala pallide rosea. Parum fertilis.

γ . LANATELLUS; *R. lanatellus* Sud. *Diagn.* p. 36 (1906). — Folia subtus dense et longe pilosa; inflorescentia inermis, pedunculis valde patulis; sepala inermia.

δ . HITSUTICALYX; *R. hitsuticalyx* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 93 (1868) et *exsicc.* n° 74! — Turio obtusus, aculeis debilibus; foliolum caul. terminale late ovatum, cordatum, breviter acuminatum; inflorescentia magna, dense hirsuta, aculeis crebris; sepala hirsuta, glandulosa, aciculata; flores albi, staminibus longis. Pollinis gradus puritatis 9/10.

? ϵ . JOURDESIANUS. — Differt a typo: turione heteracanthiore, foliis grosse serratis, foliolis latioribus, caulino terminali suborbiculari, breviter acuminato, rachide pilosiore, staminibus stylos æquantibus.

ζ . MACRANTHELUS; *R. macranelus* Marsson *Fl. Neuvorpom.* p. 147 (1869); Focke *Syn.* VI p. 290; *R. Menkei* V *macranelus* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 558 (1902). — Turio teres; folia 3-5-nata; foliolum caul. terminale suborbicularare; cuspidatum; inflorescentia ampla, pedunculis longis, divaricatis; sepala hirsuta.

? VALDEPILOSUS; *R. valdepiilosus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* 2^e sér. (1903) p. (71) 78. — Aculei glandulæque purpurea; folia acute et duplicito-serrata, supera subtus pallida vel subcinerascens; inflorescentia densa, pedicellis brevibus; petala parva, alba; stamina stylos æquantia; germina glabra.

? PSEUDO-ERUBESCENS Sud. *Bat.* p. 58 (1906) et *exsicc.* n° 179!; *R. erubescens* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 585. *p. p.* non Wirtg. — Turio angulatus, heteracanthissimus; folia grosse et inaequaliter serrata; superiora subtus \pm cincerascentia; foliolum caul. terminale ovato-rhombeum, acuminatum; flores albi, staminibus longis; inflorescentia conferta.

GERMANIA : Coblenz (Wirtgen); BELGIA : Ensival (Halin); Bruxelles (du Pré). — β . GERMANIA : *Prov. rhénana*, Boppard (Wirtgen); HELVETIA : Si-Georges, près Lancy, à Genève (Schmidely). — γ . GALLIA : *Vosges* (Pierrat). — δ . *Vosges*, St-Dié (Boulay). — ϵ . GALLIA : *Eure*, Tillière-s.-Avre, Breux, bois de la Troudière (Jourdes). — ζ . GERMANIA : *Pomerania*, Forst, prope Wolgast (Marsson). — η . GALLIA : *Haute-Savoie*, Monts Voiron (Schmidely). — θ . BELGIA : Louette-St-Pierre (Gravet), Spa (Piré), Cruppe-Spa (du Pré).

b. — (T. CLI) — *R. aceratidens* Sud. in hb. Müller.

Turio (12) laxe pilosus, angulatus; *folia* 5-nata, minute serrata; *foliolum* terminale (13) obovato-orbiculare, emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* (14) flavescens, parum foliosa, pedunculis tenuibus, parce aculeatis; *sepala* hirsuta, patula vel erecta; *stamina* stylis breviora (15); *germina* pilosa.

GALLIA : in Pyrenæis centralibus : Montauban, prope Luchon (Timbal).

c. — (T. CLI) — *R. aciphyllus* Sud. *Diagn.* p. 10 (1906); *R. adornatus* v. *albiflorus* Utsch, exsicc.

Exsicc. — Sud. *Hb. rub. rar.* n° 41!

Differt a *R. hirsuto* Wirtg. foliis profunde et acute serratis; foliolo terminali (16) ovato vel late obovato-rhombeo, basi cuneato, integro. Inflorescentia dense hirsuta (17), conferta, parum armata; stamina stylos parum superantia (18).

β. GRANDITHYRSUS; *R. hirsutus* v. *grandithyrsus* Sud. *Bull. Ac. géogr. bot.* (1904) p. 152; *R. scaber* Cott. et Cast. *Guide Frib.* p. 78, non W. N. — *Folia* subtus cinerascentia; inflorescentia magna, laxa; *sepala* erecta.

GALLIA: *Valois*, d'Ivors à Châvres, Rond-Capitaine, Waligny (Questier); GERMANIA: Freudenberg (Utsch). — β. HELVETIA: de Villarimboud à Lentigny (Perroud); GALLIA: Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson (Billot); Ardennes, Mauteville (Aigret).

¶ 6 — (T. CLII) — *R. OBSCURUS* Kalt. *Fl. Aach. Beck.* p. 281 (1845); Focke *Syn.* p. 308 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 552, ex pte; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 74 (*R. fuscus* Sbsp.) non P.-J. Müll. (1858); *R. obscurus concinnus* Focke *Syn.* p. 309 (1877).

Exsicc. — *Set of Brit. Rub.* n° 125.

Turio (1) angulatus, faciebus planis, dense pilosus, glandulosus, scaber; *aculei* inæquales, maiores compressi, recti vel reclinati, minores papulæformes; *folia* 5-nata (2), supra glabrescentia, subtus viridia, pubescentia, inæqualiter, mediocriter vel grosse serrata; *foliolum* terminale late ellipticum, basi integrum vel leviter emarginatum, breviter acuminatum; *petiolus* aculeis falcatis munitus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer angulatus, dense hirsutus, glandulis crebris, aculeis tenuibus vel mediocribus, reclinatus vel leviter falcatis instructus; *folia* 3-nata, subtus viridia pilosaque; *inflorescentia* (3) pyramidalis, basi foliosa, glandulis crebris sub indumento dense piloso-hirsuto occultis, aculeis tenuibus, flavescensibus, rectis reclinatisve munita (4); *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori, pedicellis brevibus; *sepala* tomentoso-viridia, hirsuta, glandulosa, aculeata, ± acuminata, in fructu patula vel erecta (5); *petala* obovata (6), lata rosea; *stamina* rosea vel purpurea stylos parum superantia; *germina* pilosa; *receptaculum* hirsutum. — Julius.

β. PRÆLATUS Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — Exsicc. : Sud. *Bt. exr.* n° 593! — Serratura grossior, inæqualior; *foliolum* caul. terminale ovatum, cordatum; inflorescentia densa, foliosa, minus hirsuta; stamina pallida stylos roseos sequantia.

γ. CRUENTATUS; *R. cruentatus* P.-J. Müll. in *Pollich.* XVI p. 294 (1859); Focke *Syn.* p. 312; *R. insericatus* D. decorus Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 554 p. p. (non *R. decorus* P.-J. Müll.). — Exsicc. : Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 136; — *ed.* II n° 36; *Rub. gall.* n° 140; Sud. *Rub. rar.* n° 104. — *Turio* minus hirsutus; *folia* amplissima, subtus viridia; inflorescentia laxa, minus hirsuta, pedunculis elongatis, ± divaricatis.

δ. CRUENTATIFORMIS Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — *Foliolum* caul. terminale basi latum, cordatum; inflorescentia brevis, obtusa, pedunculis patulis, breviter pilosis; *sepala* tomentosa, inermia, glandulis sessilibus obsita; *petala*, stamina stylique rubra; *germina* glabra.

ε. JUCUNDIFLORUS Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — *Aculei* caulinis parum inæquales, recti; *folia* utrinque obscure viridia; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, leviter emarginatum, cuspidatum; *rachis* hirsuta, aculeis satis validis, rectis, armata; *petala* lata rosea; *stamina* basi rosea stylos basi roseos superantia; *germina* glabra. — *Habitus R. vestiti* Wh. sed petala obovata, *folia* grosse serrata, *sepala* patula.

ζ. ERYTHROSTEMON; *R. erythrostemon* Favrat *Bull. Soc. Vaud. Sc. nat.* XVII, 530 (1881); *R. insericatus* C erythrostemon Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 553 (1902). — *Folia* subtus pallida; *foliolum* caul. terminale obovatum; inflorescentia brevis, parum armata, aculeis flavescensibus; *germina* pilosa.

η. PARVUS Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — *Nanus*; *aculei* validi, crebri; *folia* 3-nata, subtus parum pilosa, parva; *foliolum* terminale anguste elliptico-obovatum, acuminatum; inflorescentia armata; *stamina* rubra stylos rubros sequantia.

θ. FULGENS; *R. fulgens* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* IV (1904) p. 95 (132); *R. Guentheri* × *vestitus* ej. l. c. — *Folia* supra pilosa, subtus molliter piloso-velutina, argute et acute serrata; *foliolum* terminale anguste ovatum, emarginatum, acuminatum; inflorescentiae glandulæ rubræ, longæ; *germina* glabra. — *Pubes R. insericati* P.-J. Müll.

In nemoribus et locis umbrosis. — BELGIA: Lamberton; GERMANIA: Prov. *rhenana*, *Guestphalia*, *Bavaria*, *Silesia*; BRITANNIA: *Hereford* (A. Ley), *N. Wiltz* (Bailey), *Wexford* (Marshall). — β. GALLIA: *Tarn*, *Tanus*, *Travanet*; *Valois*, *Ivors* (Questier); GERMANIA: Freudenberg (Utsch). — γ. GERMANIA: *Ems*, *Coblence* (Wirtgen); BELGIA: *Fosse*, à *Brune* (du Pré); GALLIA: *Maine-et-Loire*, *Angers* (Bouvet). — δ. GALLIA: *Tarn*, *Ligots*. — ε. GALLIA: *Tarn*, *La Guizardié*, prope *Tanus*; *Orne*, *Tourouvre* (Jourdes). — ζ. HELVETIA MERIDIONALI-OCCIDENT. (Favrat). — η. GALLIA: *Tarn*, *St-Amans*. — θ. GALLIA: *Haute-Savoie*, *Monts Voivrons* (Schmidely).

HYBRIDA

R. OBSCURUS v. β. × *BASALTICARUM* v. *surdifrons* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909); *R. PRÆLATIFORMIS* Sud l. c. — Differt a var. β. foliis leviter discoloribus, aculeis subæqualibus, glandulis brevibus, floribus albis, sterilibus.

GALLIA: *Tarn*, La Cabane, via *Tanus*.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Turio pilosus*.

A. — *Turio angulatus*, faciebus planis; *folia* caul. vulgo 5-nata; *Rubi* validi.

a. — Inflorescentiae rachis pilosa.

- 1. — *Stamina* stylos superantia; *folia* subtus pilosa.....
- 2. — *Stamina* stylis breviora; *folia* subtus glabrescentia.....

b. — Inflorescentiae rachis parce pilosa; *stamina* longa; inflorescentia foliosa.....

B. — *Turio teres* vel obtusus; *folia* caulinis plerumque 3-nata.

a. — *Folia* grosse et inæqualiter serrata.

- 1. — *Stamina* stylos superantia.
 - a. — *Foliolum* caul. term. late ovatum vel obovato-orbiculare.....
 - b. — *Foliolum* caul. term. latum, rhombeum; *folia* 3-nata; inflorescentia longa.....
 - c. — *Foliolum* caul. termin. angustum, rhombeum; *folia* 5-nata; inflorescentia brevis.....

R. obscurus Kalt.

R. opulentus M. et L. b.

R. aggregatus Kalt. B.

R. entomodontus Müll. C.

R. purpurascens Sud. Cb.

R. suavifolius Grf. (Cf. n° 87).

2. — *Stamina stylis breviora.*
 a. — *Folia subtus pubescentia*
 b. — *Folia subtus glabra*
 b. — *Folia mucronato-denticulata.*
 1. — *Stamina stylos superantia vel æquantia; rachis pilosa.*
 a. — *Turio ± pruinosis; rachis pilosa*
 b. — *Turio epruinosis; rachis dense hirsuta; pedunculi patuli*
 2. — *Stamina stylis breviora*
 II. — *Turio glaber, pruinosis; stamina longa.*

R. OBSCURIFORMIS Sud. *Ce.*
R. CALVIFRONS Sud. *Dd.*

R. ERRATICUS Sud. *D.*
R. SPRENGELIIFLORUS Sud. *Db.*
R. DELICATICAULIS Sud. *De.*

- A. — *Foliolum caul. terminale ovatum vel suborbiculare*
 B. — *Foliolum caul. terminale rhombum; serratura grossa*
 III. — *Turio glaber, epruinosis; stamina stylis breviora*

R. OBSCURISSIMUS Sud. *E.*
R. INCISIFOLIUS Sud. *Eb.*
R. NANIFORMIS Sud. *Eo.*

b. — (T. CLII) — *R. opulentus* M. et Lef. *Vers. n° 72* (1859).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 105 !

Diffrer a *R. obscurum* Kalt. foliolo caul. terminali suborbiculari (7), cordato, abrupte et breviter acuminato, petiolulo proprio duplo longiore; inflorescentia brevi, densa, multiflora, pedicellis brevibus; staminibus stylis vix æquantes (8). Petala lata, ovata, rosea; stamina rosea, styli rubri, germina pilosa.

β. *CALIGANS* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — Foliolum caul. terminale ovatum, cordatum, acuminatum; styli virescentes.

GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz, chemin de Virlet, à l'intersection de la laie du Poirier d'Oignon, près de Bourgfontaine (Lefèvre). — *Tarn*, Saint-Amans, via Banquet.

B. — (T. CLIII) — *R. aggregatus* Kalt. (*pr. sp.*) *Fl. Aach. Beck.* p. 275 (1845); *Wirtg. Fl. Rheinp.* p. 157; *Focke Syn.* p. 312; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 66.

Exsicc. — *Wirtg. Hb. rub. rh. ed.* I n° 91; *ed.* 2 n° 30.

A *R. obscurum* Kalt. dignoscitur: serratura tenuiore; foliolo caul. terminali (1) ampio, late ovato vel suborbiculari, leviter emarginato, abrupte et breviter acuminato; inflorescentia parce pilosa (2), glandulis fuscis, aculeis mediocribus munita, usque ad apicem foliosa, pedunculis ascendentibus, tomentosis. *Sepala* virescentia, albo-marginata, aculeata, glandulis brevibus, fructum amplectentia; *petala* (3) lâte rosea; *stamina* rosea stylis parum superantia; *germina* glabrescentia. Pollen parum admixtum. Sæpe leviter discolor.

β. *RUBELLIFLORUS*; *R. rubelliflorus* Lefèvre. *Assoc. rub. exsicc.* n° 184 (1875). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 106 ! — Folia obscure viridia, subtus glabrescentia; petala, stamina stylique rubra.

γ. *EXCAVATUS*; *R. excavatus* L. et M. *Vers. n° 71* (1859). — Foliolum caul. terminale suborbiculare, cordatum, vulgo cuspidatum; petala rosea; stamina rosea stylis roseos æquantia.

δ. *OBSCURIFRONS*; *R. obscurifrons* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 180; *ed.* 2 n° 100 (1862); *R. macrothyrsus* B. *obscurifrons* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 551 (1902). — Foliolum caul. terminale obovato-orbiculare, integrum, cuspidatum; inflorescentia valde foliosa, aculeis reclinatis falcatis munita. Inflorescentia *R. pallidum* E. Læhr revocata.

ε. *AMENIFLORENS*; *R. ameniflorens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 150 (1901). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 107 ! — Turio pruinosis, glabrescens; folia minute et æqualiter serrata; foliolum terminale obovato-orbiculare, integrum, longe cuspidatum; inflorescentia foliosa, glandulis pallidis munita; petala staminaque rubra, styli virides.

ζ. *GRATIANOPOLITANUS*; *R. gratianopolitanus* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 67 (1902). — Foliola lata pilosaque quam in *R. vestito*; inflorescentia foliosa, pedunculis patulis; stamina stylos æquantia.

GERMANIA : Burtscheid, prope Aachen (Wirtgen); BELGIA : chaussée de Vleurgat (Piré). — β. GALLIA : *Aisne*, forêt de Retz, au Chêne-l'Officier (Lefèvre), de Billemont à Bourgfontaine (Questier). — γ. GALLIA : *Oise*, forêt de Retz, à Ormoy-le-Davien (Lefèvre). — δ. GERMANIA : Bertrich (Wirtgen). — ε. GALLIA : St-Ange, prope Grenoble (Verlot).

C. — (T. CLIII) — *R. entomodontus* P.-J. Müll. *Ann. Fl. Fr. et All.* (1862).

Exsicc. — Billot *Fl. gall. et germ.* n° 2451 (s. n. *R. Schleicheri*) !; Sud. *Bat. eur.* n° 507 !

Turio teres vel obtusus, dense pilosus; *folia* 3-4-5-nata, subtus pallida, pubescentia, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* caul. terminale (4) late ovatum vel obovato-orbiculare, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *folia* ramealia superiora subtus subcinerascentia; *inflorescentia* ± foliosa, laxe pilosa (5), glandulis longis, fuscis, aculeis sparsis, tenuibus, rectis munita, pedicellis elongatis, tenuibus; *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, inermia, fructum laxe amplectentia; *flores* (6) lâte rosei; *stamina* stylos longiora; *germina* glabra. *R. fusco-atro* similis.

β. *MEDIOXIMUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — Foliola angustiora, rhombea; stamina rubra stylos rubros æquantia; *germina* pilosa.

γ. *OCCULTUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909); *R. scabripes* de Martr.-D. *Fl. Tarn.* p. 210, non Genev.; *R. adornatus* f. *cordata* F. Kretzer *ap. Baenitz Hb. eur.* n° 5003. — Folia 3-nata, grosse serrata, subtus viridia; foliolum terminale late ovatum; inflorescentia parva, pauciflora; sepala erecta; petala, stamina stylique rubra. Pollen fere purum. — Forma vergens in *R. fusco-atrum*.

δ. *DERASIDENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909). — Gracilis; folia 3-nata, mucronato-serrata; foliolum terminale orbiculare, cordatum, inflorescentia parum foliosa; stamina stylique lâte rosea.

GALLIA : *Oise*, bois de Thury (Questier). — β. *Tarn*, Burlats; *Eure*, Verneuil (Jourdes). — γ. *Tarn*, Burlats; *Nièvre*, Montsanche (Gillot); *Haute-Saône* (Madiot); *Haute-Garonne*, Arbas; GERMANIA: Braunschweig (Kretzer); *Prov. rhénana*, Cœln, Delbrück, Montjoie (Bodewig); *Bavaria*, Waging (Progel); HELVETIA : Zurich (Herz). — δ. GALLIA : *Tarn*, Sérénac.

β. — (T. CLIII) — *R. purpurascens* Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 508 !

A *R. entomodontus* differt: foliis grosse et profunde serratis, caulinis 3-natis; foliolo terminali (7) rhombeo, breviter petiolulato; inflorescentia magna, pyramidali, subaphylla, dense piloso-hirsuta, pedunculis (8) patulis, glandulis crebris, purpureis, longis munita. *Sepala* patula vel laxe reflexa; *petala* (9) lâte rosea; stamina rubra stylos roseos superantia; *germina* glabra.

GALLIA : *Tarn*, Marssal, valle Tarnis; Foncouverte (Charbonnel); *Haute-Saône*, Bougey (Madiot).

HYBRIDA

R. PURPURASCENS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 40 (1909); *R. GRANDIDENTATUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 509 ! — Parum heteracanthus glandulosusque; discolor. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Marssal.

c. — (T. CLIII) — *R. obscuriformis* Sud. *Fl. Toul.* p. 75 (1907).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 510 !

Diffr. a *R. entomodonto* P.-J. Müll. : serratura minus grossa, foliis subtus pubescentibus, aculeis ramealibus tenuibus, inflorescentia parva, densa, glandulis brevibus munita, staminibus stylis brevioribus.

θ. *PULCHRIFACTUS*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 511 ! — Gracillimus; turio dense pilosus; folia 3-nata, subtus ± cinerascentia; foliolum terminale ovato-rhombeum; inflorescentia brevis; stamina stylique rubra; germina parce pilosa.

γ. *ELEGANTISSIMUS*. — Gracillimus; turio pilosus; folia parva, acute serrata, subtus pubescentia; foliolum terminale anguste rhombeum, sensim acuminatum; stamina alba stylis rubris breviora; germina glabra.

GALLIA : *Tarn*, Vaour, Massuguiès; *Haute-Garonne*, bois de Fronton; *Haute-Saône*, Port d'Atelier (Madiot). — β. *Haute-Garonne*, bois d'Eaunes. — γ. *Haute-Garonne*, Arbas, au Plan de Gole.

HYBRIDA

R. OBSCURIFORMIS × TOMENTOSUS Lloydianus; *R. DEFECTUS* Sud. *Fl. Toul.* p. 75 (1907). — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 512 ! — Turio angulosus, glaber; folia discolora, flores albi, steriles.

GALLIA : *Haute-Garonne*, Bel-Souiel, bois de Fronton.

D. — (T. CLIII) — **R. erraticus** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* (1899) p. 91; *R. suboboranus* Sprib. in hb. Sud.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9927 (*R. atrovirens* non Müll.); *Assoc. rub.* n° 73, p. p., 649; Sud. *Bat. eur.* n° 513.

Turio teres vel obtusus, ± pruinosis, pilosus, glandulis brevibus; *folia* 3, raro 5-nata, minute et simpliciter mucronato-serriculata (10), subtus viridia pilosaque; *foliolum* terminale ovatum vel ellipticum, emarginatum, acuminatum; *folia* ramealia minute serriculata; *inflorescentia* brevis, laxe hirsuta, glandulis fuscis, aculeis raris (11) munita; *sepala* patula vel erecta; *petala* (12), stamina et vulgo stylis latae rosea; *stamina* longa; *germina* glabra. *Pollen* parum admixtum.

β. *BREVIDENTATUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909); *R. excavatus* Gen. *Mon.* 96, p. p., non Lef. et M. — Inflorescentia tomentosa, breviter pilosa, glandulis brevibus obsita; stylis virescentes.

δ. *DISCOLOR* Sud. l. c. 41. — Foliolum caul. terminale suborbiculare; folia superiora subdiscolora.

ε. *GENOSTACHYS* Sud. l. c. 41. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 514 ! — Planta rubro-vinosa; foliola terminalia obovata, cuspidata; inflorescentia inermis; sepala erecta; stamina stylique rubra.

ζ. *SCITUS*; *R. scitus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 65 (1900). — Foliolum caul. terminale oblongo-obovatum; folia inaequaliter serrata; rachis hirsuta; stamina alba, stylis rubri, sepala erecta.

η. *ANOPLOTHYRSUS*; *R. anoplothyrsus* Sud. *Ronc. bret.* p. 20 (1904). — Aculei tenues; folia inaequaliter serrata; inflorescentia subinermis, laxa, pilosa; sepala patula; stamina alba, stylis rosei. *R. tereticauli* P.-J. Müll. similis.

θ. *SUBOBSCURUS*. — Turio obtusangulus; folia caul. 5-nata, subtus glaucescentia; foliolum terminale suborbiculare, emarginatum, cuspidatum, inflorescentia et flores ut in typo; germina pilosa. *R. obscuro* Kalt. affinis.

GALLIA : *Tarn*, Ariège, Ardèche, Rhône, Valois, Seine-inf.; BRITANNIA: Herefordshire (A. Ley); BELGIA: Herbeumont; GERMANIA: Badenia, Silesia (Kinscher, Spribille). — β. GALLIA : *Tarn*, Puy-de-Dôme. — δ, ε. *Tarn*. — ζ. Ariège, Aulus. — η. Finistère, Huelgoat. — θ. *Tarn*, forêt de l'Aiguille près les Cammazes.

HYBRIDÆ

R. ERRATICUS × QUESTIERI calvifolius Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909); *R. HEBETIRAMUS* Sud. l. c. — Folia 5-nata, ampla; glandulæ sparsæ, flores pallidi.

GALLIA : *Tarn*, la Sarrade.

R. ERRATICUS × ARGENTEUS gneissogenes Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909); *R. VIAURENSIS* Sud. l. c. — Aculei validi, æquales; glandulæ raræ, folia subtus pubescentia; flores pallidi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Tanus, sous le viaduc du Viaur.

R. ERRATICUS ? × ALTERNIFLORUS v. Clavaudii; *R. MOTELAYI* Sud.; *R. gratiflorus* *Assoc. rub.* n° 72, non P.-J. Müll. — Aculei subæquales; folia 5-nata, discolora, minute serrata; glandulæ breves, flores rosei.

GALLIA : *Gironde*, Ste-Eulalie-d'Ambarès (Montelay).

R. ERRATICUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909); *R. ERYTHRÆUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 108 ! — Folia 5-nata, discolora; aculei subæquales, validi, glandulæ rarae. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Crespinet, Saint-Amans, Teulet, la Sarrade, Cambon, Valdériès; *Haute-Garonne*, Eaunes.

R. ERRATICUS × ?; R. ADJUNCTUS Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909). — Turio dense pilosus; folia 3-nata, subtus cinerascentia, minute dentata; aculei validi, flores rosei; sepala patula; sterilis.

GALLIA : *Tarn*, bois de Mézens.

b. — (T. CLIII) — *R. sprengeliiflorus* Sud. *Diagn.* p. 41 (1906); *R. Borreri* Questier in Billot exsicc., non Bel. Salt.

Exsicc. — *Fl. gall. et germ.* n° 1867 !; Sud. *Bat. eur.* n° 180 !

Diffr. a *R. erratico*: turione epruinoso, longe piloso; inflorescentia brevi, laxa, obtusa, dense villosa-hirsuta, glandulis pallidis, aculeis flavescentibus munita, pedunculis (13) superioribus longis, patulissimis; sepala erecta, germina pilosa, stamina stylis parum superantia. Habitus *R. Sprengelii* Wh. sed heteracanthus glandulosusque.

GALLIA : Aisne, forêt de Retz, carrefour de Château-Fée (Questier).

HYBRIDA

R. SPRENGELIIFLORUS × MACROPHYLLUS; *R. EFFUSUS* L. et M. *Vers.* n° 52 (1859). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 109 ! — Serratura tenuis, inflorescentia laxa, hirsuta ut in *R. sprengeliifloro*; folia ampla, 5-nata, sepala reflexa, flores pallide rosei ut in *R. macrophyllum*.

GALLIA : Aisne et Oise, forêt de Retz, Ivors, Rond-des-Dames (Lefèvre, Questier).

c. — (T. CLIII) — *R. delicaticaulis* Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1908); *R. erraticus* v. *brevistamineus* Sud. prius.

Diffr. a *R. erratico* foliolis terminalibus rhomboidibus, inflorescentia brevi, pauciflora, parce pilosa, staminibus stylis brevioribus.

β . *CHARTACEUS*; *R. erraticus* var. *chartaceus* Sud. l. c. p. 41. — Folia ampla, tenuia; foliolum terminale ovato-rhombeum; inflorescentia brevis, pauciflora, corymbosa; stamina alba, styli rubri, germina pilosa.

GALLIA : Tarn; Sarthe, Amné (Gentil); Puy-de-Dôme, Thiers (Arbost). — β . GALLIA : Tarn, Burlats.

HYBRIDA

R. DELICATICAULIS \times *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909); *R. SERUS* Sud. l. c. — Gracilis; folia 3-nata, discolora; flores lète rosei. Serotinus, sterilis.

GALLIA : Tarn, Foncouverte.

d. — (T. CLIII) — *R. calvifrons* Sud. *Rub. tarn.* p. 41 (1909).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 515 !

Gracilis; *turio* (14) parce pilosus, subteres, glandulis brevibus, aculeis parum inæqualibus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia et fere glabra, grosse, acute et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale obovatum vel rhombum (15), subintegrum, acuminatum; *inflorescentia* corymbosa, folia parum superans, parce pilosa, glandulis brevibus, aculeis raris (16); *sepala* viridia, acuminata, parce glandulosa, subinermia, fructum laxe amplectentia; *petala* rosea; *stamina* rubra, brevissima; *styli* virescentes, deinde rubra; *germina* glabra.

GALLIA : Tarn, Foncouverte.

E. — (T. CLIII) — *R. obscurissimus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI* p. 91 (1899); *R. fusco-ater* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 208, non W. et N.

Turio (17) obsolete angulatus, pruinosus, fere glaber, aculeis mediocribus, rectis reclinatisve; *folia* 3-5-nata, ampla, obscure viridia, supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia; *foliolum* terminale (18) late ovatum vel suborbiculare, cordatum, cuspidatum vel breviter acuminatum; serratura simplex, mediocris; *inflorescentia* ± foliosa (19), pilosa, glandulis fuscis, aculeis mediocribus munita; *sepala* patula; *petala* ovata (20), lète rosea; *stamina* rubra stylis vulgo rubros superantia; *germina* glabra. Pollen fere purum.

β . *PALLIDISTAMINEUS*; *R. guestphallicus* Progel non Focke. — Foliolum caul. terminale ovatum; *stamina* alba.

GALLIA : Tarn, Lacabarède, Tanus, St Martin-Laguépie, Escoussens, Grésigne, Montirat, etc.; GERMANIA: Prov. *rhenana*, Lenterdorf (Bodewig). — β . BAVARIA : Waging, prope Tengling (Progel); BELGIA : Sauheid, Angleur (Aigret).

HYBRIDÆ

R. OBSCURISSIMUS \times *TARNENSIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909); *R. RIPARIIFORMIS* Sud. l. c. — Aculei subæquales; glandulæ raræ, folia 5-nata, subtus viridia.

GALLIA : Tarn, Escoussens, scierie du Bernasoubre.

R. OBSCURISSIMUS \times *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909); *R. RUBRI-ATER* Sud. l. c. — Parum heteracanthus glandulosusque; discolor, rachis tomentosa, sterilis.

GALLIA : Tarn, Montirat, Escoussens.

R. OBSCURISSIMUS? \times *TOMENTOSUS* Lloydianus; *R. FLAVIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909). — *Turio* pilosus, angulosus; folia 3-5-nata, grosse serrata, subtus albo-tomentosa; ramus heteracanthus glandulosusque; flores albi, steriles.

GALLIA : Tarn, Cambon, valle Lézert.

b. — (T. CLIII) — *R. incisifolius* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909).

Folia grosse et subinciso-serrata, subtus manifeste pubescentia vel leviter cinerascentia; *foliolum* terminale rhombum, basi integrum; *inflorescentia* hirsuta, elongata; *petala* staminaque rosea, styli pallidi; *germina* pilosa.

GALLIA : Tarn, valle Lézert, prope Crespinet.

c. — (T. CLIII) — *R. naniformis* Sud.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 110 !

Gracilis; *turio* teres, epruinosus, glaber, sublævis, aculeis parvis; *folia* 3-nata, subsimpliciter serrata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale suborbiculare vel obovato-orbiculare, basi emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* parva, brevis, breviter pilosa, glandulis brevibus sparsis, aculeis tenuibus, raris instructa; *sepala* tomentosa, in fructu erecta; *petala* ovata, rosea; *stamina* alba vel roseola stylis pallidos vix æquantia; *germina* glabra. — Forma vergens in *R. hebecaulis*.

GALLIA : Haute-Garonne, Balma, bois d'Aufréri.

ST — (T. CLIV) — *R. MENKEI* Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ. I* p. 679 (1825); W. et N. *Rub. germ.* p. 66 t. XXII; Focke *Syn. p. 303*; Ueb. *R. Menkei u. verw. form.*; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 555, ex pte; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 102; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp. p. 151*; *R. distractus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 296; N. Boul. *Ronc. vosg. p. 72*; *R. tereticulus* Favrat p. p., Schmid., non Kalt.; *R. fraternus* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 34 (1870); *R. tereticaulis* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 91, non P.-J. Müll.; *R. hirtus* Sbsp. *Kaltenbachii* Rogers l. c. p. 88, sall. ex pte.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. 1* n° 147; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 53; Favrat *Rub. Helv.* n° 32; *Assoc. rub.* n° 32, 34, 35, 247, 287, 384, 391, 726, 760, 762; *Set of Brit. Rub.* n° 48, 103; Baenitz *Hb. eur.* n° 8556; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 17; *Rub. gall.* n° 42; Sud. *Bat. eur.* n° 516; *Rub. rar.* n° 111.

Turio (1) procumbens, inferne teres, superne angulatus, dense pilosus, scaber, glandulis crebris; *aculei* inæquallissimi, majores compressi, recti vel reclinati, minores aciculares vel papulæformæ; *folia* plerumque 3-nata (2), raro 4-5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, grosse et inæqualiter serrata, dentibus præcipuis patulis vel refractis; *foliolum* terminale obovatum, basi integrum vel subemarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum; *petiolus* pilosus, aculeis falcati munitus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer obtusangulus, dense pilosus, aculeis validis vel mediocribus, reclinati falcati-armed; *folia* 3-nata, grosse serrata, foliolis terminalibus obovatis; *inflorescentia* (3) ± foliosa, obtusa, piloso-hirsuta (4), glandulis crebris, aculeis numerosis, validis vel mediocribus munita, pedunculus superis valde patulæ, elongatis; *sepala* tomento-viridia, hirsuta, glandulosa aculeolataque, in flore reflexa, in fructu patula (5); *petala* (6) alba, ovata; *stamina* alba stylis virescentes vel pallide roseos superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. Pollen imperfectum (7). — Julius.

β . *LACROIXII* Sud. in *hb.* Müller; *R. Lacroixii* Delastre, inédit. — Foliola breviter obovato-cuneata; folia superiora cinerascentia; flores pallide rosei.

R. collivagus; *R. collivagus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 88 (1868) et *exsicc.* n° 681; *Assoc. rub.* n° 739, 740. — Foliolum caul. terminale subovatum; inflorescentia armatissima, densa.

In nemoribus et sepiibus. — *GALLIA BOREALI-ORIENTALIS, GERMANIA OCCIDENTALIS, HELVETIA, BRITANNIA, NORFOLK, SOMERSET, ETC.* — *β. GALLIA:* Vienne, Le Rond (de Lacroix). — *γ. Vosges, Saulxures-sur-Moselle, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat); Seine-inf., les Moulineaux (Letendre).*

OBS. — Le *R. longicaulis* Gremli O. B. Z. p. 126. n'est vraisemblablement qu'une variation du *R. Menkei* Wh. — M'est inconnu.

HYBRIDÆ

R. MENKEI × VESTITUS Su-l. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 151 (1905); *R. POLYACANTHUS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 87 (1868) et *exsicc.* n° 67; *R. vestitus × fuscus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 109, p. p.; *R. Menkei* C. *hirsutus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 557 ex pte, non Wirtgen. — Folia 3-nata, foliolis lati; aculei validi, recti; petala pallide rosea, styli rubri, sepala reflexa. Parum fertilis.

GALLIA: Vosges, Saulxures-s.-Moselle, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat).

R. MENKEI × CHABOISSEAU Sud. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 151 (1903); *R. BICOLOR* Müll. et Chab. in *Chaboisseau Et. Sp. g. Rub.* n° 14 (1861). — Differt a *R. Menkei* Wh. aculeis minus inaequalibus, serratura tenuiore, foliis subd iscoloribus, inflorescentia parum armata. Sterilis.

GALLIA: Vienne, la Gabidière, près de Montmorillon (Chaboisseau).

R. MENKEI × SERPENS Sud. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 151 (1905); *R. ARISTICALYX* P.-J. Müll. in N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 71 (1867) et *exsicc.* n° 511; *R. fuscus × hirtus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 129, p. p. — Turio foliaque ut in *R. Menkei*, sed inflorescentia glandulosa, pallida; sepala petalaque angusta, calyx erectus.

GALLIA: Vosges, Saulxures, au Rupt-de-Bâmont (Pierrat).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Foliolum caulinum terminale obovatum.

A. — Stamina stylos superantia.

- a. — Folia grosse et inaequaliter serrata; inflorescentiae rachis hirsuta.
 - 1. — Serratura mediocris; inflorescentia ± elongata; foliolum terminale obovatum.....
 - 2. — Serratura grossa; inflorescentia brevis; styli rosei.....

b. — Folia minute et subaequaliter serrata.

- 1. — Sepala reflexa; inflorescentiae rachis parum pilosa, glandulis brevibus.....

- 2. — Sepala ± erecta, inflorescentiae rachis hirsuta, glandulis longis.....

B. — Stamina stylis breviora vel vix æquilonga.

- a. — Inflorescentiae rachis breviter pilosa, parum armata.

- 1. — Germina dense pilosa.....

- 2. — Germina glabrescentia; stamina brevissima.....

- b. — Inflorescentiae rachis dense hirsuta; inflorescentia corymbosa; sepala erecta.....

II. — Foliolum caulin. terminale ovatum, basi emarginatum.

A. — Stamina stylos superantia, raro æquantia; rachis hirsuta.

- a. — Dentes mediocres; folia subtus parum pilosa.....
- b. — Dentes tenues; folia subtus molliter pilosa.....

B. — Stamina stylos æquantia; rachis parum pilosa, glandulis brevibus.....

III. — Foliolum caulin. terminale rhombicum; stamina longa.

A. — Petala magna; folia coriacea, supra pilosa; rachis hirsuta.....

B. — Petala parva; folia membranacea, supra fere glabra; rachis laxe pilosa.....

b. — (T. CLIV) — *R. multifidus* Boul. et Malbr. *Assoc. rub.* (1873); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 104; *Corb. Fl. Norm.* p. 208 (1894); *R. hirtus* Malbranche *exsicc.* non W. et K.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 36, 189, 386, 446, 908; *Rub. gall.* n° 180; *Ch. Magnier* n° 1145..

A *R. Menkei* Wh. dignoscitur: aculeis rectis, validioribus; foliis amplioribus, duplicato-inciso-serratis (8), foliolis terminalibus minus manifeste obovatis, acuminatis; inflorescentia brevi, corymbosa, hirsuta, pedunculis patulissimis. *Sepala* laxe erecta, styli violacei, *germina* glabrescentia.

GALLIA: Seine-inf., Rouen (Malbranche), forêts de l'Essart, de Rouvray, de Roumare, Moulineaux, Gd Quevilly (Letendre); Manche (Corbière); Sarthe, Traugé (Henry), forêt de Bercé (Gentil).

B. — (T. CLV) — *R. Henriquesii* G. Samp. in *Revista* (1903); *Rub. Port.* p. 63 (pr. sp.); Sud. *Bat.* p. 47; *R. trifoliatus* G. Samp. *Ann. Sc. Nat.* VIII, p. p.; R.... P. Cout. et Fic. in *Boll. Soc. Brot.* XVI.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 145!

Turio angulatus, pilis brevibus, aculeis parum inaequalibus, glandulis sparsis, brevibus instructus; *folia* 3-nata, mucronato-denticulata (1), subtus ± cinerascentia; *foliolum* terminale late obovatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* subaphylla, tomentosa, parce pilosa, glandulis fuscis (2), aculeis mediocribus munita, pedunculis patulis; *sepala* tomentosa, breviter glandulosa, post anthesin reflexa (3); *petala* alba vel dilute rosea, oblonga; *stamina* alba stylis virescentes parum superantia; *germina* glabra. — Serratura tenuis *R. mucronifero* revocat; sed turionibus asperis, foliis 3-natis, antheris glabris diversus est.

β. *CONCINNATUS*; *R. concinnatus* Boul. et Lucand *Assoc. rub.* n° 392 (1880); *R. Menkei* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 129, p. p. — Foliolum terminale angustum, oblongo-ellipticum, acuminatum; pedunculi ascendentes.

LUSITANIA; HISPANIA, Galicia (G. Sampaio); *GALLIA:* Saône-et-Loire, inter Gregaine et Semur-en-Briançonnais (Château); Sarthe, St-Rémy (Chenon), Crê-s.-Loir (Launay). — β. *Saône-et-Loire*, Marignane (Lucaud).

C. — (T. CLV) — *R. muricatus* Boul. et Gillot. *exsicc.* (1874); *R. Menkei* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 130, ex pte; *R. Menkei* v. *orthosepalus* Focke Ueber R. Menkei u. verw. Form.; *R. scaber* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 569, ex pte, non Wh.; *R. Guentheri* × *pilocarpus* Assoc. rub. n° 783; *R. twardavicus* Sprib. in hb. Sud.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9504, 9060 (s. n. *R. Menkei* f.); *Assoc. rub.* n° 114, 338, 440, 441, 650, 844; *Rub. gall.* n° 43; *Bat. eur.* n° 517.

Diffr. a *R. Menkei* Wh.: turionibus glaucescentibus, foliis mucronato-denticulatis, foliolis terminalibus (4) acuminatis, glandulis longioribus, crebrioribus in inflorescentia (5), sepalis (6) in fructu erectis. *Petala* angusta, alba vel pallide rosea, *germina* glabra.

β. *RUPIGENUS*; *R. rupigenus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 16 (1898). — *Turio* epruinosus, minus heteranthus; foliola breviora latioraque.