

γ. *LUCANDII*; *R. Lucandii* Boul. et Gillot *Rub. Gall. exsicc.* n° 80 (1896); *R. vestitus* × *serpens* vel *Menkei* Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 110. — *Turio heteracanthissimus* aculeis falcatis armatus; folia subtus pilosa, superiora ± cinerascentia; foliolum caul. terminale breviter obovato-rhombeum.

δ. *SERPENS*; *R. eminens* Assoc. rub. n° 722, non N. Boul. *Ronc. vosg.*; *R. Menkei* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 130, p. p. — *Turio pruinosissimus*, dense pilosus; folia superiora subtus cinereo-tomentosa; inflorescentia subinermis, glandulis tenuibus, crebris, pallidis obsita. *R. serpentem* revocat.

GALLIA: *Saône-et-Loire*, Autun, le Morvan (Gillot); *Haute-Savoie*, Les Voirons (Schmidely); GERMANIA: Braunschweig (F. Kretzer); SILESIA: Kosel (Spribile). — β. GALLIA: Cauterets; *Saône-et-Loire*, montagne du Bonnet-Vert (Gillot). — γ. GALLIA: *Saône-et-Loire*, Roussillon-eu-Morvan, vallée de la Canche (Gillot). — δ. GALLIA: *Saône-et-Loire*, Autun, à la Creuse-d'Aury (Gillot).

#### HYBRIDA

*R. MURICATUS* × *VESTITUS*; *R. SERRULATIFRONS* Sud.; *R. subcanus* Assoc. rub. n° 651, non P.-J. Müll. — Differt a *R. muricato* foliis minute denticulatis, foliolis orbicularibus, inflorescentia laxa, sepalis subreflexis.

GALLIA: *Saône-et-Loire*, Le Creusot (Quincy).

D. — (T. CLV) — **R. brachyadens** P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 37 (1866); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 103; *R. scaber* F. Gérard *exsicc.*, non Wh.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 29, 29<sup>bis</sup>; Assoc. rub. n° 244; Sud. *Bat. eur.* n° 518.

*Turio* parce pilosus, epruinosus; *folia* inæqualiter et duplicato-mucronato-serrata, subtus viridia, parum pilosa, caulinæ plerumque 3-nata; *foliolum* terminale obovatum (7) vel obovato-rhombeum, basi integrum vel emarginatum, acuminatum; *ramus* aculeis debilibus, foliis subtus viridibus; *inflorescentia* brevis, conica, fusca, subaphylla, laxe hirsuta (8), aculeis debilibus, pedunculis mediis longis, valde patulis, glandulis diametrum pedicelli vix æquantibus; *sepala* virescentia, laxe reflexa; *petala* oblonga, alba; *stamina* alba stylis roseos vix æquantia; *germina* pilosa.

β. *STICTOCALYX*; *R. stictocalyx* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 285; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 103. — Robustior; *turio* minus glandulosus; *folia* caul. 3-5-nata; *inflorescentia* ampla. *Fructus* imperfectus. — An *R. brachyadenes* × *corymbosus*?

GALLIA: *Vosges*, St-Dié, forêts du Camberg et de St-Gorgon (Boulay); Granges, Bruyères (Biau); Gérardmer (Müller); *Saône-Inf.*, Dieppéville, forêt de Roumare (Letendre); HELVETIA. — β. GALLIA: *Vosges*, Gérardmer (Müller), St-Dié (Boulay), Granges (F. Gérard).

#### HYBRIDA

*R. BRACHYADENES* × *SERPENS* Sud.; *R. GOSSYPIATUS* N. Boul. Assoc. rub. n° 40 (1873); *R. Menkei* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 130, ex pte. — *Turio* teres, dense pilosus; *rachis* hirsuta, glandulæ pallidæ; *stamina* stylis superantia.

GALLIA: *Vosges*, Saint-Dié (Boulay).

b. — (T. CLV) — *R. clivorum* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909).

Differt a *R. brachyadeni* P.-J. Müll.: foliis subtus pallidis, molliter pilosis, ± cinerascentibus; foliolis brevioribus, latioribus, caulinæ terminali (9) obovato-orbiculari, cuspidato; *sepalis* albo-tomentosis, erectis (10); *staminibus* stylis brevioribus; *germinibus* glabrescentibus. *Petala* late ovata (11).

GALLIA: *Tarn*, Crespinet, moulin de La Bastide.

#### HYBRIDA

*R. CLIVORUM* × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909); *R. PERARDUUS* Sud. l. c. — *Aculei* æquales; *glandulæ* breves, rarae; *folia* 5-nata, discolora; *flores* rosei. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Crespinet, cum *R. clivorum*.

c. — (T. CLV) — *R. glossophyllus* P.-J. Müll. *Bonpl.* 1861 (*nomen*).

Differt a *R. Menkei* Wh. *turione tereti*, foliis parum discoloribus, mucronato-dentatis; *foliolو* terminali (12) obovato-cuneato, cuspidato, *staminibus* stylis vix æquantibus. *Ramorum* aculei obliqui; *inflorescentia* laxa, hirsutissima (13); *petala* (14) ± albo-rosea; *sepala* erecta, hirsuta; *germina* glabra.

β. *PSEUDOMURICATUS*; *R. pseudomuricatus* Corb. 2<sup>e</sup> suppl. *Nouv. Fl. Norm.* (1898) p. 169; *R. vulneriflus* × *subcanus* N. Boul. *Rub. gall.* n° 128. — *Folia* tenuiora, *foliola* latiora, breviora, apice truncato-cuspidata.

GALLIA: *Manche*, Yvetot, près de Valognes, entre la Brique et le moulin du Planchon (Lebel). — β. *Manche*, à la limite de St-Cyr et de Montebourg (Corbière).

E. — (T. CLV) — **R. bregutiensis** A. Kerner in Focke *Abh. nat. Ver. Bremen* (1894) p. 152; *R. teretiusculus* (Kalt.) Focke *Syn.* p. 300, ex pte; *R. Menkei* B. *bregutiensis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 556 (1902); *R. humifusus* Cott. et Cast. *Guide Frib.* p. 70, non W. et N.

Differt a *R. Menkei* Wh.: *foliolо* caul. terminali (15) late ovato, cordato, breviter acuminato. — *Turio* subteres, dense pilosus; *folia* 3-nata, subtus viridia, mediocriter et subæqualiter serrata; *inflorescentia* brevis, obtusa, hirsuta, aculeis validis (16), glandulis fuscis, longis munita; *sepala* laxe reflexa; *petala* ovata; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* pilosa.

β. *SUBCYLINDRICUS*; *R. subcylindricus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 89 (1868) et *exsicc.* n° 69!; *R. fuscus* × *hirtus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 129, ex pte. — Exsicc.: Assoc. rub. n° 115, 248. — Dentes tenuiores; *foliolum* caul. terminale minus latum, vix emarginatum; *inflorescentia* longior, *sepala* patula.

γ. *TARDIFLORUS*; *R. tardiflorus* Focke ap. Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 29 (1870); *R. chlorostachys* × *rudis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 624. — Differt a *R. bregutiensi* Kern. serratura acutiore, inæqualiore, foliis subtus pilosioribus, *foliolis* sensim et longe acuminatis, *staminibus* stylos æquantibus.

δ. *DIMORPHUS*; *R. dimorphus* Gremli O. B. Z. (1871), p. 124. — *Turio* parum pilosus, aculeis conicis; *folia* profunde, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* caul. terminale ovatum, acutum; *inflorescentia* aculeis crebris, falcatis; *stamina* stylos roseos æquantia.

ε. *ERIOPHORUS*; *R. eriophorus* Sud. in hb. Müller. — *Turio* dense hirsutus; *folia* 3-5-nata, duplicato-serrata; *foliolum* terminale vix emarginatum; *rachis* dense hirsuta.

ζ. *PHYLLANTHUS*; *R. phyllanthus* Boul. et Méhu Assoc. rub. n° 188 (1875); *R. rudis* × *multifidus* N. Boul. — *Turio* parum pilosus; *folia* grosse serrata, subtus cinerascentia; *foliolum* caul. terminale late ovatum, cordatum, acuminatum; *stamina* longa.

AUSTRIA : *Tirolia*, Bregenz (Kerner) ; GERMANIA : forêt Noire (Focke) ; HELVETIA : *GALLIA* : *Puy-de-Dôme*, Arlanc ; *Sarthe*, bois de Pannetièvre (Gentil) ; *Saône-et-Loire*, Roussillon-en-Morvan (Gillot). — β. *GALLIA* : *Vosges*, Saulxures-sur-Moselle, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat). — γ et ε. *HELVETIA* : Schaffhouse (Gremlie). — ε. *GALLIA* : *Marnes*, Verzy (Levent). — ζ. *GALLIA* : *Rhône*, Chénas, montagne de Rémond (Méhu).

b. — (T. CLV). — *R. villifer* P.-J. Müll., in Boul. *Ronc. vosg.* p. 140 (1869).

Exsicc. — Boul. *Ronc. vosg.* n° 124 !

A. *R. bregutensi* dignoscitur : foliis subitus dense pilosis, pilis ad nervos pectinatis, argute serratis ; foliolo terminali (17) suborbiculari, emarginato, acuminato. *Sepala erecta*, *petala* alba, *stamina* stylos superantia ; *germina* glabra. Fertilis.

β. *HISPIDIFOLIUS* Sud. ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 151 (1905) ; *R. subceanus* var. *viridifolius* N. Boul. *Assoc. rub.* n° 31. — Parum heteracanthus ; folia mucronato-serrata ; foliolum terminale cuspidatum ; inflorescentia densa, hirsutissima.

*GALLIA* : *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay). — β. *Vosges*, Saulxures-sur-Moselle (Pierrat).

c. — (T. CLV) — *R. breviglandulosus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 17 (1864) ; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI, p. 105 ; *R. hirtus* v. *genuinus* Godr.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 45 !

*Turio* subangulatus, parum pilosus, glandulis brevibus munitus ; *folia* plerumque 3-nata, subitus viridia, pubescentia, satis æqualiter serrata ; *foliolum* terminale ovato-oblongum, leviter emarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* laxa, breviter et parce pilosa, glandulis brevibus, pedunculis patulis ; *sepala* laxe reflexa ; *petala* oblonga ; *stamina* stylos æquanta ; *germina* pubescentia.

β. *RHODIOPETALUS* ; *R. rhodiopetalus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 127 (1869) et exsicc. n° 111 ! — Foliolum terminale basi latius ; *petala* pallide rosea ; *stamina* alba stylis roseis breviora.

*GALLIA* : *Vosges*, Rambervillers, carrière de Métandall (Boulay) ; *Tarn*, Mazamet, Burlats. — β. *Vosges*, St-Dié, à St-Roch (Boulay).

OBS. — Le *R. myriadenophorus* Rip. ap. Genov. 1<sup>er</sup> suppl. (1871) p. 39 ; Mon. p. 109 m'est inconnu. Peut-être prendrait-il place ici ? — *Cher*, forêt d'Allogny (Ripart).

#### HYBRIDA

*R. BREVIGLANDULOSUS* × *HIRTUS* N. Roul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 130 ; *R. TENUATISPINUS* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 41 (1866) et exsicc. n° 32 ! — Differt a *R. breviglanduloso* aculeis tenuioribus, foliolis basi latioribus, glandulis longioribus. Parum fertilis.

*GALLIA* : *Vosges*, Rambervillers, forêt de St-Gorgon (Boulay).

F. — *R. euryptalus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 94 (1868).

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 75 !

*Turio* teres, dense pilosus ; *folia* 3-4-5-nata, utrinque pilosa, inæqualiter et acute serriculata ; *foliolum* terminale (19) rhombeum, basi integrum, acuminatum ; *inflorescentia* brevis, hirsuta, glandulis longis, aculeis validis instructa, pedunculis patulis ; *sepala* laxe reflexa ; *petala* (21) magna, ovata, alba ; *stamina* alba stylos parum virescentes superantia.

*GALLIA* : *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

G. — (T. CLV) — *R. suavifolius* Greml. *Bett. Fl. Schw.* 35 (1870) ; Focke *Syn.* p. 303 ; *Ueb.* R. Menkei p. 154 ; R. Menkei II *suavifolius* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 558 (1902).

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9043 (s. n. *R. firmuli*).

*Turio* obtusangulus, parce pilosus ; *folia* 3-5-nata, grosse et inæqualiter serrata, subitus molliter pilosa, saepe subcincinata ; *foliolum* terminale (22) rhombeum, angustum, basi integrum, acuminatum ; *inflorescentia* brevis (23), laxe hirsuta, aculeis validis armata ; *flores* (24) pallide rosei ; *sepala* patula vel laxe reflexa ; *stamina* stylos parum superantia ; *germina* glabra. — Species vergens in *R. obscurum* Kalt.

β. *DISSOCIATUS* ; *R. dissociatus* Boul. et Malbr. *Assoc. rub.* n° 29 (1873) ; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 103. — *Turio* angulatus ; *folia* supra glabra ; *inflorescentia* longa, multiflora, foliosa, aculeis crebris munita.

γ. *SCALARISTACHYS* ; *R. scalaristachys* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 329. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9545. — *Turio* subangulatus ; *folia* mucronato-denticulata, subitus glabrescentia ; *inflorescentia* aphylla, longa, pedunculis patulis, glandulis brevioribus.

δ. *ARGUTIFRONS* ; *R. argutifrons* Sud. *l. c.* p. 321. — Exsicc. : Baenitz *l. c.* n° 9039 (s. n. *R. dissecti*). — Dentes angulosi ; *folia* subitus parum pilosa, foliolis longe acuminatis ; *inflorescentia* aphylla, elongata, pallida, glandulis longis ; *petala* angusta, *sepala* patula.

HELVETIA : Schaffhouse (Gremlie) ; *GALLIA* : *Vienne*, Le Rond (de Lacroix) ; GERMANIA : *Badenia* (Goetz). — β. *GALLIA* : *Manche*, Sotteville, propre Rouen (Malbranche). — γ. et δ. GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz).

#### Subsectio D. — Rudes Sud.

##### Conspectus specierum

I. — *Turio angulatus*, vulgo epruinosus ; *folia* caulinata plerumque 5-nata.

A. — *Sepala* in fructu reflexa ; *turio* glaber vel glabrescens, epruinosus.....

*R. omalus* Sud. 88

B. — *Sepala* post anthesin patula vel fructum amplectentia.

*R. melanoxyton* M. et W. 89

a. — *Foliolum* caul. terminale basi cordatum.....

*R. rudis* W. N. 90

b. — *Foliolum* caul. terminale basi integrum ; *inflorescentia* brevis, diffusa.....

A. — *Flores* lète rosei.....

*R. vallisparus* Sud. 91

B. — *Flores* albi.....

*R. glaucellus* Sud. 92

BB — (T. CLVI) — *OMALUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 142 (1901) ; ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 151 ; *R. pilocarpus* Schmid. Cat. p. 151 p. p., non Grli ; *R. bifrons* × *bavaricus* et *vestitus* × *bavaricus* Utsch, p. p.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 519.

Validus ; *turio* (1) angulatus, faciebus planis, glaber vel pilis raris munitus, epruinosus, parce glandulosus, scaber ; *aculei* inæquales, majores compressi, recti vel reclinati, minores papulæformes ; *folia* 5-nata, supra fere glabra, subtus parce pilosa, viridia vel subcinerascentia, mediocriter et subsimpliciter serrata ; *foliolum* terminale (2) late ovatum, basi vulgo emarginatum, acuminatum, infima petiolulata ; *petiolus* supra planus, aculeis reclinatis falcatis munitus ;

*stipulae* lineares, glandulosae ; *ramus* florifer angulatus, parce pilosus, aculeis validis, reclinatis falcatisve armatus ; *folia* 3-nata, satis tenuiter serrata, subtus vulgo viridia, foliolis terminalibus ovatis ; *inflorescentia* ampla (3), rachide pubescenti, breviter et parce pilosa vel fere glabra, glandulis fuscis, inaequalibus, aculeis validis, rectis reclinatisve instructa (4) ; *pedunculi* medi patuli vel patulo-ascendentes, 2-3-flori ; *sepala* tomentoso-viridia, glandulis brevibus, aculeata, non vel parum appendiculata, in flore et fructu reflexa (5) ; *petala* (6) ovata, rosea ; *stamina* alba stylis virescentes superantia ; *germina* glabra ; *receptaculum* glabrum. *Pollen* parum admixtum (7). — Julius.

β. ALBIFLORUS Sud. l. c. p. 143 ; R. *kandirinensis* Spribille in hb. Sud. — Folia subtus viridia ; inflorescentiae aculei mediocres, pedunculi ± ascendentes, flores albi.

γ. UMBROSUS Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 520. — Folia subtus viridia, glabrescentia, tenuiter serrata ; inflorescentia laxa, parum armata, pedunculis patulis, multifloris ; flores rosei.

δ. SUPRAPILOSUS Sud. in hb. Müller. — Folia supra pilosa, argute et simpliciter serrata, supera subtus cinerascentia ; flores ?

ε. FLEXILIS ; R. *belophorus* Goetz in Baenitz Hb. eur. n° 9954 non M. et L. ; R. *alterniflorus* ej. non M. et L. — Gracilis ; folia inaequaliter serrata ; foliolum terminale anguste ovatum, ellipticum vel elliptico-obovatum, longe acuminatum ; inflorescentia pyramidalis, subaphylla ; flores rosei.

GALLIA : Tarn, Pyrénées centrales, Aisne, Oise, Orne, Sarthe, Vosges ; HELVETIA : BAVARIA : Traunstein (Progol), Freyung (Prechtelsbauer), Bischofsgrün (Semler). — β. GALLIA : Tarn, Pyrénées centrales, Sarthe ; SILESIA (Spribille) ; BAVARIA : Traunstein. — γ. GALLIA : Hautes-Pyrénées : Arreau, bois de Bédat ; Tarn. — δ. GALLIA : Pyrénées centr., Luchon. — ε. GERMANIA : Badenia (Goetz).

#### HYBRIDÆ

R. *OMALUS* × *CONSOBRINUS* Sud. Rub. *tarn.* p. 42 (1908) ; R. *PUSTULATIFORMIS* Sud. l. c. — Turio glandulæque R. *omali* ; folia R. *consobrini* ; rachis pilosa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Fabas, via Salmèges.

R. *OMALUS* v. γ. × *VALDEPROXIMUS* Sud. Rub. Pyr. p. 144 (1901) ; R. *AGNATUS* Sud. l. c. — Differt a R. *omalo* foliis subtus pilosis, cinerascentibus, rachide parce pilosa, floribus albis, sterilibus.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, bois de Bédat.

R. *OMALUS* v. γ. × *AMPLISTIPULUS* Sud. Rub. Pyr. p. 143 (1901) ; R. *BEDATICUS* Sud. l. c. — Turio obtusus, glandulis rarioribus ; foliolis terminalibus latis, cordatis. Sterilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, bois de Bédat.

R. *OMALUS* var. γ. × *SPARSUS* Sud. l. c. p. 144 (1901) ; R. *CONSANGUINEUS* Sud. l. c. — Differt a R. *omalo* turionibus pilosis, parce glandulosis, rachide hirsuta, staminibus stylis æquivalentibus.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Arreau, bois de Bédat.

R. *OMALUS* × *HEBECAULIS* Sud. Rub. *tarn.* p. 42 (1909) ; R. *PATULIRAMUS* Sud. l. c. — Differt a R. *omalo* : rachide pilosa, inflorescentia laxa, pedunculis patulis, floribus albis, sterilibus.

GALLIA : Tarn, Villeneuve, route d'Alban.

R. *OMALUS* × *FURVUS* Sud. Rub. Pyr. p. 144 (1901) ; R. *RUBICUNDIFLORUS* Sud. l. c. — Folia 3-nata, subtus viridia, glabrescentia ; flores late rosei. Sterilis.

GALLIA : Haute-Garonne, Luchon, cascade des Demoiselles.

OBS — Le suivant, dont je n'ai pas vu de spécimens, semble appartenir au R. *omalo*.

R. *graniticus* Sabrs. O. B Z. (1891). — Differt a R. *omalo* turione obtusangulo, foliolis breviter petiolulatis, caul. terminali petiolulo proprio triplo vel quadruplo-longiore, inflorescentia aphylla, pedunculis ascendentibus. Serratura ?, flores ? — HUNGARIA : Pressburg (Sabransky).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — Rubi validi ; folia caulina 3-nata ; turio angulatus.

A. — Stamina stylis superantia.

- a. — Aculei caulinis valde compressi ; inflorescentiae glandulæ breves.....
- b. — Aculei caulinis parum compressi ; inflorescentiae glandulæ longissimæ.....

R. *omalus* Sud.  
R. *SCHUMMELII* Wh. B.  
R. *CALLISTACHYS* Sud. b.

B. — Stamina stylis breviora.....

##### II. — Rubi graciles ; folia caul. plerumque 3-nata ; turio ± angulatus.

A. — Folia vulgo discolora ; flores rosei. raro albi.

- a. — Folia minute serrata.....
- b. — Folia grosse serrata.....

R. *SCITULUS* Sud. C.  
R. *THELYBATUS* Focke D.  
R. *RIGIDULIFORMIS* Sud. E.

B. — Flores albi ; folia subtus viridia.....

b. — (T. CLVII) — R. *callistachys* Sud. Rub. *tarn.* p. 43 (1909). — An R. *omalo* × *fagicola* ?

Differt a R. *omalo* foliolo caul. terminali (1) suborbiculari, emarginato ; aculeis caulinis petiolaribusque crebrioribus, inflorescentia elongata, pyramidali, multiflora, pedunculis patulis. Petala (2) orbicularia, alba vel dilute rosea ; stamina rubra stylis basi roseis breviora (3). Fertilis.

GALLIA : Tarn, Alban, via Villeneuve.

B. — (CLVII) — R. *Schummelii* Vh. in Wimm. et Grab. Fl. Sil. (1829) I p. 47, 56 ; Garcke Fl. v. Deutsch. 15 (1885), 125 ; Frider. Ueb. R. *Schummelii* (1896) ; Schube Fl. v. Schl. (1904) p. 208, non Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 465.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 9078, 9982 ; Sud. Bat. eur. n° 521, 522.

Differt a R. *omalo* : tenuioribus (4) aculeis subconicis, glandulis longioribus, foliis subtus pubescentibus, minute mucronato-serratis ; inflorescentia (6) pauciflora, folia parum superanti, glandulis longissimis, fuscis munita. Foliolum caul. terminale (5) ovatum vel suborbicularare, ± emarginatum, acuminatum ; petala dilute rosea (7), germina glabra, receptaculum pilosum.

GERMANIA : Silesia, Skarsine ! Gross-Strehlitz, Neisse (Spribille), Brehme (Kinscher). Verisimiliter in Polonia.

C. — (CLVII) — R. *scitulus* Sud. Rub. Pyr. p. 75 (1900) ; R. *insericatus* × *bifrons*, *divaricatus*, *denticulatus*, *decipiens* Goetz, exsicc.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 8550, 9535 (var.)

Turio obtusangulus vel teres, glaber, epruinosus ; folia (8) 3-4-5-nata, minute et æqualiter denticulata, superiora manifeste discolora ; foliolum terminale ellipticum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum ; inflorescentia

parum armata, ± foliosa (9), tomentosa; *sepala* reflexa; *petala* rosea; *stamina* rosea stylos rubros superantia; *germina* glabra. *Pollen* parum admixtum.

β. SUBTILIS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Folia subtus viridia; foliolum terminale obovatum.

γ. CREBRIGLANDULOSUS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Glandulosissimus, discolor; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa.

GALLIA: Ariège, Orlu; Hautes-Pyrénées, Lourdes (Henry); Tarn, Pampelonne: GERMANIA: Badenia, Siegelau (Goetz), Bavaria. — β. GALLIA: Tarn, Lacabarede, Labastide-Rouairoux; BAVARIA: Traunstein (Kaufmann). — γ. Tarn, Escoussens.

D. — (T. CLVII) — R. thelybatus Focke *Syn.* p. 279 (1877); R. Caflischii v. thelybatus Focke *ap.* Asch et Gr. *Syn.* VI p. 587 (1902); R. Gugleri Erdner *Mitt. Bayer. B. Ges.*; R. bavaricus × thelybatus, epipsilus × rufus ej. exsicc.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 523, 524, 525 (*R. Gugleri* !)

Gracilis; *turio* glaber (10), parum scaber, glandulis longis; *folia* plerumque 3-nata, supra glabra, subtus viridia vel leviter cinerascentia, grosse serrata; *foliolum* caulinum terminale (11) ovato-rhombeum, basi leviter emarginatum, acutum, petiolulo proprio duplo longius; *ramus* ut in *R. rudi* W. N.; *inflorescentia* (12) parva, laxa, pedunculis patulis; *petala* (13) alba vel rosea, *stamina* alba stylos superantia; *germina* pilosa, raro glabra.

β. PUMILUS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Folia discolora, supra pilosa; *petala*, *stamina* stylique rubra.

BAVARIA: München, Traunstein, Regensburg, Ettelzhausen, Neuburg, etc. — β. GALLIA: Tarn, le Pont de la Mouline, bords du Dourdou.

E. — (T. CLVII) — R. rigiduliformis Sud. *Rub. Pyr.* p. 145 (1901).

Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 526 !

Differt a *R. omalo*: turione minus angulato, glandulosiore, scabriore; foliis inæqualiter serratis, caulinis 3-natis, foliolis terminalibus (14) ellipticis; inflorescentia brevi, glandulosiore (15), armatiore. — *Petala* alba (16), oblonga; *stamina* alba stylos virescentes superantia. *Pollen* parum admixtum; *germina* parce pilosa. Virescens.

β. ALBANENSIS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Discolor; foliolum caul. terminale ovatum, cordatum; *stamina* stylos æquantes; habitus *R. scituli*.

γ. SCABIDUS; R. scabidus Sud. *Rub. Pyr.* p. 147 (1901). — Folia minuta et æqualiter serrata; foliolum terminale ovatum; inflorescentia aculei adunci; styli rubri.

GALLIA: Tarn: Alban, Crespinet; Hautes-Pyrénées, Barrancoueu. — GERMANIA: Bavaria, Holzkirchen (Zinsmeister). — β. Tarn, Alban. — γ. Hautes-Pyrénées, Guchen.

#### HYBRIDÆ

R. RIGIDULIFORMIS × ARGENTEUS multivagus; R. ASPERIPES Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Differt a *R. rigiduliformi* foliis discoloribus, rachide minus glandulosa, floribus roseis, sterilibus.

GALLIA: Tarn, Alban.

R. RIGIDULIFORMIS × TOMENTOSUS Lloydianus Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909); R. LUTEIPES Sud. l. c. — Differt a *R. rigiduliformi* foliis subtus albo-tomentosis, inflorescentia flavescens, bracteis latis ut in *R. tomentoso*. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Alban, via Paulin.

Σ9 — (T. CLVIII) — R. MELANOXYLON Müll. et Wirtg. *ap.* Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. I n° 181 (1861), ed. 2, n° 101; Focke *Syn.* p. 257 et *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 589; Genev. *Mon.* p. 147 p. p.; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 69; *ap.* Gandg. *Nov. Cons.* p. 152; Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 55; R. durus Holuby, non Sauvalle *Fl. Cuban.*; R. perdurus Hol. et Borb.; R. foliolum *Fl. cent.* ed. 3 n° 751, non W. et N.

Exsicc. — Wirtg. l. c. n° 181, 101; Baenitz *Hb. eur.* n° 9956 (s. n. *R. humorosi*, non Müll.); Sud. *Bat. eur.* n° 527.

*Turio* (1) angulatus, fusco-ater, faciebus planis, fere glaber, epruinosus, sparsim glandulosus, scaber; *aculei* inæquales, majores validi, compressi, recti vel reclinati, minores papulæformes; *folia* plerumque 5-nata (2, 3), supra parce pilosa, demum glabrescentia, subtus pilosa, viridia vel superiora cinerascentia, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, breviter et abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius, infima subsessilia; *petiolus* supra planus, parce pilosus glandulosusque aculeis falcatis; *stipulae* angustæ, glandulosæ; *ramus* florifer glabrescens, obsolete angulatus, aculeis validis, reclinatis falcatis armatus, foliis 3-natis, grosse serratis; *inflorescentia* (4) laxa, ± foliosa flexuosaque, pilis nullis vel rariss, glandulis purpureis, longis, inæqualibus, aculeis validis, crebris, rectis, reclinatis vel subfalcatis munita (5); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, elongati, pluriflori; *sepala* tomentosae, viridia, parum pilosa, glandulosa aculeataque, post anthesin patula (6); *petala* (7) ovata, lâte rosea; *stamina* stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. *Pollen* admixtum (8). — Julius.

β. GLABRESCENS Sud. *Bat. eur.* p. 28 (1904) et exsicc. n° 82! — Folia subtus glabrescentia; inflorescentia densa, minus foliosa; styli rosei.

γ. DISCOLOR Sud.; R. Bloxamii Genev. *Mon.* p. 138 ex pte, non Lees; R. aggregatus Baenitz *Hb. eur.* n° 8535, non Kalt. — Folia superiora manifeste discolora.

δ. OMALIFORMIS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909); R. largus Sabrs. exsicc. — Folia subtus viridia, pubescentia; aculei flavescentes; flores albi, stylis rubris; *germina* glabra.

ε. OPLOSTACHYS Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Turionis glandulæ rarae vel nullæ; foliola angustiora; inflorescentia aculeis crebris, validis, aduncis vel geniculatis armata; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes æquantia.

ζ. ALBICOMIFORMIS. — Gracilis; folia 3-4-5-nata, grosse et inæqualiter dentata, superiora discolora; foliolum caul. terminale anguste ovatum, longe acuminatum; inflorescentia foliosa, pedunculis subascendentibus; *petala* alba, *stamina* alba stylos pallidos æquantia; *germina* tomentosa. — Habitus *R. albicomii* Gr. sed *turio* glaber, rachis epilosa, *germina* tomentosa.

Ad sepes et silvarum margines. — GERMANIA: Prov. rhénana, Bertrich (Wirtgen); Guestphalia (Utsch), Badenia (Goetz); BAVARIA: Traunstein (Kaufmann); GALLIA: Valois, Morbihan, Puy-de-Dôme, Maine-et-Loire; HUNGARIA: BELGIA. — β. δ. ε. GALLIA: Tarn. — δ. ζ. STYRIA: Sœchau (Sabransky).

#### HYBRIDA

R. MELANOXYLON var. ε. × TIMENDUS ?; R. HAMIFER Sud. *Rub. tarn.* p. 43 (1909). — Folia 3-nata, subtus viridia, foliolis obovatis; rami aculei uncinati vel geniculati. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Assac.

OBS. — Le *R. reclinatus* Genev. 1<sup>re</sup> Suppl. p. 37 (1871); Mon p. 152 m'est inconnu; peut-être se placerait-il ici? — Cher, forêt d'Allogny.

## Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

## I. — Inflorescentia vulgo armatissima; stamna stylos superantia.

- A. — Folia caul. plerumque 5-nata; inflorescentia aculeis validis armata.
- a. — Folium caul. terminale ovatum; dentes grossi, inaequales.
    - 1. — Flores albi vel pallide rosei; turio angulatus.....
    - 2. — Flores (petala, stamna stylique) purpurei; turio subteres.....
  - b. — Folium caul. terminale orbiculare; serratura satis aequalis.....
- B. — Folia caul. plerumque 3-nata; inflorescentia parum armata.....
- Inflorescentia sepe parum armata; stamna stylis vulgo breviora vel sequilonga.
- A. — Stamna stylos aequalia; sepala patula vel subreflexa.
- a. — Folium caul. terminale ovatum; serratura mediocris.
    - 1. — Folium caul. term. basi latum; germina glabrescentia.....
    - 2. — Folium caul. term. rhombium; germina pilosa.....
  - b. — Folium caul. terminale orbiculare; serratura tenuis.
    - 1. — Flores albi; stamna stylos aequalia.....
    - 2. — Flores late rosei; stamna stylos leviter superantia.....
- B. — Stamna stylis breviora.
- a. — Discolor; turio pubescens.....
  - b. — Virescens; turio glaber, flores albi.....
- b. — (T. CLVIII) — *R. cyclophorus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 22.

Diffrer a *R. melanoxyloone* M. et W. foliolo caul. terminali (9) suborbiculari, cordato, cuspidato, petiolulo proprio subduplicem longiore; serratura aequaliore, minus grossa, subsimplici. Inflorescentia armatissima; flores albi vel pallide rosei; stamna alba stylos virescentes superantia; germina pubescens.

$\beta$ . *DERASIFORMIS*; *R. derasiformis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 334. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9942 (s. n. *R. derasi*, non L. et M.). — Gracilior; turio obtusus, pubescens; dentes acutissimi; folium caul. terminale abrupte acuminatum; inflorescentia aphylla; flores albi; germina glabrescentia.

$\gamma$ . *OBSCURATUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909). — Turio glaber; aculei pallidi; folia obscure viridia, supra pilosa, subtus cinerascentia; folium terminale orbiculare, cordatum, acutum; petala rosea; stamna dilute rosea stylos virescentes superantia; germina glabra.

$\delta$ . *CARDIOPHORUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909). — Turio glaber; folia acute serrata, superiora discolora; folium caul. terminale orbiculare, profunde cordatum, acuminatum; petala pallide rosea; stamna alba stylos basi roseos superantia; germina glabra; sepala fructum amplectentia.

$\epsilon$ . *LABASTIDENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909). — Folia ut in var.  $\delta$  sed tenuiora, subtus appresse albo-tomentosa, minute serrata; inflorescentia pyramidalis, multiflora, glandulosa brevibus munita; petala stamnaque rosea; styli virescentes; germina glabra. *R. Rœtensis* Waisbeck. similis.

GALLIA: *Puy-de-Dôme*, la Bourboule, à la Vernière; *Valois*, forêt de Retz (Questier). —  $\beta$ . *Tarn*, Burlats; GERMANIA: *Badenia*, Siegelau (Goetz). —  $\gamma$ .  $\delta$ .  $\epsilon$ . GALLIA: *Tarn*,  $\gamma$ . *Tanus*,  $\delta$ . *Las Planques*,  $\epsilon$ . Labastide-Rouairoux.

c. — (T. CLIX) — *R. rhodopsis* Sabrs. in *hb.* Sud.; *R. moravicus* var. *rhodopsis* Sabrs. in Hayek *sched. Fl. Styr. exsicc.* (1909); *Fl. Steierm.* I, 802.

Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 528!

*Turio obtusangulus* (1), parce pilosus, breviter glandulosus, aculeis crebris, reclinatis, pallidis armatus; *folia* 3-5-nata, ampla, subtus viridia et parce pilosa, acute et subaequaliter serrata; *folium terminale* (2) late ovatum, cordatum, longe acuminatum; *inflorescentia* breviter glandulosa (3), aculeis flavescentibus, crebris munita; *sepala* aculeatissima, fructum laxe amplectentia; *petala* ovata, purpurea; *stamna* purpurea stylo rubro superantia; *germina* glabra. — Diffrer a *R. melanoxyloone* M. et W. turionibus subteretibus, floribus late purpureis; *R. furvo* Sud. admodum similis a quo differt glandulis brevioribus, aculeis majoribus, parum inaequalibus.

$\beta$ . *EXORNANS*. — Turio glaber; folium terminale basi subintegrum, apice acutum; serratura parum profonda.

STYRIA OCCIDENTALIS, in silvis Rittschen, prope Fürstenfeld (Sabransky). —  $\beta$ . GERMANIA: *Prov. rhenana*, Lenterdorf (C. Bodewig).

B. — (T. CLIX) — *R. insolatus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 166; Focke *Syn.* p. 374; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 125; *R. hirtus* Godr. *Fl. Lorr. ed. 2*, I p. 236; J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 38.

Exsicc.: *Rub. gall.* n° 94; Sud. *Bat. eur.* n° 529!

A *R. melanoxyloone* dignoscitur: turionibus debilioribus, foliis aequaliter et satis tenuiter serratis, subtus viridibus, caulinis plerumque 3-natis (4); inflorescentia brevi, parum armata (5), pedunculus patulus. — *Petala* (6) alba; *stamna* alba stylos basi roseos superantia. Planta purpureo-fusca, fertilissima. Glandulosa brevibus, turionibus angulatis, sepalis subreflexis a *R. hirto* W. et K. facile distinguitur.

GALLIA: *Meurthe-et-Moselle*, Heillecourt, près de Nancy (Godron, Harmand); Pont-à-Mousson, bois de Montauville (Jordan); GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, lignes du Pigeonnier (Müller).

C. — (T. CLIX) — *R. exilis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 340; *Diagn.* p. 42; *R. hybridus*  $\times$  *fruticosus* O. Kuntze *exsicc.*!

Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 10360 (s. n. *R. excavuti*).

Gracilis; *turio* obtusangulus, glabrescens, epruinosus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia et parce pilosa, inaequaliter et subsimpliciter serrata; *folium terminale* (7) ovatum, leviter emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *inflorescentia* pauciflora, ± foliosa, parum armata; *sepala* (8) patula; *petala* (9) ovata, pallide rosea; *stamna* alba vel pallide rosea stylos breviora; *germina* glabrescentia.

$\beta$ . *RUBRATUS*; *R. rubratus* Müll. et Boul. *Assoc. rub. exsicc.* n° 341 (1879). — Folia simpliciter serrata; inflorescentia elongata, glandulosa purpureis munita; petala alba; stamna alba, styli rubri.

?  $\gamma$ . *BOULAYI*; *R. Boulayi* Lefèvre. *Assoc. rub. exsicc.* n° 245 (1877). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 112! — Folia aequaliter serrata; inflorescentia angusta, conferta, foliosa, inermis, pedunculus brevibus; stamna alba, stylos basi roseos superantia. Parum fertilis. — Hybrida?

GALLIA: *Tarn*, Mazamet, Aussillon, Anglés, etc.; GERMANIA: Bautzen (O. Kuntze); *Badenia*, Siegelau (Goetz). —  $\beta$ . GALLIA: *Vosges*, Rochesson (Pierrat). —  $\gamma$ . *Oise*, forêt de Retz (Lefèvre), Waligny (Questier).

*R. melanoxyloone* M. et W.  
*R. RHODOPSIS* Sabrs. c.  
*R. CYCLOPHORUS* Sud. b.  
*R. INSOLATUS* P.-J. Müll. b.

*R. EXILIS* Sud. c.  
*R. RIGIDULUS* Schmid. cb.  
*R. ALPINIVAGUS* Sud. d.  
*R. ARNETTINUS* Sud. db.  
*R. SUPERBUS* Sud. e.  
*R. AMPLUS* Fritsch. eb.

b. — (T. CLIX) — *R. rigidulus* Schmid. *Bull. Soc. Bot. Genève* 3. p. 79; *Cat. rais.* p. 175 (1888); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 97; *R. rigidus* Mercier, non Smith.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 907.

Diffr. a *R. exili* foliis mucronato-serratis, superioribus subtus cinerascentibus; foliolo caul. terminali (10) late rhombeo vel subobovato, vix emarginato. Petala alba, parva; stamina alba stylos vix æquantia; germina pilosa.

GALLIA : Ain, bois, sur St-Gix (Schmidely).

#### HYBRIDA

*R. RIGIDULUS × TOMENTOSUS Lloydianus*; *R. PSEUDO-RIGIDULUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 152 (1905). — Exsicc. *Assoc. rub.* n° 742, 743. — Diffr. a *R. rigidulus* Schmid. foliis ± discoloribus, grosse serratis, rachide pilosa, sepalis reflexis.

GALLIA : Ain, Divonne, sur St-Gix (Schmidely).

D. — (T. CLIX) — **R. alpinivagus**; *R. alpinus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 17 (1898) non Macf. (1837).

Validus; *turio* faciebus planis, glaber vel parce pilosus, epruinosus, glandulis crebris; *folia* 3-5-nata (1), supra obscure viridia et glabrescentia, subtus viridia et parum pilosa, argute et simpliciter serrata; *foliolum* caul. terminale suborbiculare vel obovato-orbiculare, emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* subaphylla, pauciflora, parum armata (12), dense glandulosa, pedunculis 1-2-floris, ascendentibus; *sepala* imperfecte reflexa; *petala* (13) ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes æquantia; *germina* glabra.

β. *FAUCIUM*; *R. faucioides* Sud. *Rub. Pyr.* p. 145 (1901). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 113! — Folia magna, 5-nata, coriacea discoloraque (s.-v. *discolor* Sud. l. c. 146) vel tenuia, subvirescentia (s.-v. *virescens* Sud. l. c. = *R. scaberrimus* Sud. l. c. p. 20 var. *latifolius*); *inflorescentia* ampla, laxa, multiflora, pedunculis longis, patulis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Cauterets, sur le Pégue ; Basses-Pyrénées, Gabas, poste des douaniers ; Tarn, Mazamet. — β. Basses-Pyrénées, Eaux-Chaudes, gorge calcaire du Hourat, Hautes-Pyrénées, Cauterets.

b. — (T. CLIX) — *R. arnettinus* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909). An *R. tarnensis* × ?...

Diffr. a *R. alpinivago*: turione glandulosiore; foliis 5-natis, leviter discoloribus, foliolis terminalibus orbicularibus (14), longe cuspidatis; *inflorescentia* parum glandulosa, inermi, multiflora, pedunculis tenuibus (15), ascendentibus, bracteis tenuibus, longis munitis; *sepalis* appendiculatis, patulis; *petalis* (16) staminibusque rubris. *Stamina* stylos virescentes superantia. Fertilis.

GALLIA : Tarn, Mazamet, vallée de l'Arnette, murs granitiques.

E — (T. CLIX) — **R. superbis** Sud. *Rub. Pyr.* p. 76 (1900); *Bat. p. 29*; *R. elongatus* Rip. exsicc., non Sm.; *R. breviramus* Rip. et Gen. *Mon. p. 103?*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 83; *Rub. rar.* n° 114!

*Turio* angulatus, glabrescens, subpruinosus; *folia* (17) 3-5-nata, ± discolora, subtus pubescentia; *foliolum* caul. terminalis ovatum, cordatum, acuminatum; *serratura* mediocris, satis æqualis; *inflorescentia* tomentosa, aculeis mediocribus rectis reclinatis; *sepala* erecta (18); *petala* alba vel rosea; *stamina* vulgo alba, stylis breviora. Fertilissimus. — Inter *R. ulmifolium* Schott et *R. hirtum* (Guentheri) quasi medius sed neutiquam hybridus.

β. *SINUOSIDENS*; *R. albicomus* Sabrs. O. B. Z. p. 8 (1905) non Gremli. — Serratura inæqualissima; *foliolum* terminale longe acuminatum.

GALLIA : Tarn, in regione montosa frequens; Pyrénées centrales. — β. *STYRIA*, Soechau (Sabransky).

#### HYBRIDÆ

*R. SUPERBUS × VILLICAULIS ornatus* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. BREVIPUBENS* Sud. l. c. — *Turio* pilosus; aculei subæquales, glandulæ raræ, folia minute serrata, petala angusta. Sterilis.

GALLIA : Tarn, forêt de Cambon.

*R. SUPERBUS × ARGENTEUS multivagus* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. SUPERBIIFORMIS* Sud. l. c. — *Turio* glaber; folia 3-5-nata, subtus pilosa; flores rosei, staminibus brevibus. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Mazamet.

*R. SUPERBUS × ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. PRAVUS* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 530. — Aculei æquales, glandulae raræ, breves; folia appresse tomentosa; flores late rosei. Sterilis.

GALLIA : Tarn, St-Martin-Laguépie, Cambon, Labastide-Rouairoux, Crespinet.

*R. SUPERBUS ? × BIFRONS* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. REFERTUS* Sud. — Habitus *R. bifronti* Vest, sed *inflorescentia* parce glandulosa, *sepala* patula; *petala* alba, *stamina* stylos æquantia.

GALLIA : Tarn, Labastide-Rouairoux.

*R. SUPERBUS × TOMENTOSUS Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. LUTEIPETALUS* Sud. l. c. — Glandulæ raræ; folia albo-tomentosa, grosse serrata; *inflorescentia* multiflora; flores albo-lutescentes, steriles.

GALLIA : Tarn, Crespinet, au bas du vallon du Lézert.

*R. SUPERBUS × HIRTUS* (grex) Sud. *Rub. tarn.* p. 44 (1909); *R. OXYCALYX* Sud. l. c. — *Turio* teres; folia 3-nata, subvirescentia; glandulæ longæ, purpureæ; *sepala* erecta.

GALLIA : Tarn, St-Martin-Laguépie, vers Pétras.

b. — (T. CLIX) — *R. amplius* Fritsch ap. Hal. *Oest. bromb.* p. 262 (1891); *R. rudis* B. *amplus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 561 (1902).

*Turio* glaber, epruinosus; *folia* subtus viridia, foliolis terminalibus ovatis, cordatis, acuminatis; *inflorescentia* brevis, laxa; *petala* alba, parva; *stamina* stylis breviora; *germina* pilosa; *sepala* erecta.

AUSTRIA, prope Gloggnitz et Graz; BAVARIA : Nürnberg (Kaufmann).

90 — (T. CLX) — **R. RUDIS** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 687 (1825); W. et N. *Rub. Germ.* p. 91 t. XL; Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 40; Godr. *Mon. Rub. Nancy* p. 24; *Fl. Lorr.* 2 éd. I p. 237; Focke *Syn.* p. 325 et ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 560 (excl. var.); Hal. *Oest. bromb.* p. 256; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 65; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 98; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 152; *R. rudiformis* Genev. *Mon. p. 100*; *R. Prechtelsbaueri* Utsch ap. Baenitz *ann. 1897* (pr. *R. Sprengelii* × *rudis*); *R. asper* Wh. *prius*!

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 20, ed. 2 n° 28; Billot *Flor. gall. et germ.* n° 2059; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 55, 136; Favrat *Rub. Helv.* n° 26; K. Frider. et Gel. *Rub. Dan.* n° 72; *Assoc. rub.* n° 185, 437, 646, 750, 1029, 1100; *Rub. gall.* n° 40, 41; *Set of Brit. Rub.* n° 16; Sud. *Bat. eur.* n° 38, 531, 482; Baenitz *Hb. eur.* n° 9557, 9569; *Herb. dendr.* n° 114.

*Turio* (1) arcuato-prostratus vel scandens, angulatus, faciebus planis vel leviter excavatis, epruinosus, fere glaber, scaberrimus, glandulis crebris, brevibus obsitus; *aculei* inaequales, majores compressi, recti vel reclinati, minores crebri, papulæ formes; *solia* 3-5-nata (2), supra nitida, glabra vel glabrescentia, subtus viridia vel interdum subcinerascentia, parum pilosa, grosse et inaequaliter duplicato-serrata, dentibus præcipuis angulosus; *foliolum* terminale ± late ovatum vel rhombeum, basi integrum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* glabrescens, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer angulatus, gracilis, foliis 3-natis, grosse serratis, subtus viridibus vel cinerascentibus; *inflorescentia* (3) brevis, obtusa, diffusa, aphylla vel inferne foliosa, pilis raris vel nullis, glandulis inaequalibus, fuscis, plerumque brevibus, aculeis mediocribus munita (4); *pedunculi* medii tenues, elongati, valde patuli, 2-4-flori, pedicellis elongatis; bractæ lanceolatae, inferæ trifidæ; *sepala* cinereo-tomentosa, breviter glandulosa, parce aculeata, angusta, acuminata, post anthesin patula, in fructu patula vel imperfecte reflexa (5); *petala* (6, 7) angusta, obovato-oblonga, pallide rosea; *stamina* alba styllos virescentes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* imperfectum (8). — Julius.

β. ARGUTIFOLIUS; *R. argutifolius* M. et Lef. *Vers.* n° 89 (1859); *R. ruditis* × *tereticaulis* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 130; *R. ruditis* Schmid. *exsicc.* — Folia anguste rhombea, longe acuminata; inflorescentia pallida, laxe pilosa, glandulis brevibus munita.

γ. MEGALADENES Sabrs. *O. B. Z.* (1905). — Folia acutissima, tenuiora; inflorescentiae glandulæ longæ; pedunculi leviter ascendentes; sepala laxe reflexa.

δ. INTEGELLUS; *R. integellus* Sud. *Diagn.* p. 41 (1906). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 115! — Folia caul. 5-nata, subtus viridia; foliolum terminale basi rotundatum; inflorescentia elongata, pyramidalis, foliosa, pedunculis leviter ascendentibus; receptaculum pilosum.

ε. HARMANDIANUS; *R. Harmadianus* Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Cons.* p. 152 (1905); *R. hirto-discolor* J. Harmand *Rub. M.-et-M.* p. 40 (1887); *R. insolatus* × *bifrons* N. Boul. *Rub. exsicc.* n° 149! — Folia ut in *R. rudi* sed subæqualiter serrata, pedunculi subascendentes, sepala laxe reflexa, receptaculum pilosum. Fertilissimum. — *R. omalo* Sud. similis.

In nemoribus montosis et sepiibus. — BRITANNIA, BELGIA, GERMANIA, HELVETIA, AUSTRIA, GALLIA media et boreali-orientalis. — β. GALLIA: Aisne et Oise, bois de Tillet (Lefèvre); Haute-Savoie, colline des Allinges (Schmidely); GERMANIA: Bavaria, Gutsberg. — γ. STYRIA: Sœchau (Sabransky). — δ. GALLIA: Valois, de Billemont à Bourgfontaine (Questier). — ε. GALLIA: Meurthe-et-Moselle, Heillecourt (J. Harmand).

OBS. — La var. *murinum* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 562, du duché de Bade, m'est inconnue.

#### HYBRIDÆ

*R. RUDIS* × *BIFRONS*; *R. RUDINUS* Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Cons.* p. 152 (1905); *R. saltuum* × *rudis?* Gremli *Beit.* p. 31; *R. saltuum* × *bifrons* Gremli! *Hb. norm.* n° 117. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 533. — Turio, glandulæ foliaque ut in *R. rudi* sed discolor, inflorescentia laxa, elongata, sepala reflexa. Sterilis.

HELVETIA: Schaffhouse (Gremli); BAVARIA, Neuburg-s.-Danube (Zinsmeister).

*R. RUDIS* × *CANDICANS*; *R. KUPCOKII* Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Cons.* p. 152 (1905); *R. polyanthus* Holuby non P.-J. Müll. — Glandulæ *R. rudem* revocant, folia *R. candidans* sed parum discolora; sepala reflexa.

HUNGARIA: Bakabanya, Pukanec (Kupcok).

*R. RUDIS* × *TOMENTOSUS* *Lloydianus*; *R. DECOLORANS* Sud. *Diagn.* p. 41 (1906); *R. tomentosus* × *rudis?* Schmid. *exsicc.* — Discolor; dentes lati, rachis laxe pilosa, parce glandulosa, sepala reflexa. Sterilis.

GERMANIA: Prov. *rhenana* (Wirtgen); GALLIA: Ain, Sergy (Schmidely).

*R. RUDIS* × *RADULA* Sud.; *R. Kolbei* Barber *Fl. Oberl.* III p. 80 (1911) (*R. Radula* Sbsp.) — Differt a *R. rudi* W. turione laxe piloso, foliis subtus ± cinerascentibus, pubescens, sepalis reflexis, fructu male evoluto.

GERMANIA: *Saxonia*, Czornebog prope Bautzen (Barber).

*R. RUDIS* × *GENEVIERI* Sud. *Diagn.* p. 41 (1906); *R. RUGATUS* Sud. l. c.; *R. teretiussulus* Progel, non Kalt. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 116! — Turio foliaque ut in *R. rudi* sed discolor; inflorescentia elongata, foliosa *R. Genevieri* revocat; sepala reflexa.

GALLIA: Valois, forêt de Retz (Questier); GERMANIA: Bavaria, Traunstein (Progel).

*R. RUDIS* × *MUTABILIS*; *R. MUTABILIFORMIS* Sud. *hb.* — Differt a *R. rudi* foliis leviter discoloribus, turionibus heteracanthioribus, glandulis longioribus. Sterilis.

GALLIA: Valois, forêt de Retz, laie d'Ormoy (Questier).

OBS. — M. Focke a signalé (*ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI) des hybrides de *R. rhamnifolius* et de *R. ruditis*, près de Minden, et des *R. vestitus* et *scaber* avec le *R. ruditis*.

#### Conspectus speciei, subspeciei et microgeneris

##### I. — Flores albi vel pallide rosei.

A. — Turio angulatus, glaber, validus.

- a. — Folia caulina plerumque 5-nata; inflorescentia diffusa.....
- b. — Folia caulina 3-nata, foliolis angustis; inflorescentia elongata.....

*R. ruditis* W. N.

*R. SCOPULORUM* Sud. b.

B. — Turio gracilis, obtusangulus, pube appressa; folia discolora.....

*R. LANCEIFOLIUS* Sud. c.

II. — Petala, stamna stylique lâte rosea; folia subtus viridia.....

*R. BLANDUS* Sud. B.

b. — (T. CLXI) — *R. scopulorum* Sud.; *R. omalus* var. *scopulorum* Sud. *Rub. tarn.* p. 42 (1909).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 117!

Differt a *R. rudi* W. N.: aculeis subæqualibus, turione sublævi; foliis caulinis 3-natis (1) foliolis angustissimis; inflorescentia elongata, angusta. *Foliolum* caul. terminale anguste elliptico-obovatum, basi integrum, acuminatum; *pedunculi* pauciflori, aculeis validis, rectis vel reclinati armati; *flores* albi; *germina* glabra; *sepala* in fructu patula (2).

GALLIA: Tarn, Mirandol, via La Calquière.

c. — (T. CLXI) — *R. lanceifolius* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 336; *R. podophyllus* f. *bifrons* Utsch.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9972.

Gracilis; *turio* obtusangulus, parce glandulosus, pube appressa obsitus; *solia* 3-4-5-nata, leviter discolora, minute et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale angustum, rhombeum vel sublanceolatum, leviter emarginatum, acuminatum, breviter petiolatum, *inflorescentia* aphylla, armata; *flores* (4) albi; *stamina* styllos paulum longiora; *sepala* patula (5).

GERMANIA: Badenia, Siegelau (Goetz).

B. — (T. CLXI) — *R. blandus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 146 (1901).

Differt a *R. rudi* W. N. turionibus parce pilosis; serratura æquale; foliolo (6) caulinus terminali subobovato, leviter emarginato; sepalis viridibus, albo-marginatis, fructum laxe amplectentibus (8); petalis (7), staminibus stylisque lâte roseis. Inflorescentia (9) brevis ut in *R. rudi*. *R. Lejeunei* Wh. similis.

GALLIA: In Pyrenæis centralibus, cascade des Demoiselles, propre Luchon; Tarn, Lacabarède, St-Martin-Laguépie.

❶ — (T. CLXII) — *R. VALLISPARSUS* Sud. *Diagn.* p. 42 (1906); *Bat.* p. 58; *R. scaber* f. *rubriflora* Progel; *R. denticulatus* var. *variegatus* Progel hb.; *R. lœvifactus* (P.-J. Müll.) f. *aculeis curvatis* Progel hb.; *R. melanoxyton* Richter exsicc.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 181.

*Turio* (1) obtusangulus vel teres, pruinosus, glaber vel parce pilosus, sparsim glandulosus, scaber; *aculei* inæqualis-simi, majores mediocres, compressi, recti vel reclinati, minores papulæformes; *folia* 3-4-5-nata (2, 3), supra parce pilosa, subtus viridia, glabrescentia, interdum subcinerascentia, dentibus mediocribus, inæqualibus, plerumque simplicibus; *foliolum* terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *petiolus* supra planus, glabrescens, aculeis reclinati falcative munitus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer obtusangulus, parce pilosus, aculeis falcatis, foliis subtus viridibus vel subcinerascentibus; *inflorescentia* (4) ± pyramidalis, ± foliosa, brevisime et parce pilosa, glandulis fuscis, aculeis validis vel mediocribus, rectis vel leviter arcuatis munita (5); *pedunculus* brevibus, munita, medi patuli vel patulo-ascendentes, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia vulgo ± aculeata, glandulis brevibus, munita, acuminata, patula (6) vel fructum laxe amplectentia; *petala* (7) ovata, lète rosea; *stamina* vulgo rosea styllos rubros superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* parum admixtum, fere purum (8). — Junius-julius.

β. *FLAVEOLUS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909). — Inflorescentia subinermis, pedunculis ascendentibus; *stamina* stylique pallida.

γ. *SPISSUS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909). — Folia 3-nata; foliolum terminale obovatum; inflorescentia conferta, brevis, corymbosa; *stamina* pallide rosea; *styli* rubri; *germina* glabra.

δ. *CAUDATUS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909). — Folia subtus pallida, pubescens-cinerascentia, foliolis angustis, longe acuminatis, terminalibus oblongis; inflorescentia subinermis; *petala* *stamina* stylique rubra.

ε. *SUBRUDIS* Sud. l. c. p. 45 (1909). — Folia discolora; foliolum terminale rhombeum; inflorescentia pyramidalis, foliosa, pedunculis patulis, aculeis validis sparsis. *R. rudi* Wh. et *R. Lejeunei* Wh. similis.

ζ. *INTEGERRIMUS* Sud. l. c. 45. — Foliolum terminale obovatum; inflorescentia armata, *stamina* alba, *sepala* erecta. Planta virescens *R. integro* ± similis.

η. *PSEUDO-LEJEUNI*; *R. pseudo-Lejeunei* Sud. *Rub. Pyr.* p. 87 (1900); *R. perambigens* × *clethrophilus* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 118! — *Turio* glaber; glandulæ purpureæ; foliolum caulinum terminale ovato-rhombeum vel obovatum; inflorescentia ± foliosa; *stamina* basi rosea stylos rubros parum superantia; *germina* glabra; *sepala* subreflexa.

θ. *PERAMBIGENS*; *R. perambigens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 87 (1900). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 119! — *Gracilis*; *turio* glaber; obovatum, basi integrum, *stamina* rosea, *styli* carnei; *germina* glabra.

In nemoribus montosis et sepiibus. — *GALLIA*: *Tarn*, Valence, Grésigne, Arifat, Hautaniboul, Labastide-Rouairoux, etc.; *Valois*, forêt de Retz (Questier); *AUSTRIA*: Klamm, propre Semmering (Richter); *BELGIA*: Louette-St-Pierre (Gravet); *GERMANY*; *Bavaria*: Waging Mart. — *Turio* teres, glabrescens, glaucescens; folia 3-nata; inflorescentia glandulosa; *petala* alba; *stamina* alba styllos rubros æquantia. — *Tarn*, la Sarrade; *Haute-Garonne*, Luchon. — γ. *Tarn*, Alban, Cambon. — δ. *Tarn*, St-Martin-Laguépie, au pont de Pétras. — ζ. *Tarn*, de Travanet à Arifat. — η. *Tarn*, Vabre, Sorèze; *Haute-Garonne*, Luchon. — ι. et θ. *Ariège*, Ax, fontaine de Ventouse.

#### HYBRIDÆ

*R. VALLISPARSUS* × *REPENTINUS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909); *R. PALLIDISPINUS* Sud. l. c. — Aculei subæquales; foliolum terminale latum, cordatum; inflorescentia brevis, diffusa, parce glandulosa.

*GALLIA*: *Tarn*, Valence, près de Cambors.

*R. VALLISPARSUS* var. γ × *MYRICÆ* v. *pergracilis* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909); *R. ERYTHROCLADOIDES* Sud. l. c. non Mart. — *Turio* teres, glabrescens, glaucescens; folia 3-nata; inflorescentia glandulosa; *petala* alba; *stamina* alba styllos rubros æquantia.

*GALLIA*: *Tarn*, au bas de la côte de Villeneuve.

*R. VALLISPARSUS* × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909); *R. VARIEGATUS* Sud. l. c. — Aculei subæquales; glandulæ brevæ, rarae; folia 5-nata, discolora; flores rosei, steriles.

*GALLIA*: *Tarn*, Vaour, la Sarrade, St-Martin-Laguépie, Burlats, Arthez.

*R. VALLISPARSUS* × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909); *R. PERDEFECTIVUS* Sud. l. c. — Differt a *R. vallisparso* foliis grosse serratis, discoloribus, rachide pilosa, floribus albis, sepalis reflexis. Sterilis.

*GALLIA*: *Tarn*, chemin de las Planques.

*R. VALLISPARSUS* var. ε × *HEBECAULIS* Sud. *Rub. tñrn.* p. 45 (1909); *R. CANENTIFOLIUS* Sud. l. c. — Differt a *R. vallisparso* var. ε foliis 3-natis, rachide pilosa, floribus pallidis.

*GALLIA*: *Tarn*, de Travanet à Arifat.

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — *Stamina* stylos superantia.

A. — *Turio* glaber vel parce pilosus; flores lète rosei.

a. — *Turio* subangulatus, glabrescens; folia caulina sspèce 5-nata.

1. — *Foliolum* caul. terminale ovatum vel raro obovatum, emarginatum; folia subtus glabrescentia.....

2. — *Foliolum* caul. term. obovatum; folia minute serrata, subtus pubescentia.....

b. — *Turio* teres, glaber; folia caul. 3-nata foliolo terminali lato.....

B. — *Turio* teres, appresse pilosus; *stamina* stylique pallida.....

##### II. — *Stamina* stylis breviora.

A. — *Foliolum* caul. terminale emarginatum; serratura vulgo tenuis.....

B. — *Foliolum* caul. terminale basi integrum; serratura inæqualis.....

b. — (T. CLXIII) — *R. separatus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 79 (1900).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 534!

*R. vallisparsum* Sud.  
*R. PERGRATIOSUS* Sud. c.  
*R. SEPARATUS* Sud. b.  
*R. GRANITOPHILUS* Sud. B.

*R. ALNICOLUS* Sud. C.  
*R. INTEGRUS* Sud. Cb.

Differt a *R. vallisparso* turionibus teretibus, glabris; foliis 3-natis (1), minute mucronato-serratis, foliolis terminalibus late ovatis, emarginatis, breviter acuminatis. Inflorescentia densa (2), *petala* ovata (3), rosea; *stamina* rubra styllos roseos superantia; *germina* glabra; *sepala* in fructu erecta.

*GALLIA*: Ariège, Reims, propre Foix; *Tarn*, Crespinet, St-Martin-Laguépie.

c. — (T. CLXIII) — *R. pergratiosus* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1905) p. 328.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 9530 (*R. gratiosus* non M. et Lef.).

*R. 3-5-nata* (4), minute serrulata,

*Turio* obsolete angulatus, pruinosus, glabrescens, glandulis purpureis munitus; folia 3-5-nata (4), minute serrulata, subtus viridia pubescentiaque; foliolum terminale obovatum, acuminatum; inflorescentia (5) glandulæ purpureæ, longæ, inæquaes; flores (6) lète rosei staminibus longis, sepalis patulis.

*GERMANIA*: Badenia, Siegelau (Goetz); *ITALIA*: Liguria (Cl. Bicknell).

B. — (T. CLXIII) — **R. granitophilus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 131 (1901).

*Turio* teres, appresse pilosus, pruinosus, pallidus, scaberrimus; *folia* (7) 3-5-nata, subtus pallide viridia vel cinerascentia *R. vallisparsum* revocant; *inflorescentia* (8) laxa, pallida, multiflora, foliosa, aculeis validis armata, pedunculis longis, sparsim pilosis; *sepala* imperfecte reflexa; *petala* rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa. *Pollen* parum admixtum.

GALLIA : in *Pyrenæis centralibus*, Luchon, val de Burbe; *Tarn*, Trébas.

C. — (T. CLXIII) — **R. alnicolus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 148 (1911).

*Turio* subteres (9), glaucescens, glabrescens, aculeis validis munitus; *folia* (10) plerumque 5-nata, minute serrata, subtus vulgo viridia, parce pilosa; *foliolum* caul. terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* (11) pyramidalis, laxa, ± foliosa, aculeis crebris, validis, reclinatis falcatis instructa, pedunculis tomentosis, breviter glandulosis; *calyx* patulus (12); *petala* pallide rosea; *stamina* alba vel rosea stylos roseos vix æquantia; *germina* pilosa.

β. *VIRIDISTYLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909). — Styli virescentes; *stamina* rosea, *sepala* erecta; *inflorescentia* valde foliosa.

γ. *NEUROPHYLLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909). — Folia caul. 3-nata, inæqualiter serrata; *inflorescentia* aphylla, parum armata; *stamina* rubra, brevissima; styli pallidi; *calyx* erectus.

δ. *LATIFOLIUS*; *R. gratifolius* var. *latifolius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 148 (1901). — Folia 3-nata, minute serrata; *foliolum* terminale late ovatum; *inflorescentia* aphylla, laxa, parum armata; *stamina* alba, styli rosei, *calyx* erectus.

ε. *NUBILOVIRENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909); *R. Bayeri* var. *glabriusculus* Schm. — *Turio* angulatus, aculeis debilibus munitus; serratura inæqualis; *inflorescentia* subinermis, valde foliosa, pedunculis ascendentibus; styli rubri. Planta obscure viridia.

GALLIA : In *Pyrenæis centralibus*, Luchon, val de Burbe, vallée de Louron, Bordères; *Tarn*, Anglés, Castres, Durfort, Peyrebrune. — β. *Tarn*, Teulet, St-Martin-Laguépie. — γ. *Tarn*, Mazamet, à Hautpoul. — δ. Haute-Garonne, Luchon; *Tarn*, de Montirat à la Garde-Viaur. — ε. *Tarn*, Arfons, Hautaniboul; *Jura*, St-Gix (Schmidely).

b. — (T. CLXIII) — *R. integer* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909).

*Turio* subteres, glabrescens; *folia* (13) 3-5-nata, inæqualiter serrata, subtus glabrescentia, viridia; *foliolum* caul. terminale rhombeum vel ellipticum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* angusta, armata, glandulic crebris, purpureis munita; *sepala* (14) laxe erecta; *petala* (15) rosea; *stamina* alba stylis breviora; *germina* glabra.

GALLIA : *Tarn*, Bellegarde, la Sarrade, Teulet, St-Martin-Laguépie.

92 — (T. CLXIV) — *R. GLAUCELLUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 22 (1898); ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 152; *R. lapicidarum* = *hirtus* × *lipopogon* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 220.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 535.

*Turio* (1,2) arcuato-prostratus, obsolete angulatus vel teres, pruinosus, fere glaber, glandulis brevibus, sparsis munitus; *aculei* inæquales, majores leviter compressi, recti vel reclinati, minores aciculares vel papulæformes; *folia* (3) plerumque 3-nata, flavescenti-viridia, utrinque sparsim pilosa, subtus viridia, minute mucronato-denticulata; *foliolum* terminale late ovatum vel obovato-orbiculare, basi subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolus* supra planus, glabrescens, aculeis reclinatis falcatis munitus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer obtusangulus, parce pilosus, pallidus, glandulis brevibus, aculeis debilibus, reclinatis falcatis instructus, foliis minute serriculatis, subtus viridibus; *inflorescentia* (4) oblonga, sœpe obtusa, parum foliosa, rachide (5) brevissime et parce serriculatis, subtus viridibus; *inflorescentia* (4) oblonga, sœpe obtusa, parum foliosa, rachide (5) brevissime et parce pilosa vel non, glandulis brevibus, pallidis, aculeis sparsis, tenuibus instructa; *pedunculi* medii patuli, pauciflori, pedicellis tenuibus, sœpe inermibus; *sepala* tomentoso-viridia, albo-marginata, glandulis brevissimis, inermia vel aculeolis sparsis munita, fructum amplectentia (6); *petala* (7) ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes vel dilute roseos superantia; *germina* glabra vel parce pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollen* parum admixtum (8). — Julius-augustus.

β. *INERMIS* Sud. l. c. p. 22. — *Inflorescentia* inermis, glandulis brevibus rarisque munita.

γ. *FALLAX* Sud. l. c. p. 150 (1901). — *Inflorescentia* subinermis; *sepala* subreflexa.

δ. *ROSELLUS* Sud. l. c. p. 150. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 120 ! — *Petala* pallide rosea.

ε. *ARMATUS* Sud. *Bull. Assoc. pyr.* n° 310 (1904). — *Aculei* longi, validi in turione, petiolis pedicellisque (9).

ζ. *CHLOROCALYX*; *R. chlorocalyx* Sud. *Rub. Pyr.* p. 79 (1900). — *Folia* subtus pubescentia; *inflorescentia* pyramidalis, *sepala* flavescentia, *germina* glabra.

η. *LONGIGLANDULOSUS*. — *Folia* caulina sœpe 5-nata, superiora subdiscolora; *inflorescentia* glandulæ longæ, crebræ.

In nemoribus montosis siliceis. — GALLIA : *Pyrénées*, *Tarn*; GERMANIA : *Badenia*; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok).

Obs. — Par certaines de ses variétés, le *R. glaucellus* se rapproche du *R. tereticaulis* P.-J. Müll., qui a les aiguillons plus fins, le turion moins glauque et un peu velu; par d'autres, il rappelle le *R. vallisparsum*, qui est plus robuste et a les fleurs d'un beau rose. Ses axes non poilus l'éloignent du *R. scaber* Wh., qui est placé dans les *R. glandulosi* P.-J. Müll.

#### HYBRIDÆ

*R. GLAUCELLUS* × *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn* p. 46 (1909); *R. SUBEDENTULUS* Sud. l. c. — *Turio* angulatus, pruinosus; aculei validi, crebri; *folia* 5-nata, mucronato-serrata; rachis pilosa, armata. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, St-Martin-Laguépie, vallée du Viaur.

*R. GLAUCELLUS* × *ULMIFOLIUS* Sud. l. c.; *R. FALSUS* Sud. l. c. 46 (1909). — Validus; aculei subæquales; glandulæ breves; *folia* 5-nata, discolora; flores rosei; *sepala* reflexa. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Mazamet, St-Martin-Laguépie.

*R. GLAUCELLUS* × *OMALUS*; *R. SEMIGLAUCELLUS* Sud. — *Habitus* *R. glaucelli* sed *inflorescentia* elongata, multiflora, *sepala* subreflexa, flores steriles.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Cadéac (Duffort).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — *Stamina* stylos superantia.

A. — *Folia* minute serriculata; *inflorescentia* glandulis pallidis munita, vulgo parum armata.

a. — *Turio* heteracanthissimus; *sepala* vulgo erecta.....

*R. glaucellus* Sud.

b. — *Turio* aculeis subæqualibus munitus; *sepala* subreflexa.....

*R. GLAUCISPINUS* Sud. b.

B. — *Folia* mediocriter serrata; *inflorescentia* vulgo armata, glandulis fuscis vel purpureis munita.

a. — *Foliolum* caul. terminale ovatum vel rhombeum; serratura inæqualis.....

*R. SCABERRIMUS* Sud. B.

b. — *Foliolum* caul. terminale obovatum; serratura tenuis, æqualis.....

*R. DISPECTUS* Sud. Bb.

II. — *Stamina stylis breviora.*

- A. — Inflorescentia parum glandulosa ; turio  $\pm$  angulatus; folia caul. 3-5-nata..... R. LUTEISTYLUS Sud. C.  
 B. — Inflorescentia glandulis crebris munita ; turio teres ; folia caul. 3-nata.  
   a. — Sepala ovata, cinereo-viridia; glandulæ purpureæ..... R. ACCESSIVUS Sud. Cb.  
   b. — Sepala angusta, viridia, albo-marginata; glandulæ pallidæ..... R. PRÆTEXTUS Sud. Cc.  
 b. — (T. CLXIV) — *R. glaucispinus* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909).

*Turio* (10) pruinosis, glaber, subeglandulosus : *aculei* subæquales, subconici ; *folia* 3-nata, mucronato-serrata, subitus cinerascentia ; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acutum ; *inflorescentiae* glandulæ breves ; *sepala* (11) laxe reflexa ; *flores* albi ; *germina* pilosa.

GALLIA : *Tarn*, Burlats, via fontanorum.

B. — (T. CLXV) — *R. scaberrimus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 19 (1898).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 121.

*Turio* obsolete angulatus vel teres, glaucescens, fere glaber, fuscus, saepe parum glandulosus, scaberrimus, aculeis rectis munitus ; *folia* 3-5-nata (1), utrinque viridia glabrescentiaque, mediocriter et subsimpliciter serrata ; *foliolum* terminale ovatum vel rhombeum, leviter emarginatum, acutum vel acuminatum ; *ramus* angulatus, glabrescens, *inflorescentia*  $\pm$  foliosa, aculeis vulgo crebris, rectis reclinatis, glandulis purpurascensibus, inæqualibus instructa (2) ; *sepala* aculeata, patula vel erecta ; *petala* alba, *stamina* alba stylos virescentes vel purpureos [*R. callistylus* Kinscher *Repert.* VII (1909) 80] superantia ; *germina* glabra.

β. OBLONGATUS Sud. l. c. p. 20. — Validus ; folia 5-nata, foliolis terminalibus oblongis.

γ. FALLACINUS Sud. l. c. ; *R. thelybatus* (Focke) var. *ciliatus* Kupk. *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 246. — Planta pallide viridia, foliolis terminalibus subobovatis ; *stamina* stylos subæquantia.

δ. PUBESCENS Sud. l. c. — Turio, ramus, foliaque pubescens.

ε. LAXATIFLORUS ; *R. laxatiflorus* Sud. l. c. p. 92 (1900) ; *R. laxiflorus* Sud. l. c. p. 23, non M. et L. ; *R. glaucculus* v. *laxus* Sud. l. c. p. 23. — Folia minute serrata ; inflorescentia ampla, multiflora, laxa, armata ; *sepala* laxe erecta ; *germina* pilosa.

ζ. SCABRICAUSTRALIS ; *R. scabricaulis* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 71 (1902) ; *R. apiculatus* Bor. *Fl. cent. ed.* 3, n° 754, non W. et N. ; *R. foliolatus* Goetz ap. Baenitz *Herb. eur.* n° 9045, non L. et M. — Aculei caulini leviter curvati ; folia 3-nata, foliolis sensim acuminatis ; *sepala* laxe reflexa.

η. SUBNIGER (Spribille *pr. sp.*) in hb. Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 536. — Folia 5-nata, inæqualiter serrata ; *foliolum* terminale cordato-ovatum, acuminatum ; *sepala* patula ; *germina* glabra ; fructus imperfectus.

θ. PERACUTIDENS ; *R. peracutidens* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 331 ; *R. quadraticus* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9565, non P.-J. Müll. ; *R. prionodontus* Goetz l. c. n° 9067, non M. L. — Folia subtus pubescentia, acute et duplicato-serrata ; *foliolum* terminale latum, longe acuminatum ; inflorescentia foliosa ; *sepala* laxe reflexa ; *germina* pilosa.

ι. RIGIDULATUS ; *R. rigidulatus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 319 ; *R. rigidatus* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 8570, non Greml. — Folia inæqualiter et grosse serrata, subtus  $\pm$  cinerascentia ; *foliolum* terminale latum, rhombeum, basi integrum ; inflorescentia conferta ; *flores* magni, staminibus longis.

κ. MICROTRICHUS ; *R. microtrichus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 239. — Turio leviter pubescens ; folia caul. 3-nata, subtus pubescentia ; inflorescentia rare aculeolata et glandulosa ; *sepala* erecta ; *germina* glabrescentia. Vergens ad *R. hebecaulis*.

GALLIA : Typus et var. β. δ. ε. Pyrénées, Tarn, Valois, Anjou. — γ. Pyrénées ; HUNGARIA : Bakabanya (S. Kupcok). — ζ. θ. ι. GERMANIA : Badenia (Goetz). — η. SILESIA (Spribille). — κ. HUNGARIA : Bakabanya, in colle Prielozok (Kupcok).

## HYBRIDÆ

*R. SCABERRIMUS*  $\times$  *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 20 (1898) ; *R. CELATUS* Sud. l. c. p. 213 (1901) ; *R. parviflorus* Sud. l. c. p. 20, non Nutt. — Gracilis, subeglandulosus,  $\pm$  discolor, floribus roseis, sterilibus.

GALLIA : in *Pyrenæis centralibus*, Cauterets, promenade des Lacets, sentier de la Raillièvre.

*R. SCABERRIMUS* var.  $\times$  *TOMENTOSUS* *Lloydianus* ; *R. LAITNENSIS* = *nemorosus*  $\times$  *tomentosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 265. — Habitat *R. scaberrimi* sed folia grosse serrata, subtus albo-tomentosa, flores steriles.

HUNGARIA : Bakabanya, in colle Lajtna retro Chladnam.

*R. SCABERRIMUS*  $\times$  *ERRATICUS* v. *scitus* ; *R. LAXUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 75 (1900). — Turio parce pilosus, inflorescentia laxissima, flores rosei, steriles.

GALLIA : Ariège, Aulus, via Saleix.

*R. SCABERRIMUS*  $\times$  *OMALUS* ? ; *R. fuscovirens* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909). — Validus ; turio glaucescens ; glandulæ crebræ, breves ; *sepala* reflexa ; *petala* alba, *stamina* alba stylos rubros superantia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Lacabarède, à Campan.

β. — (T. CLXV) — *R. dispectus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 21 (1898) ; Ronc. bret. p. 19 ; *R. melanoxyton* Progel p.p., non M. et Wirtg.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 122.

Differet a *R. scaberrimo* foliis minute mucronato-serratis, foliolis terminalibus (3) obovatis, basi fere integris, abrupte acuminatis. Turio subangulatus, parce pilosus, inflorescentia (4) parum armata ; *sepala* patula vel laxe reflexa ; *petala* late ovata (5).

β. NORMANDICUS ; *R. scaber* v. *subcanus* (non P.-J. Müll.) Corb. *Fl. Norm.* p. 208. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 905 ; Ch. Magnier *Fl. sel.* n° 2452. — Inflorescentia brevis, densa, corymbosa ; *sepala* in fructu erecta.

γ. CORIACEIFOLIUS ; *R. coriaceifolius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 22 (1898). — Turio teres, pruinosisimus ; folia coriacea, minute mucronato-serrulata ; *foliolum* terminale oblongo-obovatum ; *stamina* stylos æquantia ; *sepala* laxe reflexa.

δ. ARVERNENSIS ; *R. arvernensis* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* LI (1904) p. 22 ; *R. longipes* *Assoc. rub.* n° 654, non N. Boul. Ronc. vosg. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 123 ! — Turio pruinosis ; folia 3-5-nata, minute serrata, subtus glabrescentia ; *foliolum* terminale obovato-rhombeum vel ellipticum, emarginatum, acuminatum ; inflorescentia magna, laxa, foliosa ; *stamina* longa ; *germina* pilosa ; *sepala* patula.

GALLIA : Pyrénées, Tarn, Gers, Valois, Finistère ; BAVARIA : Lambach, Ossagebirge (Progel), Traunstein. — β. Normandie (Corbière). — γ. Pyrénées, Cauterets. — δ. Auvergne, Le Mont-Dore, au Capucin, à la Grande-Scierie, la Bourboule, route de Latour.

C. — (T. CLXV) — *R. luteistylus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 76 (1900).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 537 !

*Turio* obsolete angulatus, glaucescens, fere glaber, parce glandulosus; *folia ampla* (6), 3-5-nata, sœpe subtus cinerascentia, dentibus mediocribus, inæqualibus; *foliolum terminale* late ovatum, basi integrum vel emarginatum, acuminate; *ramus* leviter angulatus, parce pilosus glandulosusque; *inflorescentia* (7) parum glandulosa, ± armata, epilosa; *sepala* patula vel erecta; *petala* alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis flavescentibus breviora; *germina* glabra.

β. *PUBESCENTS* Sud. *l. c.* p. 77. — Folia subtus pubescentia viridiaque.

γ. *ANCEPS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 71 (1901); *R. anceps* Rip. exsicc., non Boul. et Let.; *R. prolixatus* Rip. et Gen. ap. Gen. Mon. p. 87? — Folia minute serrata, subtus viridia; foliolum terminale cuspidatum; sepala erecta.

δ. *MUCRONULATUS* Sud. *l. c.* 77. — Folia subtus viridia et glabrescentia, minute mucronato-serrata; sepala laxe reflexa. Parum fertilis.

ε. *ANOMALUS* Sud. *l. c.* — Aculei parvi, conici; folia ut in var. δ; sepala erecta; styli rubri; parum fertilis.

ζ. *NUDISTYLUS*; *R. nudistylus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 339; *R. Bayeri* (Focke) f. *vestita* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 10849. — *Turio* angulatus; folia 5-nata, foliolis caul. terminalibus abrupte acuminatis; inflorescentia subinermis; stamina brevissima.

η. *HYPOPSIS*. — Folia simpliciter serrata, supra sparsim, subtus molliter piloso-velutina, ± cinerascentia; foliolum terminale obovatum, basi subintegrum, cuspidatum; germina pilosa.

GALLIA: *Tarn*, *Pyrénées*; GERMANIA: *Silesia* (Kinscher). — γ. *Cher*, forêt d'Allogny (Ripart). — δ et ε. *Ariège*. — ζ. GERMANIA: *Badenia*, propre Waldkirch (Goëtz). — η. BAVARIA: *Traunstein* (Kaufmann).

#### HYBRIDÆ

*R. LUTEISTYLUS* × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 46 (1909); *R. PARVIDENS* Sud. *l. c.* — Glandulæ raræ, brevissimæ; folia 5-nata, subdiscolora; flores rosei, staminibus brevibus. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Bellegarde, Cambon; *Ariège*, Montgauzy, prope Foix.

*R. LUTEISTYLUS* × *RADULA timendus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 77 (1900); *R. PSEUDO-TIMENDUS* Sud. *l. c.* — *Turio* epruinosus, aculeis curvatis; folia 5-nata, subtus viridia; rachis pilosa; stamina stylos æquantia; sepala patula. Sterilis.

GALLIA: *Ariège*, Ascou.

b. — (T. CLXV) — *R. accessivus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 149 (1901).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 124.

Differt a *R. luteistylus* turionibus teretibus, glaucioribus; foliis plerumque 3-natis, subtus pubescentibus; ramis subtertibus, glandulosioribus, aculeis tenuioribus; inflorescentia brevi, pauciflora, parum armata, glandulis brevibus, crebris, obsita (8); sepalis erectis. *Flores* albi, *stamina* brevia, *styli* virescentes vel rubri.

β. *ROSEIFLORUS*. — Petala pallide rosea; stamina roseola; folia subdiscolora.

GALLIA: *Tarn*, *Pyrénées*, *Haute-Garonne*. — β. *Tarn*, Montcouyoul.

#### HYBRIDA

*R. ACCESSIVUS* × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909); *R. CALLIPETALUS* Sud. *l. c.* — Differt a *R. accessivo* foliis discoloribus, foliolis obovatis, cuspidatis, floribus roseis, sterilibus.

GALLIA: *Tarn*, Peyrebrune, Crespinet, Marssal.

c. — (T. CLXV) — *R. prætextus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 78 (1900).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 125.

*Turio* (9) teres, ± pruinosus, fere glaber, glandulis brevibus; *folia* 3-nata (10), subtus viridia, parum pilosa; *foliolum terminale* anguste ovatum vel oblongum, subemarginatum, acuminatum, breviter petiolatum; *inflorescentia* pauciflora, pallida, dense glandulosa, ± armata; *sepala* angusta, acuminata, viridia, albo-marginata, aculeata, fructum amplectentia (11); *petala* alba; *stamina* alba stylis breviora; *germina* glabra.

β. *CONTIGUUS*; *R. contiguus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 150 (1901). — Foliolum terminale latum, suborbicularare.

γ. *SCABIOSUS*; *R. scabiosus* Sud. *l. c.* p. 21 (1898). — Foliola terminalia subobovata; aculei obliqui; inflorescentia pyramidalis; petala ovata.

δ. *SUPPRASINUS*; *R. subprasinus* Sud. *l. c.* p. 23 (1898). — Dentes tenues, æquales; foliolum terminale late rhombeum, tenuiter acuminatum; inflorescentia parva, arcuata; petala angusta.

ε. *SURDIFOLIUS*; *R. surdifolius* Sud. *l. c.* p. 77 (1900). — Aculei caulinii falcati; inflorescentia ampla, foliosa, parce pilosa; styli rubri; sepala patula. — *R. luteistylus* similis.

GALLIA: *Tarn*, *Pyrénées*, *Haute-Garonne*. — γ. et δ. *Pyrénées*, Cauterets. — ε. *Ariège*, Orlu.

#### HYBRIDÆ

*R. PRÆTEXTUS* × *ULMIFOLIUS*; *R. SEMIPRÆTEXTUS* Sud. *hb.* — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 126! — Habitus *R. ulmifolii* sed glandulæ sparsæ, stamina brevia, fructus abortivus.

GALLIA: *Tarn*, Alban, via Ambialet; *Haute-Garonne*, Eaunes.

*R. PRÆTEXTUS* v. ε. × *OMALUS scitulus*; *R. scituliformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 78 (1900). — Differt a *R. prætexto* var. ε. aculeis validis, subæqualibus, floribus roseis, staminibus stylos æquantibus. Sterilis.

GALLIA: *Ariège*, Orlu.

*R. PRÆTEXTUS* × *VALLISPARSUS*; *R. PRÆTEXTIFORMIS* Sud. — Habitus *R. prætexti* sed flores rosei, steriles.

GALLIA: *Tarn*, le Bousquet, près Mazamet (Biau).

#### Subsectio E. — *Hystrices* Focke.

##### Conspectus specierum

###### I. — Petala læte rosea.

- |  |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
| A. — Turio dense pilosus; folia subtus viridia.  |  |                             |
| a. — Foliolum caulinum terminale late ovatum vel suborbiculare.....                          |  | R. fusco-ater Wh. 93        |
| b. — Foliolum caul. term. anguste ovatum, ellipticum vel obovatum; sepala patula vel erecta. |  | R. adornatus P.-J. Müll. 94 |

- B. — *Turio glaber* vel parce pilosus, interdum pilosus sed tunc folia ± discolora.
- Folia superiora subtus cinereo vel albo-tomentosa.....
  - Folia subtus viridia, raro (in apricis) superiora leviter cinerascentia.
    - Sepala fere semper reflexa; inflorescentia elongata.....
    - Sepala patula vel erecta; foliolum caul. terminale latum, ovatum vel orbiculare.
    - Sepala patula vel erecta; foliolum caul. terminale angustum, ellipticum vel rhombium.....

## II. — Flores albi.

- A. — Folia superiora subtus cinerea vel albo-tomentosa.....
- B. — Folia omnia subtus viridia.....

- R. obtruncatus* P.-J. Müll. 95  
*R. Lejeunei* Wh. 96  
*R. rosaceus* Wh. 97  
*R. Hystrix* Wh. 98

- R. hebecarpus* P.-J. Müll. 99  
*R. Koehleri* Wh. 100

**93** — (T. CLXVI) — **R. FUSCO-ATER** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 681 (1825); Wh. et N. *Rub. germ.* p. 72 t. XXVI; Focke *Syn.* p. 343; *Abhandl.* (1894) p. 159; *Genev. Mon.* p. 141; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 75; *Ronc. brev.* p. 19; ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 152; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 82; *R. obscurus* Sbsp. *R. fusco-ater* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 554; *R. verrucosus* Lees *Journ. Bot.* (1894) p. 48; *R. badius* Bab. p. p. — Excl.: *R. fusco-ater* Babingt., Wirtig. *Fl. Rheinp.* p. 156; Holuby *O. B. Z.* XXIII, p. 382.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8557, 8559 (var. s. n. *R. Guentheri* × *villicaulis* Utsch); *Set of Brit. Rub.* n° 128.

*Turio* (1) arcuato-procumbens, angulatus, faciebus planis vel convexis, fusco-purpureus, epruinosus, dense pilosus, glandulis crebris, inaequalibus minutis; *aculei* inaequalissimi, majores compressi, recti vel reclinati, minores crebri, aciculares vel papuliformes; *folia* (2) plerumque 5-nata, nonnulla 3-nata, obscure viridia, supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, mediocriter, inaequaliter sed non profunde serrata; *foliolum* terminale suborbicularis, basi emarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *petiolus* supra planus, dense glandulosus, aculeis reclinatis falcativis munitus; *stipulae* lineares, glandulosae; *ramus* florifer pilosus, aculeis validis, rectis vel falcatis armatus, foliis 3-natis, subtus viridibus; *inflorescentia* (3) magna, interrupta, inferne foliosa, piloso-hirsuta, glandulis purpurascensibus, longis, inaequalissimis, aculeis validis, crebri, rectis vel subfalcatis instructa (4); *pedunculi* medii elongati, patuli, multiflori, bracteis lanceolatis; *sepala* tomentoso-viridia, albo-marginata, hirsuta, glandulosa aculeataque, in flore reflexa, in fructu ± patula vel subreflexa (5); *petala* (6) ovata, purpurea; *stamina* vulgo rosea stylos virescentes vel roseos superantia; *germina* pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollen* admixtum. — Julius.

β. EXCUSIDATUS; *R. excusidatus* Sud. in *hb.* Müll. — Serratura inaequalis; foliola distincte cuspidata; inflorescentia subaphylla, aculeis rectis armata; stamina stylos vix superantia; germina glabra. — *R. decoro* P.-J. Müll. similis.

γ. EXASPERATUS; *R. exasperatus* L. et M. *Vers.* n° 87 (1859). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 127. — Folia grosse serrata; foliolum terminale ovatum; inflorescentia laxissima, sepe usque apicem foliosa; stamina pallida stylos virescentes superantia; germina glabrescentia. — *R. Lejeunei* Wh. similis.

δ. HORRIPILUS; *R. horripilus* L. et M. *Vers.* n° 63 (1859); *R. pilosus* Lef. *prius*. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 128! — Folia grosse serrata, ramealia supera subtus pallida, molliter pilosa; foliolum terminale orbiculare, abrupte acuminatum; aculei validi, crebri, pallidi; sepala dense aculeata; stamina rosea; germina glabrescentia. — *R. adornato* P.-J. Müll. similis.

ε. HORRICOMUS; *R. horripilus* v. *horricomus* Sud. *Diagn.* p. 43 (1906). — Differt a var. δ. foliis subtus molliter pilosis, pilis densis, ad nervos pectinatis, superioribus leviter discoloribus. Turio rachisque dense hirsuta. — *R. pyramidale* Kalt. revocat.

ζ. UNCINULATUS; *R. uncinulatus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 330. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9553! (s. n. *R. phyllophori*, non L. M.) — Turio obtusus, pruinosis; folia minute, acute et inaequaliter serrata; foliolum terminale longe acuminatum; inflorescentia parva, pauciflora; aculei petiolares parvi, uncinati.

η. PHYLLOPHORUS; *R. phyllophorus* L. et M. *Vers.* n° 117 (1859). — Exsicc.: Billot *Fl. Gall. et Germ.* n° 3376!; Sud. *Bat. eur.* n° 538! — Folia grosse et inaequaliter serrata, subtus viridia et parum pilosa; foliolum terminale acuminatum; inflorescentia elongata, interrupta, usque apicem foliosa, pilosissima armatissimaque; stamina alba stylos basi roseos superantia; germina glabra.

θ. FULCRATUS; *R. fulcratus* M. et L. *Vers.* n° 116 (1859); *R. vulgaris* Fisch.-Oest. *Rub. Bern.* n° 6 p. 32, non W. N. — Differt a var. η foliolis caulinis terminalibus vix emarginatis, acutis vel breviter acuminatis; inflorescentia breviore, deniore, minus hirsuta, staminibus albis vel pallide roseis stylos virescentes superantibus.

ι. ERINACEUS Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 555 (1902); *R. erinaceus* Schmid. *Bull. Soc. Bot. Gen.* n° 4, 158 (1888); *Cat.* p. 158. — Minus validus quam in praecedentibus var.; inflorescentia densa, pauciflora; folia ramelia superiora ± cincto-tomentosa; stamina rosea.

κ. PYCNOTRICHUS; *R. Sabranskyanus* var. *pycnotrichus* Hayek; *R. pilocarpus* v. *pycnotrichus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) p. 391. — Folia 3-5-nata; foliolum terminale ovatum, cordatum; dentes parum profundi; inflorescentia brevis, parce pilosa; stamina alba; sepala laxe erecta.

In locis montosis, ad sepes et silvarum margines. — GERMANIA OCCIDENTALIS; BRITANNIA: *Surrey*, *Oxford*, *Warwick*, *Derby*, etc.; GALLIA: *Bretagne*, *Anjou*, *Maine*, *Normandie*, *Cantal*, etc. — β. GERMANIA: *Alsacia*, *Wissembourg* (Müller). — γ. GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, Rond Capitaine, laie de Cuvergnon (Lefèvre). — δ. GALLIA: *Aisne*, forêt de Retz (Lefèvre). — ε. *Valois*, Fleury (Questier). — ζ. GERMANIA: *Badenia*, Siégelau (Goetz). — η. GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, canton de Bettz, Crépy-en-Valois (Lefèvre, Questier). — θ. *Valois*, Buisson de Waligny (Lefèvre); HELVETIA: Berne (Fischer-Oester); GERMANIA: *Badenia* (Goetz). — ι. GALLIA: *Haute-Savoie*, M<sup>e</sup> Salève (Schmidely); *Rhône*, Lyon (Jordan). — κ. STYRIA: Sœchau (Sabransky); GALLIA: *Haute-Garonne*, Aufréni, prope Toulouse.

## HYBRIDÆ

*R. FUSCO-ATER* var. η × *BIFRONS* Sud. *Diagn.* p. 43 (1906); *R. LATIBRACTEATUS* Sud. l. c. — Inflorescentia ut in var. *phyllophoro* sed folia discolora, foliolis minus latis, glandulæ sparsæ.

GALLIA: *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

*R. FUSCO-ATER* var. ι × *RADULA* (grex); *R. ERINACEIFORMIS* Sud. *hb.* — Differt a var. ι foliolis minus latis, glandulis brevioribus, serratura grossa.

GALLIA: *Rhône*, Lyon, aux Jumeaux (Jordan).

## Conspectus speciei, subspecierum et microgeneri

I. — Stamina stylos superantia; calyx post anthesin laxe reflexus.

- A. — Inflorescentia armata, aculeis glandulisque purpurascensibus munita.
- Rami aculei recti vel parum curvati; sepala sœpe reflexa; petala lœte rosea .....
  - Rami aculei uncinati; sepala patula; flores pallide rosei.....
- B. — Inflorescentia glandulis aculeis pallidis munita.
- Inflorescentia subaphylla, parum armata, pedunculis patulis.....
  - Inflorescentia foliosa, aculeis validis armata.....

II. — Stamina stylis breviora.....

- R. fusco-ater* Wh.  
*R. HARTMANNI* Gandg. B.  
*R. OIGOCCLADUS* M. L. C.  
*R. ABSCONDITUS* L. M. Cb.  
*R. DECORUS* P.-J. Müll. D.

B. — (T. CLXVII) — **R. Hartmannii** Gandg. *Rub. nouv.* p. 111 (*nom.*) (1884); Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 153; *R. horridus* Hartm. *Handb.* 2 *Upsal* 139 (1882), *non* F. Schultz (1819); Focke *Syn.* p. 351; *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 595; Aresch. *Some Obs. g. Rubus* p. 118.

Exsicc. — Ch. Magnier *Fl. sel.* n° 1144.

Differt a *R. fusco-atro* Wh. : *aculeis* caulinis validissimis, pallidioribus; *foliis* (1) grosse serratis, foliolis terminalibus suborbicularibus, submarginatis, acuminatis; *aculeis* petiolaribus valde falcatis uncinatis, ramealibus robustissimis, plerumque aduncis vel valde arcuatis; *foliis* ramealibus superis interdum subdiscoloribus; *inflorescentia* armatissima, aculeis pallidis, curvatis (2). *Calyx* dense aculeatus, patulus; *petala* pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pubescens. — Differt a *R. obtusifolia* P.-J. Müll. turionibus dense pilosis, foliis minus discoloribus. Folia grosse serrata, rachis dense pilosa, sepala patula *R. adornatum* P.-J. Müll. revocant; foliorum figura *R. fusco-atrum* v. *horripilum*.

**SUECIA MERIDIONALIS** : *Ostrogothia*, insula Ido, etc.

C. — (T. CLXVII) — *R. OIGOCLADUS* M. et Lef. *Vers.* n° 70 (1859); N. Boul *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 100 (*incl. var. nanceiensis*), *non* Rogers *Handb.* p. 65; *R. Lejeunei* God. *Fl. Lorr.* 2<sup>e</sup> éd. I p. 234; Gr. et G. *Fl. Fr.* I p. 541, *non* Wh.; *R. Godronii* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 184, *non* Lec. et Lmt.; *R. rosaceus* Cott. et Cast. *Guide Fribr.* p. 73, *non* W. et N.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 243, 1023; *Rub. gall.* n° 83, 84; Baenitz *Hb. eur.* n° 9967 (*s. n. R. obscuri*); Sud. *Bat. eur.* n° 539; *Rub. rar.* n° 129.

Differt a *R. fusco-atro* Wh. : *turionibus* (3) dense coactili-villosis; *aculeis* tenuioribus, subulatis, flavescentibus; *foliis* minute serratis, utrinque pilosis, foliolis terminalibus (4) ovato-orbicularibus, emarginatis, breviter acuminatis; *ramis* pilosioribus, pallidis, aculeis debilioribus armatis; *inflorescentia* pyramidalis, parum foliosa, dense piloso-hirsuta, pedunculis patulis (5), glandulis tenuibus, flavescentibus, aculeis debilibus, pallidis instructa (6). *Calyx* hirsutus, tenuiter glandulosus, parce aciculatus, post anthesin laxe reflexus; *petala* (7) elliptica, lète rosea; *stamina* purpurea stylis purpureo-superantia; *germina* glabra. *Pollen* parum admixtum.

β. *CONSOCIATUS*; *R. consociatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 112 (1859). — *Turio* minus heteracanthus; *inflorescentia* densa, parum armata; *stamina* stylique pallida. — *R. obscurum* Kalt. similis.

**GALLIA BOREALI-ORIENTALIS** : *Oise*, forêt de Retz, au Chêne-l'Officier, au Rond du Cheval blanc! (Lefèvre); *Marne*, bois de Mersy! (Levent); *Haute-Marne*, Bourbonne-les-Bains, bois de Serqueux (Levent); *Meurthe-et-Moselle* : Mousson (Salle), Nancy, à la Malgrange (Godron), à Heillecourt (Harmand); **HELVETIA** : *Fribourg*, Corseray (Perroud); **GERMANIA**, vallée de la Münster (Goetz). — β. *Alsacia*, Lauterbach (Müller).

b. — (T. CLXVII) — *R. absconditus* Lef. et M. *Vers.* n° 106 (1859).

*Aculei* validi ut in *R. fusco-atro* Wh., sed flavescentes ut in *R. oigocladus* M. et L. — *Folia* 5-nata, grosse serrata; *foliolum* terminale (8) orbiculare, emarginatum, abrupte acuminatum; *ramus* pallidus, aculeis flavescentibus, obliquis, validis, armatus; *inflorescentia* elongata, foliosa, hirsuta (9), glandulis relative brevibus, aculeis lutescentibus, reclinatis, validis munita (10), pedunculis ascendentibus; *petala* (11) lète rosea; *stamina* rosea stylis purpureo-superantia.

β. *EXSECATUS*; *R. exsecatus* M. et Wirtg. *ap.* Wirtg. *Hb. Rub. rh. ed.* I n° 179 (1862); Focke *Syn.* p. 309. — *Turio* angulosus; serratura tenuis; foliolis terminalia cordata, sepala patula; glandulae numerosæ.

γ. *SILENSANUS* Kinscher *Repertor. sp.* (1906) p. 211. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 540! — *Folia* ut in typo; *turio* minus angulatus; glandulae crebreiores, longiores; flores pallide rosei; sepala patula.

**GALLIA** : *Oise*, bois de Lévignen, bois du Roi (Lefèvre), Coin fendu (Questier). — β. **GERMANIA** : *Prov. rhinana*, Kondewald, prope Bertrich (Wirtgen); **GALLIA** : Lyon (Jordan). — γ. **SILESIA**, Spitzberg, Pangl, propre Nimptsch (Kinscher).

#### HYBRIDA

**R ABSCONDITUS** var. *silensanus* × **RADULA**; *R. subrotundicaulis* Kinscher *Reprt. VIII* (1909) p. 81; *R. absc.* var. *silens*. × *R. glandulosus* ej. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 541! — Differt a *R. absconditus* var. *silens* foliis discoloribus, *inflorescentia* multiflora, laxa, floribus parum fertilibus.

**GERMANIA** : *Silesia*, in silva prope Kummelwitz sita haud procul Münsterberg (H. Kinscher).

D. — (T. CLXVII) — **R. decorus** P.-J. Müll. in *Flora XLI* (1858), p. 151; *R. conspicuus* × *hirtus* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 127; *R. insericatus* D. *decorus* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 554, *ex pte.*

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 130!

*Turio* ut in *R. fusco-atro* Wh. *Folia* 5-nata, amplissima, subtus viridia, pubescentia, mediocriter et æqualiter serrata; *foliolum* terminale suborbicularare (12), emarginatum, breviter acuminatum; *ramus* dense pilosus, aculeis validis, obliquis, foliolis latis, cuspidatis; *inflorescentia* valde foliosa, hirsuta, aculeis crebris, validis (14), rectis reclinatis, glandulis leviter erubescens instructa; *sepala* fructum laxe amplectentia; *petala* ovata, lète rosea; *stamina* stylis roseis breviora (13); *germina* pilosa.

β. *EUPECTUS*. — *Turio* pruinosis; *folia* minute serrata, subtus molliter pilosa, ± cinerascentia; *rachis* laxe hirsuta; *flores* ut in typo. — *Serratura* tenuis *R. erraticum* revocat, sed glandulis longissimis diversus est.

**GERMANIA** : *Alsacia*, Weissemburg, lignes du Pigeonnier, vis-à-vis St-Germain (Müller). — β. **GALLIA** : *Tarn*, Burlats, via fontanorum.

♦ ♦ — (T. CLXVIII) — **R. ADORNATUS** P.-J. Müll. *ap.* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 87 (1858); in *Flora* (1859) p. 234; Focke *Syn.* p. 313; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 102; *R. fusco-ater* Wirtg. *Fl. Rheinpr.* p. 156, *non* Wh.; *R. Hystrix* v. *adornatus* Focke Koch's *Syn.* p. 777; *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 596; *R. atrorubens* Wirtg. prius.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 21, 87; *ed.* 2 n° 34, 35; Sud. *Rub. rar.* n° 131.

Planta pallide viridis, flavescentis. *Turio* (1) angulatus, faciebus planis vel convexis, epruinosus, dense piloso-hirsutus, parce glandulosus, aculeis inæqualissimis, majoribus basi valde dilatatis, reclinati, intermedii acicularibus, minoribus papulæformibus; *folia* 5-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, pilosa, pilis ad nervos pectinatis, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum, petiololus proprio duplo vel triplo longius; *petiolus* aculeis reclinati falcatis, armatus; *ramus* angulatus, dense hirsutus, aculeis pallidis, validis, obliquis munitus, foliis 3-natis, subtus viridibus, grosse serratis; *inflorescentia* (3) oblonga, obtusa, sèpè usque apicem foliosa, dense piloso-hirsuta, glandulis crebris, pallidis, aculeis validis, flavescentibus, numerosis, reclinati falcatis instructa (4); *pedunculi* medii patuli, multiflori; *sepala* cinereo-virentia, hirsuta, dense aculeata, glandulosa, albo-marginata, appendiculata, fructum laxe amplectentia (5); *petala* (6) ovata vel obovata, lète rosea; *stamina* rosea stylis roseos superantia; *germina* glabra. — Julius.

β. *SEMISERPENS* Sud. *Rub. tern.* p. 48 (1909). — *Folia* caul. 3-nata; *inflorescentia* aphylla, parum armata; *flores* rubri.

γ. *STYRIACUS*; *R. Kœhleri* var. *Sabrs.* in *hb.* Sud. — *Turio* subteres, parum pilosus; *folia* 3-nata, argute et inæqualiter serrata; *inflorescentia* laxa, parum foliosa.

GERMANIA : *Prov. rhenana*, Coblenz, Ems, Lentesdorf (Bodewig), Taunus (Wirtgen); GALLIA : *Saône-et-Loire*, Monthelon (Gillot); *Valois*, forêt de Retz (Questier); Ardennes, bords de la Meuse, entre Mouzon et Goigny (Callay); BELGIA : Ardennes, Silenrieux (du Pré), Pailhe. —  $\beta$ . GALLIA : *Tarn*, Burlats. —  $\gamma$ . STRIA ORIENT. : Soeckau (Sabransky).

**Conspicuum speciei, subspecierum et microgenerum**

I. — Folium caulinum terminale ovatum vel breviter obovatum, acuminatum.

A. — Stamina stylis superantia; folia inaequaliter et grosse serrata.....	R. <i>adornatus</i> P.-J. Müll.
B. — Stamina stylis breviora; folia eequaliter et grosse serrata.....	R. <i>BILLOTII</i> P.-J. Müll. b.
II. — Folium caulinum terminale ellipticum vel anguste obovatum, basi fere integrum.	
A. — Folium caul. term. ellipticum vel obovato-rhombeum; dentes mediocres, inflorescentia longa.....	R. <i>HOSTILIS</i> M. et W. B.
B. — Folium caul. term. obovatum; dentes grossi; inflorescentia brevis.....	R. <i>RUDIFOLIUS</i> Sud. Bb.
III. — Folium caulinum terminale oblongo-acuminatum; folia subtus pilosissima.	
A. — Dentes acutissimi; inflorescentia pallida, densa, armatissima.....	R. <i>CHLOROBELUS</i> Sud. C.
B. — Dentes parum profundi; inflorescentia laxa, parum armata, glandulis fuscis munita.....	R. <i>OBLONGIFOLIUS</i> M. et W. Cb.

b. — (T. CLXIX) — R. *Billotii* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 283.

A. *R. adornato* P.-J. Müll. dignoscitur *foliis* minute et eequaliter serratis, *foliolo* terminali (1) breviter obovato, emarginato, abrupte acuminato; *inflorescentia* ampla, pyramidalis, aphylla; *petalis* angustioribus, staminibus stylis pallidis brevioribus (2).

$\beta$ . TUTZINGENSIS; *R. pilocarpus* (Greml.) Focke *Syn.* p. 354, *ex pte.* — Folia caul. 3-nata; serratura tenuis; folium caulinum terminale ovatum, leviter emarginatum; inflorescentia armatissima, obtusa; stamna alba stylis carnosus eequalitatis; germina pilosa.

$\gamma$ . SUBPYRENAICUS. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 154 ! — Turio appresse pilosus; folia caul. 3-nata; stamna purpurea, stylis flavescens.

GALLIA : *Vosges*, Gérardmer, vallée de la Vologne, route de St-Dié, rocallles (Müller); BELGIA : Sartilman (Aigret). —  $\beta$ . GERMANIA : *Bavaria*, Tutzing (Greml., Progel.). —  $\gamma$ . GALLIA : *Haute-Garonne*, Miramont.

B. — (T. CLXIX) — **R. hostilis** Müll. et Virtg. *ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed.* I, n° 139 (1861); Focke *Syn.* p. 324; *R. adornatus* var. *ferox* Wirtg. *hb., prius.*

Exsicc. — Wirtg. *l. c. ed.* 1 n° 139, 178; *ed. 2 n° 67, 98.*

Diffrer a *R. adornato* P.-J. Müll.: *turione* laxe piloso; *foliis* 3-5-natis (3), acute et subaequaliter serratis; *foliolo* terminali elliptico, obovato vel rhombeo, basi fere integro, acuminato, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longiore; *inflorescentia* elongata angusta, interrupta, usque ad apicem foliosa, pedunculis leviter ascendentibus (4, 5). *Petala* (6) staminaque rosea; *calyx* erectus.

$\beta$ . PURCHASEIANUS; *R. Purchasianus* Rogers *Journ. Bot.* (1895), p. 102; *R. rosaceus* Sbsp. *Purchasianus* ej. *Handb. Brit. Rub.* p. 80. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 22. — Gracilis pallidusque; serratura inaequalis; inflorescentia densa, parum foliosa, dense hirsuta; sepala laxe erecta. *R. adornato* similis.

$\gamma$ . FESTIVUS; *R. festivus* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 138 (1861); Focke *Syn.* p. 314; *R. macrothyrsus* C. *festivus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 551.* — Turio minus heteracanthus; inflorescentia latior, laxior, usque apicem foliosa; aculei obliqui.

$\delta$ . AMETHYSTINUS; *R. festivus* v. *amethystinus* Sud. in *hb. Mus. Paris.* — Folia grosse serrata; inflorescentia hirsutior, armatrix; petala staminaque violaceo-purpurea.

$\epsilon$ . EDENTULUS Sud. in *hb. Mus. Paris.* — Dentes lati, parum profundi; inflorescentia brevis, obtusa; stamna stylis eequalitatis.

$\zeta$ . DASYPHYLLUS; *R. rosaceus* Sbsp. *dasyphyllus* Rogers *Journ. Bot.* (1899) p. 197; *Hand. Brit. Rub.* 83; *R. Kœhleri*  $\gamma$ , *pallidus* Bab. *Brit. Rub.* p. 204; *R. saxiculus* Bab. *prius*, p. p. non P.-J. Müll. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 45. — Turio glaucens, laxe pilosus; folia 3-5-nata, argute et subsimpliciter mucronato-serrata, subtus molliter pilosa; folium terminale elliptico-obovatum, basi emarginatum; aculei pallidi; pedunculi patuli, breves; stamna stylis superantia; sepala in fructu patula.

GERMANIA : *Prov. rhenana*, Bertrich, Eifel (Wirtgen); Adenau (Bodewig); Saarbrücken (Winter); BRITANNIA : Huntingdon (A. Ley). — GALLIA : Finistère, Huelgoat (Henry). —  $\beta$ . BRITANNIA : Herefordshire, Howle Hill; Worcester, Derby, etc. (Rogers). —  $\gamma$ . GERMANIA : *Prov. rhenana*, Bertrich (Wirtgen). —  $\delta$ . GALLIA : *Valois*, bois de Louvry (Questier). —  $\epsilon$ . *Valois*, forêt de Retz (Questier). —  $\zeta$ . BRITANNIA : Derbyshire, Yorkshire, etc.

Obs. — Le *R. Kœhleri* Sbsp. *balticus* Focke *Syn.* p. 350 (1877) se rapproche apparemment du *R. hostilis* M. et W. Il m'est inconnu. — Mechlenburg, Malchin.

b. — (T. CLXIX) — **R. rudifolius** Sud. in *hb. Müller.*

*Turio* subteres; *folia* (7) grosse serrata, 3-nata, utrinque piloso-aspera; *foliolum* terminale obovatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, pauciflora, dense hirsuta (8), pallida; *sepala* erecta; *petala* (9), stamna stylique rosea; *germina* glabra.

GALLIA : Vienne, allée de Dauzé, au Rond (de Lacroix).

C. — (T. CLXIX) — **R. chlorobelus** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 319.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8576 (s. n. *R. suavifolii*, non Greml.).

*Turio* subangulatus, dense pilosus, aculeis pallidis, rectis, inaequalissimis armatus; *folia* 3-nata, grosse et acute serrata (10), subtus molliter piloso-velutina, pallida,  $\pm$  cinerascentia; *foliolum* terminale oblongum, sensim et longe acuminatum, emarginatum, breviter petiolatum; *ramus* dense hirsutus, aculeis longis, flavescens, reclinatis munitus; *inflorescentia* densa, parum foliosa, valde hirsuta, glandulis longis (11), flavescens, aculeis elongatis, crebris, pallidis, rectis instructa; *sepala* tomentosa, patula; *flores* rosei; *stamna* stylis superantia; *germina* glabra.

GERMANIA : Badenia, Siegelau, prope Waldkirch (Goetz).

b. — (T. CLXIX) — *R. oblongifolius* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 144 (1860); *ed. 2 n° 77*; Focke *Syn.* p. 304; *R. Menkei* A *oblongifolius* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 555, ex pte.*

*Folia* subtus viridia, breviter piloso-velutina, simpliciter mucronato-serrata, caulinata 3-4-5-nata; *foliolum* terminale (12) oblongum, acuminatum; *inflorescentia* laxa (13),  $\pm$  foliosa, hirsuta, glandulis fuscis, longis, aculeis sparsis munita; *sepala* dense glandulos-hirsuta, inermia vel parce aculeata; *petala* ovata (14). Pubes *R. pyramidalis* Kalt.

GERMANIA : *Prov. rhenana*, Eifel (Wirtgen).

Obs. — L'étiquette de Wirtgen ne donne aucune indication sur la couleur de la fleur; mais l'auteur comparant sa plante au *R. Lejeunei* Wh., il est vraisemblable qu'elle a les fleurs roses.

95 — (T. CLXX) — R. OBTRUNCATUS P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 152; Vers. n° 91 (sensu amplio).

*Turio* (1) angulatus, glabrescens, epruinosus, glandulis longis, erubescens, aculeis inaequalissimis, majoribus compressis, rectis vel reclinatis, intermediiis acicularibus, minoribus papulaeformibus; *folia* 5-nata (2-3), supra glabra, inferiora subtus viridia, parce pilosa, superiora cinereo vel albo-tomentosa, omnia mediocriter, inaequaliter et subsimiliciter mucronato-serrata; *foliolum* terminale ovatum vel vulgo obovatum, basi leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolo lulo proprio triplo longius, infima sessilia; *petiolus* supra planus, aculeis reclinatis falcativis munitus; *stipulae* lineares, glandulosae; *ramus* angulatus, parce pilosus, aculeis pallidis, mediocribus, reclinatis, foliis 3-natis, superis discoloribus, foliolis terminalibus obovatis, cuspidatis vel abrupte acuminatis; *inflorescentia* (4) oblonga, basi foliosa, laxe pilosa, glandulis crebris, longis, aculeis numerosis, flavescentibus, rectis reclinatis instructa (5); *pedunculi* medii breves, patulo-ascendentes, 2-3-flori; *sepala* cinereo-tomentosa, pilosa, glandulosa, parce aculeata, brevia, post anthesin patula (6); *petala* (7) ovata, late rosea; *stamina* dilute rosea stylis flavescentes superantia; *germina* parce pilosa; *receptaculum* pilosum. — Julius.

β. ANGUSTICUSPIS; *R. angusticuspis* Sud. *Obs. Set. of Brit. Rub.* p. 35 (1904); *R. anglosaxonicus* Sbsp. *R. setulosus* Rogers *Journ. Bot.* (1892) p. 209, non M. et Lef.; *Handb. Brit. Rub.* p. 58. — Exsicc.: *Set of Brit. Rub.* n° 121. — Gracilis; foliolum caul. terminale tenuiter acuminatum, basi subintegrum; inflorescentia laxior; sepala fructum laxe amplectentia; germina pilosa.

γ. ACICULATICAULIS; *R. aciculaticaulis* Sud. in hb. Müller. — Foliolum terminale breviter obovatum, cuspidatum; dentes tenues; inflorescentia densa, epilosa; sepala laxe reflexa; germina pilosa. *R. omalo* similis.

δ. EXPOLITUS; *R. expolitus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 152 (1901). — Manifeste discolor; turio parce pilosus; aculei purpurascenes; inflorescentia elongata, densa; styli rosei; germina glabra.

ε. SAXICOLIFORMIS Sud. *Bull. Soc. Belg.* XLVII (1910), 217. — Turio pilosus; aculei mediocres, reclinati; folia subtus molliter pubescentia, argute et simpliciter serrata; foliolum caul. terminale late ovatum, subemarginatum, breviter acuminatum; inflorescentia densa, pilosa; germina glabra. *R. saxicolo* P.-J. Müll. similis.

In locis montosis. — GERMANIA: Alsacia, Heimbach, derrière les bains de Gleisweiler (Müller); Prov. rhénane: Gross-Koenigsdorf, prope Coln (Bodewig). — β. BRITANNIA: Devon, Somerset, Oxford, Gloucester, Hereford, Brecon, etc. (Rogers). — γ. GALLIA: Montauban, prope Luchon. — δ. GALLIA: Hautes-Pyrénées, Ardengost, bois de Gertoux. — ε. BELGIA: Louette-St-Pierre (Gravet).

## Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

## I. — Foliola terminalia (in turione et ramo) obovata.

A. — Folia grosse vel mediocriter et inaequaliter serrata.

- a. — Turio parce pilosus; inflorescentia ± densa.....
- b. — Turio glaber; inflorescentia laxissima; stamina rosea.....

*R. obtruncatus* P.-J. Müll.  
*R. ARDENSI* Sud. b.

B. — Folia minute mucronato-denticulata.

- a. — Turio pruinosus; inflorescentia laxa.
  - 1. — Turio glabrescens; inflorescentia parum armata. Fertilis.....
  - 2. — Turio pilosus; inflorescentia armatissima. Parum fertilis.....
- b. — Turio epruinosus; inflorescentia densa.....

*R. ERYTHRANTHEMUS* Sud. B.  
*R. VENUSTUS* Favrat. C.  
*R. MORVENNICUS* Gillot. Bb.

## II. — Foliolum caulinum terminale ovatum vel rhombium; sepala patula vel erecta.

A. — Folia subtus parce pilosa; inflorescenties glandulæ rubrae.

- a. — Stamina stylis superantia; sepala patula.....
- b. — Stamina stylis vix æquantia; sepala erecta.....

*R. MUTABILIS* Genev. D.  
*R. VALLIVAGUS* Sud. Db.  
*R. HYPOCHLORUS* Sud. Dc.

B. — Folia subtus molliter piloso-velutina; glandulæ pallidæ.....

## III. — Foliolum caulinum terminale suborbiculare vel late ovatum.

A. — Turio glaber; sepala in fructu reflexa.....

*R. RUBRANS* P.-J. Müll. E.

B. — Turio pilosus.

- a. — Sepala laxe reflexa; germina glabra.....
- b. — Sepala patula vel fructum amplectentia; germina pilosa.....

*R. HORRENS* Sud. F.  
*R. PILOCARPUS* GrL. G.

b. — (T. CLXXI) — *R. ardens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 153 (1901).

Differt a *R. obtruncato* P.-J. Müll.: turione glabro; foliis (1) minute serratis, foliolis angustioribus, longe acuminatis; inflorescentia grandi, laxissima, foliosa, glandulis purpureis munita (2, 3), pedunculis elongatis, leviter ascendentibus, epilosis; staminibus stylisque late roseis vel purpureis. Pollen parum admixtum; petala (4) magna, ovata.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon, val de Burbe; *Maine-et-Loire*, Noyant-la-Gravoyère, à la Corbinière (Bouvet).

## HYBRIDA

*R. ARDENSI* × *ULMIFOLIUS vulgatus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 153 (1901); *R. CUNEIFER* Sud. l. c. — Aculei subæquales; glandulæ breves, rarae; folia discolora, foliolis cuneatis; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon, val de Burbe.

B. — (T. CLXXI) — *R. erythranthemus* Sud. *Bat. eur.* p. 29 (1904).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 85!; Baenitz *Hb. eur.* n° 10365 (*R. formidabilis*) (var.).

Gracilis; turio subteres, purpurascens, glaucescens, glabrescens; folia 3-5-nata (5), supra sparsim pilosa, superiora subtus cinereo vel albo-tomentosa pilosaque, omnia minute et simpliciter mucronato-serrata; foliolum terminale obovatum, emarginatum, breviter acuminatum; inflorescentia brevis, laxe, subaphylla, breviter hirsuta, glandulis purpureis, aculeis mediocribus instructa, pedunculis longis, patulis (6); sepala tomentosa, parce pilosa, imperfecte reflexa; petala ovata (7), rubra; stamina rubra stylis rubros superantia; germina parce pilosa. Pollinis gradus puritatis 9/10.

GALLIA: Tarn, forêt de Sérénac; GERMANIA: Badenia, prope Waldkirch (Goetz).

## HYBRIDÆ

*R. ERYTHRANTHEMUS* × *TOMENTOSUS Lloydianus* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909); *R. ERYTHRANTHEMOIDES* Sud. l. c. — Differt a *R. erythranthemo* foliis discoloribus, grosse serratis, floribus pallidis, sterilibus.

GALLIA: Tarn, Crespinet.

*R. ERYTHRANTHEMOIDES* × *ULMIFOLIUS* Sud. l. c.; *R. OBUNCISPINUS* Sud. l. c. 47. — Validus, subeglandulosus; aculei subæquales; folia appressa albo-tomentosa, rachis pilosa. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Crespinet, cum praecedente.

b. — (T. CLXXI) — *R. morvennicus* Gillot *exsicc. Assoc. rub. et ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 127 (1900); *R. Gillotii*  $\times$  *serpens* N. Boul. *ap.* R. et C. l. c.

*Exsicc. — Assoc. rub.* n° 198, 512, 1094; *Rub. gall.* n° 186; *Sud. Rub. rar.* n° 132!

*Turio angulatus*, epruinosus, heteracanthissimus, parce pilosus; folia 5-nata (10), supra glabrescentia, subtus pilosa, cinereo-tomentosa, subtiliter mucronato-denticulata; foliolum terminale breviter obovatum, emarginatum, abrupte et longe acuminatum; inflorescentia densa, pauciflora, ± foliosa, pilosa, rubra; sepala laxe reflexa; petala elliptica (12), rosea; stamina rosea stylos superantia. Fertilis.

GALLIA : Saône-et-Loire, Roussillon, St-Prix-en-Morvan (Gillot, Lucand); Meuse, St-Mihiel (Salle); Nièvre, Allogny-en-Morvan, C. dans le bois de la Chaux, Quarri-les-Tombes (Gillot); BELGIA, Tlemalle-Haute (Aigret).

#### HYBRIDA

*R. MORVENNICUS*  $\times$  *SERPENS elongatifolius* Gillot; *R. FAGINETII* Gillot *in Rub. gall. exsicc.* n° 187 (1901). — Differt a *R. morvennico* foliis inaequaliter serratis, subtus viridibus, inflorescentia glandulosiore, floribus pallidis, staminibus brevioribus, sepalis erectis.

GALLIA : Saône-et-Loire, St-Prix, forêt du Folin (Faginetum), au-dessus de la Goulette (Gillot).

C. — (T. CLXXI) — *R. venustus* Favrat *in Bull. Soc. Vaud.* 17 p. 534 (1881); Schmid. *Cat.* p. 150; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI, p. 93, 128; Focke *Abhandl. Brem.* (1894) p. 158. — An *R. podophyllum*  $\times$  *hirtus*?; *R. Bayeri*  $\times$  *conspicuus* sec. Schmid.

*Exsicc. — Favrat Rub. Helv.* n° 38; *Assoc. rub.* n° 758, 849.

*Turio* obsolete *angulatus*, glaucescens, pilosus, parum heteracanthus, aculeis longis munitus; *folia* 3-5-nata (8), supra parce, subtus breviter pilosa, ± subcinerascentia, subtiliter mucronato-denticulata; *foliolum* caul. terminale obovato-oblongum, abrupte et breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, aphylla, laxissima, breviter pilosa (9), aculeis crebris, validis, rubris armata, pedunculis valde patulis, multifloris; *sepala* tomentosa, angusta, in fructu patula vel erecta; *petala* rosea; *stamina* stylos superantia; *germina* glabra. *Fructus* male evolutus.

GALLIA : Ain, Divonne, sur St-Gix; Haute-Savoie, M<sup>e</sup> Salève (Schmidely).

D. — (T. CLXXI) — *R. mutabilis* Genev. *Mém. Soc. Ac. M.-et-L.* (1860) p. 84; *Mon.* p. 163, *pr. max. p.*; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 73; Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 57, non Rogers *Handb.* p. 71; *R. trachycalyx* f. *grandiflora* Progel *hb.*; *R. exasperatus* f. *petatis roseis* Progel.

*Exsicc. — Sud. Rub. rar.* n° 133.

*Turio* (13) manifeste *angulatus*, faciebus planis, glaber, glaucescens, heteracanthissimus; *folia* caulina plerumque 5-nata, supra sparsim pilosa, subtus cinereo vel albo-tomentosa, grosse et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (14) ovatum vel late rhombeum, basi leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* validus, angulosus, erubescens, aculeis rectis reclinatis munitus, foliis ± discoloribus, grosse serratis; *inflorescentia* elongata, basi foliosa, laxe pilosa, aculeis validis, crebris, glandulosis rubris, elongata, inaequalibus, pedunculis patulo-ascendentibus (15); *sepala* in fructu patula (16); *petala* (17) late elliptica, rosea; *stamina* alba stylos superantia; *germina* glabra; *pollen* parum admixtum.

β. *ACANTHOPHYLLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909). — *Exsicc. — Sud. Bat. eur.* n° 542! — Folia discolora, subtus in nervis aculeis crebris munita; petala staminaque rubra; sepala laxe reflexa.

γ. *ZOBOTHICUS*; *R. zobothonicus* Figert et Sprib. *Beitr. Rub. Prov. Schl.* p. 346 (1904). — Folia subtus pilosa, foliolis angustioribus, longe petiolulatis, terminalibus ellipticis; inflorescentia armatissima; stamna rosea; germina pilosa. *R. hypochlorus* Sud. similis.

δ. *TRIANGULUS*; *R. triangulus* Kretzer *ap.* Baenitz *Hb. eur. (ann. 1895)*. — *Turio* teres, pilosus, aculeis basi dilatatis; inflorescentia elongata, mediocriter armata, petala angusta; germina pilosa.

ε. *PHYLLOPHOROIDES*. — *Turio* dense pilosus, pruinosus; folia argute serrata; foliolum terminale ellipticum; inflorescentia elongata, usque apicem foliosa; petala staminaque pallide rosea, styli purpurei; germina glabra.

GALLIA : Vendée, Anjou, Loire-Inférieure, Oise, Tarn, Ariège, etc.; GERMANIA : *Prov. rhinana*, Bavaria, Waging, Tettenhausen (Progel). — β. *Tarn*, Crespinet. — γ. SILESIA : Schweidnitz (Spribble). — δ. GERMANIA, in valle Weser (F. Kretzer). — ε. GERMANIA : *Prov. rhinana*, Gross Königsdorf (Bodewig).

#### HYBRIDA

*R. MUTABILIS*  $\times$  *ADSCITUS*, *R. DECEPTORIUS* Sud. *in Bouvet Rub. Anj.* (1903) p. 688; Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 76. — Differt a *R. mutabilis*: aculeis minus inaequalibus, foliis subtus pilosis, floribus sterilibus.

GALLIA : Maine-et-Loire, St-Léger-du-Bois (Genevier, *in hb.* Bureau).

b. — (T. CLXII) — *R. vallivagus* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909).

A *R. mutabilis* Genev. dignoscitur; turione debiliore, minus angulato, pruinoso; foliis (1) subaequaliter et argute serratis; partibus floris (3) purpureis; staminibus stylis brevioribus (2) vel vix æquilongis; sepalis in fructu erectis.

β. *ECHINOPUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909). — Serratura grossa ut in *R. mutabilis* Gen.; inflorescentia aculeis flavescens; armatissima; stamna alba.

γ. *FECUNDUS* Sud. l. c. 47. — Folia minute mucronato-serrata; folia subtus molliter pubescentia.

GALLIA : Tarn, Cambon, Mazamet, Albine, etc. — β. Cambon-du-Temple. — γ. Le Banquet, la Fontasse.

#### HYBRIDA

*R. VALLIVAGUS*  $\times$  *TOMENTOSUS* *ancophilus* Sud. *Rub. tarn.* p. 47 (1909); *R. HORRIDIFLORUS* Sud. l. c. — Validus et discolor; serratura tenuis, flores albi, sepala patula; sterilis.

GALLIA : Tarn, Albine.

c. — (T. CLXXII) — *R. hypochlorus* Sud. *Diagn.* p. 44 (1906).

*Exsicc. — Assoc. rub.* n° 113.

A *R. mutabilis* Gen. distinguitur: turione epruinoso, parce piloso; foliis (4) pallide viridibus, subtus dense pilosis, acute et mediocriter serratis; inflorescentia pallida, flavescens, piloso-hirsuta (5). Petala (6) rosea; stamna alba, styli virescentes.

GALLIA : Valois, Varambaumont (Questier); Sarthe, Crê-s-Loir (Launay); Maine-et-Loire, Angers (Bouvet).

E. — (T. CLXXII) — **R. rubrana** P.-J. Müll. in Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 75 (1902).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 543.

*Turio* angulatus, erubescens, glaber, glaucescens; *folia* 4-5-nata (7), argute serrata, superiora discolora; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbicularare, basi emarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* pilosa, ± armata, rubra; *sepala* (8) laxe reflexa; *flores* (9) vive rosei, staminibus longis; *germina* glabrescentia.

β. SAXIVAGUS Sud. *Rub. tarr.* p. 47 (1909). — Folia caulinata 3-nata, subtus piloso-velutina, mucronato-denticulata; inflorescentia perar mata; petala orbicularia.

γ. ALBELLUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 544 ! — Validus; folia grosse et inaequaliter serrata, subtus albo-tomentosa; inflorescentia pyramidalis, subaphylla, pedunculis patulis; staminea rosea; styli lutescentes.

GALLIA : Vienne, étang de Monterban (Chaboisseau); Tarn, Escoussens, Crespinet; Hautes-Pyrénées, Arreau. — β. Tarn, Burlats. — γ. Tarn, Labastide-Rouairoux.

#### HYBRIDA

**R. RUBRANS** var. γ. × **PRÆTEXTUS**; **R. ALBELLIFORMIS** Sud. *hb.* — Habitus *R. rubrantis* var. *albelli* sed minus discolor, flores albi, steriles. GALLIA : Tarn, Labastide-Rouairoux, loco dicto « Pont de la Peyre ».

F. — (T. CLXXII) — **R. horrens** Sud. *Diagn.* p. 44 (1906).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 134 !

Validus; *turio* (10) angulatus, pilosus, aculeis robustis, crebris armatus; *folia* 5-nata, minute denticulata, superiora discolora; *foliolum* terminale orbiculare, cordatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* (12, 13) pyramidalis, densa, hirsuta, armatissima; *sepala* laxe reflexa; *flores* (14) rosei, staminibus longis; *germina* glabra. — *R. fusco-atro* Wh. similis.

GALLIA : Valois, Le Plessis-au-Bois, taillis d'Ivors (Questier); GERMANY : Bavaria, Wengen (Zinsmeister).

G. — (T. CLXXII) — **R. pilocarpus** Greml! *Beitr. Fl. Schw.* (1870) p. 42 (err. typ. *R. psilocarpus*); *O. B. Z.* (1871) p. 133; Focke *Syn. Rub.* p. 354, p. p. et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 601 p. p.; Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1906) p. 49, non Schmid. *Bull. Soc. Bot. Genev.* 151 (1888) nec N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 92; *R. pilocarpoides* Sabrs. ! *O. B. Z.* (1905) n° 8; *R. rosaceus* Progel *hb.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 86.

*Turio* obtusangulus, pilosus, glaucescens, aculeis mediocribus; *folia* 3-5-nata (15), supra parce pilosa, subtus pilosa, inferiora viridia, superiora cinereo-tomentosa, inaequaliter et argute serrata; *foliolum* terminale orbiculare vel obovato-orbiculare, leviter emarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum; *ramus* obsolete angulatus, pilosus, mediocriter armatus, foliis superioribus subdiscoloribus; *inflorescentia* brevis, ± foliosa, laxe hirsuta, glandulis fuscis, inaequalisimis, aculeis validis vel mediocribus instructa; *sepala* aculeata, patula vel fructum laxe amplectentia (16); *petala* (17) rosea; *stamina* alba styllos virescentes vix superantia; *germina* pilosa.

HELVETIA : Zürichberg, prope Zürich ! (Greml); BAVARIA : Waging, prope Traunstein (Progel); STYRIA : Söchau (Sabransky).

OBS. — La plante décrite par Greml dans son *Beitrag* est celle du Zürichberg ! dont je possède des spécimens de Greml lui-même; c'est aussi celle du *Batotheca* n° 86 ! Greml a rapporté aussi à son *R. pilocarpus* une forme de Bavière qui constitue le type *R. pilocarpus* de M. Focke. *R. eu-pilocarpus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905), plante à feuilles vertes en dessous et à folioles cauli. terminale ovale ou elliptique. Cette forme, bien différente de celle-ci et que j'ai rattachée au *R. Billotii*, ne saurait être considérée comme le type de l'espèce, Greml ayant formellement visé la plante de Suisse et non celle de Bavière ! — Les spécimens que j'ai reçus de M. Schmidely sous le nom de *R. pilocarpus* rentrent dans mon *R. omalus*.

#### HYBRIDA

**R. PILOCARPUS** × **DURIMONTANUS** ?; **R. PSEUDO-MARSHALLII** Sabrs. *O. B. Z.* (1905) n° 8; **R. bifrons** × **pilocarpoides** Sabrs. l. c. — Aculei parum inaequales, recti, validi; dentes tenues; folia superiora subdiscolora; foliolum terminale obovatum, abrupte acuminatum; rachis parce pilosa, aculeis rectis armata; sepala reflexa, germina glabra; fructus male evolutus.

STYRIA ORIENTALIS : Söchau (Sabransky).

96 — (T. CLXXIII) — **R. LEJEUNEI** Wh. in Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 683 (1825); Wh. et N. *Rub. germ.* p. 79 t. XXXI; Focke *Syn.* p. 316 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 542; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 99, ex pte; Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 153.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 648; Baenitz *Hb. eur.* n° 9052.

*Turio* (1) procumbens, angulatus, faciebus planis vel convexis, erubescens, epruinosus, pilosus, sparsim glandulosus, aculeis inaequalissimis, majoribus compressis, rectis reclinatis, minoribus acicularibus vel papulæformibus munitus; *folia* caulinata plerumque 5-nata (2, 3), supra sparsim pilosa, subtus viridia et parum pilosa, inaequaliter et mediocriter serrata, dentibus angulosus; *foliolum* terminale ellipticum, late rhombeum vel leviter obovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* supra planus, aculeis reclinatis falcativis munitus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* florifer angulatus, pilosus, aculeis rectis reclinatis instructus, foliis grosse serratis, subtus viridibus; *inflorescentia* (4) pyramidalis, laxa, inferne foliosa, laxe pilosa, glandulis rubris, inaequalibus, aculeis satis validis, rectis reclinatis munita (5); *pedunculi* medii patuli, longi, 3-flori; *sepala* tomentosa, parce pilosa, glandulosa, aculeata, post anthesin laxe reflexa (6); *petala* (7) ovata vel late elliptico-obovata, lète rosea; *stamina* rosea styllos virescentes superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. — Julius.

β. BRACTEATUS; *R. Lejeunei* Rub. gall. exsicc. n° 85. — Inflorescentia sœpe usque apicem foliosa, pedunculis leviter ascendenteribus; sepala in fructu patula. Folia superiora sœpe leviter cinereo-tomentosa.

γ. EXACUTATUS; *R. exacutatus* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 153 (1905); *R. acutatus* Goetz in Baenitz *Hb. eur.* n° 10345, non M. et L. — Dentes minus grossi, inaequales, ± divaricati; rachis pilosa, armatissima, longe glandulosa.

δ. FUCKELII; *R. Fuckelii* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 96 (1858); ed. 2 n° 71, 103; in *Flora* (1859) p. 235; Focke *Syn.* p. 306; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 66; *R. Hystrix* C Fuckelii Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 596 (1902). — Turio parum angulatus, minus heteracanthus; aculei pallidi, in petiolis ramisque falcati vel adunci; foliolum terminale ellipticum, basi integrum, acuminatum; pedunculi leviter ascendenteribus; *stamina* pallida?

ε. POWELLI; *R. Powelli* Rogers *Journ. Bot.* (1894) p. 47; *R. rosaceus* Sbsp. *R. Powelli* ej. *Handb. Brit. Rub.* p. 81. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 100 ! — Var. è similis, sed gracillimus, folia inaequaliter serrata, foliola angusta, flores parvi, rosei ?

ζ. ATROVIRENS; *R. atrovirens* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 26. — Exsicc. : F. Schultz *Hb. norm.* n° 651 (s. n. *R. atrovirens*); Sud. *Bat. eur.* n° 545 ! — Folium terminale (8) late ovato-rhombeum, basi integrum; dentes grossi, inaequales; inflorescentia hirsuta, subaphylla; petala lète rosea; stamina stylique rosea.

**n.** UNCATISPINUS ; *R. uncatuspinus* P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 29 et exsicc. n° 24 (1866). — Folia caulinata 3-5-nata, mucronato-denticulata; foliolum terminale emarginatum; aculei rameales curvati; inflorescentia interrupta; sepala laxe reflexa; petala late rosea; stamina dilute rosea stylis pallidos superantia; germina pilosa.

In nemoribus montosis. — GERMANIA: *Prov. rhénana*, Malmédy, Aachen, Eifel; *Bavaria*; *Badenia*; BELGIA; GALLIA BOREALIS: *Aisne* et *Oise*, Arganson (Lefèvre), de Taillefontaine à Emeville (Questier). — β. BELGIA: La Roche, Harzé, route d'Aywaille (du Pré), Chèvremont (Aigret), etc. — γ. GERMANIA: *Badenia*, Waldkirch (Goetz). — δ. GERMANIA: Coblenz (Wirtgen). — ε. BRITANNIA: *Kent*, *Essex*, *Oxford*. — ζ. GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, vallon de la Lauterbach (Müller). — η. GALLIA: *Vosges*, forêt de Boremont, près de Bruyères (Boulay).

OBS. — Il est possible que le *R. acutibasis* Sud. in hb. Müller, *Diagn.* p. 53 (1906) ne soit qu'une forme grêle, à folioles étroites, de la var. δ. Fleurs? — *Prov. rhénana*, Eifel (Wirtgen).

## HYBRIDÆ

*R. LEJEUNEI* v. ζ × *TOMENTOSUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 153 (1905); *R. PALLIDIFLORUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 425 (1889). — Glandulae longae, folia discolora, superiora supra tomentella, flores rosei staminibus albis; sterilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, de la Hainbach à Gleisweiler (Müller).

*R. LEJEUNEI* × *ROSACEUS*; *R. WATHELETHII* Sud. in hb. *Hort. Bruxel.* — Differt a *R. Lejeunei* Wh. foliola latiora, inflorescentia brevi, sepalis patulis, floribus sterilibus.

BELGIA: Ramelot (Wathelet).

### Conspectus speciei et subspecierum

#### I. — Turio pilosus.

A. — Turio heteranthecissimus glandulosusque.

a. — Folium caulinum terminale ellipticum, late rhombum vel obovatum..... *R. Lejeunei* Wh.  
b. — Folium caulinum terminale latum, ovatum vel suborbiculare, emarginatum..... *R. EMARGINATUS* P.-J. Müll. B.

B. — Turio aculeis subaequalibus, glandulis rarior munitus..... *R. FORMIDABILIS* L. et M. C.  
II. — Turio fere glaber; inflorescentia parum armata..... *R. BALNEARIENSIS* Sud. D.

OBS. — Le suivant, dont je n'ai pas vu de spécimens, semble intermédiaire entre le *R. Lejeunei* Wh. et le *R. emarginatus* P.-J. Müll.

*R. euprepes* Focke Abb. N. V. *Bremen* XIV, 75 (1897); ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 543. — Differt a *R. Lejeunei* Wh. foliis duplikato-serratis, foliolis laterialibus, terminalibus emarginatis, breviter acuminatis. Foliola omnia petiolulata. — ITALIA: *Liguria*, Pegli, prope Gênes (Focke).

B. — (T. CLXXIV) — **R. emarginatus** P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 34 p. 164; *Vers.* n° 138; *R. napaeus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 543 (1902)?

Differt a *R. Lejeunei* Wh.: foliis (1) superioribus subtus leviter cinerascentibus, foliolis latioribus, terminalibus late ovatis vel suborbicularibus, cordatis, abrupte et breviter acuminatis. — *Turio* angulatus, sparsim pilosus, heteranthecissimus glandulosusque; *serratura* grossa; *inflorescentia* pilosa, parum foliosa, glandulis longis munita, pedunculis patulis (2, 3); *calyx* reflexus; *petala* (4) emarginata, rosea; *stamina* alba stylis pallidos superantia; *germina* glabra.

β. **OBLONGATUS**; *R. oblongatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 122 (1859). — Folia inaequilatera mucronato-serrata, subtus viridia; foliola minus lata, abrupte acuminata; inflorescentia laxa, brevis, aphylla; petala late rosea; stamina stylique pallida.

γ. **CARNEIFLORUS**; *R. carneiflorus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 108 (1859). — Gracilior; folia grosse serrata, subtus viridia; folium terminale late ovatum; inflorescentia densa; flores purpurei.

δ. **ATROBURENS**; *R. atrorubens* M. et Lef. *Vers.* n° 119 (1859). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 112! ; Sud. *Rub. rar.* n° 135! — Validus; folia 5-nata, grosse serrata, subtus viridia; foliolum terminale suborbiculare, breviter et abrupte acuminatum; inflorescentia elongata, aculeis reclinatis falcativis armatissima; petala late rosea; stamina stylique pallida; germina glabrescentia.

ε. **CRISPUS**; *R. crispus* L. et M. *Vers.* n° 85 (1859). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 136! — Folia grosse et inaequilatera subinciso-serrata *R. discerptum* P.-J. Müll. revocant; dentes præcipui refracti; foliolum caulinum terminale ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; folia ramealia superiora parum discolora; inflorescentia sœpe valde foliosa, aculeis curvatis armata; petala, stamina stylique rosea; germina pilosa.

ζ. **BREVIS**; *R. brevis* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* p. 33 (1870); O. B. Z. (1871) p. 98, 127; *R. Kœhleri* β. *Reuteri* II *brevis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 598 (1902). — Turio obtusus, pilosus; dentes parum profundi; foliolum caulinum terminale ovatum, emarginatum, sensim acuminatum; inflorescentia brevis; germina pilosa.

η. **ROSELLINUS** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1910), 291. — Turio parce pilosus; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, breviter acuminatum; inflorescentia foliosa, pedunculis ascendentibus; petala dilute rosea; stamina rosea, styli vires centes; germina glabrescentia.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, prope Bobenthal (Müller); *Bavaria*, Vaging (Progel); HELVETIA: Rigi, Lugano, Luino (Focke). — β. *Alsacia*, Weissenburg, Alsbach (Müller). — γ. *Alsacia*, la Reissbach, prope Weissenburg (Müller). — δ. GALLIA: *Valois*, forêt de Retz, au Rond-Capitaine, à Cuvergnon (Lefèvre); *Seine-et-Oise*, forêt de Rambouillet. — ε. GALLIA: *Valois*, bois de Lévignen (Lefèvre), de Fontaines (Questier). — ζ. HELVETIA: Schaffhouse (Gremli). — η. GALLIA: *Ariège*, Carcanières.

C. — (T. CLXXIV) — **R. FORMIDABILIS** Lef. et M. *Vers.* n° 65 (1859); *R. blandulus* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 72 (1902); *R. rosaceus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 99, ex pte.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 381; *Rub. gall.* n° 177 (s. n. *R. rosacei*); Sud. *Bat. eur.* n° 546! 547; Billot n° 970 (*R. Lejeunei*).

Robustus; *turio* faciebus planis, laxe pilosus, subeglandulosus, aculeis subaequalibus, validis armatus; *folia* (5) ampla, 5-nata, subtus viridia et parce pilosa, grosse et inaequilatera serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel orbiculare, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio duplo longius, infima petiolulata; *ramus* pilosus, sparsim glandulosus, aculeis validis munitus, foliis grosse dentatis, subtus viridibus; *inflorescentia* (6, 7) laxa, grandis, pyramidalis, subaphylla, laxe hirsuta, glandulis erubescensibus, longis, aculeis crebris, validis, rectis reclinatis ins-tructa, pedunculis elongatis, multifloris, patulo-ascendentibus; *sepala* pilosa, aculeata, in fructu reflexa (8); *petala* (9) late ovata, rubra; *stamina* alba vel dilute rosea stylis pallide roseos superantia; *germina* glabra; *pollen* parum admixtum.

GALLIA: *Aisne* et *Oise*, forêt de Retz, cant. de Betz (Lefèvre, Questier), bois de Pierrefond, à Beauvieux (Levent); *Seine-et-Oise*, Montfort-l'Amaury (M<sup>le</sup> Bélèze); *Seine*, Clamart (B. de Lesdain); BRITANNIA: *Surrey*, Walton, Common (Wolley-Dod).

D. — (T. CLXXIV) — **R. balneariensis** Sud. *Rub. Pyr.* p. 154 (1901); *R. Lejeunei* Schmid. exsicc. ; *R. Buserianus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) n° 1!

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 137!

*Turio* angulatus, fere glaber, heteranthecissimus glandulosusque; *folia* 5-nata (10), subtus viridia, parce pilosa, argute et subaequaliter serrata; *foliolum* terminale ovatum vel breviter obovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* parce pilosus; foliis subtus viridibus, argute serratis; *inflorescentia* (11, 12) pyramidalis, parum foliosa, breviter pilosa, dense glandulosus, aculeis tenuibus vel mediocribus munita, pedunculis mediis patulis, multifloris; *sepala* viridia,

breviter pilosa, glandulosa aculeataque, post anthesin patula; *petala* (13) lâete rosea; *stamina* rubra stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *pollen* parum admixtum.

*β. REVERSUS* Sud. *Bat. eur.* p. 29 (1904) et exsicc. n° 84! — Sepala reflexa; inflorescentia densa, foliosa, pedunculis ascendentibus.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Castelviel, prope Luchon; HELVETIA: Cant. *Fribourg*, bois d'Estavoyer-le-Gibboux (Schmidely), Bouleyre, prope Buile (Jaquet), etc.

97 — (T. CLXXV) — **R. ROSACEUS** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. germ.* I p. 685 (1825); W. et N. *Rub. germ.* p. 85 t. XXXVI; Focke *Syn.* p. 345; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 594; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 99; ex pte; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 78; Sud. ap. Gand. *Nov. Consp.* p. 153; *R. aculeatissimus* Kalt. *Fl. v. Aach.* p. 300; *R. heteracanthus* Lej. *Rev. Fl. Spa.*; *R. trachycalyx* Progel hb. p.p.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 187; *Assoc. Rub.* n° 652; Baenitz *Hb. eur.* n° 10344 (var.); *Rub. gall.* n° 141, 142; Sud. *Rub. rar.* n° 138.

*Turio* (1) scandens vel procumbens, angulatus, faciebus planis vel convexis, fusco-purpureus, glaber vel sparsim pilosus, glandulosus, aculeis inæqualissimis, majoribus compressis, rectis, minoribus acicularibus vel papulæformibus; *folia* (2, 3) plerumque 5-nata, supra glabra vel glabrescentia, subtus viridia et parum pilosa, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolus* parce pilosus, glandulosus, aculeis reclinatis falcatisve munitus; *stipulae* lineares, alte adnatae, glandulosæ; *ramus* florifer leviter angulatus, parce pilosus, aculeis tenuibus, reclinatis subfalcatisve munitus, foliis 3-natis, grosse serratis, subtus viridibus; *inflorescentia* (4) brevis, obtusa, folia parum superans, saepè usque apicem foliosa, laxe pilosa, glandulæ purpureis, crebris, longis, aculeis mediocribus, reclinatis falcatisve instructa (5); *pedunculi* medii patuli, pedicellis brevibus; *sepala* tomentoso-viridia, breviter pilosa, glandulosa, post anthesin laxe reflexa, patula vel fructum ± amplectentia (6); *petala* (7) ovata vel breviter obovata, rubra; *stamina* rosea stylos virescentes superantia; *germina* glabra; *receptaculum* parce pilosum. *Pollen* parum admixtum (8). — Julius.

*β. RUTILANS* Sud. *Rub. tarn.* p. 48 (1909). — Turio glabrescens; foliolum terminale ovatum, acuminatum; dentes grossi; aculei rameales falcati; inflorescentia apice attenuata, sepala patula; *stamina* rosea stylos rubros superantia.

*γ. VALENS* Sud. l. c. p. 48 (1908); *R. Menkei* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 209, non Wh. — Turio parce pilosus; *folia* ut in typo sed subtus pilosiora; inflorescentia minus brevis, parce pilosa, aculeis validis armata; *sepala* dense glandulosæ aculeata; *stamina* stylique rosea.

*δ. SCABIPES*; *R. scabipes* Genev. *Mém. Soc. Ac. M. et L.* (1860); *Mon.* p. 94; *R. Sprengelii* Bor. *Fl. Cent.* ed. 3, II, p. 210, p.p.; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 63; *R. rosaceus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 78, silt. ex pte. — Exsicc. *Set of Brit. Rub.* n° 21. — Validus; turio parce pilosus; folia supra parce pilosa; foliolum caul. terminale orbiculare vel obovato-orbiculare, abrupte acuminatum; serratura acuta, inæqualis; inflorescentia minus brevis, laxior, rachide hirsuta; *sepala* patula; *stamina* stylique pallide rosea.

In nemoribus montosis. — GERMANIA OCCIDENTALIS et BAVARIA, BELGIA, BRITANNIA, GALLIA BOREALIS. — *β.* et *γ.* GALLIA: *Tarn.* — *δ* GALLIA: Vendée, La Verrie, au Chiron de la Roche, à la Vachonière (Genevier); BRITANNIA: *Somerset*, prope Chard (Murray).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folia grosse et inæqualiter serrata; rachis ± pilosa.

- A. — Turio epruinosus; inflorescentia vulgo densa.
  - a. — Inflorescentia rubra, aculeis rectis vel parum arcuatis munita.....
  - b. — Inflorescentia pallida, aculeis pallidis, crebris, falcatis.....
- B. — Turio ± epruinosus; inflorescentia laxa, pedunculis patulis.....

II. — Folia minute serrata; inflorescentia armatissima, rubra, epilosa vel parce pilosa.

- A. — Calyx erectus; folia subtus parce pilosa.....
- B. — Calyx in fructu laxe reflexus; folia subtus molliter pubescenti-cinerea; *germina* pilosa.....

b. — (T. CLXXVI) — **R. drepanophorus** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* II (1904) p. 24.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 548, 549.

*Turio* glaber, epruinosus; *folia* (1) supra glabra, subtus viridia pubescentiaque, mediocriter vel grosse serrata; *folium* terminale orbiculare, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo longius; *rami* aculei falcati, flavescentes; *inflorescentia* basi foliosa, interrupta, hirsuta, aculeis crebris (2, 3), flavescentibus, elongatis, plerumque falcatis armatisima; *pedunculi* breves, patuli, pedicellis divaricatis; *sepala* acuminata, fructum laxe amplectentia; *petala* (4) angusta, rosea; *stamina* alba stylos pallidos parum superantia; *germina* glabra.

GALLIA: Puy-de-Dôme, Collanges, Mons, Arlanc; *Cantal*, le Fayet de la Chapelle-Laurent (Charbonnel); BAVARIA: Tettenhausen (Progel).

#### HYBRIDÆ

*R. DREPANOPHORUS* × *ULMIFOLIUS*; *R. DREPANOPHOROIDES* Sud. — Turio et ramus glabri, parce glandulosi; folia caulinæ 5-nata, discolora, figura foliorum *R. drepanophorum* revocant; aculei petiolares uncinati; flores lâete rosei, steriles.

GALLIA: *Cantal*, Prunhes de Massiac (Charbonnel).

*R. DREPANOPHORUS* × *TOMENTOTUS Lloydianus*; *R. DREPANOPHOROMORPHUS* Sud. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 550! — Habitus *R. drepanophori* sed folia discolora, bracteæ latæ, aculei ± flavescentes, flores albi, steriles.

GALLIA: *Cantal*, via S. Pouey, La Chapelle-Laurent (Charbonnel).

*R. DREPANOPHORUS* × *COLEMANNII*; *R. HEMIDREPANOPHORUS*. — Folia et turio ut in *R. Colemannii* Blox. sed aculei crebriores, inæquales, flores parvi, sepala patula ut in *R. drepanophoro*. Sterilis.

GALLIA: *Cantal*, bois des Margerides (Charbonnel).

c. — (T. CLXXVI) — **R. rosaceifrons** Sud. in hb. Bicknell.

A *R. rosaceo* Wh. dignoscitur: turione glaucescenti, foliis (9) minute serratis, supra parce pilosis, subtus molliter pubescentibus, foliolo caul. terminali orbiculari, profunde cordato, breviter acuminato; inflorescentia laxa, breviter pilosa, rubra, aculeis rectis, validis armata (10, 11). *Sepala* in flore reflexa, deinde...?; *petala* (12) rosea; *stamina* purpurea stylos dilute roseos superantia; *germina* hirsuta. *Pollen* parum admixtum.

ITALIA: Liguria, supra Perinaldo (C. Bicknell).

## HYBRIDA

*R. ROSACEIFRONS*  $\times$  *INCANESCENS*; *R. LIGURINUS* Sud. *in hb.* Bicknell. — *Turio pruinosis, glaber, heteracanthissimus; folia 3-5-nata, discolora; foliolum terminale orbiculare, cordatum; rachis hirsuta, glandulis purpureis obsita; flores albi. Pollen atrophum.*

ITALIA: *Liguria*, supra Perinaldo (Cl. Bicknell).

B. — (T. CLXXVI) — *R. coronatus* N. Boul. *Ann. Assoc. rub.* n° 504 (1882); Sud. *Bat. p. 30*; *R. Sprengelii*  $\times$  *foliosus* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 125.*

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 504; *Rub. gall.* n° 86; Sud. *Bat. eur.* n° 87, 551.

*Turio* obsolete angulatus, glaucescens, parce pilosus, aculeis reclinatis vel leviter falcatis munitus; *folia* 3-5-nata (5), supra glabra, subtus viridia, parce pilosa, grosse dentata; *foliolum* terminale late ovatum, cordatum, acuminatum, petiolulo proprio duplo vel triplo longius; *inflorescentia* elongata, subaphylla, laxissima, breviter pilosa, aculeis crebris, pallidis, rectis vel subfalcatis armata (6, 7); *pedunculi* medii patuli, longi; *sepala* dense aculeata, appendiculata, diverse patula; *petala* (8) lâete rosea; *stamina* dilute rosea styllos superantia; *germina* glabra.

$\beta$ . *GRANDICUSPIDATUS* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909). — *Turio* glaber, pruinosisimus; *folia* grosse et profunde duplicato-serrata; *foliolum* caul. terminale obovato-orbiculare, longe et abrupte acuminatum; *inflorescentia* armatissima; *stamina* alba stylos virescentes superantia. Pollinis gradus puritatis 9/10. Fertilissimus.

$\gamma$ . *PATULIFLORUS* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909). — *Folia* inæqualiter dentata, subtus pallida,  $\pm$  cinerascentia; *turio* glaber, angulatus; *inflorescentia* brevis, aphylla, laxa, pedunculis longis, patulis, aculeis flavescentibus munita; *stamina* stylique pallida. Pollinis gradus puritatis 9/10.

GALLIA: *Nord*, bois de Phalempin (Boulay); *Valois*, forêt de Retz (Questier); BELGIA: Prov. *Namur*, Louette-St-Pierre (Gravet), Nyle-Tharoul (Wathelet). —  $\beta$ . et  $\gamma$ . GALLIA: *Tarn*,  $\beta$ . St-Martin-Laguépie;  $\gamma$ . Sérénac.

C. — (T. CLXXVI) — *R. lithophilus* Sud. *Rub. Pyr. p. 24* (1898); *R. buhnensis* f. *latifolia* Progel *hb.*

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10344 (s. n. *R. absconditi*); Sud. *Rub. rar.* n° 139.

*Turio* angulatus, glaucescens, fere glaber heteracanthissimus; *folia* (13) plerumque 3-nata, nonnulla 5-nata, subtus viridia pubescentiaque, minute et subæqualiter serriculata; *foliolum* caul. terminale late ovatum vel suborbiculare, leviter emarginatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, laxa, lata, rachide parce pilosa, glandulis purpureis, longis, crebris, aculeis numerosis, elongatis, rectis reclinatisve armatissima (15); *pedunculi* medii (14) patulo-ascendentes; *sepala* viridia, dense glanduloso-aculeata, in fructu erecta; *petala* (16) ovata, lâete rosea; *stamina* rubra styllos superantia.

$\beta$ . *SERRULATIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909). — *Foliolum* caul. terminale obovatum, basi rotundatum; *inflorescentia* densior, minus armata; *stamina* stylique purpurea.

GALLIA: in *Pyreneis centralibus*, Luchon, Foix, Cauterets, Aulon, Arbas; *Tarn*, Lacabarède; GERMANIA: *Bavaria*, Waldmunchen (Progel). —  $\beta$ . *Tarn*, Peyrebrune, Crespinet.

## HYBRIDÆ

*R. LITHOPHILUS* var.  $\beta$ .  $\times$  *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909); *R. INFERAX* Sud. *I. c.* — *Aculei* subæquales, glandulæ raræ, *folia* discolora, flores rubri, steriles.

GALLIA: *Tarn*, Peyrebrune, cum var.  $\beta$ .

*R. LITHOPHILUS* var.  $\beta$ .  $\times$  *PROCERUS lacertosus* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909); *R. REALMONTENSIS* Sud. *I. c.* — *Habitus* *R. lithophili* var.  $\beta$ . sed parum glandulosus et leviter discolor, flores albi vel roseoli, steriles.

GALLIA: *Tarn*, Cabrol, prope Réalmont.

*R. LITHOPHILUS*  $\times$  *INCANESCENS* Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909); *R. LEUCOCHROUS* Sud. *I. c.* — *Habitus* *R. incanescens* Bert. sed foliis minute serratis, glandulis longioribus, crebroribus, *inflorescentia* armatiore, floribus albis, sterilibus diversus est.

GALLIA: *Tarn*, Lacabarède, bâle de Lamotte.

*R. LITHOPHILUS*  $\times$  *RIVULARIS angustisetus* var. Sud. *Rub. tarn. p. 48* (1909); *R. OBSCURATUS* Sud. *I. c.* — Differt a *R. lithophilo* turionibus teretibus, foliolis minus latis, floribus albis.

GALLIA: *Tarn*, Lamotte, prope Lacabarède.

*R. ROSACEUS*?  $\times$  ...?; *R. RECTISPINUS* N. Boul. *Ronc. vosg. p. 92* (1868) et exsicc. n° 72! — *Turio* glaber, obtusangulus; *folia* satis argute serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum; *inflorescentia* rubra, armatissima, subaphylla; *petala* rosea, *stamina* stylis breviore; *fructus* male evolutus. — *R. rosaceus* Wh. similis, sed verisimiliter hybridus.

GALLIA: *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (N. Boulay).

OBS. — Le groupe du *R. rosaceus* Wh., tel que je le comprends, se rapproche du *R. Lejeunei* Wh. par le *R. coronatus* N. Boul., dont l'*inflorescence* est allongée, et du *R. Hystrix* Wh. par le *R. lithophilus* Sud. Il est surtout reconnaissable à ses larges folioles caulinaires terminales.

98 — (T. CLXXVII) — *R. HYSTRIX* Wh. *in Bluff et Fingerh.* *Comp. Fl. germ. I p. 687* (1825); W. et N. *Rub. germ. p. 92 t. XLI*; Focke *Syn. p. 374*; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 596*; Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl. p. 153*; *R. rosaceus* var. *Hystrix* Rogers *Handb. Brit. Rub. p. 79* (1900); *R. rubescens* Lejeune *Fl. Spa II, p. 340 (nomen)* (1813); *R. thrysiflorus* de Martr.-D. *Fl. Tarn p. 207*, non Wh.; *R. rubelliflorus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. XLVI p. 92* (1899), non Lef.; *R. rosaceus* var. *silvestris* Murray *Fl. Somers. p. 116*; *R. trachycalyx* Progel *p. p.*

Exsicc. — *Set of Brit. Rub. n° 98, 99*; Baenitz *Hb. eur.* n° 8571 (s. n. *R. rosacei*).

*Turio* (1) angulatus, fusco-rubens, epruinosus vel parum glaucescens, glaber vel sparsim pilosus, dense glandulosus, aculeis crebris, inæqualissimis, majoribus compressis, rectis reclinatis, minoribus acicularibus instructus; *folia* (2) plerumque 5-nata, supra obscure viridia, sparsim pilosa, subtus viridia, pallidiora pubescentiaque, satis grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale angustum, rhombeum, basi integrum vel leviter emarginatum, sensim acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* aculeis majoribus reclinatis falcatis munitus; *stipulae* angustæ, glandulosæ; *ramus* angulatus, glabrescens, dense glanduloso-aciculatus, aculeis inæqualissimis, majoribus reclinatis vel leviter falcatis munitus; *folia* 3-nata, subtus viridia, foliolis terminalibus rhombis; *inflorescentia* (3)  $\pm$  pyramidalis, aculeis crebris, longis, fusco-purpureis, inæqualissimis, majoribus reclinatis vel subfalcatis armata (4), pedunculis mediis patulis; *sepala* tomentoso-virescentia, parce vel non pilosa, glanduloso-aciculata, in flore reflexa, post anthesin patula vel laxe erecta (5); *petala* ovata (6, 7), lâete rosea; *stamina* rubra styllos superantia; *germina* glabra; *receptaculum* glabrescens. — Julius.

$\beta$ . *VELATUS*; *R. velatus* Lef. ap. *Genev. Mém. Soc. ac. M. et L. XXVIII p. 32* (1872) et *Mon. p. 97*, ex pte, non Rogers *Handb. p. 92*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 552. — *Turio* parce pilosus; *folia* satis æqualiter serrata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale subovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *rachis* laxe pilosa; *pedunculi* ascendentes; *calyx* erectus; *stamina* stylique pallida.

γ. METUENDUS; *R. metuendus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 151 (1901); *R. rosaceus* Sud. l. c. p. 80, non Wh. — Folia argute serrata, subtus glabrescentia; aculei crebri, validi, pallidi; inflorescentia elongata, armatissima, pedunculis patulis; flores ut in typo; pollen fere purum.

δ. SALLEI; *R. Sallei* Sud. *Diagn.* p. 45 (1906). — Folia ut in typo; inflorescentia pallida, flexuosa, valde foliosa, mediocriter armata, multiflora, rachide breviter pilosa, pedunculis longis, tenuibus. *R. rufescens* L. et M. similis.

ε. MURRAYI; *R. Murrayi* Sud. *Obs. Set. of Brit. Rub.* p. 71 (1904); *R. adornatus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 80, non Müll. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 71. — Differt a typo turione pilosiere, serratura tenuiore, inaequali; foliolo terminali basi dilatato, sensim acuminato, rachide pilosiere.

In memoribus montosis. — GERMANIA OCCIDENTALIS: Becker Bruch, prope Minden et Mennighuffen (Weihe); Siegelau, prope Waldkirch (Goetz); BAVARIA, Waging (Progel); BELGIA, Spa (Lejeune), Wegnez; GALLIA: Valois, Chézy (Questier); Tarn, Lacaune; Pyrénées, Arbas; BRITANNIA: Somerset, Derby, etc.; Hibernia (Rogers). — β GALLIA: Valois, chemin de Vez (Lefèvre); BELGIA: Angleur (Wathelet) — γ. Tarn, Ariège. — δ. Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson, bois de Chemineau (Salle); Valois, forêt de Retz à Arganson (Questier). — ε. BRITANNIA: Dorset! (Murray); frequens (sec. M. Rogers).

OBS. — La var. *Murrayi* tend vers le *R. adornatus* P.-J. Müll. par ses turions velus et vers le *R. rufescens* L. et M. par sa dentelure fine. Elle me semble inseparable du *R. Hystrix* d'Angleterre, dont elle dérive apparemment.

#### Conspectus speciei, subspeciei et microgenerum

I. — Folia inaequaliter, grosse vel mediocriter serrata.

*R. Hystrix* Wh.

*R. abietinus* Sud. b.

II. — Folia minute serriculata, subtus pilosa.

*R. rufescens* L. et M. B.

*R. rubicundus* M. et W. Bb.

b. — (T. CLXXVIII) — *R. abietinus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 24 (1898); Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 58.

*Turio* (1) glaber, aculeis pallidis, reclinatis falcativis armatus; *foliolum* caul. terminale obovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, *inflorescentia* (2, 3) interrupta, foliosa, apice nutans, parum pilosa, pallida; *stamina* dilute rosea stylis breviora; *sepala* erecta; *germina* pilosa.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, Cauterets; Maine-et-Loire, forêt de Longuenée (Bouvet); BAVARIA: Traunsdorf prope Traunstein (Kaufmann).

B. — (T. CLXXVIII) — *R. rufescens* Lef. et M. Vers. n° 90 (1859); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 101; *R. rosaceus* Sbsp. *R. infecundus* Rogers *Journ. Bot.* (1892) p. 338; *Handb. Brit. Rub.* p. 80; *R. thrysiflorus* Bab. p.p.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 242, 765; *Set. of Brit. Rub.* n° 70; Sud. *Rub. rar.* n° 140 (*R. rufescens*), n° 141 (*R. infecundus*).

*Turio* angulatus, fusco-purpureus, sparsim pilosus, glandulosus, aculeis valde inaequalibus munitus; *folia* (4) 5-nata, supra parce pilosa, subtus villosa-velutina, interdum subcinerascentia, argute et subaequaliter serrata; *foliolum* terminale anguste ovatum, ellipticum vel oblongo-obovatum, leviter emarginatum; *ramus* parum armatus, foliis argute serratis; *inflorescentia* (5, 6) obtusa, ovata, ± foliosa, valde multiflora, breviter pilosa, dense glandulosa, aculeis fusco-rubris, tenuibus vel mediocribus, reclinatis falcativis munita; *pedunculi* medii patulo-ascendentes multiflori; *sepala* tomentosa, breviter piloso-glanduloso-aciculata, post anthesin patula vel fructum amplectentia; *petala* (7) obovata, rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

β. TRIFOLIOLATUS; *R. subcanus* Corb. *Fl. Norm.* p. 208, non P.-J. Müll. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 905; *Rub. gall.* n° 191. — Aculei caulinis recti, folia 3-nata, utrinque glabrescentia; *foliolum* terminale oblongo-obovatum; *inflorescentia* densa; *petala* bilobata, rosea; *stamina* alba stylos roseos parum superantia. *Fructus* male evolutus.

γ. ROSACEIFORMIS Sud. *Rub. tarn.* p. 49 (1909). — *Turio* pallidus, pruinosisimus; folia caul. 3-nata, foliolis terminalibus obovatis; *inflorescentia* pyramidalis, pallida, rachide pilosa; *stamina* rosea stylos rubros superantia.

GALLIA: Valois, forêt de Retz, bois de Lévignen (Lefèvre); Meurthe-et-Moselle, forêt de Pouvenelle, à Pont-à-Mousson (Salle), bois Hilarion (Jordan); Nord, Mont des Cats (Boulay); Seine-Inferieure, Dieppe (Letendre); GERMANIA: Prov. rhénana, Eifel (Wirtgen); BRITANNIA: frequens (Rogers). — δ. GALLIA: Manche, circa Cherbourg (Corbière). — γ. GALLIA: Tarn, la Calquière.

#### HYBRIDA

R. RUFESCENS × TERETICAULIS γ; R. SEMIRUFESCENS Sud. *Diagn.* p. 60 (1906); *R. Lejeunei* var. ? in hb. Müller. — Glabrescens; folia grosse serrata; aculei tenues; *sepala* patula; flores late rosei. Parum fertilis.

GALLIA: Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson, forêt de Pouvenelle (Salle).

b. — (T. CLXXVIII) — *R. rubicundus* P.-J. Müll. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 150; *ed.* 2 n° 39 (1861); Focke *Syn.* p. 310; *R. hirtius* v. *purpureus* Wirtg. prius; *R. insericatus* β. *rubicundus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 553 (1902).

Exsicc. — Wirtg. l. c. ed. 1 n° 64, 150; *ed.* 2 n° 39.

*Turio* pilosior quam in *R. rufescens*; *folia* (8) subtiliter mucronato-serriculata; *inflorescentia* (9, 10) foliosa, subinermis vel parum armata, pilosa, glandulosa rubris, longis munita; *sepala* erecta; *petala* (11) late rosea; *stamina* stylos vix superantia. — *R. obscuro* Kalt. similis, sed *turio* heteranthecissimus, glandulæ longissimæ.

GERMANIA: Prov. rhénana, Montabaurer Höhe, prope Coblenz (Wirtgen).

OBS. — R. chalaranthus Genev. 1<sup>er</sup> Suppl. p. 35 (1872); Mon. p. 98, de la forêt d'Allogny (Cher), semble prendre place ici; il m'est inconnu.

99 — (T. CLXXIX) — R. HEBECARPUS P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 282, n° 10; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 28; Sud. ap. Gdg. *Nov. Consp.* p. 158.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 23!

*Turio* (1) obsolete angulatus, epruinosus, parce pilosus, glandulosus, heteranthecissimus, aculeis majoribus compres- sis, rectis reclinatis, minoribus aciculatis; *folia* plerumque 5-nata (2), supra fere glabra, subtus pubescentia, cinereo vel albo-tomentosa, minute et simpliciter mucronato-serrata, mucronibus diverse patulis; *foliolum* terminale breviter obovatum, basi integrum vel leviter emarginatum, abrupte et breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* aculeis falcatis; *stipulae* angustæ; *ramus* obtusus, pilosus, aculeis falcatis armatus, foliis 3-natis, minute serrulatis, discoloribus, foliolis terminalibus obovatis, latis, breviter acuminatis; *inflorescentia* (3) pyramidalis, interrupta, basi foliosa, rachide parce pilosa, aculeis crebris, validis, reclinatis falcativis, glandulosa, aculeata, in flore et fructu reflexa (5); *petala* (6, 7) obovata, alba; *stamina* alba stylos basi roseos æquantia; *germina* pilosa; *receptaculum* pilosum. *Pollinis* gradus puritatis 3/4. Fertilissimus. — Julius.

$\beta$ . HEBECARPOIDES; *R. bavaricus*  $\times$  *pubescens*, *bavaricus*  $\times$  *bifrons*  $\times$  *vestitus*, *bavaricus*  $\times$  *serpens*  $\times$  *bifrons*, etc. Utsch! — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 152. — *Turio angulatus*, *folia parum discolora*, *in umbrosis viridia*, *supra glabra*, *subsim-*  
*pliciter dentata*; *foliolum terminale late ovatum vel suborbiculare*, *emarginatum*, *breviter acuminatum*; *petala roseola*.  
Cetera ut in typo. — *Intermedius inter R. apiculatum* Wh. et *R. hebecarpum* P.-J. Müll.

GALLIA : *Vosges*, vallée de la Vologne, entre Granges et Gérardmer, Retournemer (Boulay); Gérardmer, extrémité N.-O. du lac (Müller), etc. —  $\beta$ . GERMANIA : *Bavaria*, Freyung, Bierhütte (Prechtelsbauer).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Stamina stylos superantia vel iis æquilonga*.

A. — *Inflorescentia aculeis crebris, validis armata*.

a. — *Sepala in fructu reflexa*.

1. — *Folia minute et æqualiter serrata*.

a. — *Turio laxe pilosus*; *folia subtus pubescentia*; *foliolum caul. terminale obovatum*....

b. — *Turio pilosus*; *folia subtus molliter pilosa*; *foliolum caul. terminale ovatum*....

c. — *Turio glaber*; *foliolum caul. terminale ellipticum*....

2. — *Folia inæqualiter et satis grosse serrata*; *turio glabrescens*....

b. — *Sepala in fructu patula*.

1. — *Inflorescentia rachis hirsuta*....

2. — *Inflorescentia rachis parce pilosa*.

a. — *Inflorescentia armatissima*, *foliola ramealia acuminata*....

b. — *Inflorescentia medicriter armata*; *foliola ramealia cuspidata*....

*R. hebecarpus* P.-J. Müll.

*R. INDUSIATUS* Focke b.

*R. DISJUNCTIFLORUS* Sud. c.

*R. ACERATISPINUS* Sud. B.

*R. BAVARICUS* Focke C.

*R. LAPEYROUSIANUS* Sud. D.

*R. VAGABUNDUS* G. Samp. Db.

B. — *Inflorescentia parum armata*; *sepala in fructu reflexa*; *turio glaber*.

a. — *Folia minute mucronato-serrata*, *rachis pilosa*, *turio subteres*....

b. — *Folia mediocriter serrata*, *rachis parce pilosa*, *turio angulatus*....

*R. DORANUS* Sud. E.

*R. SPISSIFOLIUS* Sud. F.

II. — *Stamina stylis breviora, calyx erectus*.

A. — *Inflorescentia rachis glabrescens*....

B. — *Inflorescentia rachis pilosa*; *dentes tenues*....

*R. RUBRIGLANDULOSUS* Sud. Fb.

*R. TENUICUSPIDATUS* Sud. Fc.

b. — (T. CLXXX) — *R. indusiatus* Focke *Syn. p. 284* (1877); *R. macrostachys* B *indusiatus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 567* (1902).

Diffr. a *R. hebecarpo* P.-J. Müll. *turione debiliore*, *pilosore*; *foliis (1)* *subtus molliter piloso-velutinis*; *foliolو caul. terminale ovato*, *emarginato*, *acuminata*; *inflorescentia (2)* *densa*, *hirsuta* — *Folia supra parce pilosa*, *acute et subsim-*  
*pliciter serrata*; *petala (3)* *alba vel roseola*, *stamina stylos parum superantia*; *germina pilosa*. — Forma vergens in  
*R. apiculatum* var. e.

GERMANIA : *Bavaria*, circa Traunstein, Waging, Gessenberg (Progel); BELGIA : Sauheid (Aigret).

c. — (T. CLXXX) — *R. disjunctiflorus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 321.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9040 ! (s. n. *R. disjuncti* non M. et L.).

A *R. hebecarpo* P.-J. Müll. distinguuntur : *turione debiliore*, *glabrescenti*; *foliis (4)* *3-5-natis*, *acute serratis*, *subtus pilo-*  
*sioribus*; *foliolо terminali late elliptico*, *emarginato*, *tenuiter acuminato*; *inflorescentia laxissima*, *pedunculis longis*,  
*divaricatis (5)*, *rachide laxe hirsuta*, *setis glanduliferis longissimis munita*; *germinibus glabrescentibus*.

GERMANIA : *Badenia*, Sieglau, prope Waldkirch (Goetz).

B. — (T. CLXXX) — **R. aceratispinus** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* (1904) p. 23; *R. exasperatus* Progel *hb. p. p.*, *non Lef. et M.*

*Turio (6)* *angulatus*, *faciebus leviter excavatis*, *glabrescens*, *scaberrimus*, *aculeis validissimis armatus*; *folia 5-nata (7)*,  
*inæqualiter et grosse serrata*, *supra glabra*, *subtus appresse cinereo-tomentosa*; *foliolum terminale late ovatum*, *emarginatum*,  
*abrupte acuminatum*, *petiolulo proprio duplo longius*; *petiolо aculei ± adunci*; *ramus angulatus*, *aculeis validis*,  
*falcatis munitus*; *inflorescentia (8)* *brevis*, *foliosa*, *laxe hirsuta*, *aculeis robustis*, *crebris*, *pallidis*, *reclinatis falcatis*  
*instructa*, *pedunculis mediis ascendentibus*; *sepala in fructu reflexa*; *petala (9)* *alba*; *stamina alba* *stylos virentes* vel  
*basi roseos superantia*; *germina pilosa*.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Collanges, prope Dore-l'Eglise; *Cantal*, Lastic(Charbonnel), Cirques-de-Jordanne; GERMANIA : *Bavaria*, Weltenburg (Kaufmann), Tettenhausen prope Traunstein, Taching (Progel).

C. — (T. CLXXX) — **R. bavaricus** Focke; *R. Kœhleri* Sbsp. *R. bavaricus* Focke *Syn. p. 351* (1877); *R. Kœhleri bavaricus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 598*; *R. eudetelus* = *candidans*  $\times$  *vestitus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 211.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 553.

*Turio angulatus*, *epruinosus*, *pilosus*, *aculeis crebris*, *validis armatus*; *folia (10)* *caul. 3-5-nata*, *supra glabra*, *subtus*  
*cinereo vel albo-tomentosa* et *breviter pilosa*, *acute et inæqualiter serrata*; *foliolum terminale ovatum*, *emarginatum*,  
*acuminatum*; *inflorescentia lata*,  $\pm$  *foliosa*, *flavescens*, *hirsuta*, *aculeis crebris*, *reclinatis falcatis* *munita*, *pedunculis*  
*mediis valde patulis (11)*; *sepala patula* vel *laxe reflexa*; *petala (12)* *alba* vel *dilute rosea*; *stamina stylos pallidos*  
*superantia*.

$\beta$ . HELVETICUS; *R. brevis* Schmid. exsicc. — *Turio parce pilosus*; *glandulæ rubræ*, *pedunculi patulo-ascendentes*;  
*stamina stylos superantia*.

$\gamma$ . INFESTIFORMIS; *R. infestiformis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 321; *R. cordifolius*  $\times$  *infestus* F. Kretzer *ap. Baenitz Hb. eur.* n° 9037 et exsicc.; *R. exasperatus* Progel *p. p. non L. et M.* — *Turio glabrescens*, *aculeis robustis*, *curvatis arma-*  
*tus*; *foliolum caul. terminale late ovatum*; *sepala patula*, *petala alba*, *stamina stylos superantia*; *germina glabra*.

$\delta$ . SCRUPUS; *R. scrupeus* Progel *Fl. Amts. Waldm.* p. 7 (1889), *ex pte, exsicc.* n° 775; *R. subbavaricus* Sabrs. O. B. Z. (1895) n° 8; *R. intractabilis* Sabrs. exsicc. non P.-J. Müll.; *R. pseudopilocarpus* Sabrs. in hb. Sud. non Schmid. — *Turio glabrescens*; *foliolum caul. terminale late ovatum*; *aculei pallidi*; *stamina stylos vix æquantia*; *germina pilosa*. Forma vergens in *R. pilocarpum* Grli.

$\epsilon$ . SCHARNOSINENSIS (Sprib. in hb. Sud.) — *Gracilis et subvirescens*; *turio pilosus*; *foliolum caul. terminale obovato-*  
*rhombeum*; *stamina stylos æquantia*; *germina glabra*.

$\zeta$ . RUFIGLANDULOSUS Progel hb. — *Turio glabrescens*; *folia argute serrulata*; *foliolum caul. terminale obovatum*, *cuspi-*  
*datum*; *rachis laxe pilosa*; *sepala erecta*, *stylis rosei*, *germina glabra*; *glandulæ rufæ*, *densissimæ*. *R. lithophilo* similis.

n. TERRIBILIS ; *R. sacerdos* (Hol.) var. *terribilis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) 246. — *Turio glaber*; aculei flavescens; folia subtus canescens-viridia; foliolum terminale obovatum, longe acuminatum; rachis pilosa, foliosa; stamina stylos sequentia; germina glabra.

GERMANIA : *Bavaria, Saxonia*; AUSTRIA : *Tirolia*; HUNGARIA : Bakabanya. — β. HELVETIA : *Vaud*, Gourze (Schmidely). — γ. GERMANIA : *Guestphalia*, Porta (F. Kretzer); *Bavaria*, Waging (Progel). — δ. GERMANIA : *Bavaria*, Waldmünchen (Progel); *Saxonia*, Waldheim (Kinscher); AUSTRIA : *Styria*, Seeschau (Sabransky). — ε. GERMANIA : *Silesia*, Gross-Strehlitz prope Scharnstein (Spribille). — ζ. GERMANIA : *Bavaria*, prope Tettenhausen (Progel). — η. HUNGARIA : Bakabanya, Uhlska (S. Kupcok).

OBS. — Le *R. maleficus* Holuby O. B. Z. XXV (1875) p. 314 semble appartenir à ce groupe. M'est inconnu.

#### HYBRIDÆ

*R. BAVARICUS* var. δ. × *BIFRONS*; *R. SCRUPIFORMIS* Sud. *Bull. Ac. g. bot.* (1911); *R. pilocarpus?* var. *megalacanthus* Prog. hb. — Aculei inaequales et glandulæ *R. scrupi* sed folia discolora, serratura tenuis *R. bifrontis*. Flores albi, steriles.

GERMANIA : *Bavaria*, Waging prope Traunstein (Progel).

*R. BAVARICUS* var. δ. × *PROCERUS*?; *R. SUDREANUS* Sabrs. *Z. B. G.* (1904) p. 546. — *Turio angulatus*, pilosus, aculeis parum inaequalibus, glandulæ crebris munitus; folia 3-nata, minute serrata, discolora; foliolum terminale late ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia ampla; flores dilute rosei, steriles.

STYRIA ORIENTALIS : Seeschau (Sabransky).

D. — (T. CLXXX) — ***R. Lapeyrouesianus*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 79 (1900).

Validus; *turio* angulatus, glaucescens, fere glaber, heteracanthissimus, aculeis robustis, reclinatis falcatisve armatus; *folia* (13) 5-nata, supra glabra, subtus appresso albo-tomentosa; *foliolum* terminale ovatum, leviter emarginatum, longe acuminatum; dentes inaequales, parum profundi; *ramus* parce pilosus, aculeis validis, majoribus reclinatis falcatisve armatus; *inflorescentia* grandis, pyramidalis, ± foliosa, breviter pilosa, aculeis crebrimis, validis (14), rectis vel reclinatis; *pedunculi* (15) medii breves, 2-3-flori, floribus longe pedicellatis; *sepala* aculeata, imperfecte reflexa; *petala* (16) alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia. *Pollen* parum admixtum.

GALLIA : Ariège, Ax, vallée d'Orgeix; route de l'Aude, près de Lavail.

b. — (T. CLXXXI) — *R. vagabundus* G. Samp. in *Revista* (1904); *Rub. Port.* p. 69.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 182.

Intermedius inter *R. hebecarpum* P.-J. Müll. et *R. Lapeyrouesianum* Sud. — *Turio angulatus*, parce pilosus, epruinosus, dense glandulosus, aculeis reclinatis falcatisve armatus; *folia* 3-5-nata (1), supra glabrescentia, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, minute et simpliciter mucronato-serrata; *foliolum* terminale late ovatum vel obovato-orbiculare, emarginatum, acuminatum; *ramus* pilosus, angulatus, aculeis brevibus, obliquis, ± falcatis; *foliolum* terminale obovato-orbiculare, cuspidatum; *inflorescentia* (2-8) angusta, interrupta, pallida, breviter pilosa, aculeis tenuibus, pedunculis brevibus; *sepala* patula vel imperfecte reflexa; *petala* alba; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia; *germina* glabra.

LUSITANIA : Vieira, Salamonde; Montalegre, Ponteira (G. Sampaio).

E. — (T. CLXXXI) — ***R. doranus*** Sud. *Bat. p.* 13 (1903); *R. longiculpis* Genev. *Mon.* p. 190, ex pte, (nom. *infaust.*), non *R. longicuspis* P.-J. Müll.; *R. vestitus* × *Bellardii* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 127.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 40!

*Turio* obsolete angulatus, glaber vel parce pilosus, aculeis inaequalissimis, crebris, plerumque conicis; *folia* (4) caul. 5-nata, nonnulla 3-4-nata, supra glabra, subtus pubescentia, cinereo vel albo-tomentosa, in umbrosis viridia, subtiliter mucronato-denticulata; *foliolum* caulinarium terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; *stipulae* lanceolatae; *ramus* obtusangulus, parce pilosus, aculeis rectis, reclinatisve munitus; *folia* subtiliter mucronato-serriculata, foliolis acuminatis; *inflorescentia* magna, pyramidalis, ± foliosa, pilosa, aculeis crebris, vulgo pallidis, tenuibus vel mediocribus (5), pedunculis mediis (6) patulis, multifloris; *sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa aculeataque, post anthesin reflexa; *petala* alba, magna (7); *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra. Fertilis.

GALLIA : Puy-de-Dôme, le Mont-Dore, la Bourboule, base du puy de Dôme.

F. — (T. CLXXXI) — ***R. spissifolius*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 155 (1901); *R. Menkei* Genev. *Mon.* p. 113, ex pte, non Wh. Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10362 (s. n. *R. exasperati* non Lef. et M.).

*Turio* angulatus, glabrescens, glaucescens, aculeis compressis; *folia* (8) supra glabra, subtus cinereo vel albo-tomentosa, pubescentia, inaequaliter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale ovatum vel suborbicularis, leviter emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* erubescens, densa, saepe breviter pilosa, dense glandulosa, usque apicem foliosa, aculeis (9) sparsis, tenuibus parum armata, pedicellis (10) brevibus; *sepala* reflexa; *flores* albi (11); *germina* glabra. Fertilis.

GALLIA : Pyrénées, Luchon; Tarn, Crespinet; Allier, Cusset, à l'Ardoisière; GERMANIA : Badenia, propre Waldkirch (Goetz).

b. — (T. CLXXXI) — *R. rubriglandulosus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 327; *R. denticulatus* (Kerner) Focke *Syn.* 282, ex pte.

Exsicc. — Progel n° 39; Baenitz *Hb. eur.* n° 9525 (s. n. *R. decori* non P.-J. Müll.).

*R. spissifolius* similis, a quo differt: foliis caul. plerumque 3-natis (12), foliolis minus latis, argute serratis; inflorescentia glandulosa purpurea, longissimis, dense obsita (13), aculeis validis armata; sepalis erectis, staminibus brevissimis (14).

β. ABNORMIS Sud. in *Monit. Tiflis.* p. 5 (1909). — Folia magna, grosse et inaequaliter serrata; inflorescentia foliosa, parce pilosa, glandulosa longissimis sed sparsis, relative raris, aculeis tenuibus munita; pedunculi tenues, ascendentis, mediis 2-3-flori; *sepala* dense glandulosa; cetera ut in typo.

GALLIA : Tarn, Vayssières-Escure, propre les Faillades; Puy-de-Dôme, Tauvet (Lamotte); GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz). — β. ROSSIA MERIDIONALIS : prov. Batoum (Woronow); *Bavaria*, Waging (Progel); Traunstein (Kaufmann).

c. — (T. CLXXXI) — *R. tenuicuspitatus* Sud. *Rub. tarn.* p. 49 (1909).

*Turio* obsolete angulatus, pilosus; *folia* 3-nata (15), minute denticulata, discolora; *foliolum* terminale obovatum, leviter emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* pyramidalis, magna, aphylla, hirsuta (16), aculeis erubescens, mediocribus munita, pedunculis patulis (17), multifloris; *sepala* patula vel erecta; *flores* albi; *stamina* stylis breviora; *germina* glabra.

GALLIA : Tarn, bois de Brassac.

**100** — (T. CLXXXII) — **R. KOEHLERI** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* p. 681 (1825); Wh. et N. Rub. *Germ.* p. 71 t. XXV; Focke *Syn.* p. 348 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 595; Hal. *Oest. bromb.* p. 263; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 105; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 82, *salt. ex pte*; Barber *Fl. Oberl.* III p. 89 et var. *appendiculatus* ej. l. c. p. 91 (1911); *R. heterogenes* Boul. et Vendrely, *exsicc.* (1873); *R. raripilus* N. Boul. *exsicc.* (1873); *R. glandulososrudis* J. Harmand *Rub. M.-et-M.* p. 37 pl. XV (1887); *R. savus* Holuby *O. B. Z.* (1873), 383; *R. pygmæus* f. *thuringensis* G. Graun *exsicc.* n° 137.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 55; *ed.* 2 n° 40; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 76, 137, 138; Assoc. *rub.* n° 41 (*R. raripilus*), 46 (*R. heterogenes*), 655; *Rub. gall.* n° 87; Baenitz *Hb. eur.* n° 9551 (*R. pætreus*), 9563 (*R. pygmæus*) 10378, 10381 (*f. umbrosa*); N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 14 (*R. horridicaulis* f. *silvat.*); Sud. *Bat. eur.* n° 146.

**Turio** (1) angulatus, faciebus planis vel convexis, epuruinosus, glabrescens, glandulis sparsis, elongatis, aculeis creberimis, inæqualisimis, majoribus compressis, rectis reclinatisve, minoribus acicularibus; *folia* plerumque 5-nata (2), supra-glabra, subitus viridia, pubescens, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, acuminate, petiolulo proprio triplo longius, infima breviter petiolata; petiolus parce pilosus, glandulosus, aculeis falcatis armatus; *stipulae* lineares, glandulosæ; *ramus* angulatus, parce pilosus, heteracanthissimus, aculeis validis, crebris, longis, reclinatis vel leviter falcatis munitus; *folia* 3-nata, subitus viridia, grosse serrata, foliolis acuminatis, terminalibus ovatis-ellipticisve; *inflorescentia* ± elongata (3), vulgo usque apicem foliosa, obtusa, laxe pilosa, aculeis crebris, pallidis vel suberubescens, validis, fere rectis, glandulis inæqualibus, plerumque longissimis dense obsita (4); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, longi, pluriflori; *sepala* tomentoso-viridia, pilosa, glandulosa aculeataque, appendiculata, post anthesin laxe reflexa (5); *petala* ovata (6, 7), in unguem attenuata, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* glabrescens. Pollen admixtum (8). — Julius.

β. COGNATUS Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 83 (1900); *R. cognatus* N. E. Brown in E. B. *ed.* 3 *Suppl.* p. 101 (1892) *p. p.*; *R. debilis* Bab. *Journ. Bot.* (1895) p. 102, *p. p.*, non N. Boul. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 41. — Foliolum caul. terminale late ovatum vel suborbiculare, basi rotundatum vel vix emarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia densior, minus armata.

γ. LONGISPICULUS. — Aculei caulinis tenuiores; serratura minus grossa; foliolum terminale orbiculare, cordatum, omnia latissima, marginibus sese tegentia; inflorescentia parum foliosa, acuta, pedunculus valde patulis; petala angusta. *R. rivulari* M. et W. similis.

δ. SETULOSUS; *R. setulosus* M. et Lef. *Vers.* n° 135 (1859); *R. rufus* × *hirtus nigricatus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* p. 130. — Aculei breviores, minus crebri; rachis breviter pilosa, mediocriter armata, glandulis relative brevibus; fructus imperfектus. — An *R. spinulifer* ×?

ε. STENOBOTRYS; *R. stenobotrys* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 35 et *exsicc.* n° 28 (1866); *R. Schleicheri* × *hirtus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI, p. 131, *ex pte* (1900). — Turio minus angulatus quam in typo, leviter pilosus, glaucescens; inflorescentia angusta, foliosa, erubescens, aculeis falcatis armata. *R. Schleicheri* Wh. similis.

In locis montosis, ad silvarum margines. — GERMANIA : *Silesia, Bavaria, Saxonia, Prov. rhenana*; AUSTRIA : *Moravia, Bohemia, etc.*; BELGIA; BRITANNIA; GALLIA : *Vosges, Haute-Saône, Orne, Puy-de-Dôme*; ITALIA : *Liguria* (Cl. Bicknell). — β. BRITANNIA, HIBERNIA (Rogers). — γ. ALSATIA (Müller). — δ. GALLIA : *Oise*, bois du Roi: *Aisne*, Boissy-Fresnoy (Lefèvre), St-André (Questier). — ε. GALLIA : *Vosges*, forêt de St-Gorgon, près de Rambervillers (Boulay).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — Sepala in fructu laxe reflexa.

A. — Stamina stylis superantia; aculei rameales reclinati falcative.

a. — Foliolum caul. terminale basi latum, cordatum, ovatum vel suborbiculare.

1. — Turio glabrescens.

A. — Dentes grossi; inflorescentia parum pilosa, laxa.....

B. — Dentes tenues; inflorescentia hirsuta, densa, parum foliosa.....

2. — Turio pilosus; rachis hirsuta, parum armata.....

b. — Foliolum caul. terminale ellipticum vel obovatum, basi subrotundatum, serratura inæqualis; rachis parce pilosa.

1. — Turio parce pilosus; aculei ± fusi.....

2. — Turio glaber; aculei flavescens.....

c. — Foliolum caul. terminale rhombum; serratura tenuissima; inflorescentia armatissima.....

B. — Stamina stylis breviora; aculei rameales adunci.....

R. Koehleri Wh.

R. VALIDISPINUS Sud. b.

R. SPINULATUS N. Boul. c.

R. SPINULIFER M. et L. B.

R. FLAVIRAMUS Sud. Bb.

R. LUPIMONTANUS Figert. Bo.

R. CHENONII Sud. C.

##### II. — Sepala in fructu patula vel erecta.

A. — Folia (præsertim ramealia) grosse et inæqualiter serrata; turio ± pilosus.

a. — Inflorescentia parum armata, glandulis purpureis obsita.

1. — Inflorescentia valde foliosa; Rubi fertiles.....

2. — Inflorescentia subaphylla; fructus male evolutus.....

b. — Inflorescentia armata, pilosa, vulgo ± pallida.

1. — Sepala in fructu patula; dentes vulgo mediocres; aculei flavescens.....

2. — Sepala in fructu erecta; dentes grossi, inæquales.

A. — Folia caul. pleraque 5-nata; foliolum terminale basi ± emarginatum.

a. — Stamina stylos sequantia; dentes profundi.....

b. — Stamina stylos superantia; dentes parum profundi.....

B. — Folia caul. pleraque 3-nata; foliolum terminale basi fere integrum, dentes acutissimi....

R. ASPERIDENS Sud. D.

R. GEREZIACUS G. Samp. Db.

R. REUTERI Merc. E.

R. SUBPYGMÆOPSIS Sprib. Fb.

R. APRICUS Wimm. F.

R. PYGMÆUS Wh. Fc.

B. — Folia (etiam ramealia) minute et æqualiter serrata.

a. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta; turio pilosus; stamina stylos sequantia vel superantia.

1. — Foliolum terminale ovatum; inflorescentia parum armata.....

2. — Foliolum caul. term. suborbiculare; inflorescentia armatissima.....

b. — Inflorescentiae rachis piloso-hirsuta; turio glaber.....

c. — Inflorescentiae rachis glabrescens vel pilis brevibus munita; turio vulgo glaber.

1. — Stamina stylos superantia.

A. — Foliolum caul. terminale suborbiculare.....

B. — Foliolum caul. term. late ovatum, emarginatum; planta fusco-purpurea.....

C. — Foliolum caul. terminale ellipticum vel obovatum.....

2. — Stamina stylis breviora; foliola lata.....

R. SAMICOLUS P.-J. Müll. G.

R. HORRIDICAULIS P.-J. Müll. Gb.

R. LEPTOCERCUS Sud. Dc.

R. ROTUNDELLUS Sud. H.

R. INFUSCATUS P.-J. Müll. Hb.

R. POLYOPON B. et Mot. Hc.

R. IMPOLITUS Sud. Hd.

b. — (T. CLXXXIII) — **R. validispinus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 155 (1901).

Diffr. a *R. Koehleri* Wh. foliis (1) minute mucronato-serriculatis, inflorescentia densa, angusta (2), pedunculis (3) brevibus, patulis, superne aphylla.

GALLIA : in Pyrenæis centralibus, circa Luchon.

## HYBRIDA

*R. VALIDISPINUS × RIVULARIS* (grex); *R. FORTISPINUS* Sud. in hb. Müller. — Differt a *R. validispino* foliis grosse serratis, fructu male evoluto.

GALLIA : in *Pyrenæis centralibus*, circa Luchon.

c. — (T. CLXXXIII) — *R. spinulatus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 101 (1868); *R. vestitus × hirtus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 128, p.p.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 81 !

A *R. Kœhleri* Wh. dignoscitur : *turionibus* minus angulatis, pilosis, aculeis tenuioribus, sparsioribus; *foliis* (4) supra pilosis, subæqualiter et acute dentatis; *foliolo* terminali late ovato vel suborbiculari, abrupte acuminate; *inflorescentia* parum foliosa, minus armata, rachide hirsuta (5), pedunculis patulissimis. *Germina* glabra, petala ovata (6).

♂. DRYMOPHILOIDES; *R. Kœhleri* f. *drymophila* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 10379 (1900). — Turio sublævis, aculeis parum inæqualibus armatus; folia caul. 3-nata; inflorescentia densa; germina parce pilosa.

γ. PRÆRUPTORUM; *R. præruptorum* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 97 (1868) et exsicc. n° 78. — Turio angulatus, aculeis validis munitus; folia caul. plerumque 3-nata, subtus pilosa, foliolis terminalibus ovatis; inflorescentia arcuata; germina glabra.

δ. HORRIDIFORMIS; *R. horridiformis* Müll. et Pierrat *Assoc. rub. exsicc.* n° 338 (1880); Sud. *Rub. rar.* n° 142. — Folia tenuiter mucronato-serrata; stamina stylos æquantia.

GALLIA : *Vosges*, St-Dié, forêt du Camberg (Boulay); *Valois*, forêt de Retz (Questier); *Manche*, Mortain (Henry); STYRIA : Soechau (Sabransky). — β. GERMANY : *Badenia*, Eckleberg (Goetz). — γ. GALLIA : *Vosges*, Saulxures-s.-Moselle, Bambois-de-Bâmont (Pierrat). — δ. GALLIA : *Vosges*, Rochesson (Pierrat); *Corrèze*, Bort.

B. — (T. CLXXXIII) — ***R. spinulifer*** M. et Lef. *Vers.* n° 152 (1859); *R. Kœhleri* γ *spinulifer* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 105 (1900); *R. Kœhleri* Rogers *Handb.* p. 82; ex pte; *R. cannabinus* Gremli *O. B. Z.* (1871) p. 127; *R. subconicus* Kinscher *Allg. Bot. Zest.* (1909) n° 4.

Exsicc. — Set of *Brit. Rub.* n° 127; Sud. *Bat. eur.* n° 554! 555; Baenitz *Hb. eur.* n° 9547.

Differt a *R. Kœhleri* Wh. *turionibus* leviter pilosis, aculeis minus crebris; *foliolo* caul. terminali (7) obovato, basi fere integro, abrupte acuminate, petiolulo proprio duplo vel triplo longiore; *rami* aculeis falcatis, foliolis anguste obovatis, breviter acuminate; *inflorescentia* angusta, vulgo usque apicem foliosa, pedunculis (9) patulo-ascendentibus, rachide parce pilosa, minus armata (8), glandulis minus elongatis. *Sepala* reflexa; *petala* (10) obovata, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* glabra vel parce pilosa. — Intermedius fere inter *R. fuscum* Wh. et *R. Kœhleri* Wh.

GALLIA : *Aisne* et *Oise*, forêt de Retz, Rond-des-Dames, Bourgfontaine, Waligny (Lefèvre, Questier); *Meuse*, Bar-le-Duc (Ninck); *Finistère*, Toull an Dioull; *Sarthe*, Yvré-l'Évêque, forêt de Bercé (Gentil, Henry); BRITANNIA : *Herefordshire*, Woods, Walford (A. Ley), etc.; HELVETIA : Schaffhouse, Welchingen (Greinli); GERMANY : *Badenia* (Goetz), *Saxonia*, *Bavaria*, *Guestphalia*, Freudenberg (Utsch); AUSTRIA : *Moravia*, Weidenan (Hruby), Wall-Meseritsch (Petrak).

## HYBRIDÆ

*R. SPINULIFER × FOLIOSUS corymbosus*; *R. CUNEATIFACTUS* Sud. *Diagn.* p. 45 (1906). — Habitus *R. spinuliferi* M. et L. sed minus heterothecanthus, glandulæ breviores, inflorescentia brevis, parum armata. Substerilis; foliola cuneata.

GALLIA : *Valois*, Châtillon (Questier).

*R. SPINULIFER × ...?* Sud. *Obs. Set of Brit. Rub.* n° 104; *R. OCHRODERMIS* A. Ley *Journ. Bot.* (1893) p. 105; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 91. — Exsicc. : Set of *Brit. Rub.* n° 104! — Gracilis; turio glaber, glaucescens; folia argute serrata, caul. plerumque 3-nata, sæpe subdiscolora; rachis laxe pilosa, aculeis tenuibus, flavescens munita; sepala reflexa. Parum fertilis.

BRITANNIA : *Herefordshire*, Hangh Wood (A. Ley).

b. — (T. CLXXXIII) — *R. flaviramus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 160 (1901).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 143!

Planta viridi-flavescens; *turio* (11) glaber, faciebus planis, aculeis validis, reclinatis; *folia* 3-5-nata, grosse et inæquilater serrata; *foliolum* terminale late ellipticum vel breviter obovatum (12); *folia* ramealia superiora subtus ± cinerascentia; *inflorescentia* foliosa, epilosa, aculeis crebris, validis, obliquis (13), lutescentibus armata, pedunculis ascendentibus; *petala* parva (14), *stamina* alba stylis virescentes superantia; *calyx* reflexus; *germina* glabra. *R. aceratispino* similis.

GALLIA : *Hautes-Pyrénées*, Ys, alt. 800 m.

c. — (T. CLXXXIII) — *R. lupimontanus* Figert ap. Spribille *Beit. Rub. Prov. Schles.* (1904) p. 347.

*Turio* glaber, epruinosus; *folia* 3-5-nata (15), minute et simpliciter mucronato-denticulata; *foliolum* terminale rhombicum, leviter emarginatum; *inflorescentia* glandulis purpureis, aciculis longis dense obsita, rachide pilosa (16, 17); *sepala* laxe reflexa; *flores* albi (18), staminibus longis; *germina* glabra.

SILESIA : Goldberg, Wolfsberg (Figert et Spribille); GALLIA : *Cantal*, Brezons, St-Martin-de-Vigouroux (Charbonnel).

C. — (T. CLXXXIII) — ***R. Chenonii*** Sud. *Diagn.* p. 46 (1906); *Bat. p. 59.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 183!

*Turio* angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, epruinosus, parce pilosus, glandulis brevibus, sparsis, aculeis crebris, pallidis, plerumque reclinatis falcatis munitus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia pubescentiaque, dentibus inæqualibus, mediocribus, parum profundis; *foliolum* terminale (10) breviter obovatum vel obovato-orbiculare, basi integrum vel subemarginatum, cuspidatum vel abrupte acuminatum, longe petiolatum, infima petiolulata; *petiolorum* aculei aduncii; ramus angulatus, pilosus, aculeis crebris, brevibus, obliquis, plerumque geniculatis aduncis armatus, foliis 3-natis, subtus viridibus, grosse serratis, foliolis terminalibus obovatis, nervo medio dense aculeato; *inflorescentia* oblonga, foliosa, laxe hirsuta, glandulis tenuibus, diametrum rachidis fere æquantiibus, aculeis creberrimis, flavescentibus, obliquissimis, falcatis, geniculatis aduncis instructa (20); *sepala* laxe reflexa; *petala* alba, ovata (22); *stamina* stylis virescentibus breviora (21) vel æquilonga; *germina* pilosa vel glabra; *receptaculum* pilosum.

β. ANGULOSUS; *R. angulosus* Gremli *O. B. Z.* (1871) p. 128 et *Hb. norm.* n° 152. — Turio minus angulatus, e pube longiore crebrioreque; foliolum caul. terminale late ovatum, attenuato-acutum. Cetera ut in *R. Chenonii*.

BELGIA : Espinette (du Pré); GALLIA : *Valois*, forêt de Retz, au-dessus du Rond-Capitaine, laie de Cuvergnon (Questier); *Sarthe*, St-Rémy-de-Sillé, à la Pierre-du-Coq (Chenon), Sillé-le-Guillaume (Henry). — β. HELVETIA : Schaffhouse, Welchingen (Greinli).

OBS. — Nettement caractérisé par ses aiguillons très denses, très obliques, vivement courbés. Rappelle un peu le *R. grypoacanthus* M. et Lef., mais est plus hétéracanthe. Ses glandes sont plus courtes que dans les autres sous-espèces du *R. Kœhleri* Wh., ce qui le rapproche un peu du *R. fuscus* Wh.

## HYBRIDA

*R. CHENONII × PROPINQUUS* Sud.; *R. INUNCATUS* Lef. et M. Vers. n° 40 (1859); *R. Questieri × ulmifolius* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 77; *R. propinquus × adscitus* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 141. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 71 ! — Valilius; turio pilosus, glaucescens, aculeis æqualibus; folia 5-nata, ± cinerascentia, foliolis terminalibus obovato-orbicularibus, cuspidatis; aculei rameales petiolaresque crebri, obliquissimi, geniculati uncinative; glandulæ tenues, brevissimæ; flores rosei; stamina alba stylis pallidis breviora. Sterilis.

GALLIA : Oise, chemin de la Tournelle à Ivors.

D. — (T. CLXXXIV) — *R. asperidens* Sud. in Bouv. Rub. Anjou (1907) p. 58; *R. fuscus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 94, ex pte.

Exsicc. : Rub. gall. n° 173 (*R. fuscus* f. *vergens* in *R. pallidum*); Sud. Bat. eur. n° 556, 557.

*R. spinulifero* similis sed: *turio* glaucescens, pilosior; *serratura* inæqualissima, composita; *foliola* marginibus ± crispata, terminale anguste ovatum vel ellipticum (1), leviter emarginatum, petiolulo proprio duplo longius; *aculei* petiolares reclinati vel subfalcati; *ramus* mediocriter armatus; *inflorescentia* usque apicem foliosa, laxe pilosa, erubescens, glandulis inæqualibus, aculeis mediocribus, rectis reclinatisve munita, pedunculis leviter ascendentibus (2); *sepala* post anthesin patula, in flore terminali erecta; *petala* (3) alba, stamina alba stylis virescentes superantia; *germina* pilosa. — Turio heteracanthus ut in *R. Kœhleri* Wh.; inflorescentia parum armata *R. fuscum* Wh. revocat.

β. HYSTRICOIDES; *R. hystricoides* Sud. Diagn. p. 45 (1906). — Serratura æqualior, minus profunda; inflorescentia laxior, armatior, pedunculis patulis; *germina* glabra. — *R. spinulifero* M. et L. similis

γ. HISPIDULICAULIS; *R. hispidulicaulis* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 154 (1905); *R. fuscus* v. *canescens* ferow N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 95. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 38 (s. n. *R. horridicaulis* v. *cuspidati* N. Boul.); Sud. Bat. eur. n° 558. — Foliolum caul. terminale late ovatum emarginatum; inflorescentia densa, parum foliosa.

δ. ISERANUS. — Serratura æqualis; foliolum caul. terminale obovato-rotundatum, cuspidatum; inflorescentia valde foliosa, pedunculis ascendentibus.

GALLIA : Eure-et-Loir, Sarthe, Maine-et-Loire, Seine, Loire-Inférieure, etc.; BELGIA : Isque, la Hulpe, Stockel, Overysche (du Pré), Souheid (Aigret); GERMANIA : Prov. rhénane (Bodewig), Bavaria, Saxonia. — β. GALLIA : Valois, forêt de Retz, au Rond-des-Dames (Questier); Tarn, Soreze — γ. GALLIA : Vosges, Rochesson (Pierrat); Seine-et-Oise, forêt de Rambouillet, bois des Morues (M<sup>me</sup> Bélèze). — δ. Isère, Uriage, en montant au Pré Godet (Gillot).

OBS. — *R. proximus* Sud., *R. Kœhleri* Hal. in Verb. z.-b. Ges. Wien (1885) p. 667, non Wh.; *R. foliolosus* Hal. Oest. bromb. p. 265 (1891), non Don. — Vraisemblablement voisin du *R. asperidens* — Turio epuisosus, parce pilosus; foliolum terminale cordato-ovatum; inflorescentia foliosa; petala lata; *germina* glabra. — AUSTRIA, propre Payerbach (Halacsy).

## HYBRIDA

*R. ASPERIDENS* v. γ × *HIRTUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Cons. p. 151 (1905); *R. hispidulicaulis* Boul. et Pierrat Assoc. rub. n° 577 (1883); *R. fuscus* v. *canescens* ferow N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 95, ex pte. — Differt a *R. asperidensi* v. γ. inflorescentia laxiore, glandulosiore, aciculata, sepalis erectis, fructu abortivo.

GALLIA : Vosges, Gerbamont, aux Plateaux (Pierrat).

b. — (T. CLXXXIV) — *R. gereziacus* G. Samp. Ann. Sc. nat. (1904); tir. à p. p. 7; Sud. Bat. p. 31; *R. Kœhleri* var. *gereziacus* G. Samp. Rub. Port. p. 73.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 88 !

*R. asperidens* simillimus sed folia obscure viridia; foliolum terminale (4) ovato-rhombeum, sensim acuminatum; inflorescentia subaphylla; flores parvi. Calyx (5) patulus vel laxe erectus; *germina* glabra; *fructus* male evolutus.

LUSITANIA : Terras de Boura, Gerez (G. Sampaio).

c. — (T. CLXXXIV) — *R. leptocercus* Sud. Rub. Pyr. p. 70 (1900); *R. saxicola* Utsch, exsicc., non P.-J. Müll.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 559 !

*Turio* angulatus, glaber, heteracanthissimus glandulosissimusque; *folia* 5-nata (6), supra sparsim pilosa, subtus viridia pilosaque, argute et inæqualiter dentata; *foliolum* terminale ellipticum vel rhombeum, basi integrum, longissime acuminatum; *inflorescentia* foliosa, armata, dense glandulosa, laxe hirsuta (7); *sepala* in fructu patula; *petala* alba; *stamina* alba stylis parum superantia; *germina* glabra. *Styli* post anthesin erubescentes.

GALLIA : Ariège, in collibus schistosis, Reims, prope Foix; GERMANIA : Freudenberg, prope Hohenhain (Utsch).

## HYBRIDA

*R. LEPTOCERCUS* × *SEPARATUS*; *R. SEPARATIFORMIS* Sud. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 560 ! — Glandulæ breves ut in *R. separata*, sed turio angulatus, folia 5-nata foliolis angustis, acuminatis; petala rosea; stamina stylis breviora. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Reims, prope Foix.

E. — (T. CLXXXIV) — *R. Reuteri* Mercier ap. Reutér Rub. genev. Cat. pl. Genève (1861) ed. 2 p. 272; Schmid. Cat. Rono. Genev. p. 165; *R. Kœhleri* β *Reuteri* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 105, ex pte (1900); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 598, ex pte.

Exsicc. — Ch. Magnier Fl. sel. n° 3759; Assoc. rub. n° 770, 849.

A *R. Kœhleri* Wh. dignoscitur: turione pilosiere, foliis (8) mucronato-serratis, foliolis terminalibus angustioribus, elongatioribus, oblongis, rhombis vel ellipticis, basi integris vel subemarginatis, acuminatis, petiolulis propriis brevirostris; ramo pilosiere; inflorescentia (9) flavescens, angustiore, minus laxa, dense hirsuta, pedunculis brevioribus, aculeis obliquioribus, curvatoribusque; sepalis patulis. *Germina* glabra; *stamina* longa.

β. PLINTHOSTYLUS; *R. plinthostylus* Genev. Mém. Soc. ac. M.-et-L. XXVIII p. 108 (1869); Mon. p. 99; *R. Kœhleri* var. *Reuteri* N. Boul. l. c. ex pte; *R. Lejeunei* Genev. Mon. p. 137, non W. et N. — Folia grosse et inæqualiter serrata; inflorescentia aculeis rectis, longis, validis, glandulis brevibus diametrum peduncularum vix æquantibus armata; petala dilute rosea; stamina alba stylis pallidos vel roseos superantia; *germina* pilosa.

γ. BREVISTAMINEUS Sud. Bat. eur. p. 14 (1903) et exsicc. n° 41 ! — Foliola latiora quam in typo, basi leviter emarginata; inflorescentia aphylla, pedunculis patulis; stamina stylis breviora.

δ. PYGMÆOPSIS; *R. pygmæopsis* Focke Syn. p. 564 (1877); ap. Asch. et Gr. Syn. p. 595; *R. pygmæus* Wirtg. Fl. Rheinpr. p. 161, ex pte; *R. franconidicus* Kinscher Repert. (1909) 342. — Exsicc. : Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 102; ed. 2 n° 82 (s. n. *R. pygmæi*); Baenitz Hb. eur. n° 8568, ex pte; Sud. Bat. eur. n° 561, 562. — Folia grosse serrata, subtus glabrescentia; foliolum caul. terminale ovatum vel ovato-rhombeum; inflorescentia brevis, laxe villosa; flores albi, sepalae patulae; stamina stylis æquantia vel parum superantia.

*e. SUPRADECOMPOSITUS*; *R. Schleicheri* var. *β*. W. et N. *Rub. germ.* p. 68. — Turio parce pilosus, aculeis creberimis, valvis armatus; folium terminale ovatum, sensim et longe acuminatum; inflorescentia magna, valde multiflora, pilosa, aculeis creberimis, reclinatis falcatis densissime onusta.

*HELVETIA*: Genève; *GALLIA*: Ain, Jura, Haute-Savoie. — *β GALLIA*: Vendée, St-Laurent-sur-Sèvre, St-Hilaire, à Boutin (Genevier); Maine-et-Loire, Cholet (Bouvet); Loire-Inférieure, Auverné (de l'Isle); Tarn, St-Michel-de-Léon. — *γ. HELVETIA*: Fribourg, inter Villaz-St-Pierre et Villarimboud; *GERMANIA*: Bavaria, Freyung (Prechtelsbauer). — *δ. GERMANIA*: Prov. rhenana, Coblenz, Montabaurer (Wirtgen), Koenigsforst (Bodewig); Saxonia, Bavaria, Guestphalia, Silesia; *BELGIA*: Groenendaal (du Pré), Marchin; *GALLIA*: Gers, forêt de Berdoues (Duffort); Vosges. — *ε. BELGIA*? (Lejeune hb. Hort. Bruxell).

#### HYBRIDÆ

*R. REUTERI* var. *β × QUESTIERI*; *R. SUAVERIANUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 76 (1902); *R. thyrsiflorus* Bor. *Fl. Cent. ed.* 3, n° 746, non Wh. — Glandulæ breves; folia subtus viridia; inflorescentia foliosa, parum glandulosa, sepala reflexa; flores rosei, steriles.

*GALLIA*: Vendée, Mortagne, vallée de la Sèvre (Genevier).

*R. REUTERI* var. *β × ...?*; *R. SECOPHILOIDES* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 77 (1902); *R. analogus* Gen. non Lef. et M. — Turio glabrescens, glandulæ brevibus; folia subtus viridia; foliolum terminale obovato-cuneatum; inflorescentia parum armata, foliosa, glandulæ brevibus munita; flores albi, sepala reflexa. Sterilis.

*GALLIA*: Vendée, St-Laurent-sur-Sèvre (Genevier).

OBS. — M. Schmidely a distribué (Assoc. rub. n° 755) de Sergy (Ain) une forme qui paraît être un *R. Reuteri* × *tomentosus*.

F — (T. CLXXXIV) — *R. APRICUS* Wimm. *Fl. v. Schles.* 3<sup>e</sup> ed. p. 626 (1857); Focke *Syn.* p. 351, et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 600; Hal. *Oest. bromb.* p. 264; *R. Kœhleri* *β. apricus* Fick, *Fl. Schles.* p. 125; *R. Bellardii* × *bavaricus* Utsch *Hyb. gen. Rub.* (1895); *R. Kœhleri* × *glandulosus* Hofmann *exsicc.*; *R. crebrisetus* Boul. et Cornet Assoc. rub. n° 37 (1873); *R. hennebergensis* Sagorski D. b. M. n° 6 p. 82 (1887); *R. glandulosus* v. *ochrosetus* Borb.; *R. Schleicheri* × *vestitus* *pilosus* F. Kretzer ap. Baenitz *Hb. eur. ann.* 1895; *R. apricus* var. *pseudo-Kœhleri* Barber *Fl. Oberl.* III p. 95 (1911), var. *pseudobellardii* ej. l. c.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8587; *Rub. gall.* n° 144 (v. *subcalvatus* K. Frid.); Assoc. rub. n° 37, 579; Sud. *Bat. eur.* n° 184, 568 (f. *gracilis*).

A *R. Kœhleri* Wh. dignoscitur: *turione* debiliore, obtusangulo, laxe piloso, aculeis tenuibus, subulatis munito; *foliis* supra sparsim pilosis, foliolis minus lati, caulinis terminali (10) elliptico, leviter emarginato, sensim acuminato, breviter petiolulato, infimis subsessilibus; *inflorescentia* obtusa, densiore, piloso-hirsuta, aculeis tenuioribus munita, pedunculis inferioribus ascendentibus; *sepals* virescentibus, fructum laxe amplectentibus (11). *Petala* (12) obovata, alba, raro dilute rosea; *stamina* alba stylis virescentibus superantia; *germina* glabrescentia. — Serratura grossa, aculeis tenuioribus, sepalis in fructu erectis a *R. Reuteri* facile distinguitur. Planta viridi-flavescens ad *R. incultum* M. et Wirtg. vergens.

*β. SPINEUS* Sud. *Rub. tann.* p. 49 (1909). — Turio glaber, rachis glabrescens, inflorescentia armatior, dentes minus grossi.

*γ. BIBRACTENSIS*; *R. bibractensis* Boul. et Gillot Assoc. rub. *exsicc.* n° 579 (1883). — Turio rachisque glabra; folium caulin. terminale suborbicularis, cordatum, breviter acuminatum; inflorescentia brevis, densa. *R. glaucello* revocat.

*δ. BREVITHYRSUS*; *R. brevithyrsus* Boul. et Malbranche Assoc. rub. n° 246 (1877); *R. rufus* var. *brevithyrsus* Cörb. *Fl. Norm.* p. 210; *R. rufus* × *multifidus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 110; *R. infestus* var. *setosus* Kinscher *Repert.* VII (1909) p. 80. — Validus; turio faciebus planis vel leviter canaliculatis, glabrescens; folium caulin. terminale late ovatum vel suborbicularis, abrupte et breviter acuminatum; inflorescentia brevis, hirsuta.

*ε. LIGNICENSIS*; *R. lignicensis* Figert in Barber *Fl. Oberl.* III p. 97 (1911). — Turio glaber, glaucescens; serratura grossa, inaequalis; folium terminale ovatum, leviter emarginatum; rachis epilosa, glandulæ fuscis onusta; stamna stylis æquantia.

*GERMANIA*: Silesia, Saxonia, Bavaria, Thuringia, Schleswig, Prov. rhenana; *BELGIA*: Stavelot-Coo; *BOHEMIA*; *HUNGARIA*; *GALLIA*: Saône-et-Loire, Seine-Inférieure, Maine-et-Loire, Nord. — *β. GALLIA*: Tarn, Anglais. — *γ. GALLIA*: Saône-et-Loire, M<sup>e</sup> Beuvray (Gillot) — *δ. GALLIA*: Seine-Inférieure, Elbeuf (Malbranche); *GERMANIA*: Saxonia, monte Stolpenberg (Kinscher). — *ε. GERMANIA*: Saxonia, Mordgrund prope Langenöl (Barber).

*b. — (T. CLXXXIV)* — *R. subpygmæopsis* Spribille in *hb. Sud.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 564!

*Foliolum* caulin. terminale ovatum (13), emarginatum; *serratura* grossissima; *aculei* rameales petiolaresque crebri, validi, falcati uncinate; *inflorescentia* (14) brevis; *stamina* stylis æquantia.

*GERMANIA*: Silesia, Zobtengobirge (Spribille); Bavaria, Tengling (Progel); Waginger See.

*c. — (T. CLXXXIV)* — *R. pygmæus* Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. germ.* I p. 67 (1825); W. et N. *Rub. germ.* p. 93 t. XLII (*excl. var. b, c*); O. Kuntze, *exsicc.*; *R. petraeus* Kœhl. in Wimm. et Grab. *Fl. Siles.* I, 2, p. 55; *R. variisentus* et *pygmaeiformis* Kinscher *exsicc.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 565.

Differit a *R. apricus* Wimm. foliis (15), caulinis plerumque 3-natis, dentibus acutissimis, foliolo terminali elliptico, basi fere integro, acuminatissimo; inflorescentia (16) laxiore, armatiore. Calyx in fructu erectus; petala (17) anguste ovata.

*GERMANIA*: Silesia, Schmiedeberg (Kœhler), Münsterberg, Silberberg (Kinscher); Bavaria: Waging, Teisendorf (Progel); *HUNGARIA*: Bakabanya, Grunt (S. Kupcok).

OBS. — Les figures *b* et *c* des *Rubi germanici* représentent une feuille caulinaire d'une autre espèce; la vraie feuille est figurée en *a*; le calice se relève sur le fruit.

#### HYBRIDA

*R. PYGMÆUS* × *RIVULARIS*; *R. FORMOSULUS* Sud; *R. formosus* (non L. et M.) = *bifrons* × *rivularis* var. Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 242. — Folia caulin. 3-5-nata; folium terminale basi emarginatum; flores substeriles.

*HUNGARIA*: Bakabanya, Sarkandistolna (S. Kupcok).

*G — (T. CLXXXV)* — *R. saxicolus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 140 (1859); Focke *Syn.* p. 375; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 607, *ex pte*, non Genev.; *R. villicaulis* × *hirtus* Utsch; *R. explanatus* Figert *Allg. Bot. Zeit.* (1906) n° 4; *R. Lamyi* Sud. *Rub. Pyr.* p. 26; Genev. pr. min. p.

Exsicc. — Wirtg. *hb. rub. rh. ed.* I n° 151; ed. 2 n° 79; Baenitz *Hb. eur.* n° 9981; Sud. *Bat. eur.* n° 566 (fa juvénis).

*Turio angulatus*, parum pilosus, aculeis mediocribus, rectis reclinatis munitus ; *folia* 5-nata (1), supra parce pilosa, subitus piloso-velutina, minute et simpliciter mucronato-serriculata ; *foliolum* caul. terminale latum, ovatum, leviter emarginatum, acuminatum, infima petiolulata ; *ramus* pilosus, foliis 3-natis, minute denticulatis, subitus pallidis, molliter pubescentibus ; *inflorescentia* grandis, pyramidalis, multiflora, parum foliosa, rachide hirsuta, aculeis medio-cribus, reclinatis subialcatis (2) ; *catyx* patulus ; *petala* (3) angusta, alba ; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia ; *germina* glabra.

β. *Casparyi* ; *R. Casparyi* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 2 n° 38 (1858) ; *ed.* I n° 149 ; *R. Radula* B. *Casparyi* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 565 (1902). — Planta pallida ; aculei sparsiores ; folia superiora subitus subcinerascentia ; *calyx* erectus.

γ. *Vogesicolus* ; *R. vogesicolus* Sud. *Diagn.* p. 47 (1906). — Folia subtus viridia, pubescentia, non velutina, ampla, foliolis terminalibus late ovato-rhombeis ; *inflorescentia* densa ; *stamina* stylos æquantia.

δ. *Figertii* Sud. *Bat.* p. 59 (1906) et *exsicc.* n° 185 ! ; *R. Figertii* Spribille *Beitr. Rub. Prov. Schles.* 345 (1904). — Folia caul. plerumque 3-nata, foliolis minus latis, caulino terminali anguste ovato ; *sepala* laxe reflexa.

ε. *Parisiensis* Sud. *Bat.* p. 59 (1906) et *exsicc.* n° 186, 567. — Folia ampla, mediocriter serrata ; *foliolum* caul. terminale suborbiculare, emarginatum, cuspidatum ; *inflorescentia* densa ; *styli* rosei. — *R. horridicauli* P.-J. Müll. similis sed aculei tenuiores, dentes profundiores.

ζ. *OCCIDENTALIS* ; *R. crebrisetus* Corb. *Fl. Norm.* p. 209, *ex pte*, non B. et Corn. — *Exsicc.* : *Rub. gall.* n° 192. — Folia caul. 3-nata ; *foliolum* terminale obovatum ; *calyx* erectus ; *stamina* stylos æquantia.

GERMANY : *Alsacia*, prope Cusel ! (Müller) ; *Prov. rhenana*, Eifel (Wirtgen) ; *Palatinat* (Honig), *Silesia* (Kinscher), *Bavaria*, Waging (Progel) ; GALLIA : Cautelets. — β. GERMANY : *Prov. rhenana*, Laach (Wirtgen). — γ. GALLIA : *Vosges* ; BELGIA ; Chèvremont (Aigret) ; GERMANY : *Prov. rhenana*, Kilburg (Bodewig). — δ. GERMANY : *Silesia* (Spribille), *Badenia*, Herrenable (Kaufmann) ; HELVETIA : Romont. — ε. GALLIA : *Seine-et-Oise*, bois de Meudon, Montmorency (B. de Lésdain), forêt de Rambouillet (M<sup>me</sup> Bélize). — ζ. GALLIA : *Manche*, Tourlaville (Corbière).

Obs. — La forme suivante semble se placer dans le voisinage du *R. saxiculus* P.-J. M. Je n'en ai pas vu de spécimens authentiques.

β. *Mikanii* Köhler ap. Wimm. et Grab. *Fl. Siles.* I, 2, 56 (1829) ; Focke *Syn.* p. 353 ; *R. apicus* B. *Mikanii* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 601 (1902) ; *R. hirsutus* Wimm. *Fl. Schles.* 3 *Aufz.* p. 627 (1857). — *Turionis* aculei parum inæquales ; *folia* mucronato-serrata ; *foliolum* caul. terminale suborbiculare, emarginatum, acutum ; *inflorescentia* brevis, densa ; *stamina* stylos æquantia ; *germina* pilosa. — *Silesia*, Schmiedeberg (Wimmer).

M. Focke (ap. Asch. et Gr. l. c. 601) rapproche du *R. Mikanii* le *R. Weigelii* Köhl. ap. Wimm. et Grab. l. c. 55 (1829). Cette forme m'est inconnue.

b. — *R. horridicaulis* P.-J. Müll. in *Bonpl.* (1861) p. 284 ; *R. fuscus* f. *horridicaulis* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 96 ; *R. apiculatus* C *horridicaulis* Focke ap. Asch. et Gr. l. c. 581 ; *R. saxiculus* F. Gérard. *Pl. vosg.* p. 73, non P.-J. Müll. *Exsicc.* — *Assoc. rub.* n° 387 ; Sud. *Hb. rub. rar.* n° 13 ! ; *Bat. eur.* n° 568.

Validus ; *turio* faciebus planis, aculeis robustis dense armatus ; *foliolum* caul. terminale (4) cordato-suborbiculare, breviter acuminatum, omnia lata, marginibus sese tegentia ; *inflorescentia* folia parum superans, densa, hirsuta, aculeis validis munita (5, 6) ; *petala* (7) ovata. Cetera ut in *R. saxicolo* P.-J. Müll.

GALLIA : *Vosges*, Gérardmer, entre les lacs de Retournemer et de Longemer (Müller). Granges, C. du pré Genest à la Moulure (F. Gérard) ; *Bruyères*, Yvoux (Biau) ; *Maine-et-Loire*, Brissac (Bouvet) ; GERMANY : *Alsacia*, Münster (Müller) ; HELVETIA, le Desenant sur Grangettes (Jaquet).

H. — (T. CLXXXV) — **R. rotundellus** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. t. LI* p. 23 (1904) ; *R. saxiculus* Genev. *Mon.* p. 128, non P.-J. Müll.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 569 !

*Turio* leviter angulatus, glaber ; *folia* (8) caul. plerumque 5-nata, subtus viridia glabrescentiaque, argute serrata ; *foliolum* caul. terminale suborbiculare, emarginatum, acutum ; *inflorescentia* obtusa, brevis, glabrescentia, aculeis crebris, pallidis armata (9) ; *sepala* aculeata, fructum laxe amplectentia ; *flores* (10) albi ; *stamina* stylos pallidos superantia ; *germina* pilosa.

β. *Pilosus* Sud. in hb. Müller ; *R. insolatus* f. *cordifolia* *pallescens* Progel. — Folia minute denticulata, supra pilosa.

γ. *Cuspidatus* Sud. et Bouv. in Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 59. — *Foliolum* caul. terminale orbiculare, distincte cuspidatum ; *germina* pilosa.

δ. *Pseudoglaucellus* Sud. — *Exsicc.* : Sud. *Bat. eur.* n° 570. — Folia 3-nata, flavescenti-viridia ; *foliolum* terminale obovato-rotundatum, cuspidatum ; rachis glabra ; *sepala* patula vel subreflexa ; *germina* glabra. *R. glauccello* similis sed glandulosior epruinosusque.

ε. *Platydactylus* ; *R. platydactylus* Kinscher *exsicc.* — *Exsicc.* : Sud. *Bat. eur.* n° 571 ! — Aculei flavescentes, in turione recti, in ramo reclinati ; *folia* ampla, tenuia, subtus parce pilosa ; *foliolum* caulinum terminale longe petiolulatum, cuspidatum ; *inflorescentia* laxa, pauciflora ; *sepala* post anthesin patula, denique ± reflexa ; *petala* staminaque dilute rosea. Fructificatio non tota. Aculeis turionis recti et stipulae dilatae *R. triviales* revocant.

GALLIA : *Puy-de-Dôme*, la Bourboule, le Mont-Dore, lac Chauvet ; *Cantal*, Lascelle-de-Jordanne ; *Tarn*, Lacaze ; GERMANY : *Bavaria*, Waging (Progel) ; BRITANNIA : *Sussex*, St-Leonardi Forest. — β. GALLIA : *Basses-Pyrénées*, Eaux-Bonnes ; GERMANY : *Bavaria*, Waldmünchen (Progel). — γ. GALLIA : *Maine-et-Loire*, Beaucozé, champ Cotin (Bouvet). — δ. GALLIA : *Loire-Inférieure*, de N.-D. des Landes à Vigneux (Henry) ; *Maine-et-Loire*, Beancouzé (Bouvet). — ε. GERMANY : *Silesia*, Hellenbusch, prope Münsterberg (Kinscher).

b. — CLXXXV) — *R. infuscatus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 308 ! (*nomen*) ; *R. crebrisetus* (Boul. et Corn.) *Assoc. rub.* n° 845, non n° 37 ; *R. Köhleri* β *crebrisetus* Corb. *Fl. Norm.* p. 209 (1894) *ex pte* ; *R. hirtus* Godr. in hb. Le Jolis, non W. et K. *Exsicc.* — *Assoc. rub.* n° 845 ; *Rub. gall.* n° 193.

*R. rotundello* similis sed : *folia* caul. 3-nata (11) ; *foliolum* terminale ovatum vel subobovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum ; *inflorescentia* glandulis longis (12), aculeis tenuibus, rectis reclinatis dense obsita, pedunculis patulis ; *petala* (13) elliptica ; *stamina* alba stylos carnosæ æquantia vel parum superantia ; *germina* glabra. Planta fusco-purpurea.

β. *Crebrispinus* ; *R. crebrispinus* Sud. *Diagn.* (1906). — Folia minute mucronato-serriculata, caulina 3-4-5-nata ; *foliolum* terminale oblongo-obovatum.

GALLIA : *Manche*, Valognes, à Beaumont, près de Chiffrevault (Lebel), Cherbourg (Le Jolis, Corbière) ; BAVARIA : Waging (Progel). — β. Vienne, Le Rond (de Lacroix).

#### HYBRIDA

*R. INFUSCATUS* × *ADSCITUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Cons.* p. 154 (1905) ; *R. ENSIFER* Lebel et Müll. *Bonpl.* (1861) *nomen*. — *Turio pilosus* ; dentes grossi ; *folia* 3-5-nata, foliolis latis, *inflorescentia* ampla, pilosa ; *flores* rosei, *sepala* reflexa.

GALLIA : *Manche*, St-Germain-de-Tournebut (Lebel).

c. — (T. CLXXXV) — *R. polyplon* Boul. et Motelay *exsicc.* (1875); N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 106 (1900); *R. chloroticus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 25 (1899); *R. raphidacanthus* Progel *Ber. Bot. Ver. Landsh.* 11, (1887), p. p.

*Exsicc. — Assoc. rub.* n° 190 !

Differt a *R. rotundello*: turione parce piloso; foliolis terminalibus obovatis (14), saepe cuneatis, abrupte acuminatis; inflorescentia longiore, parce pilosa, armatiore (15). — Folia utrinque parce pilosa, flores (16) albi, sepala in fructu laxe erecta, germina pilosa. — In umbrosis viridi-flavescens est. (*R. chloroticus* Sud. l. c.).

β. *RAPHIDORACHIS*; *R. raphidacanthus* Kinscher *Reperf.* VII (1909) p. 81. — *Exsicc. : Sud. Bat. eur.* n° 572 ! — Turione aculei parum inaequales; folia caul. 5-nata; foliolum caulinum terminale late ellipticum.

γ. *RAPHIDACANTHUS*; *R. raphidacanthus* Progel. *Ber. Bot. Ver. Landsh.* (1889) p. 11, p. p.; *R. dumosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 260 non Lef. — Gracilior; folia caul. pleraque 3-nata; stamina stylis vix superantia; germina glabra.

GALLIA: *Hauts-Pyrénées*, Cauterets, torrent du Pégrière (Motelay), promenade des Lacets; *Haute-Savoie*, Farette, près Conflans (Perrier); BAVARIA: Teisendorf, prope Traunstein; Unterhütte (Progel). — β. SILESIA: Hoellenbusch, prope Münsterberg (Kinscher), cum typo. — γ. BAVARIA: Waging, Waldmünchen, Forststrasse, Langen Fels (Progel); BELGIA: Barse (Charlet); HUNGARIA: Bakabanya (S. Kupcok).

#### HYBRIDÆ

*R. POLYOPLON × CONSOBRINUS* var. *ferox*; R. PERRIER Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* t. LVIII (1911) p. 36. — Aculei crebri, validi, subaequales, glandulae subnudæ; folia subtus viridia, caulinata 3-nata; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA: *Haute-Savoie*, le Châtelard, près de Conflans (E. Perrier de la Bâthie).

*R. POLYOPLON × ULMIFOLIUS*; R. EXILENTUS Sud. *Rub. Pyr.* p. 26 (1899). — Gracilis: aculei subaequales, glandulae breves, raræ, flores rosei, steriles. Virescens.

GALLIA: *Hauts-Pyrénées*, Cauterets, promenade des Lacets.

d. — (T. CLXXXV) — *R. impolitus* Sud. *Fl. Toul.* p. 75 (1907); *R. Degenianus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 240.

*Exsicc. — Sud. Bat. eur.* n° 573 !

Habitus *R. rotundelli* Sud. sed inflorescentia pyramidalis, pedunculis ± patulis, stamina stylis breviora; germina vulgo pilosa.

β. *CUSPIDATUS* Sud. et Bouvet; Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 59. — Foliolum caul. terminale orbiculare, abrupte cuspidatum; germina glabra.

γ. *FULVIFORMIS*. — Turio parce pilosus; serratura minus tenuis; inflorescentia armatior, pedunculis ascendentibus; sepala laxe reflexa, germina pilosa.

GALLIA: Gers, Pujaudran, à Tillère; Tarn, Aussillon: GERMANIA: Bavaria, Waging (Progel); Silesia, Münsterberg (Kinscher); HUNGARIA: Bakabanya, valle Grunt (Kupcok). — β. GALLIA: Tarn, Sales; Anjou, Beaucouzé, Champs-Cottin (Bouvet). — γ. GALLIA: Haute-Garonne, Sengouagnet, au col de Buret.

### Subsectio F. — *Glandulosi* P.-J. Müll.

#### Conspectus specierum

I. — Turionis aculei compressi, basi dilatati, vulgo flavescentes.

A. — Petala rosea vel rubra; inflorescentiae glandulae longæ; sepala in fructu erecta... ....

*R. furvus* Sud. 101

B. — Petala alba; inflorescentiae glandulae flavescentes.

*R. Schleicheri* Wh. 105

a. — Turio heteracanthissimus, aculeis valde compressis; inflorescentia ± armata, glandulis vulgo longis munita.....

*R. scaber* Wh. 103

b. — Turio parum heteracanthus, ± pilosus, pruinosus; inflorescentia vulgo parum armata vel subinermis, glandulis relative brevibus munita; stamina stylis superantia.....

*R. tereticaulis* P.-J. Müll. 104

II. — Turionis aculei subconici, basi non manifeste dilatati.

A. — Inflorescentiae glandulae relative breves, diametrum rachidis vix æquantes.....

*R. purpuratus* Sud. 102

B. — Inflorescentiae glandulae longæ, plerumque diametrum rachidis sensim superantes.

*R. Bellardii* Wh. 106

a. — Flores purpurei vel lète rosei; turio saepe glaber.....

*R. rivularis* M. et W. 107

b. — Flores albi, raro petalis dilute roseis.

*R. serpens* Wh. 108

1. — Foliolum caul. terminale ellipticum, abrupte acuminatum; dentes tenues; inflorescentia brevis, stamina stylis superantia.....

*R. hirtus* W. et K. 109

2. — Non ut supra.

A. — Glandulae, seti glanduliferi aculeique flavescens; frons pallidus.

a. — Pedicelli sepalaque aculeis crebris, acicularibus et glandulis longis obsita.

b. — Pedicelli sepalaque glandulosa sed inermes vel parum aciculata.....

B. — Glandulae, seti aculeique purpureo-violacea; frons obscure viridis.....

#### × *Flores rosei*.

101 — (T. CLXXXVI) — *R. FURVUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 81 (1900); *ap.* Gandg. *Nov. Conspp.* p. 154; *R. Sabrans-ryanus* Hayeck *exsicc.*

*Turio* teres (1), pallidus, epruinosus vel subglaucescens, glabrescens, glandulis longis, aculeis inaequalissimis, flavescens, majoribus basi compressis, rectis reclinatiis, minoribus acicularibus munitus; *folia* (2, 3) plerumque 3-nata, supra sparsim pilosa, subtus viridia, glabrescentia vel parum pilosa, argute et inaequaliter serrata, dentibus parum profundis; *foliolum* terminale late ovatum, ovato-rhombeum vel raro leviter obavatum, basi emarginatum, breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolus* glabrescens, aculeis majoribus reclinatiis munitus; *stipulae* linear-lanceolatae; *ramus* obtusus, glabrescens, dense glanduloso-aciculatus, foliis subtus viridibus; *inflorescentia* (4) mediocris, inferne foliosa, rachide glabrescenti, glandulis longis, crebris, inaequalibus, aculeis flavescens, tenuibus, rectis, dense obsita (5); *pedunculi* medii patulis vel leviter ascendentibus, 2-3-flori; *sepala* tomentoso-viridia, dense glanduloso-aciculata, acuminata, fructum amplectentia (6); *petala* (7) oblonga, lète rosea; *stamina* rubra stylis rubros superantia; *germina* fere glabra; *receptaculum* pilosum. Frons obscure viridis. *Pollen* fere purum (8). — Julius-augustus.

o — *Styli rubri*.

β. *LATIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 156 (1901). — *Exsicc. : Sud. Rub. rar.* n° 144 ! — *Foliolum* caul. terminale suborbicularare (2), cordatum, acuminatum; inflorescentia densa, pedunculis ascendentibus; *sepala* erecta.

$\gamma$ . *PATULIPES* Sud. l. c. — Folia ut in var.  $\beta$ ; inflorescentia magna, pyramidalis, multiflora, pedunculis patulis. Interdum stamina alba [*R. personatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1904), 96, (133)].

$\delta$ . *GLABRESCENS* Sud. l. c. — Fere glaber; aculei validi, obliqui; foliolum terminale ovatum; sepala viridia, longe acuminata; stamina stylos æquantia; germina pilosa.

$\epsilon$ . *FEROX* Sud. l. c. — Aculei crebri, rameales falcati; folia minute serrata, foliolis acuminatis; foliolum terminale ovatum; germina pilosa.

$\zeta$ . *FALLAX* Sud. l. c. 157. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 574. — Folium terminale obovatum; aculei valde compressi; inflorescentia pauciflora.

$\eta$ . *NUDIPES* Sud. in hb. Müller. — Folia caul. 5-nata, foliolis ut in var.  $\beta$ ; inflorescentia laxa, parum armata, glandulis brevibus ut in *R. tereticauli*; germina pilosa.

$\theta$ . *PALLIDISTAMINEUS* Sud. *Bat. eur.* (1906) et exsicc. n° 187!; *R. exilis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 223, non Sud. — Planta obscure viridis, glandulis subfuscis, inflorescentia parum armata, staminibus albis; folia ut in typo.

oo. — *Styli virescentes*

$\iota$ . *VIRIDISTYLUS* Sud. *Rub. tarn.* 49 (1909); *R. eupilocarpus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) p. 391. — Stamina rosea, inflorescentia arum armata; cetera ut in typo.

$\kappa$ . *SINUICOLUS* Sud. *Rub. tarn.* 50 (1909); *R. sinuiculus* Sud. in hb. Müller; *R. apricus* Sbsp. *hamatus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) n° 8; *tir. à p. p. 12*; *R. rivularis* var. *glareosus* Kupcok, exsicc. — Folia typi sed grosse serrata; aculei rameales ± falcati vel adunci; stamina pallida.

$\lambda$ . *DEBILIFLORUS* Sud. *Rub. tarn. p.* 50 (1909). — Foliola angusta, longe acuminata, terminalia oblonga; inflorescentia aphylla, laxa, pedunculis tenuibus; stamina pallida.

$\mu$ . *SUBCORYMBOSIFORMIS*; *R. subcorymbosiformis* Schmid. in hb. Sud.; *R. pycnanthus* Progel hb. non Genev. — Gracilis; turio parce pilosus; folia grosse serrata; inflorescentia parva, pauciflora; stamina rosea.

In nemoribus montosis humidis. — **GALLIA**: *Tarn*, Pyrénées, Cantal; **GERMANIA**: Saxonie, Zittau (Hofmann); **STYRIA**. —  $\beta$ .  $\gamma$ .  $\delta$ .  $\zeta$ .  $\eta$ . in Pyrénées centralibus. —  $\epsilon$ . **GALLIA**: Ariège, Ascou. —  $\nu$ . **GERMANIA**: Saxonia (Hofmann); **HUNGARIA**: Bakabanya (Kupcok). —  $\epsilon$ . **GALLIA**: *Tarn*; **ITALIA**: Liguria, M° Ceppo (Bicknell); **BAVARIA**: Traunstein (Kaufmann). —  $\times$ . **STYRIA**: Söchau (Sabransky); **GALLIA**: *Tarn*, Basses-Pyrénées; **HUNGARIA**: Bakabanya, Grunt (Kupcok). —  $\lambda$ . **GALLIA**: *Tarn*, Saint-Paul; **BAVARIA**: Einhard prope Traunstein (Kaufmann). —  $\mu$ . **GALLIA**: Haute-Savoie, les Allinges (Schmidely); **BAVARIA**: Plattenberg (Progel).

HYBRIDÆ

*R. FURVUS* var.  $\beta$  × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr. p.* 157 (1901); *R. ARCANUS* Sud. l. c. — Folia *R. furvi* sed. superiora leviter discolora; glandulæ breves; flores rubri, steriles.

**GALLIA**: in Pyrenæis centralibus, Castelviel, prope Luchon.

*R. FURVUS* var.  $\zeta$  × *ULMIFOLIUS rusticus* Sud. l. c. 157 (1901); *R. LABANS* Sud. l. c. — Habitus *R. furvi* var.  $\zeta$ . sed glandulæ breves, sepalata tomentosa, flores subalbi, fere steriles.

**GALLIA**: in Pyrenæis centralibus, Castelviel, prope Luchon.

*R. FURVUS* × *BIFRONS* Sud. *Rub. tarn. p.* 50 (1909); *R. OLIGOSPERMUS* Sud. l. c. — Habitus *R. furvi* sed folia minute serrata, subdiscolora, flores roseoli, parum fertiles.

**GALLIA**: *Tarn*, Vabre.

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Stamina stylos superantia, raro æquantia.

A. — Turio glaber vel glabrescens; inflorescentiae rachis epilosa.....

*R. furvus* Sud.

B. — Turio pilosus; inflorescentiae rachis pilosa.

*R. AMPLIFRONS* Sud. b.

a. — Folium cauline terminale orbiculare vel late ovatum.....

*R. FONTIVAGUS* Sud. c.

b. — Folium cauline terminale obovatum.....

*R. VENUSTULUS* Sud. d.

A. — Inflorescentiae rachis pilosa; dentes tenues; stamina rubra.....

*R. NOTABILIS* Sud. B.

B. — Inflorescentiae rachis epilosa.

*R. ROSELLUS* Sud. C.

a. — Turio epruinosis; aculei validi; folium caul. terminale obovatum.....

b. — Turio ± pruinosis; folium cauline terminale ovatum, emarginatum.....

*R. SPINIGER* — Folia caul. 3-nata; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, cuspidatum; inflorescentia aculeis rectis reclinatisve, pallidis dense armata; styli virescentes.

*R. PULCELLIFLORUS*; *R. pulcelliflorus* Kinscher *Repert.* (1909) p. 341. — Folium caul. terminale ovatum, sensim acuminatum; inflorescentia brevis, glandulis pallidis; stamina rosea; germina pilosa.

*R. ISERANUS*; *R. iseranus* Barber *Abhandl. Goerlitz in Bd. XXIII* (1901), 214; *Fl. oberl. III* p. 110 (1911). — Folium terminale ovatum, subemarginatum, acuminatum; inflorescentia elongata, foliosa, aculeis pallidis, crebris armata; petala staminaque pallide rosea; germina pilosa.

*AUSTRIA*: Styria, Söchau (Sabransky); **GERMANIA**: Bavaria, Tengling, Waging (Progel). —  $\beta$ . **GALLIA**: Cantal, St-Pouey, bois de Chausse-Charbonnel. —  $\gamma$ . **GERMANIA**: Silesia, prope Wartha, in monte Kapellenberg dicto (Kinscher). —  $\delta$ : **GERMANIA**: Silesia, Grenzdorf, prope Meffersdorf (Barber); Thuringia, Sonneberg (Kinscher).

c. — (T. CLXXXVII) — *R. fontivagus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 219; *R. pallidus*? f. *subalpina* Progel.

Differt a *R. furvo*: turione piloso; aculeis minoribus; foliolo (3) caul. terminali obovato, angusto; rachide pilosohirsuta (4, 5). Petala rosea, stamina rosea stylos virescentes superantia; germina glabra.

$\beta$ . *RUBRISTYLUS*. — Styli rubri, germina pilosa; foliolum terminale ovato-rhombeum.

**GALLIA**: Ariège, Gariac, prope Foix; Haute-Garonne, Buzet, Arbas; **BELGIA**: Trooz, bois des Forges (Aigret); **GERMANIA**: Bavaria, prope Traunstein (Progel). —  $\beta$ . **Bavaria**, Esterholz (Zinsmeister), Etendorf (Kaufmann).

d. — (T. CLXXXVII) — *R. venustulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 83 (1900); *R. Zobtensis* Spribille *exsicc.*

Diffr. a *R. furvo*: turione parce piloso; aculeis creberrimis, obliquis; foliolo caulin terminali (6) obovato; inflorescentia angusta, pilosa (7), staminibus rubris stylis pallidis brevioribus (8). Germina glabra; serratura tenuis.

*GALLIA*: Ariège, vallée d'Ascou; *SILESIA*: Zobtengebirge (Spribille).

B. — (T. CLXXXVII) — ***R. notabilis*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 157 (1901).

*Exsicc.* — Sud. *Rub. rar.* n° 145!

*Turio* teres (9), glaber, epruinosus, aculeis validis, valde compressis armatus; *folia* 3-5-nata, supra glabra, subtus pallida, argute serrata; *foliolum* terminale obovatum vel ovato-rhombeum, basi integrum vel leviter emarginatum, acuminatum; *aculei* petiolares falcatisim vel uncinati, rameales validi, falcati; *inflorescentia* laxa, grandis, epilosa, aculeis validis, flavescentibus, reclinatis falcatisim munita (10); *pedunculi* longi, patulo-erecti; *sepala* tomentosa, fructum laxe amplectentia (11); *petala* (12) rosea; *stamina* rosea stylis virescentes subæquantia; *germina* glabra. Planta pallide viridis.

*β. LONGISETUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 50 (1909). — Serratura inæqualior; foliolum terminale oblongo-obovatum; inflorescentiae glandulæ longæ; *stamina* alba stylis rubros subæquantia.

*GALLIA*: in *Pyrenæis centralibus*, circa Luchon. — *β. Tarn*, St-Paul-du-Dadoune.

#### HYBRIDÆ

*R. NOTABILIS* × *RIVULARIS* (grex); *R. PATULISPINUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 158 (1901). — *Turio* parce pilosus, dense glanduloso-aciculatus; *folia* 3-nata, foliolis terminalibus ovatis; *inflorescentia* armatissima, pedunculis patulis; flores albi, substeriles.

*GALLIA*: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon, via Superbagnères.

*R. NOTABILIS* × *SERPENS*; *R. RETENTUS* Sud. l. c. p. 158 (1901). — Habitus *R. notabili* sed *folia* subtus pilosa, minute serrata; *inflorescentia* laxissima, pilosa, brevis; *petala* rosea, *stamina* brevia. Sterilis.

*GALLIA*: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon, via Hispaniæ.

C. — (T. CLXXXVII) — ***R. rosellus*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 158 (1901); *R. posoniensis* Holuby *exsicc.*, non Sabrs.; *R. Bayeri* fl. *roseis* Schmidely *exsicc.*; *R. styriacus* var. *aperorum* Sabrs. in hb. Sud.

*Turio* (13) subteres, glaucescens, glaber, aculeis pallidis, compressis; *folia* caul. 3-nata, argute serrata, utrinque sparsim pilosa; *foliolum* terminale (14) late ovatum, basi emarginatum, abrupte acuminatum; *ramus* glabrescens, aculeis satis validis munitus; *inflorescentia* ± foliosa, epilosa, pallida, aculeis crebris (15), pedunculis patulis (16); *sepala* fructum laxe amplectentia; *petala* (17) ovata, rosea; *stamina* alba vel rosea stylis breviora; *germina* glabrescentia. Planta pallide viridis.

*GALLIA*: Pyrénées, Tarn, Haute-Savoie; HUNGARIA; STYRIA ORIENTALIS; BAVARIA, etc.

#### HYBRIDÆ

*R. ROSELLUS* × *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn.* p. 50 (1909); *R. ROSELLIFORMIS* Sud. l. c. — Diffr. a *R. rosello* turione angulato, foliis 5-natis, *inflorescentia* multiflora, armatissima. Sterilis.

*GALLIA*: Tarn, Cambon-du-Temple.

*R. ROSELLUS* × *VALLISPARSUS* Sud. l. c.; *R. PSEUDOROSELLUS* Sud. l. c. (1909). — Diffr. a *R. rosello* turione subangulato, glandulis brevioribus, *inflorescentia* parum armata. Sterilis.

*GALLIA*: Tarn, Saint-Cirgue, au moulin de Gignac.

**102** — (T. CLXXXVIII) — ***R. PURPURATUS*** Sud. *Rub. Pyr.* p. 82 (1900); ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 154.

*Exsicc.* — Sud. *Bat. eur.* n° 575!

*Turio* (1) teres, glabrescens, glaucescens, glandulis crebris, purpureis, inæqualibus, longis, aculeis debilibus, majoribus parum compressis, rectis reclinatis, minoribus acicularibus instructa; *folia* plerumque 3-nata (2, 3), supra parce pilosa, subtus viridia, parum pilosa, argute et subæqualiter serrata; *foliolum* terminale anguste ovatum, ellipticum vel rhombeum, basi leviter emarginatum, acutum vel breviter acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petiolus* glabrescens, aculeis tenuibus, reclinatis vel subfalcatis munitus; *ramus* debilis, parce pilosus, glandulis crebris, rubris, aculeis tenuibus obsitus, foliis subtilibus viridibus; *inflorescentia* (4) mediocris, brevis, obtusa, parum foliosa, parce pilosa, tomentosa, aculeis mediocribus, rectis reclinatis, glandulis purpureis, longis, dense obsita (5), pedunculis mediis 1-3-floris, patulis; *sepala* tomentoso-viridia, glanduloso-aciculata (6), appendiculata, fructum laxe amplectentia (7); *petala* obovata (8) vel ovata, lète rosea; *stamina* rubra stylis rubros superantia; *germina* glabra; *receptaculum* glabrescens. *Pollen* parum admixtum. — Habitus *R. hirti* W. et K. — Julius-augustus.

δ. *TENERIMUS* Sud. l. c. p. 159 (1901). — *Inflorescentia* fere inermis; dentes tenues, parum profundi.

γ. *VIRIDISTYLUS* Sud. l. c. p. 82 (1900); *R. casurepertus* Kupcok; *R. bifrons* × *hirtus*? ej. in hb. Sud. — *Inflorescentia* armata; dentes satis grossi; stylis virescentes.

δ. *OSTENSUS*; *R. ostensus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) 94 (131); *R. foliosus* *emancipatus* × *hirtus* Guentheri? Schmid. l. c. — Folia 5-nata, subtus pubescentia; foliolum caul. terminale obovatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis; stylis rosei. Fertilis.

ε. *LÆTIFLORUS*; *R. sérpens* var. *lætiflorus* Kupcok in hb. Sud. — *Inflorescentia* subinermis, glandulis brevibus onusta; stylis virides.

ζ. *SUPERPREDATUS*. — Folia inæqualiter serrata, subtus pallida, pubescentia, caul. 3-nata; foliolum terminale late ovatum; *inflorescentia* aculeis crebris, rectis munita; *sepala* laxe reflexa vel diverse patula; *stamina* stylique pallida.

In nemoribus montosis. — *GALLIA*: Pyrénées, Loire, Tarn; *GERMANIA*: Saxonia, Bavaria, Silesia; *AUSTRIA*: HUNGARIA; *BELGIA*: Huy. — ε. *GALLIA*: Haute-Savoie, M<sup>ts</sup> Voirons (Schmidely). — ε. *HUNGARIA*; *BELGIA*: Bakabanya, Biela Bana (Kupcok). — ζ. *BAVARIA*: Graefenberg (Scherzer).

OBS. — Le *R. amœnus* Kœchl. in Wimm. et Grab. *Fl. Sil.* 1, 2, 54 (1829); *R. eu-hirtus* IV *amœnus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 613 semble se rattacher au *R. purpuratus*; il m'est inconnu.

#### HYBRIDÆ

*R. PURPURATUS* × *BRACHYTHYRSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 107; *R. INFUSCUS* Sud. l. c. p. 82 (1900). — A *R. purpurato* dignoscitur: aculeis validioribus, turione angulato, foliis caul. 5-natis, *inflorescentia* ampla, pyramidali, minus glandulosa; floribus pallidis, sterilibus; *sepalis* reflexis.

*GALLIA*: Ariège, Aulus, via Labouche.

*R. PURPURATUS* × *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn.* p. 50 (1909) ; *R. VABRENSIS* Sud. *l. c.* — Folia 3-nata; aculei aequales, glandulæ breves; inflorescentia armata; stamina stylique pallida. *Folia R. purpurati*; aculei *R. fagicola*.

GALLIA : Tarn, Vabre.

*R. PURPURATUS* × *OPERTUS*?; *R. FOUILLETINUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 82 (1900). — Differt a *R. purpurato* glandulis brevioribus, inflorescentia angusta, elongata, sepalis reflexis, germinibus pilosis. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Aulus, bords du Fouillet, à la prise d'eau.

*R. PURPURATUS* × *THYRSIFLORUS* var. *pallidipes*: *R. PURPURATIFORMIS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 159 (1901). — Differt a *R. purpurato* inflorescentia angusta, glandulis brevibus; floribus albis, staminibus stylis brevioribus. Sterilis.

GALLIA : in Pyrenæis centralibus, Luchon, via Superbagnères.

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — Stama stylos superantia vel iis aequilonga.

A. — Inflorescentiae glandulæ rubro-purpureæ.

- a. — Turio glabrescens; inflorescentiae rachis glabrescens..... *R. purpuratus* Sud.
- b. — Turio pilosus; inflorescentiae rachis pilosa; folia subtus viridia.
  - 1. — Dentes profundi; inflorescentiae glandulæ relative breves.....
  - 2. — Dentes parum profundi; inflorescentiae glandulæ longissimæ.....
- c. — Turio pilosus; folia subtus albicantia.....

B. — Inflorescentiae glandulæ pallidæ; aculei subnulli.....

*R. PRÆDATUS* Schmid. c.

*R. CARNEUS* Sabrs. b.

*R. ACUMINUM* Sud. d.

*R. BELLATULUS* Sud.

##### II. — Stama stylis breviora.

A. — Turio fere glaber; inflorescentiae rachis glabrescens.

- a. — Folia grosse vel mediocriter serrata; foliolum caul. terminale angustum.....
- b. — Folia minute serrata; foliolum caul. term. obovato-orbiculare.....

B. — Turio pilosus; inflorescentiae rachis piloso-hirsuta.....

*R. BRUMALIS* Sud. B.

*R. RUFISPINUS* Sud. Bb.

*R. BRACHYANDROIDES* Sud. Bc.

b. — (T. CLXXXIX) — *R. carneus* Sabrs. ap. Sud. *Bat. eur.* (1906); *R. divexitramus* var. *carneus* Sabrs. *Œ. B. Z.* (1905) p. 395; *R. lætevirens* Progel, ex pte.; *R. hirtus* f. *rubriflora* ej.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 188!

Differt a *R. purpurato*: turione (2) piloso, foliis minute mucronato-denticulatis, foliolo terminali (2) elliptico, inflorescentia brevi, armata, glandulis longis dense obsita (3). *Petala* rosea; *stamina* dilute rosea, stylis rubros parum superantia; *sepala* viridia, dense aculeata, in fructu erecta (4). Habitus *R. lithophili*.

AUSTRIA : *Styria orientalis*, Sœchau (Sabransky); BAVARIA, Waging (Progel).

c. — (T. CLXXXIX) — *R. prædatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) (72) 79; *R. polytrichus* var. *coloratus* Progel.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 576.

A *R. purpurato* dignoscitur: turione piloso, robustiore; foliis (5) 3-4-5-natis, argute serrulatis; inflorescentia pyramidalis, multiflora, glandulis brevioribus (6, 7), rachide pilosa; staminibus minus longis, sepalis interdum patulis.

GALLIA : Tarn, Ausillon, Anglés, Burlats, Fabas, Lacaua; Pyrénées, Arbas; etc.; Haute-Savoie, Monts Voirons (Schmidely); SILESIA : Lewin (Barber); BAVARIA : Rieselwald (Progel); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok).

#### HYBRIDÆ

*R. PRÆDATUS* × *QUESTIERI* Sud. *Rub. tarn.* p. 50 (1909); *R. CERTUS* Sud. *l. c.* — Aculei parum inaequales, glandulæ breves, sparsæ; folia 3-5-nata, subtus viridia; flores rosei, steriles.

GALLIA : Tarn, Sauveterre.

*R. PRÆDATUS* × *PERVIRESCENS* var. ? Sud. *l. c. p.* 50 (1909); *R. INCERTISSIMUS* Sud. — Turio glabrescens, aculei pallidi, compressi, inaequales; folia 3-nata, argute serrata; flores albi, staminibus brevibus. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Lacabarède, prope les Fontanelles.

*R. PRÆDATUS* × *ULMIFOLIUS* Sud. *l. c. p.* 50 (1909); *R. SUBSTRICHTUS* Sud. *l. c.* — Pruinosis; glandulæ breves, folia 3-5-nata, discolora; flores rosei, substeriles.

GALLIA : Tarn, inter Foncouverte et Fabas.

*R. PRÆDATUS* × *HIRTUS interruptus* Sud. *l. c.*; *R. PERERYTHROSTYLUS* Sud. *l. c.* 50 (1909). — Turio glaber, dentes tenues, rachis pilosa, glandulæ longæ, purpureæ; stama stylis purpureis breviora.

GALLIA : Tarn, Burlats.

d. — *R. acuminum* Sud.

*Turio* teres, dense pilosus; *folia* 3-nata, minute serrulata, subtus molliter pubescentia, albicantia; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* pilosa, aculeis mediocribus, glandulis purpureis munita; *sepala* erecta; *petala* rosea; *stamina* alba stylis rubros superantia; *germina* pilosa.

GALLIA : Pyrénées de la Haute-Garonne, Arbas, crête calcaire du mail de Bourusse.

B. — (T. CLXXXIX) — *R. brumalis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 83 (1900); *R. pseudorosaceus* Sabrs. in hb. Sud.; *R. Günthert v. patulus* Goetz.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10369; Sud. *Bat. eur.* n° 577.

A *R. purpurato* distinguitur: serratura grossa (8), inflorescentia (9) brevi, laxa, staminibus stylis brevioribus (10). *Petala* lata, calyx erectus.

β. *CALLIANDER*; *R. calliander* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 154 (1905); *R. Sprengelii* Fischer-Ooster *Rub. Bern.* p. 33, non Wh. — Inflorescentia pauciflora; stama stylos subæquantia.

γ. *HONTENSIS*; *R. scaber* var. *hontensis* Kupc. et Sabrs. *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 148. — Folia minute serrata; foliolum terminale rhombicum; inflorescentia elongata, interrupta, glandulis brevibus obsita; petala oblonga.

GALLIA : Pyrénées, Tarn; GERMANIA : Badenia (Goetz); STYRIA (Sabransky). — β. *HELVETIA* : Berne (Fischer-Ooster). — γ. HUNGARIA : Bakabanya, in valle Grunt (Kupcok).

## HYBRIDA

*R. BRUMALIS* × *ARGENTEUS firmatus*; *R. ERYTHROGYNOIDES* Sud. *Rub. tarn.* p. 51 (1909). — Aculei validi; glandulæ sparsæ; folia superiora subdiscolora, inflorescentia armata, laxa; flores rosei, staminibus stylis rubris brevioribus. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, La Cabane, via Tanus.

b. — (T. CLXXXIX) — *R. rufispinus* Sud. *in hb.* Müller; *Rub. tarn.* p. 51 (1909).

*Turio* (11) glaber, pruinosis, aculeis tenuibus, longis; *folia* 3-nata, supra glabra, minute dentata; *foliolum* terminale (12) breviter obovato-orbiculare, submarginatum, cuspidatum; *rachis* (13) pilosa, glandulis purpureis, longissimis, aciculis sparsis obsita. *Flores* lète rosei, staminibus brevibus.

GALLIA : *in Pyrenæis*, Eaux-Bonnes (de Lacroix); Montauban, prope Luchon; *Tarn*, Lacaune.

c. — (T. CLXXXIX) — *R. brachyandrodes* Sud. *Rub. tarn.* p. 51 (1909); *R. pilinocephalus* Progel, *ex pte.*

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 578.

*Turio* pilosus, aculeis tenuibus; *folia* 3-5-nata, argute serrata; *foliolum* terminale ovatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, rachide (14) dense et breviter piloso-hirsuta, glandulis purpureis, longis dense obsita; *flores* rosei; *stamina* stylis rubris breviora (15).

β. INÆQUATUS Sud. *l. c.* p. 51 (1909). — Serratura inæqualis; *folia* subdiscolora; inflorescentia angusta, densa.

γ. CUSPIDIGER; *R. pilinocephalus* Progel *hb.*, *ex pte.* — Folia minute et acute serrulata; *foliolum* terminale late ovatum, basi subrotundatum, cuspidatum; inflorescentia densa; stylis rubri, germina glabra.

δ. TIMBALIANUS. — *Turio* dense pilosus; *folia* utrinque pilosa; *foliolum* terminale rhombeum; inflorescentia densa; *stamina* stylique pallida; germina glabra.

GALLIA : *Tarn*, Ariège, Haute-Garonne; GERMANIA : Bavaria, Waging (Progel), Traunstein (Kaufmann). — β. GALLIA : *Tarn*, Travanet, Pont-de-Cirou. — γ. BAVARIA : Tengling (Progel). — δ. GALLIA : Haute-Garonne, Arbas, au mail de Bourusse.

## HYBRIDA

*R. BRACHYANDROIDES* var. × *R. THYRSOIDEUS goniophyllus* var. Sud. *Rub. tarn.* p. 51 (1909); R. INÆQUATIFORMIS Sud. *l. c.* — Folia 3-nata, discolora; inflorescentia grandis, subglandulosa; flores albi, calyx reflexus; sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-Cirou, via Pampelonne.

C. — (T. CLXXXIX) — *R. BELLATULUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 51 (1909).

Gracilis elegansque; *turio* debilis, glabrescens, epruinosus vel subglaucescens, glandulis tenuibus, longis, pallidis, aculeis tenuissimis, acicularibus obsitus; *folia* (16) 3-nata, parva, utrinque parce pilosa, subtus viridia, mediocriter et subinæqualiter serrata; *foliolum* terminale oblongum vel oblongo-rhombeum, basi integrum vel leviter emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *inflorescentia* pauciflora, laxa, aphylla, glabrescens, subinermis, glandulis tenuissimis, longis, pallidis obsita (1); *sepala* inermia, dense glandulosa, in fructu erecta; *petala* ovata vel oblonga (18), rubra; *stamina* purpurea stylos purpureos superantia; *germina* glabra. Fertilis.

β. ELEGANTISSIMUS. — *Foliolum* terminale obovatum; *folia* superiora subtus ± cinerascentia, styli virescentes.

GALLIA : *Tarn*, in regione montosa : Brassac, Anglès, Hautaniboul, etc.; Aude, forêt des Fanges (Marty). — δ. Haute-Garonne, Arbas, grotte de Bourusse.

XX — Flores albi.

103 — (T. CXC) — **R. SCABER** Wh. ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I, 683 (1825); W. et N. *Rub. germ.* p. 80, t. XXXII; Focke *Syn.* p. 840 et ap. *Asch. et Gr. Syn.* VI p. 568 (*excl. syn.*); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 118; Hal. *Oest. bromb.* p. 257; Barber *Fl. Oberl.* III p. 115; *R. Gremianus* Hayek.

Exsicc. — G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 571; *Rub. gall.* n° 143, 188; *Assoc. rub.* n° 842; Sud. *Bat. eur.* n° 39, 189, 579.

*Turio* (1) debilis, subteres, pruinosis, ± pilosus, pallidus, glandulis brevibus, aculeis debilibus, majoribus basi compressis, reclinatis vel subfalcatis, minoribus papulæformibus; *folia* (2, 3) pallide viridia, 3-5-nata, utrinque parce pilosa, subtus viridia, argute et subæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum, ovato-rhombeum vel leviter obovatum, basi emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *petioli* aculei falcati; *stipulae* lineares; *ramus* cylindricus, flexuosus, dense pilosus, pallidus, glandulis brevibus, aculeis tenuibus, reclinatis vel subfalcatis munitus, foliis 3-natis, argute et subinæqualiter serratis; *inflorescentia* (4) ± foliosa, breviter hirsuta, glandulis crebris, pallidis, plerumque diametro rachidis brevioribus, aculeis sparsis, flavescensibus, reclinatis falcatis munita (5); *pedunculi* medii patuli, 2-3-flori, pedicellis tenuibus; *sepala* tomentoso-viridia, albo-marginata, tenuiter glanduloso-aciculata (6), angusta, post anthesin (7) vulgo reflexa, interdum ± patula; *petala* alba (8), ovata vel oblonga; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* pilosum. — Julius.

β. FALLAX. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 10391. — Serratura inæqualis; *folia* leviter discolora; *sepala* patula.

γ. MEYERI; *R. Meyeri* G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 95 (*cum diagn.*) — Folia minute serrulata, caul. 5-nata; *foliolum* terminale ovatum, basi integrum; inflorescentia elongata; *sepala* reflexa.

δ. FALCICULIFER Sud. et Sabrs. — Inflorescentia aculeis crebris, falcatis, validis armata; *sepala* patula vel laxe erecta; *germina* glabra. Cetera ut in typo.

In locis montosis. — GERMANIA : Guestphalia, Saxonia, Silesia, Hercynia silva; BELGIA : Namur, Nafrairure (Gravet); Marchin (Wathelet); GALLIA : Saône-et-Loire, forêt de Pianois (Lucand); AUSTRIA : prope Steyer (Bayer sec. Halacsy), Styria. — β. GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz). — γ. GERMANIA : Eilenriede, prope Hannover, Koenigsberge prope Pyrmont (G. Braun); Bavaria, Waging (Progel). — δ. AUSTRIA : Styria orient., Tautendorf (Sabransky).

## HYBRIDA

*R. SCABER* × *BIFRONS*; *R. SEMISCABER*. — Differt a *R. scaber* foliis argute serratis, discoloribus, rarioribus, floribus sterilibus.

GERMANIA : Bavaria, Waging, prope Traunstein (Progel).

Obs. — Lé *R. conspectus* Genev., rapproché du *R. foliosus* W. N., pourrait aussi être subordonné au *R. scaber* Wh., qu'il rappelle par sa denticulure fine et ses turions pruineux; il en diffère par ses turions plus anguleux, ses folioles plus larges, ses aiguillons plus forts. Des spécimens du Rhône relèvent cette plante au *R. corymbosus* P.-J. Müll., ce qui me l'a fait détacher du *R. scaber*. — Le *R. mucronipetalus* P.-J. Müll. n'est pas identique au *R. scaber* Wh., ainsi que l'admet M. Focke (*ap. Asch. et Gr. l. c.* 568); il a les aiguillons plus forts, plus dilatés à leur base, ses folioles plus étroites, sa denticulure plus grossière, ses étamines moins longues, etc. Il est intermédiaire entre les *R. scaber* Wh. et *Schleicheri* Wh., et me paraît plus rapproché de ce dernier.

**104** — (T. CXCI) — *R. TERETICAULIS* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 173; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 105; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 119; *R. scaber* ssp. *tereticaulis* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 569, ex pte; *R. firmulus* Gremli O. B. Z. XXI (1871) p. 94; *R. brachyacanthus* Progel 8 Ber. B. V. Landshut, 26 (1882) p. p.; *R. glandulosus* var. *obovato-rotundatus* Fisch.-Ooster Rub. Bern. p. 34; *R. scabiformis* Hofmann, exsicc. (1900); *R. scaber* var. *botruosus* Kupcok; *R. serpens* var. *latifolius* Progel ex pte; *R. Bayeri* Schm. p. p., exsicc.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 86!; Billot *Fl. gall. et germ.* n° 1869 (s. n. *R. Bellardii*); *Assoc. rub.* n° 454, 455; Baenitz *Hb. eur.* n° 9041 (s. n. *R. exsoluti* non M. et L.); Gremli *Hb. norm.* n° 201 (s. n. *R. firmuli*); Sud. *Bat. eur.* n° 92!

*Turio* (1, 2) debilis, cylindricus vel subteres, glaucescens, pilosus, glandulis brevibus, tenuibus, erubescens, aculeis inaequalibus, tenuissimis, acicularibus, brevibus, rectis reclinatis munitus; *folia* 3-nata (3), raro 4-5-nata, utrinque parce pilosa, subtus viridia, argute, simpliciter et aequaliter mucronato-serrata; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum vel subovatum, basi emarginatum, longe et subabrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo longius; *petiolus* supra planus, pilosus, aculeis tenuibus, reclinatis; *stipulae* lineares; *ramus* teres, pilosus, aculeis sparsis, tenuibus, reclinatis munitus, foliis minute mucronato-serratis, subtus viridibus, foliolis terminalibus obovatis, acuminatis; *inflorescentia* (4) elongata, laxa, saepe usque apicem foliosa, rachide tomentosa, pubescenti, parce vel epilosa, glandulis tenuibus, erubescens, brevibus, plerumque diametro pedunculorum brevioribus, aciculis sparsis instructa (5); *pedunculi* medii patulo-ascendentes, 2-4 floribus longe pedicellatis, pedicellis patulis, tenuibus; *sepala* (6) tomentoso-viridia, acuminata, breviter pilosa, glanduloso-aciculata, in fructu patula vel laxe erecta (7); *petala* (8) parva, oblonga, alba; *stamina* alba stylis basi roseos vix aequantia; *germina* glabra; *receptaculum* breviter pilosum; pollen admixtum. — Julius-augustus.

β. *MICRODONTUS* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 120 (1900); *R. microdontus* M. et Lef. Vers. n° 186 (1859). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 580. — Folia ampla, subtiliter mucronato-denticulata; foliolum caul. terminale cordatum, breviter acuminatum; rachis leviter pilosa; styli virescentes.

γ. *ACUTICUSPIS* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) p. 320. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9018 (s. n. *R. acutifolii*, non P.-J. Müll.) — Turio pruinosis; dentes tenues, acuti; foliola ramealia terminalia longe cuspidata; inflorescentia arcuata, angusta, pedunculis ascendentibus.

δ. *BREVIGLANDULOSUS* Sud. *Bat. p.* 48 (1905) et exsicc. n° 148!; *R. Bellardii* Genev. Mon. ! non Wh. et N. — Gracilis et pallide viridis; aculei petiolares falcati; folia mucronato-serriculata, foliolis breviter acuminatis, ramealibus acutis; inflorescentia parva, brevis, pauciflora, glandulis pallidis brevibusque munita; stamina stylis parum superantia. — *R. scabro* Wh. similis.

ε. *CORDIGER* Sud. in hb. Müller; *R. hirtus* var. *subserrulatus* Progel; *R. heterophyllus* Utsch. p. p. — Turio purpureus, glaucescens; folia caul. 3-5-nata, subtiliter et inaequaliter serriculata; foliola lata, terminale suborbicularis, cordatum, abrupte acuminatum; inflorescentia densa, multiflora, pedunculis brevibus. Cetera ut in typo.

ζ. *BREVISTAMINEUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 82 (1902); *R. ovalifrons* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1907) p. 257; *R. Guentheri* f. *cordifolia brachyadenia* Progel hb. — Habitus typi sed aculei longiores, stamina brevissima, germina dense pilosa.

η. *SCLEROZYLLUS*; *R. sclerophyllus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 211, non Sud. — Gracilis; folia inaequaliter et duplikato-serrata; foliolum caul. terminale late ovatum; inflorescentia parva, densa; germina pilosa; cetera ut in typo. Forma vergens ad *R. fragariiflorum*.

θ. *LIPOTRICHUS*; *R. lipotrichus* Kupcok = *thyrsanthus* × *hirtus* ej. in hb. Sud. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 581! — Turio pruinosis; folia 3-5-nata, minute serriculata, subtus ± cinereo vel albo-tomentosa; foliolum terminale late cordato-ovatum; stamina stylis pallidos aequantia; germina glabra; sepala in fructu patula vel subreflexa. Forma ad *R. crassum* Hol. var. *peltifolium* vergens.

ι. *RUBRISTYLIFORMIS*. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 582. — Folia ut in typo sed minute mucronato-serriculata, subtus glabrescentia; glandulae brevissimae, parum apparentes; inflorescentia aphylla, pedicellis gracilis; sepala parce aculeata; petala late ovata; stamina stylis rubris breviora; germina glabra.

κ. *ARMATICAULIS*. — Aculei validi, compressi, erubescens; folia mucronato-serrulata, caul. 3-nata; foliolum terminale anguste ovatum; inflorescentia angusta, aculeis crebris armata; stamina stylis roseis breviora, germina glabra; parum fertilis.

In nemoribus montosis. — GALLIA: *Vosges*, *Valois*, *Bretagne*, *Languedoc*, *Pyrénées*, *Alpes*, *Jura*; BELGIA: *Prov. Namur*; GERMANIA: *Alsacia*, Prov. *rhenana*, *Badenia*, *Bavaria*, *Saxonia*; HELVETIA: AUSTRIA: HUNGARIA. — β. GALLIA: *Aisne* et *Oise* (Lefèvre). — γ. GERMANIA: *Badenia* (Goetz). — δ. GALLIA: *Maine-et-Loire*, *Béziers* (Genevier); *Valois*, *Chêne-l'Officier* (Questier); *Finistère*, *Huelgoat*. — ε. GALLIA: *Vosges*; GERMANIA: *Badenia*, *Silesia*, *Nesselgrund* (Kinscher), *Bavaria*, *Freyung* (Prechtlbauer), *Waldbüchen* (Progel). — ζ. GALLIA: *Nièvre*, *St-Honoré-les-Bains* (Bureau); HUNGARIA: *Bakabanya*, *Hrabova* (S. Kupcok). — η. HUNGARIA: *Magaslak* (Kupcok). — θ. HUNGARIA: *Bakabanya*, *Grunt* (S. Kupcok). — ι. AUSTRIA: *Styria*, *Sœchau* (Sabransky). — κ. GALLIA: *Haute-Garonne*, *Sengouagnet*, au col de Buret.

Obs. — Les *R. gracilicaulis*, *rariflorus* Gremli O. B. Z. (1871) p. 125 et *scabrifolius* l. c. p. 96 me sont inconnus. Peut-être appartiennent-ils au groupe du *R. tereticaulis*? Les diagnoses trop sommaires de Gremli ne permettent pas d'interpréter les espèces créées par ce botaniste et dont je n'ai pas pu voir des spécimens authentiques. D'après ce que j'ai appris de son ex-collaborateur M. E. Burnat, Gremli ne conservait même pas ses types! — Le *R. compactus* (non Utsch) = *hirtus* var. × *Guentheri* var. Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 258 est une forme peu normale dérivée du *R. tereticaulis*.

#### HYBRIDÆ

*R. TERETICAULIS* ? × *LASITHYRSUS*, *R. LASITHYRSOMORPHUS* Sud. hb. — Turio obtusangulus, pubescens, glaucescens, aculeis compressis; folia discolora, minute serrulata; inflorescentia laxa, breviter pilosa glandulosaque, aculeis sparsis, tenuibus; flores albi, steriles; stamina stylis aequantia.

GALLIA: *Haute-Garonne*, vallée de l'Arbas, à Montgaillard.

*R. TERETICAULIS* ? × *DURIMONTANUS*; *R. FRITSCHII* Sabrs. in Hayek Fl. Styr. exsicc. n° 350 (1906) (pr. sp.); Fl. Steierm. p. 769. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 583! — Turio obtusangulus, aculeis compressis, glandulis brevibus; folia 3-nata, superiora ± cinereo-tomentosa; flores albi, staminibus stylis brevioribus, sepalis subreflexis. *R. durimontanum* Sabrs. revocat.

AUSTRIA: *Styria*, *Sœchau* (Sabransky).

*R. TERETICAULIS* × *ULMIFOLIUS* Sud.; *R. SUBACULEATUS* Gandg. Rub. now. p. 114 (1884); *R. subinermis* M. et Lef. Vers. n° 101 (1859), non Rupr. — Differt a *R. tereticauli* P.-J. Müll. aculeis majoribus, foliis subdiscoloribus, foliolis obovatis, floribus roseis, sepalis reflexis. Sterilis.

GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Lefèvre), Montlevron (Questier).

*R. TERETICAULIS* × *BIFRONS* Sud. Diagn. p. 56 (1906); *R. SEMITERETICAULIS* Sud. l. c. — Folia *R. tereticaulis* P.-J. Müll. sed discolora; aculei validiores, glandulae breves; sepala patula.

GALLIA: *Valois*, Waligny (Questier); STYRIA: *Sœchau* (Sabransky).

*R. TERETICAULIS* × *TOMENTOSUS* Lloydianus; *R. CURTISEPALUS* = *carpathicus* × *tomentosus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 204. — Differt a *R. tereticauli* turione glabro, foliis subtus cinerascentibus, dentibus latis, sepalis reflexis, floribus sterilibus.

HUNGARIA: Bakabanya, in cæduso Tatiar et in valle Stampock (S. Kupcok).

*R. TERETICAULIS* × *INCANESCENS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1906); *R. ADENOPHYLLOIDES* Nob. ; *R. adenophyllus* Greml. in hb. Burnat, non G. Braun (1880); *R. vagus* Focke in Burnat *Fl. Alp. mar.* III, (1899) p. p. ap. Asch. et Gr. l. c., p. p. — *Turio pruinosis*; folia grosse serrata, leviter discolora; glandulae ut in *R. tereticauli*; sepala ± erecta. Sterilis.

ITALIA : *Liguria*, Chioanea, circa Ormea.

*R. TERETICAULIS* × *HEBECAULIS condensatus*; *R. WEISSENBURGENSIS* Sud. *Bull. Soc. Pyr.* n° 314 (1904) et exsicc. — *Habitus R. tereticauli* sed glandulae rarae, aculei parum inaequales, inflorescentia densa.

GERMANIA : *Alsacia*, Weissenburg, à la Reissbach (Müller).

*R. TERETICAULIS* (grex) × *PODOPHYLLUS holochlorus*; *R. HOLOCHLOROIDES* Sud. et Sabrs. — Aculei leviter compressi, folia minute serriculata, 3-5-nata, foliolis latis ut in *R. holochlora*; turio subteres, inflorescentia dense glandulosa, sepala erecta, flores parvi ut in *R. tereticauli*. Substerilis.

AUSTRIA : *Styria orientalis*, Soechau, in silvis Kohegraben (Sabransky).

*R. TERETICAULIS* × *PULCHER* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906); *R. LUXATUS* Sud. l. c. — *Turio teres*, pilosus; folia subdiscolora, argute serrata, 3-nata, foliolis latis; inflorescentia flexuosa, subinermis; flores rosei, sepala erecta.

GALLIA : *Valois*, bois de Montigny (Questier).

*R. TERETICAULIS* × *FOLIOSUS corymbosus* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906); *R. VITTOZII* Sud. l. c. — *Habitus R. tereticaulis* sed aculei majores; inflorescentia *R. corymbosum* revocat. Calyx patulus.

HELVETIA ? : Montheron, fontaine des Meules (E. Vittoz).

*R. TERETICAULIS* × *MENKEI* Sud. : *R. DEBILIS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 98 (1868) et exsicc. n° 79 ! — *Turio teres*, serratura tenuis ut in *R. tereticauli*, sed inflorescentia laxa, brevis, hirsuta, pedunculis patulis; petala magna, alba; stamina alba stylis superantia; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA : *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Camberg (N. Boulay).

\* *R. TERETICAULIS* × *HIRTUS* (grex) Sud.; *R. HEMATOCAULON* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 138 et exsicc. n° 422 (1869) ! — Differt a *R. tereticauli* inflorescentia arcuata, glandulis longioribus, rubris, staminibus brevibus. Parum fertilis. Planta fusco-purpurea.

GALLIA : *Vosges*, Rochesson, à Pleinfaing (Pierrat).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

##### I. — *Turio* distincte pilosus.

A. — *Stamina* stylis breviora vel æquilonga.

- a. — *Folia* minute, subsimpliciter et æqualiter mucronato-serrata.
  - 1. — *Inflorescentiae* rachis tomentosa, parce et breviter pilosa.....
  - 2. — *Inflorescentiae* rachis piloso-hirsuta.....
- b. — *Folia* grosse et inæqualiter serrata; *stamina* vulgo brevissima.....

B. — *Stamina* stylis superantia.

- a. — *Foliolum* caul. terminale anguste ovatum vel rhombeum.....
- b. — *Foliolum* caulinum terminale obovatum.
  - 1. — Rachis breviter et parce pilosa; *folia* minute mucronato-denticulata.....
  - 2. — *Inflorescentiae* rachis piloso-hirsuta.....
- c. — *Foliolum* caul. terminale latum, basi cordatum.
  - 1. — *Foliolum* caul. terminale orbiculare; rachis hirsuta.
    - a. — *Foliolum* caulinum terminale acuminatum.....
    - b. — *Foliolum* caul. terminale cuspidatum.....
  - 2. — *Foliolum* caul. terminale late ovatum; rachis epilosa.....

##### II. — *Turio* fere glaber.

A. — *Stamina* stylis superantia; serratura tenuis.

- a. — *Inflorescentia* laxa, rachide epilosa; sepala vulgo erecta.....
- b. — *Inflorescentia* densa; sepala in fructu reflexa; rachis epilosa.....

B. — *Stamina* stylis breviora.....

*R. tereticaulis* P.-J. Müll.  
*R. DERASIFOLIUS* Sud. B.  
*R. FRAGARIIFLORUS* P.-J. Müll. c.

*R. CURTIGLANDULOSUS* Sud. C.

*R. SAXETANUS* Sud. D.  
*R. SUBALPINUS* Sud. Db.

*R. FISCHER-OOSTERI* Sud. E.  
*R. LEPTOPUS* Sud. Eb.  
*R. MIOSTYLUS* N. Boul. b.

*R. ARGUTIPILUS* Sud. F.  
*R. SCHNETZLERI* Favrat Fb.  
*R. FINITIMUS* Sud. Fc.

b. — (T. CXCII) — *R. miostylus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 105 (1868); *R. pendulinus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 121 ex pte; *R. brachyacanthus* var. *effusus* Progel, p. p.; *R. latifrons* Progel hb. p. p. !

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 85 !

A *R. tereticauli* dignoscitur: foliolo terminali (1) late ovato, cordato; foliis ramealibus grosse serratis, foliolis terminalibus late ovatis, emarginatis, acutis; inflorescentia (2) densa; staminibus (3) stylis superantibus. Petala oblonga (4). — Differt a *R. hirtio* W. K. glandulis brevissimis.

β. *GLAUCESCENS*; *R. Guentheri* f. *stricta* Goetz in Baenitz *Hb. eur.* n° 10372. — *Turio pruinosis*, parum pilosus; folia obscure viridia; inflorescentia laxa, brevis; germina glabra.

γ. *LÆTUS*; *R. lœtus* Progel hb. p. p.; *R. tereticaulis* f. *cordifolia* ej. — Serratura tenuis, acuta; inflorescentia laxa, flexuosa, pallida, breviter pilosa; germina pilosa; calyx subreflexus.

δ. *BOLLE*; *R. Bollæ* Sabrs. O. B. Z. XXXVI, 289 (1886). — *Folia magna*, subtiliter mucronato-denticulata; caul. 3-5-nata; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia brevis, laxa, pallida, breviter pilosa; germina glabra.

ε. *SUBSERPENS*; *R. villiramis* Kupcok non Sud. — Viridi-flavescens; *folia* minute serriculata; *foliolum* terminale subemarginatum, breviter acuminatum; inflorescentia pallida, densa, breviter pilosa, calyx erectus; germina glabra.

ζ. *GALLIA*: *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Camberg (Boulay); *BAVARIA*: Wonneberg, Rieselberg (Progel). — ζ. *GERMANIA*: *Badenia*, Siegelau (Goetz). — η. *BAVARIA*: Waldmünchen (Progel). — θ. *HUNGARIA*: inter Posonium et Reese (Sabransky). — ε. *HUNGARIA*: Bakabanya, Ham-poch (S. Kupcok); *BAVARIA*: Freyung.

η. — (T. CXCII) — *R. fragariiflorus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 173, n° 49.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 146 !

Differt a *R. tereticauli* P.-J. Müll.: aculeis validioribus, minus inæqualibus, petiolaribus falcatis; foliis (5) grosse et inæqualiter serratis, caul. 3-natis; foliolo terminali anguste ovato vel subrhombico, leviter emarginato, acuminato; staminibus brevissimis, germinibus pilosis. Inflorescentia brevis, aphylla, breviter pilosa (6), pedunculis patulis; sepala in fructu patula (7); petala parva, ovata (8).

θ. *PERANGUSTUS*; *R. tereticaulis* v. *perangustus* Sud. in hb. Müller; *R. perangustus* P.-J. Müll. ined. — *Foliolum* caul. terminale rhombicum, basi sæpe integrum; *stamina* stylos æquantia; germina glabra.

γ. CRETACEUS ; *R. tereticaulis* v. *cretaceus* Sud. in hb. Müller. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 147. — Turio dense pilosus ; inflorescentia brevis, corymbosa ; sepala in fructu erecta.

δ. SERPENTIFORMIS Sud. Rub. tarn. 51 (1909). — Exsicc. : Bat. eur. n° 584. — Aculei tenues ; foliolum caul. terminale rhombeum ; inflorescentia pallida, densa, arcuata, pedunculis patulo-ascendentes ; stamina brevissima ; germina glabra. Fertilissimus.

ε. EMARGINATUS ; *R. tereticaulis* var. *macellus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 219. — Aculei tenues ; foliolum caul. terminale late ovatum, abrupte acuminatum ; inflorescentia foliosa ; petala ovata, emarginata ; stamina brevissima ; germina glabra.

ζ. TRIANGULIFORMIS ; *R. trianguliformis* Spribille in hb. Sud. — Gracilis ; turio parce pilosus ; aculei tenues ; foliolum caul. terminale ovatum, cordatum, sensim et longe acuminatum ; inflorescentia brevis, aphylla, pedunculis patulis ; folia argute et inaequaliter serrata.

η. CTENODON ; *R. ctenodon* Sabrs. in hb. Sud. — Turio dense pilosus ; folia grosse et inaequaliter subinciso-serrata ; foliolum terminale cordato-ovatum, acuminatum ; pedunculi ascendentes ; germina glabrescentia.

θ. MACELLIFORMIS. — Folia ut in typo ; aculei parvuli ; inflorescentia laxissima, flexuosa, foliosa, subinermis, pallida, pedunculis patulis, tenuibus ; flores parvi ; petala angusta ; stamna stylis pallidis valde breviora ; germina glabra.

GERMANIA : Alsatio, forêt de Steinseltz (Müller) ; GALLIA : Vosges, Allarmont (Blau). — β. GALLIA : Vosges, Gérardmer ; Ariège, Laurenti (Marty) ; Haut-Garonne, Arbas, Sengouagnet. — γ. GALLIA : Cher, forêt de Menetou-Salon (Ripart) ; Haute-Garonne, Arbas, à Pène-Blanque. — δ. GALLIA : Tarn, Anglés. — ε. GALLIA : Luchon ; HUNGARIA : Bakabanya, monte Tatiar (Kupcok). — ζ. SILESIA : Schweidnitz (Spribille), Mittelwalde (Kinscher). — η. STYRIA : Söchau (Sabransky) ; SILESIA : Mittelwalde (Kinscher). — θ. BAVARIA : Traunstein, Siegsdorf-Heitau (Prechtielsbauer).

B. — T. CXCII) — **R. derasifolius** Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905), p. 334 ; *R. sparsipilus* Genev. in hb. Boreau ; *R. argutipilus* Sud. Rub. Hb. Bor., non Rub. Pyr. ; *R. derasus* P.-J. Müll. in hb. Levent.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 9947 (s. n. *R. excavati* var.) ; Sud. Bat. eur. n° 585, 586.

Satis validis ; aculei caulinii reclinati ; folia amplissima, simpliciter et tenuiter mucronato-serrata ; foliolum terminale (9) latum, breviter obovatum vel obovato orbiculare, leviter emarginatum, abrupte et breviter acuminatum ; inflorescentia brevis, piloso-hirsuta (10), parum armata, glandulis fuscis, diametrum peduncularum fere aequalibus ; petala angusta (12) ; stamna stylis vix aequalia (11) ; germina parce pilosa ; sepala laxe erecta.

β. NEUROPHYLLUS ; *R. tereticaulis* v. *neuroph.* Sud. in hb. Müller ; *R. neurophyllus* P.-J. Müll. hb. — Planta viridi-flavescens ; folia caul. 5-nata ; inflorescentia elongata ; germina glabra.

? γ. LEJOLISH ; *R. Lejolisi* Corb. Nouv. Fl. Norm. p. 209 (1894) ; *R. gymnostylus* Assoc. rub. n° 860, non P.-J. Müll. — Exsicc. : Assoc. rub. n° 860 ; Rub. gall. n° 89. — Foliolum terminale obovatum, vix emarginatum, longe acuminatum ; folia superiore subtus ± cinerascentia ; ramus dense pilosus ; inflorescentia elongata, multiflora, densa ; styli rubri. Parum fertilis. — An *R. tereticaulis* × *Menkei* ?

δ. SUBLANATUS ; *R. lanatus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 214, non Focke. — Turio pruinosis, dense tomentoso-villosus ; folia coriacea, minute serrata, subtus molliter pubescenti-velutina ; foliolum caul. terminale obovato-suborbicularis, longe petiolatum ; rachis dense villosa, subinermis ; styli rosei ; germina pilosa.

GALLIA : Marne, bois de Mersy (Levent) ; Ardèche, Suc de Baudouin (Revol) ; Pyrénées, Arbas ; Valois, forêt de Retz, la Ferté-Milon, Saint-Martin (Questier) ; GERMANIA : Badenia, Staufen (Goetz) ; Bavaria, Nierharding (Progel) ; BELGIA : Marchin (Wathelet). — β. GALLIA : Vosges, Bambois (Pierrat) ; GERMANIA : Thuringia, Sonneberg (Kinscher). — γ. GALLIA : Manche, Cherbourg (Corbière). — δ. HUNGARIA : Bakabanya ; Tatiar (Kupcok) ; GERMANIA : Silesia, Lervin (Barber).

OBS. — Müller avait déterminé cette plante *R. derasus* ; mais le type *derasus*, décrit au groupe du *R. foliosus* Wh., a le turion anguleux, la denture irrégulière, les pétales plus larges, et dérive peut-être du *R. tereticaulis* par croisement. — La plante du duché de Bade a les carpelles glabres et les étamines moins courtes, mais ne paraît pas différer autrement de celle de la Marne.

C. — (T. CXCII) — **R. curtiglandulosus** Sud. Rub. Pyr. p. 173 (1901) ; *R. serpens* var. *scabriformis* Hofmann Pl. crit. sax. (1903) n° 103 ; *R. brachyacanthus* f. *angustata* Progel ; *R. scaber* var. *ferrugineus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 217 ; *R. extensus*, *carpaticus* × *hirtus* ? ej. exsicc. ; *R. laetus* Progel hb. p. p.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 587 (f. germ. glabris), 588.

Differt a *R. tereticauli* P.-J. Müll. : turione scabriore, foliis (13) glaucescentibus, serratura inaequali, foliolis terminibus anguste ovatis vel rhomboidis, emarginatis, staminibus stylis virescentes superantibus. Inflorescentia breviter pilosa (14), laxa, glandulis pallidis, brevibus ; germina pilosa, raro glabra ; sepala erecta (15), patula vel laxe reflexa (v. *umbrosus* Sud. l. c.). Flores albi vel roseoli [*R. dichrous* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 222].

β. SCYTHICUS Sud. Bat. eur. p. 60 (1906) et exsicc. n° 190 ! ; *R. tereticaulis* v. *scythicus* Sabrs. O. B. Z. (1905) p. 389. — Inflorescentia hirsuta, aciculis crebris, flavescens munita.

? PROTENSUS ; *R. protensus* N. Boul. Assoc. rub. ex pte, n° 394 (1880) ; *R. marmarcus* = *serpens* var. *lividus* × *tereticaulis* Kupcok l. c. p. 235 (1910). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 589. — Folia subtus glabrescentia, supra pilosa ; styli rubri ; germina glabra ; glandulae rubrae.

δ. PINETORUM ; *R. pinetorum* N. Boul. Ronc. vosg. p. 139 (1869) et exsicc. n° 123 ! ; *R. brevipetiolatus* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903) 72 (79), p. p. — Foliolum caul. terminale oblongo-rhombeum, breviter petiolatum ; folia simpliciter mucronato-serrata ; inflorescentia ut in *R. tereticauli* sed stamna longa.

ε. OVALIFORENS Sud. Rub. tarn. p. 52 (1909). — Folia typi sed subtus pubescentia ; inflorescentia brevis, laxa, diffusa ; petala dilute roseola ; stamna roseola stylis rubros superantia ; germina pilosa ; calyx erectus.

ζ. CLIVICOLUS ; *R. cliviculus* Sud. Rub. Pyr. p. 159 (1901) ; *R. adenophyllus* (G. Br.) f. *calvata* Progel. — Serratura tenuis ; foliolum caul. terminale rhombeum, acuminatum ; folia subtus pubescentia ; petala pallide rosea ; stamna alba stylis basi roseos superantia ; germina glabra. — Flores rosei *R. purpuratum* revocant ; glandulae breves *R. tereticaulem*.

? SUBROLIOSUS ; *R. curtiglandulosus* × *foliosus* ? — Serratura grossa, inaequalis ; foliolum terminale obovatum, cuspido-tum ; inflorescentia elongata, foliosa, flexuosa, subinermis ; sepala patula ; germina glabrescentia ; fructificatio non tota.

θ. LAZERGESII. — Glandulae purpureae, relative longae ; folia subtus molliter pubescentia, argute serrulata ; foliolum terminale anguste ellipticum vel rhombeum ; inflorescentia rubra, parce pilosa ; stamna alba stylis purpureos superantia, germina glabra.

GALLIA : Pyrénées, Vosges, Tarn, Isère ; GERMANIA : AUSTRIA ; HUNGARIA ; HELVETIA ; BELGIA. — β. AUSTRIA : Styria, Söchau (Sabransky). — γ. GALLIA : Vosges, Haute-Garonne, Tarn, Ariège ; GERMANIA : Badenia : AUSTRIA : Styria ; HUNGARIA : Bakabanya. — δ. GALLIA : Vosges, Saint-Dié, forêt du Cambey (N. Boulay) ; Haute-Savoie, Monts Voiron. — ε. GALLIA : Tarn, Hautaniboul. — ζ. GALLIA : Luchon ; Tarn, Grandval ; GERMANIA : BAVARIA, Posthof (Progel). — η. GERMANIA : BAVARIA, Bad Empfing, prope Traunstein (Kaufmann). — θ. GALLIA : Ariège, Lavelanet, montagne calcaire de Soula.

## HYBRIDÆ

*R. CURTIGLANDULOSUS × BIFRONS*; *R. SABRANSKYANUS* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) 208, *non Hayek*; *R. bifrons × Radula* ej. — *Turio teres*; aculei validi, subæquales, rameales recti; glandulæ raræ; folia discolora, acute serrata; flores rosei, sepala reflexa. Sterilis.

HUNGARIA: *Bakabanya*: in colle Prielozok (S. Kupcok.)

*R. CURTIGLANDULOSUS × TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tarn. p.* 52 (1909); *R. PERDUBIUS* Sud. l. c. — Dentes lati; folia parum subdiscolora, sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Albine.

D. — (T. CXCII) — **R. saxetanus** Sud. *Rub. Pyr. p.* 15 (1898), p. 133; *R. farinosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 213.

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 148!

*Turio* teres, pilosus, glaucescens, parce glandulosus, sublœvis, aculeis tenuibus; *folia* 3-nata, subtus pubescentia, subtiliter mucronato-serriculata; *foliolum* terminale (16) obovatum, basi integrum vel subemarginatum, satis abrupte acuminatum, breviter petiolulatum; *ramus* pilosus, parce glandulosus, parum armatus, foliis subtiliter mucronato-denticulatis; *inflorescentia* brevis, densa, brevissime pilosa (17), glandulis sparsis, brevibus, aculeis tenuibus munita; *sepala* (18) tomentosa, parce aculeata, breviter glandulosa, post anthesin patula vel erecta; *petala* (19) alba vel pallide roseola (s. var. *roseulus* Sud. l. c.). — Exsicc.: *Rub. rar.* n° 149, obovata vel ovata; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* fere glabra; *pollen* parum admixtum. — Parum heteracanthus glandulosusque.

β. *APRICUS* Sud. l. c. 133; *R. scabiformis* Hofmann exsicc., p. p. — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 150. — Inflorescentia laxa, armata; styli rubri.

γ. *ELONGATIFLORENS* Sud. *Rub. tarn. p.* 52 (1909); *R. foliosus* v. *albiflorus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 126. — Exsicc.: *Assoc. rub.* n° 506 (1882). — Folia caul. 5-nata; foliolum terminale elliptico-obovatum, sensim acuminatum; inflorescentia angusta, elongata, aphylla.

GALLIA: *Pyrénées*, Luchon, Cauterets, Eaux-Bonnes, Eaux-Chaudes, etc.; *Tarn*, Crespinet, Ambialet; SAXONIA; HUNGARIA. — γ. *Nord*, Cassel, monts des Récollets; *Tarn*, Paulin.

## HYBRIDÆ

*R. SAXETANUS* v. β × *APICULATUS granitogenes*; *R. GABARINUS* Sud. *Rub. Pyr. p.* 133 (1901). — Aculei validi; folia 3-5-nata, subtus tomentoso-velutina; rachis pilosa, armata; flores rosei, steriles.

GALLIA: *Basses-Pyrénées*, inter Gabas et Eaux-Chaudes.

*R. SAXETANUS* × *BABBINGTONII insuetus*; *R. SEPARABILIS* Sud. *Rub. Pyr. p.* 133 (1901). — Differt a *R. saxetano* turione angulato, heteracanthiore, aculeis validioribus, inflorescentia multiflora, floribus roseis, parum fertilibus.

GALLIA: *Basses-Pyrénées*, inter Gabas et Eaux-Chaudes.

*R. SAXETANUS* × *SERPENS* v. *puripulvis*; *R. ARGUTISPINUS* Sud. l. c. p. 134 (1901). — A *R. saxetano* dignoscitur turione aciculato, inflorescentia glaucescens, multiflora.

GALLIA: *Pyrénées*, Luchon, val de Bure.

b. — (T. CXCIII) — *R. subalpinus* Sud. *Rub. Pyr. p.* 14 (1898).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 590!

A *R. saxetano* differt: validiore; aculeis inæqualioribus; foliis 3-5-natis (1), acute serratis, foliolis latioribus, terminali obovato-orbiculari; inflorescentia elongata, multiflora, densa, hirsuta (2). *Petala* (4) alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* pilosa; *calyx* erectus (3).

β. *INTERSITUS*; *R. intersitus* Sud. l. c. 15 (1898). — Foliola minus lata, grosse serrata; inflorescentia laxior, subinermis; *petala* pallide rosea.

GALLIA: *Hautes-Pyrénées*, Cauterets. — β. *Hautes-Pyrénées*, Cauterets; *Tarn*, Saint-Amans.

E. — (T. CXCIII) — **R. Fischer-Oosteri** Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp. p.* 151 (1905); *Diagn.* (1906); *R. glandulosus* var. *montanus* et var. *cordatus* Fischer-Ooster *Rub. Bern. p.* 34.

Gracilis; *turio* dense pilosus; *folia* (5) caul. 3-nata, utrinque pilosa, argute denticulata, subtus viridia; *foliolum* caul. terminale cordato-orbiculare, acuminatum; *ramus* pilosus, subinermis, foliolis latissimis, suborbicularibus, cordatis, breviter acuminatis; *inflorescentia* interrupta, foliosa, densa, subinermis, piloso-hirsuta, glandulis brevibus munita (6); *pedunculi* (7) breves, ascendentes; *calyx* erectus; *petala* ovata (8); *stamina* stylos superantia; *germina* glabra.

HELVETIA: *Berne*, Zimerwald, Längenberg (Fischer-Ooster).

b. — (T. CXCIII) — *R. leptopus* Sud. hb.

Pallide viridis; *turio* subangulatus, glaucescens, pilosus, aculeis tenuibus; *folia* 3-nata (9), subtiliter mucronulato-denticulata, parum pilosa; *foliolum* caul. terminale orbiculare, cordatum, apice truncato-cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius; *inflorescentia* elongata, foliosa, hirsuta, subinermis, glandulis fuscis, crebris obsita (10); *sepala* erecta (11); *stamina* stylos superantia; *germina* glabra.

GALLIA: *Vosges*, Vagney, à Lémont (Boulay).

F. — (T. CXCIII) — **R. argutipilus** Sud. *Rub. Pyr. p.* 174 (1901); *R. scaber* var. *oligotrichus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 216.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 591.

*Turio* teres, fere glaber, epruinosus vel subglaucescens, aculeis tenuibus munitus; *folia* 3-5-nata (12), minute serrata, subtus viridia glabrescentiaque; *foliolum* caul. terminale ovatum vel obovatum, subemarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* laxa, grandis, breviter et parce pilosa, glandulis brevibus (13), pedunculis longis, ascendentibus, parum armatis; *calyx* erectus; *stamina* stylos superantia (14); *germina* glabrescentia. *Pollen* parum admixtum; *petala* alba vel roseola.

β. *NUDIPES*. — Inflorescentia inermis, subeglandulosa.

γ. *PSEUDO-BELLARDII*; *R. tereticaulis* v. *pseudo-Bellardii* Sud. *Ronc. bret. p.* 22 (1902); *R. flexuosus* Lej. *Rev. Spa* (1824), prius; *R. Michelianus* Lej. p. p.; *R. serpens* Wh. ap. Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II p. 172, ex pte! — Foliolum caul. terminale æqualiter ellipticum ut in *R. Bellardii*.

δ. FRAGILIPES ; *R. fragilipes* Sud. *Rub. Pyr.* p. 174 (1901). — Foliolum caul. terminale suborbiculare ; pedunculi graciles, patuli ; germina glabra.

ε. ANAMPHIESTUS ; *R. anamphiestus* G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 78 ; T. Bräeucker *Rub.-Art.* p. 71. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 592. — Turio glaucescens, validus ; folia caul. 3-5-nata ; serratura tenuis ; foliolum terminale subobovatum, emarginatum ; inflorescentia subinermis, pedunculis ascendentibus, glandulis relative longis ; germina glabra. Forma vergens in *R. serpentem*.

ζ. HENRICI ; *R. Henrici* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 230 ; *R. hontensis* × *vestitus* ej. l. c. — Folia magna, caulinata, 3-5-nata, argute serrulata ; foliolum terminale suborbiculare, cordatum ; inflorescentia brevis, parce aciculata, pedicellis brevibus ; petala roseola ; germina pilosa. Fertilis.

η. HECKOI ; *R. Heckoi* = *nemorusus* × *tereticaulis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 231. — Turio glaucescens ; foliola latia, marginibus sese tegentia, terminale late ovatum vel suborbiculare, profunde cordatum ; serratura inaequalis ; styli purpurei, germina glabra.

θ. ARBASCENSIS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 593 ! — Inflorescentia subinermis, pedunculis patulis ; petala roseola, ovata ; stamina basi rosea styllos roseos superantia ; germina pilosa. Cetera ut in typo. Vergens in *R. purpuratum*.

ι. CHLOOCALYX. — Gracilis ; folia caul. 3-nata ; foliolum terminale oblongum vel oblongo-obovatum, sensim acuminate ; inflorescentia laxa, foliosa, multiflora, epilosa, mediocriter armata ; sepala viridia, petala parva, germina pubescentia. *R. ruddis* W. N. gracilis habitum habet, sed turio teres, glaucescens.

GALLIA : *Pyrénées*, Luchon, Arreau, etc. ; *Tarn*, Aussillon, Nages ; *Cantal*, Chabillac (Charbonnel) ; *Aude*, forêt des Fanges (Marty), le Clat (Dages) ; *Haute-Savoie*, Mt Mirantin (Perrier) ; GERMANIA : *Prov. rhénane*, Eremberg (Bodewig) ; *Silesia*, Dirsdorf (Kischer) ; HUNGARIA : Bakabanya (S. Kupcok). — β. Pyréennes. — γ. GALLIA : Finistère, Huelgoat ; BELGIA : BAVARIA : Waldmünchen (Progel). — δ. GALLIA : Luchon. — ε. GERMANIA OCCID. : Osterode (G. Braun) ; GALLIA : *Cantal*, Chabillac (Charbonnel) — ζ. et η. HUNGARIA : Bakabanya : in valle Grunt (Kupcok). — θ. GALLIA : Haute-Garonne, Arbas, à Pène Blanque. — ι. BAVARIA : Traunstein (Scherzer).

b. — (T. CXCIII) — *R. Schnetzleri* Favrat *Bull. Soc. Vaud. sc. nat.* XXI, 119 (1881) ; *Cat. Ror. Suis.* p. 27 ; *R. divexi-ramus* C. *Schnetzleri* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 621 (1902).

*Turio* (15) obsolete angulatus, glabrescens ; *folia* 3-nata ; *foliolum* caul. terminale anguste ovatum (16), subemarginatum, sensim acuminate ; *inflorescentia* angusta, densa, breviter hirsuta, pedunculis brevibus (17) ; *sepala* post anthesin reflexa ; *stamina* styllos superantia ; *germina* pilosa.

HELVETIA : bois du Jura vaudois, près de la Gouille Margot (Favrat, Schmidely) ; GERMANIA : *Saxonia*, Lausitz (Missbach).

Obs. — Le suivant, dont je n'ai pas vu de spécimens authentiques, semble se placer ici. J'ai reçu de Holuby, sous le nom de *R. Ebneri*, des échantillons qui appartiennent au *R. serpens* Wh. micr. *R. longisepalus* P.-J. Müll.

ρ. EBNERI Kerner *Nov. Pl. spec.* III, 46 (1871) ; Focke *Syn. p. 390* ; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 570. — Turio glabrescens, glaucescens ; folia caul. 3-5-nata, argute serrata ; foliolum terminale latum, ovatum, leviter emarginatum, breviter acuminate ; inflorescentia brevis, breviter pilosa, parum armata ; sepala erecta ; stamina styllos superantia. — Tirolia, Innsbruck, etc... ? (Kerner).

c. — (T. CXCIII) — *R. finitimus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 21 (1898) ; *R. longistylus* f. *innocens* Borbas *Ung. Bot. Blatt.* (1903) p. 3, sec. Kupcok exsicc.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 594.

*Turio* (18) glaber, glaucescens ; *folia* 3-5-nata, argute serrata ; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum, leviter emarginatum, acuminate ; *inflorescentia* subaphylla, subinermis, epilosa vel breviter pilosa, glandulis brevissimis munita ; *sepala* inermia, patula vel laxe erecta ; petala alba vel pallide roseola ; *stamina* alba stylis breviora (19) ; *germina* pubescens. — *R. ruddis* similis.

β. GLABRICAULIS ; *R. glabricaulis* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906). — Turio glandulosior ; rami glandulæ longæ ; inflorescentia angusta, elongata ; sepala dense glandulosa, parce aciculata ; germina pilosa.

γ. INNOXIUS ; *R. innoxius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 160 (1901) ; ? *R. rugosulus* Sabrs. ; *R. gracilescens* Prog. *Bot. Ver. Landsh.* (1882), 104, pr. min. p. — Folia 3-nata, minute mucronato-denticulata ; foliolum caul. terminale breviter obovatum, cuspidatum ; styli virides ; germina glabra.

δ. RUBRISTYLUS Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1909) ; *R. pilinocephalus* Progel, ex pte. — Folium caul. terminale breviter obovatum ; inflorescentia diffusa, rachide hirsuta ; stamina rubra, brevissima ; styli rubri ; germina glabra.

ε. JUCUNDIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1909) ; an *R. finitimus* var. δ. × *ulmifolius*? — Folia subtiliter mucronulato-sericeolata, superiora leviter discolora ; foliolum caul. terminale oblongo-obovatum ; pedunculi ascendentibus ; stamina alba, brevissima ; styli rubri ; germina glabra.

ζ. MEGATHYRSUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 595 ! — Folia magna ; foliolum terminale suborbiculare, emarginatum, breviter acuminate ; inflorescentia ampla, pyramidalis, aphylla, multiflora, rachide pilosa, pedunculis patulis ; stamina alba, styli virescentes, germina glabra.

η. PORPHYROGYNUS ; *R. tereticaulis* var. *porphyrogynus* Sabrs. in hb. Sud. — Folia magna, inaequaliter serrata ; foliolum terminale ovatum, emarginatum, acuminate ; rachis subepilosa, aculeis flavescentibus, crebris munita ; stamina alba stylis purpureis breviora ; germina pilosa. Forma vergens in *R. rivulare* (*leptobelum*).

θ. SIMULANS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 596. — Folium terminale anguste obovatum ; inflorescentia breviter pilosa glandulosaque, subinermis ; petala ovata ; stamina styllos lutescentes subaequantia ; germina pilosa. *R. argutipilo* affinis.

GALLIA : Pyréennes, Cauterets, Arbas ; Aude, forêt des Fanges (Marty) ; Cantal, Leynhac (Lavergne) ; Tarn, Burlats, Lacaune ; GERMANIA : Silesia, Mittelwalde (Kinscher), Bavaria, Waldmünchen (Progel) ; AUSTRIA : Styria, Moravia ; HUNGARIA : Bakabanya (S. Kupcok). — β. GALLIA : Pyréennes. Luchon. — γ. Pyréennes : GERMANIA : Bavaria. — δ. GALLIA : Tarn, Lacabarède ; BAVARIA : Waging (Progel). — ε. GALLIA : Tarn, Lacabarède. — ζ. GALLIA : Tarn, Grésigne. — ι. AUSTRIA : Styria : Soebach (Sabransky). — θ. GALLIA : Tarn, Sérénac.

#### HYBRIDA

*R. FINITIMUS* var. θ. × *LITHOPHILUS* ; *R. SUBDIVERGENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Differt a *R. finitimus* var. θ. turione angulato, aculeis validioribus, densioribus, foliolis latioribus.

GALLIA : Turn, Lacabarède.

105 — (T. CXCIV) — **R. SCHLEICHERI** Wh. in Boenning *Prod. Fl. Monast.* p. 152 (1824) ; in Tratt. *Rosac. Mon.* III, 22 (1823) ? ; ap. Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 680 ; Ser. ap. DC. *Prod.* II p. 562 ; W. et N. *Rub. germ.* p. 68, t. XXIII (*mala*) ; Rchb. *Fl. excurs.* p. 604 ; Focke *Syn. p. 361* et ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 604 ; Hal. *Oest. bromb.* p. 267 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 111, p. p. ; Barber *Fl. Oberl.* III p. 107 ; *R. spinulosus* P.-J. Müll. in *Flora p. 169* (1858) ; *R. Schleicheri* × *Bellaridii* Utsch a interm. gen. *Rub.* Münster i. W. (1896) ; *R. macrophyllus* × *serpens* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9058 ; *R. scaber* Cott. et Cast. *Guide Fr. p. 78*, ex pte. — Excl. *R. Schleicheri* Genev., Bor..

Exsicc. — G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 58 ; *Rub. gall.* n° 88, 145 ; Baenitz *Hb. eur.* n° 8023, 9058 ; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 34 ; Sud. *Bat. eur.* n° 42, 597.

*Turio* (1) cylindricus, debilis, subglaucescens, laxe pilosus, heteranthicissimus, glandulis longis, inaequalibus, aculeis crebris, flavescentibus, majoribus manifeste compressis, basi dilatatis, reclinatis falcatisve, minoribus aciculatis, papuliformibus munitus ; *folia* (2) plerumque 3-nata, nonnulla 4-5-nata, utrinque parce pilosa, subtus viridia, satis grosse et inaequaliter serrata ; *foliolum* terminale anguste ovato-rhombeum vel obovato-rhombeum, basi subemarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius ; *petiolus* supra planus, aculeis crebris armatus, majoribus falcatis ; *stipulae* lineares ; *ramus* cylindricus, pilosus, dense glanduloso-aciculatus, aculeis falcatis, foliolis terminalibus rhombicis ; *inflorescentia* (3) primum nutans, deinde erecta, angusta, basi foliosa, piloso-hirsuta, dense glandulosa, glandulis inaequalibus, plerumque diametrum rachidis longe superantibus, aculeis flavescentibus, reclinatis falcatisve munita (4) ; *pedunculi* medii paulo-ascendentes, pauciflori ; *sepala* (5) tomentoso-viridia, ovata, acuminata, pilosa, glandulosa aculeataque, in flore reflexa, in fructu patula vel ± erecta (6), raro reflexa ; *petala* (8) oblongo-spatulata, alba ; *stamina* alba stylis virescentes superantia ; *germina* pilosa, raro glabra [var. *grandidentatus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 109 (1911)] ; *receptaculum* pilosum ; pollen admixtum (9). — Junius-julius.

β. CONJUGATUS Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1909) ; *R. flandricus* Boul. et B. de Lesd. exsicc. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 598. — Foliola anguste rhombea, grosse dentata ; sepala in fructu reflexa vel patula (*R. Schl. f. lancifolia* Barber) ; germina glabra.

γ. ERIOCRADUS Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1909). — Folia acute et duplicato-serrata, subtus pilosissima, foliolis latis ; rachis hirsutissima ; petala pallide rosea ; calyx erectus, germina pilosa.

δ. CARNEISTYLOS Sud. l. c. — Folia subaequaliter serrata ; foliolum terminale late ovato-rhombeum ; sepala patula, styli rosei ; germina glabra ; pollen fere purum.

ε. LONGIRAMULUS ; *R. longiramulus* Sabrs. ap. Form. O. B. Z. (1887) p. 128 ; *R. serpens* var. *longiramulus* Sabrs. Verh. Ver. Nat. Pressb. (1888). — Turio glabrescens ; inflorescentia laxa, brevis, parce pilosa, pedunculis elongatis, patulis.

ζ. LONGISETUS Sud. ; *R. florentulus* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1904), 96, 133, p. p. — Turio pilosus ; foliolum terminale obovato-rhombeum ; dentes tenues ; inflorescentia laxe hirsuta, setis glanduliferis longis obsita ; sepala dense aciculata.

η. MITIS Wimmer et Grab. Fl. Sil. II p. 78. — Exsicc. : Sud. : Sud. *Bat. eur.* n° 509. — Turio glabrescens ; foliolum terminale ovato-rhombeum ; inflorescentia aciculis longis dense obsita ut in var. ζ, breviter et laxe pilosa. Forma vergens in *R. fulvum*.

θ. SEQUANENSIS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 600 ! — Folia 3-nata, grosse et inaequaliter dentata ; foliolum terminale ovatum, emarginatum, acuminatum ; inflorescentia foliosa, obtusa, glandulis leviter purpurascens in onusta ; germina glabra. Forma ad *R. hirtum* W. K. vergens.

In nemoribus montosis. — GERMANIA ; AUSTRIA ; HELVETIA ; BRITANNIA : Yorkshire ; GALLIA : Vosges, Finistère, Vienne, Seine-inférieure, Meurthe-et-Moselle. — β. GALLIA : Tarn, Sauveterre ; Manche, Morlaix (Henry) ; Nord, Saint-Acaire ; GERMANIA : Bavaria, Silesia. — γ. GALLIA : Tarn, Burlats ; GERMANIA : Bavaria, Traunstein. — δ. GALLIA : Tarn, Grésigne ; Hautes-Pyrénées. — ε. HUNGARIA : Bakabanya, Bodengraben, Bilderbaum. — ζ. GERMANIA : Silesia, Frankenstein (Kinscher) ; Bavaria, Traunstein (Kaufmann) ; GALLIA : Haute-Savoie, M<sup>e</sup> de Boisy (Schmidely) ; BELGIA : Ster-Stavelot, Brume, Soignes (du Pré). — η. GERMANIA : Silesia (Wimmer, Spribile) ; Prov. rhenana Walberberg (Bodewig) ; Bavaria, Nürnberg (Prechtlbauer). — θ. GALLIA : Seine, Clamart (B. de Lesdain).

#### HYBRIDÆ

*R. SCHLEICHERI* ? × *SILESIACUS* ; *R. INFESTIFRONS* Sud. et Sprib. ; *R. thyrsiflorus* Wimm. sec. Spribile. — Exsic. : Sud. *Bat. eur.* n° 601 ! — Turio angulatus, parce pilosus, aculeis compressis, glandulis sparsis ; folia caul. 5-nata ; foliolum terminale ovatum, acuminatum ; inflorescentia elongata, breviter pilosa glandulosaque, aculeis falcatis armata ; flores albi, steriles. Habitus *R. infesti* Wh.

GERMANIA : Silesia, Hirschberg, Hohenwiese, prope Schmiedeberg (Spribile).

*R. SCHLEICHERI* × *VILLICAULIS* ; *R. RHODACANTHODES* Kinscher Repert. (1909) p. 78. An *R. Gremlia* Focke var. ? — Habitus *R. Schleicheri* Wh. sed aculei subaequales, compressi, glandulæ raræ, petala staminaque rosea, sepala reflexa ; substerilis.

GERMANIA : Saxonia, Hubertusburger Forst (Kinscher).

*R. SCHLEICHERI* × *BIFRONS* ; *R. SINGULARIS* Sud. — Differt a *R. Schleicheri* turione fere glabro, aculeis subaequalibus, glandulis rarissimis, foliis ± discoloribus, acute dentatis, floribus substerilibus.

GERMANIA : Bavaria, Westerberg prope Ruhpolding : Konneberg, prope Waging (E. Kaufmann).

*R. SCHLEICHERI* × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* ; *R. SPATIOSUS* Kupcok = *carpaticus* × *tomentosus* ej. Mag. Bot. Lap. (1910) p. 206. — Turio glaber, subangulatus, aculeis compressis ; folia discolora, grosse serrata ; inflorescentia multiflora, pilosa, glandulosa ; flores albi, steriles ; sepala post anthesin subreflexa.

HUNGARIA : Bakabanya, Muskovskie (Kupcok).

OBS. — Le *R. HLIVENSIS* = *bifrons* × *Lloydianus* Kpk. l. c. 204 a apparemment la même origine que le *R. spatirosus*. — HUNGARIA : Hlina.

*R. SCHLEICHERI* × *RADULA* ; *R. SEMISCHLEICHERI* Sud. — Habitus *R. Schleicheri* sed turio angulatus, glandulæ breves, sepala reflexa ; sterilis.

GERMANIA : Bavaria, Grünsberg (Scherzer) ; Saxonia, Bautzen (Hofmann).

*R. SCHLEICHERI* var. γ. × *APICULATUS* v. *mollaversus* Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1902) ; *R. SCHLEICHEROIDES* Sud. l. c. — Turio angulatus ; folia 3-nata, subtus cinerascentia, pilosa ; rachis hirsuta ; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Burlats, via Missècle.

*R. SCHLEICHERI* (grex) × *VALLISPARSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 52 (1909) ; *R. PSEUDO-SCHLEICHERI* Sud. l. c. — Aculei validi, pallidi ; turio pruinosis ; folia 3-nata, flores rosei, steriles.

GALLIA : Tarn, inter Montirat et Garde-Viaur.

*R. SCHLEICHERI* × *HIRTUS* Guentheri Hofmann in hb. Sud. ; *R. HERMANNII* Sud. — Aculei ut in *R. Schleicheri* ; turio glaber, dentes tenues, rachis pilosa, stamina stylis rubris breviora. Sterilis.

GERMANIA : Saxonia, Polenzthal (Hermann Hofmann).

#### Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Folium caulinum terminale anguste ovatum, rhombeum vel obovatum.

A. — Inflorescentia rachis piloso-hirsuta ; turio pilosus, raro glaber.

a. — Folium caulinum terminale ovato-rhombeum vel ellipticum.

1. — Stamina stylos superantia.

A. — Turio pilosus..... R. Schleicheri Wh.  
B. — Turio glaber ; serratura grossa..... R. DISSECTIFOLIUS Sud. b.

2. — *Stamina stylis breviora vel sequilonga.*
- A. — *Inflorescentiae glandulæ breves; calyx in fructu fere reflexus.* ..... R. *MUCRONIPETALUS* P.-J. Müll. B.
  - B. — *Inflorescentiae glandulæ longissimæ.*
    - a. — *Foliolum caul. terminale latum, grosse serratum.* ..... R. *APERTIFLORUS* P.-J. Müll. Bb.
    - b. — *Foliolum caul. term. angustum, argute serratum; sepala erecta.* ..... R. *HUMILIS* P.-J. Müll. Bc.
- b. — *Foliolum caulinum terminale obovatum, basi rotundatum, integrum, raro subemarginatum.*
- 1. — *Stamina stylos superantia.*
    - A. — *Folia subtus viridia.* ..... R. *LONGICUSPIS* P.-J. Müll. C.
    - B. — *Folia superiora discolora.* ..... R. *SCOPULICOLUS* Sud. Ob.
  - 2. — *Stamina stylis breviora.* ..... R. *LOUETTENSIS* Sud. et Grav. Ce.
- B. — *Inflorescentiae rachis glaber vel breviter et parce pilosa; turio vulgo glaber.*
- a. — *Stamina stylos superantia.*
    - 1. — *Inflorescentia parum armata, glandulis relative brevibus obsita.*
      - A. — *Sepala in fructu patula vel reflexa; folia subtus viridia.* ..... R. *FISSURARUM* Sud. D.
      - B. — *Sepala erecta; folia subtus viridia, foliolis terminalibus latis.* ..... R. *CHLOROXYLON* Sud. Dc.
      - C. — *Sepala erecta; folia discolora, foliolis terminalibus angustis.* ..... R. *ELONGATIPES* Sud. Dd.
    - 2. — *Inflorescentia armatissima, glandulis longissimis munita.*
      - A. — *Ramus florifer fere glaber; serratura mediocris.* ..... R. *FURVUS* Sud. E.
      - B. — *Ramus florifer pilosus; serratura parum profunda.* ..... R. *SPHENOIDEUS* N. Boul. Db.
  - b. — *Stamina stylis breviora.*
    - 1. — *Folia minute et subæqualiter serrata.*
      - A. — *Inflorescentia armatissima, epilosa, glandulis longissimis obsita.* ..... R. *POLYACANTHOIDES* Sud. Eb.
      - B. — *Inflorescentia parum armata, glandulis diametrum rachidis parum superantibus.* ..... R. *CONTERMINUS* Sud. F.
    - 2. — *Folia grosse et inæqualiter serrata.* ..... R. *LACERATUS* P.-J. Müll. Fb.
- II. — *Foliolum caulinum terminale late ovatum, cordatum, acuminatum.*
- A. — *Stamina stylos superantia.*
- a. — *Folia grosse et inæqualiter serrata.* ..... R. *HUMIFUSUS* Wh. G.
  - b. — *Folia minute et subæqualiter serrata.* ..... R. *IRRUFATUS* P.-J. Müll. Gb.
- B. — *Stamina stylis breviora.*
- a. — *Folia grosse et inæqualiter serrata.*
    - 1. — *Sepala in fructu erecta.* ..... R. *INAEQUABILIS* Sud. H.
    - 2. — *Sepala in fructu reflexa; petala suborbicularia.* ..... R. *PARVIPETALUS* Sud. Eb.
  - b. — *Folia minute serrata; sepala in fructu erecta.*
    - 1. — *Turio epruinosus; rachis pilosa.* ..... R. *GRACILIFLORENS* Sud. He.
    - 2. — *Turio pruinosissimus; rachis epilosa.* ..... R. *CÆRULEICAULIS* Sud. Hd.
- b. — (T. CXCIV) — *R. dissectifolius* Sud. *Diagn. p. 47 (1906); R. macradenius* Kupcok *Mag. Bot. Lap. (1910) p. 261.*
- Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 602 !
- Differ a *R. Schleicheri* Wh. turione glabro; foliis grosse, profunde et inæqualiter serratis; germinibus glabris. — Turio glaucescens; folia 3-nata; foliolum terminale (10) rhombeum vel subobovatum, acuminatum; stamna longa, sepala erecta, petala angusta, rachis pilosa.
- β. *LUTEISPINUS* Sud. Rub. tarn. p. 52 (1909). — Turio leviter angulatus; inflorescentia densa, armatissima; petala late ovata. *R. aprico* Wimm. similis.
- γ. *PLUSIACANTHUS; R. plusiacanthus* Borbas. — Turio epruinosus; foliolum terminale obovatum; inflorescentia foliosa, parce pilosa.
- GALLIA : Tarn, Cambon-du-Temple, Mazamet; Vienne, Le Rond (de l'acroix); BAVARIA : Traunstein (Kaufmann); BELGIA : Louette-St-Pierre (Gravet); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — β. Tarn, St-Amans. — γ. HUNGARIA : Bakabanya, Pukanec (Kupcok).
- B. — (T. CXCV) — ***R. mucronipetalus*** P.-J. Müll. in *Bonpl. (1861) p. 298; N. Boul. Ronc. vosg. p. 73 et ap.*
- R. et C. Fl. Fr. VI p. 111, p.p.; *R. scaber* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 568, ex pte.*
- Exsicc. — Ronc. vosg. n° 54 !; Assoc. rub. n° 117, 778.
- Turio glaucescens, pilosus ut in *R. Schleicheri* Wh., sed aculei minus inæquales, sparsi, reclinati, raro falcati; *folia* grosse serrata; *foliolum* caul. terminale (1) anguste ovato-rhombeum vel oblongum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* laxe pyramidalis, apice aphylla, rachide pilosa, glandulis brevibus, diametro rachidis brevioribus (2), aciculis sparsis instructa; *pedunculi* medii longi, patuli (3), 2-3-flori, bracteis linearibus, longis muniti; *sepala* in fructu laxe reflexa; *petala* oblonga, acuta (4); *stamina* alba stylis virescentes æquantia; *germina* glabra. Intermedius inter *R. Schleicheri* W. et *R. scabrum* W.
- β. *GRANDICUSPIS; R. pallidus* f. *staminib. brevibus* Progel; *R. flaccidifolius* Hofmann exsicc., non P.-J. Müll. — Turio subangulatus; folia 5-nata, obscure viridia, dentibus parum profundis; foliolum terminale oblongum vel oblongo-obovatum, acuminatum; inflorescentia pauciflora; petala obtusa vel bilobata.
- γ. *FALLACINUS.* — Foliolum terminale subobovatum, breviter acuminatum; inflorescentia brevis, obtusa; petala obtusa; germina glabra.
- δ. *RADBÆ; R. Radbæ* Tocl Mon. Rub. Boh. p. 24 (1903). — Styli rubri, germina tomentosa. Cetera ut in typo.
- ε. *MICRANTHUS.* — Exsicc. Rub. gall. n° 182 (*R. mucronipetalus* f. *gracilis*). — Gracilis; folia 3-nata, flores parvuli; *stamina* stylis virescentibus valde breviora; calyx erectus; germina glabra.
- ζ. *MUCRONIPETALOIDES.* — Turio glaber, *stamina* brevia, petala obovata, obtusa vel bilobata. Cetera ut in typo.
- η. *SERICIGER.* — Turio laxe pilosus; folia grosse serrata, utrinque molliter pilosa; rachis dense hirsuta, glandulis relative brevibus; *stamina* alba stylis lutescentibus breviora; petala ± emarginata, obovata; germina glabra.
- GALLIA : Vosges, Gérardmer (Müller), Rochesson, Gerbamont, Vagney, etc.; BELGIA : Louette-St-Pierre; GERMANIA : Bavaria, Silesia, Thuringia. — β. GERMANIA : Saxonia (Hofmann), Bavaria, Silesia. — γ. GALLIA : Haute-Garonne, Balma, Sengouagnet; GERMANIA : Bavaria, Traunstein; BELGIA : Modave. — δ. BOHEMIA : Rozmítal (Tocl). — ε. GALLIA : Vosges, Gerbamont (Boulay). — ζ. AUSTRIA : Styria, Soechau, (Sabransky); GERMANIA : Thuringia, Steinach (Kinscher). — η. GALLIA : Haute-Garonne, massif d'Arbas.