

HYBRIDA

R. MUCRONIPETALUS var. " × *ULMIFOLIUS*; *R. RHODANTHERUS*. — Turio angulatus; aculei subæquales, folia caul. 3-nata, discolora; inflorescentia parce glandulosa; flores rosei, steriles, staminibus brevibus, antheris purpleis.

GALLIA : Haute-Garonne, massif d'Arbas.

b. — (T. CXCV) — *R. apertiflorus* P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 110 (1868); *R. mucronipetalus* var. *apertiflorus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 112 (1900); *R. mucronipetalus* Sud. in hb. Mus. Paris.

Exsicc. — N. Boul. Ronc. vosg. n° 91 !; Assoc. rub. n° 116, 447 (var).

Turio ut in *R. mucronipetalus* P.-J. Müll.; foliola latiora, caulinum terminale (5) ovato-rhombeum, leviter emarginatum; serratura grossa; inflorescentia brevis, armata, diffusa, laxissima, vulgo foliosa, rachide dense hirsuta, glandulis longis, inæqualissimis (6), aculeis crebris munita; pedunculi medii longi, patuli (7); calyx laxe reflexus; petala satis magna (8), oblonga, alba; stamina alba stylis virescentes æquantia; germina glabra.

β. *DIVEXIRAMUS*; *R. divexiramus* P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 38 (1867); *R. Schleicheri* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 111, ex pte; *R. apricus* Boul. et Pierrat exsicc. (1875). — Exsicc. : Ronc. vosg. n° 30, 30 bis; Assoc. rub. n° 195. — Turio validus, dense pilosus; foliola lata, acuta vel breviter acuminata; inflorescentia parum foliosa, elongata, rachide breviter pilosa; sepala in fructu erecta; petala latiora.

γ. *COGNATUS*; *R. cognatus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 149 (1869) et exsicc. n° 135 ! — Folia grosse et duplicito-serrata; inflorescentia aphylla, angusta, densa, pauciflora; stamina stylis breviora. *R. serpentis* similis.

δ. *LAMPROTHYRSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Turio glabrescens; folia obscure viridia; inflorescentia folia superans; petala pallide roseola; stamina rosea stylis virescentibus breviora; germina pilosa.

ε. *OVATIPETALUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Turio virescens, parce pilosus; folia obscure viridia; inflorescentia elongata, aphylla, laxe hirsuta; sepala viridia, erecta; petala late ovata vel suborbicularia, alba; stamina alba stylis roseis breviora. *R. praetexto* similis.

ζ. *MICRANTHEMUS*; *R. falcifer* Kupcok exsicc., non P.-J. Müll.; *R. bifrons* × *Guentheri* ej. — Turio dense pilosus; foliolum terminale rhombeum, basi integrum; inflorescentia inferne foliosa, armatissima, glandulis subpurpureis; flores parvuli; petala late ovata; stamina stylis lutescentibus breviora; germina glabra. Folia pallide viridia, superiora subtus leviter cinerascentia.

GALLIA : Vosges, Saulxures-s.-Moselle, au Bambois-de-Bâmont (Pierrat); Valois, forêt de Retz; Finistère, Toull-an-Dioull; BELGIA : Torgnon (du Pré); GERMANIA : Saxonie, Waldheim (Kinscher). — β. Vosges, forêt de St-Gorgon (Boulay), Rochesson (Pierrat). — γ. Vosges, Rochesson, à Battion (Pierrat). — δ. Tarn, Montirat. — ε. Tarn, St-Cirgue, au moulin de Gignac. — ζ. HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok); GALLIA : Haute-Saône, Passavant (Madiot).

c. — (T. CXCV) — *R. humilis* P.-J. Müll. Vers. n° 188 (1859); Genev. Mon. p. 85, ex pte; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 124; Sud. Rub. Hb. Bor. p. 84.

Turio aculeique ut in *R. Schleicheri* Wh.; folia 3-nata (9), subtus pilosa, dentibus parum profundis, inæqualibus; foliolum terminale anguste rhombeum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum; inflorescentia brevis, subaphylla, breviter pilosa, aculeis vulgo crebris, glandulis longis munita (10); pedunculi tenues, patulo-ascendentes; pedicelli breves; calyx (11) erectus; petala parva, alba; stamina alba stylis virescentes æquantia; germina glabra. — Intercidum styli rosei (*R. neglectus* Rostoch, non P.-J. Müll.).

β. *HYPERANTHUS*; *R. hyperanthus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 146 (1869) et exsicc. n° 132 ! — Folia ampla, glabrescentia; ramus flexuosus; inflorescentia laxa, subinermis.

γ. *CITREISTYLUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Folia viridi-flavescentia, superiora discolora; stamina stylis citreis breviora; germina pilosa.

δ. *FLORENTULUS*; *R. florentulus* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1904) 96 (133) p. p.; *R. craponensis* × *pseudomacrophylloides* ej. — l. c. — Differt a var. γ foliis subtus viridibus, parce pilosis; inflorescentia brevi, obtusa, armatissima.

GALLIA : Vienne, les Adriers, bois de Prun ! (Chaboisseau), la Moulière (de Lacroix); Valois, Faverolles (Questier); Tarn, Anglés; SAXONIA : Gaussig (Hofmann). — β. Vosges, Rochesson (Pierrat); HELVETIA : Chatonnay (Perroud). — γ. GALLIA : Tarn, Arfons, Cambon; BAVARIA : Unterhutte (Progel). — δ. GALLIA : Haute-Savoie, M^e de Boisy (Schmidely).

OBS. — Le *R. reconditus* Schmid. Cat. p. 170 (1888) ne diffère du *R. humilis* P.-J. Müll. que par ses folioles plus larges et ses dents plus superficielles. Semble mal fructifier. Hybride ? — Ain, Sergy (Schmidely).

HYBRIDA

R. HUMILIS × *ADSCITUS* in hb. Müller; *R. INTECTUS* P.-J. Müll. Vers. n° 189 (1859). — A *R. humili* dignoscitur: turione subangulosus, aculeis validioribus, rectis, foliolis ramealibus latioribus, subtus pilosioribus, rachide hirsutiore. Flores roseoli; stamina pallida stylis æquantia; sepala patula. Parum fertilis.

GALLIA : Vienne, bois de Prun, aux Adriers; étang de Monterban, à Moulisme (Chaboisseau).

C. — (T. CXCV) — *R. longicuspis* P.-J. Müll. in hb. Levent (1860); Sud. ap. Gdg. Nov. Cons. p. 154, non *R. longiculpis* Genev. Mon. p. 190; *R. hirtus* var. *crucimontanus* f. *obovalifolius* Sprib. in hb. Sud.; *R. tereticaulis* var. *longiculifolius* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 219.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 580 (s. n. *R. orthoclada*).

Turio teres, pilosus, epruinosus, aculeis creberrimis, inæqualissimis, minus validis quam in *R. Schleicheri* Wh.; folia 3-5-nata, supra glabra, subtus pubescens, argute mucronato-serriculata; foliolum terminale (12) obovatum, basi integrum vel subemarginatum, abrupte et longe acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; ramus pilosus, aculeis reclinatis falcativis munitus, foliis minute serratis; inflorescentia pyramidalis, erecta, breviter pilosa, parum foliosa, aculeis mediocribus (13), rectis reclinatis armata; pedunculi medii patulo-ascendentes (14), plerumque 3-flori; sepala tomentosa, pilosa, glandulosa aciculataque, in fructu patula; petala (15) oblonga, alba; stamina alba stylis virescentes superantia; germina glabra; pollen parum admixtum.

β. *DISJUNCTUS*; *R. disjunctus* Müll. et Lef. Vers. n° 154 (1859). — Inflorescentia magna, laxissima, pedunculis inferioribus longis, patulissimis; calyx laxe reflexus; petala dilute rosea.

γ. *OLIGANTHUS*; *R. oliganthus* P.-J. Müll. in Bonpl. (1861) p. 287; N. Boul. Ronc. vosg. p. 111; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 114. — Exsicc. : Ronc. vosg. n° 92. — Turio dense pilosus; foliolum caul. terminale breviter obovatum vel obovato-suborbicular, cuspidatum; dentes minus tenues; inflorescentia arcuata, brevis, pauciflora; sepala in fructu erecta; stamina stylis basi roseos parum superantia.

δ. INCERTUS ; *R. incertus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 289 (1878) ; *R. minutiflorus* Wirgt. *Hb. rub. rhen. ed. II* n° 44 p. p., non P.-J. Müll. ; *R. abnormis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 256. — Exsicc. : Billot n° 2257. — Differt a var. γ, foliis subtus pilosis, foliolis minus abrupte acuminatis, pedunculis ascendentibus, sepalis subreflexis.

ε. KÖHLERIFORMIS Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 221. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 1181 (s. n. *R. Schleicheri* gr.). — Aculei validi, compressi, curvati; folia acute et grosse serrata; foliolum caulin. terminale ellipticum vel obovatum, basi integrum, longe acuminatum; inflorescentia laxa, foliosa, armata; sepala in fructu reflexa. Forma vergens in *R. Köhleri* Wh.

GALLIA : Marne, bois de Rilly (Levent); Sarthe, Yvré-l'Évêque (Henry); Saône-et-Loire, Autun (Gillot); Tarn, Camalières, Cambon-du-Temple; GERMANIA : Bavaria, Lauf (Kaufmann); Silesia, Münsterberg (Kinscher), Gorkauer Bergweg (Spribille); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — β. GALLIA : Aisne, forêt de Retz, ferme d'Arganson (Lefèvre); BELGIA : Etterbeck (Crépin). — γ. GALLIA : Vosges, Gérardmer (Müller), Coinches, à la Behouille (Boulay); Tarn, Burlats. — δ. GALLIA : Vosges, Gerbamont, à Battion (Pierrat); Cher, Rhin-du-Bois; GERMANIA : Prov. rhénane, Condenthal; Bavaria, Traunstein. — ε. BELGIA : Groenendaal (du Pré).

HYBRIDÆ

R. LONGICUSPIS var. γ × *CHLOROSTACHYS* Sud. ap. Gdg. *Nov. Conspl.* p. 154 (1905); *R. TEMNOSTACHYS* P.-J. Müll. in *Boul. Ronc. vosg.* p. 134 (1869) (*pr. sp.*); *R. Menkei* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 130, ex pte. — Exsicc. : N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 118. — Habitus *R. longicuspis* var. γ sed aculei tenuiores, crebriores, folia mucronato-denticulata, inflorescentia brevis, arcuata, pedunculis superioribus patulis, glandulis longis munita; stamina stylos æquantia.

GALLIA : Vosges, Gérardmer, au pont (Müller), éboulis de rochers (Boulay).

R. LONGICUSPIS × *SERPENS*?; *R. CAMALIERENSIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Differt a *R. longicuspidi* aculeis tenuioribus, turione pilosiore, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Camalières, via la Bassine.

b. — (T. CXCV) — *R. scopoliculus* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909).

Turio subepruinosus, appresse pilosus; *folia* 3-nata, satis grosse serrata, superiora subtus albo-tomentosa; *foliolum* terminale obovatum (16), subemarginatum, abrupte acuminatum; *rachis* pilosa, armata (17); *calyx* patulus vel erectus (18); *stamina* alba stylos superantia.

β. *HAMILIFER* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Foliola breviter cuspidata; aculei petiolares ramealesque tenues, adunci; inflorescentia corymbosa, glandulis brevibus obsita; calyx patulus; germina pilosa. Hybrida?

γ. *TOMENTICARPUS* Sud. l. c. — *Turio* glaber; aculei petiolares ramealesque reclinati; inflorescentia hirsuta, glandulis brevibus munita; calyx erectus, tomentosus; stamina stylos rubros parum superantia; germina dense pilosa.

GALLIA : Tarn, Crespinet, Massals. — β. Tarn, le Cayla. — γ. Tarn, Valence; BAVARIA : Traunstein (Prechtelsbauer).

HYBRIDÆ

R. SCOPULICOLUS × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909); *R. DEALBATUS* Sud. l. c. — *Discolor*, eglandulosus; *folia* 5-nata; flores rosei; sterilis.

GALLIA : Tarn, Crespinet, vallée du Lézert.

R. SCOPULICOLUS × *BIFRONS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909); *R. ADSCITIFORMIS* Sud. l. c. — Aculei æquales; *folia* 5-nata, discolora; *rachis* hirsuta, parce glandulosa; flores rosei. — *R. adscito* Gen. similis.

c. — (T. CXCV) — *R. louettensis* Sud. et Gravet *Bat. eur.* p. 60. (1906).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 191!

Differt a *R. longicuspidi* P.-J. Müll. foliolis angustioribus, caulin. terminali (19) elliptico-obovato, basi integro, acuminato; inflorescentia laxa, subinermi (20), glandulis tenuibus, relative brevibus munita; staminibus brevissimis (21), sepalis laxe reflexis. Petala ovata (22); germina glabra. Forma vergens ad *R. scabrum*.

BELGIA : Namur, Louette-St-Pierre (Gravet).

D. — (T. CXCV) — *R. fissurarium* Sud. *Rub. Pyr.* p. 161 (1901); *R. brevis* Progel hb., non Greml.

Turio glabrescens, epruinosus, aculeis validis, curvatis munitus; *folia* 3-5-nata (23), grosse serrata, utrinque sparsim pilosa; *foliolum* terminale anguste ovato-rhombeum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; aculei petiolares uncinati; *ramus* pubescens, aculeis falcatis uncinatis armatus; *inflorescentia* grandis, pyramidalis, multiflora, subaphylla, breviter pilosa, glandulis relative brevibus, aculeis mediocribus, reclinatis, falcatis armatis (24); calyx laxe reflexus (25); petala (26) obovata, alba; stamina alba stylos virescentes superantia; germina glabra; pollen parum admixtum.

β. *FLAVIFRONS*; *R. flavifrons* Sud. *Rub. hb. Bor.* p. 79 (1902); *R. ratiboriensis* Spribille *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandg.* (1900) p. 169, p. p.; *R. scaber* var. *mitior* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 215. — *Turio* glaber, glaucescens; *folia* 3-5-nata, inæqualiter et mediocriter serrata; *foliolum* terminale obovatum, basi subintegrum, acuminatum; aculei rameales reclinati vel falcati; inflorescentia brevis, ± foliosa; sepala patula, styli rubri.

γ. *GLABELLUS*; *R. glabellus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 162 (1901); *R. Holzfussii* Spribille *Beitr. Rub. Prov. Schles.* (1904), p. 344. — *Turio* glaber, glaucescens, parum heteracanthus; *folia* argute serrata, subtus glaucescentia, caulin. 3-4-5-nata; *foliolum* terminale ellipticum vel obovatum, acuminatum; *rachis* purum pilosa; *pedunculi* ascendentes; *glandulæ* fuscæ; *sepala* viridia, imperfecte reflexa.

δ. *SAMUELIS*; *R. Samuelis* Sabrs. ap. Kupcok N. *Beitr. Kennl. Rub. Bak. in Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 227; *R. scaber* × *sulcatus* ej. l. c. — Inflorescentia subaphylla; petala roseola, sepala in fructu reflexa, germina pilosa; cetera ut in var. β.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Ardengost; BELGIA : Louette-St-Pierre (Gravet); GERMANIA : Silesia, Kreusburg (Kinscher); Bavaria, Traunstein, Waldmünchen (Progel); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — β. GALLIA : Tarn, Paulin, la Bassine; Doubs, Pontarlier (Déséglise); GERMANIA : Silesia, Ratibor, Obera (Spribille); HUNGARIA : Bakabanya. — γ. GALLIA : Pyrénées, Luchon; GERMANIA : Silesia, Geppersdorf (Kinscher), Kosel, Thielaukoppe, Gross-Strehlitz (Spribille); Bavaria, Waging (Progel). — δ. HUNGARIA : Katrenka (Kupcok).

HYBRIDA

R. FISSURARUM v. γ × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 162 (1901); *R. SESSILIGLANDULOSUS* Sud. l. c. — Aculei subæquales; glandulæ subsessiles; *folia* 5-nata, rachis tomentosa, flores rosei, steriles. — *R. Questieri* L. M. similis.

GALLIA : in *Pyrenæis centralibus*, Luchon.

b. — (T. CXCVI) — *R. sphenoideus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 150 (1869); *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI, p. 112.

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 137 !

Turio glabrescens, epruinosus; *folia* 3-5-nata, minute mucronato-denticulata; *foliolum terminale* (1) obovatum, basi integrum, acuminatum; *ramus* pilosus, flexuosus, armatissimus; *inflorescentia* breviter pilosa, ± foliosa, glandulis longis, aculeis crebris (2) munita, pedunculis (3) patulis; *calyx* reflexus; *petala* (4) obovata; *stamina* stylos virescentes superantia; *germina* pilosa.

GALLIA : *Vosges*, Rochesson (Pierrat).

c. — (T. CXCVI) — *R. chloroxylon* Sud. *in hb.* Müller; *Rub. tarn.* p. 53 (1909); *R. serpens* v. *gabretanus* Progel, exsicc. ex pte; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 165; *R. altisilvaticus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 113 (1911).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 603.

Turio glabrescens, glaucescens, dense glandulosus; *folia* argute serrata; *foliola* ± lata, caul. terminale late obovatum vel ovato-rhombeum (5), leviter emarginatum, acuminatum; *rachis* parce pilosa vel non; *inflorescentia* brevis, parum armata (6); *sepala* laxe erecta; *stamina* alba stylos virescentes superantia (7); *germina* glabra. *Planta* viridi-flavescens.

β. PRÆCIPUUS Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — *Foliolum terminale elliptico-obovatum*; *folia* glabrescentia; glandulae breves; *stylis* rubri vel virides [*R. cuneiformis* Barber *Fl. Oberl.* III p. 101 (1911)]; pollen fere purum.

γ. SUBVULSUS; *R. subvulsus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 106 (1911). — *Folia subtus glabrescentia*, minute mucronato-serrulata; *foliolum terminale* late obovatum, abrupte acuminatum; *germina* pilosa.

GALLIA : *Tarn*, Nord, Ariège, Haute-Garonne, *Vosges*; GERMANIA : Silesia, Prov. rhenana, Bavaria, Saxonia; HELVETIA : Fribourg; MORAVIA. — β. GALLIA : *Tarn*, Lacabarède; BELGIA : Namur, Remont (Hardy); GERMANIA : Silesia, Münsterberg (Kinscher); Saxonia, Scheffelsteins (Barber). — γ. GERMANIA : Saxonia, Rietschen prope Teirha (Barber).

HYBRIDÆ

R. CHLOROXYLON × *NEMORENSIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909); *R. INCONSPICUTUS* Sud. l. c. — Differt a *R. chloroxylone* foliis obscure viridibus, inflorescentia magna, multiflora, glandulis brevibus, sepalis reflexis. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, les Fournials, prope St-Amans.

R. CHLOROXYLON × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909); *R. INSIGNIFOBMIS* Sud. l. c. — Validus; *turio* angulatus, heteracanthus; *folia* 5-nata, discolora; *inflorescentia* grandis, pilosa, armata, glandulosa; *flores* rosei, steriles.

GALLIA : *Tarn*, Alban, les Fournials, prope St-Amans.

R. CHLOROXYLON × *TOMENTOSUS* Lloydianus Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909); *R. PALLIDIGLANDULOSUS* Sud. l. c. — *Turio* angulatus, glandulæ breves, *folia* discolora, grosse serrata; *flores* albi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, forêt de Sérénac.

d. — (T. CXCVI) — *R. elongatipes* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909); *R. saxicolus* Progel *hb.*, non P.-J. Müll.

Turio pubescens, epruinosus; *folia* 3-nata, mucronato-dentata, superiora discolora; *foliolum terminale* (8) anguste elliptico-obovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* aphylla, laxe, parce pilosa, glandulis brevibus munita, pedunculis longissimis (9), patulis; *sepala* laxe erecta; *petala* ovata (10); *stamina* stylos virescentes superantia; *germina* glabra.

GALLIA : *Tarn*, Saint-Paul, Cambon; *Oise*, Compiègne (Salle); BAVARIA : Waging (Progel).

E. — (T. CXCVI) — *R. fulvus* Sud. *Rub. hb. Bor.* p. 78 (1902); *Bat. p. 31*, non Focke (1910); *R. rivicularis* var. *grandidentatus* Kupcok exsicc.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 89 !

Turio (11) glaber, subepruinosus, leviter angulatus, aculeis validis, falcatis uncinatisve armatus; *folia* 3-5-nata, supra glabrescentia, subtus viridia, sparsim pilosa, dentibus mediocribus, acutis, inaequalibus; *foliolum terminale* (12) ellipticum, rhombeum vel leviter obovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; *aculei* petiolares geniculati vel aduncii; *ramus* glabrescens, aculeis crebris, validis armatus, majoribus falcatis, geniculatis uncinatisve; *inflorescentia* ± foliosa, epilosa, aculeis crebris, ± falcatis armatissima, glandulis longissimis, numerosis obsita (13); pedicelli breves; *sepala* dense glandulosa, aculeata, in fructu (14) reflexa vel patula; *petala* (15) ovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra. — Inflorescentia armatissima, dense glandulosa *R. Kœhleri* revocat.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-la-Mouline, prope Murat; *Cher*, forêt d'Allogny, aux Chauffards (Déséglise); *Puy-de-Dôme*, la Bourboule, au funiculaire (Henry); HUNGARIA : Bakabanya, Biela (Kupcok); GERMANIA : Silesia, Münsterberg (Kinscher).

HYBRIDA

R. FULVUS ? × *BIFRONS*; *R. MUTATUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909). — *Turio* glaber, angulatus; aculei validi, parum inaequales; *folia* 3-5-nata, discolora; *inflorescentia* glandulis longis, sparsis munita; *flores* albi.

GALLIA : *Tarn*, Boissezon-de-Masviel, au-dessous du vieux château.

b. — (T. CXCVI) — *R. polyacanthoides* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 319.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8567 (s. n. *R. polyacanthi*, non Gr.), 10351 (var.).

A *R. fulvo* recedit: serratura tenuiore, aequali; foliolo caul. terminali (16) leviter emarginato; *inflorescentia* angusta, aculeis minus curvatis (17); petalis (19) angustis, distantibus; staminibus stylis brevioribus (18). *Calyx* erectus, *germina* glabra.

β. CRAPONENSIS; *R. craponensis* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) 77 (70), p. p. — *Turio* parce pilosus; *foliolum terminale* obovatum; pedunculi ascendentes.

γ. FRAGAROIDES; *R. fragaroides* Weeber ined. — *Inflorescentia* foliosa, aculeis falcatis; *petala* parva, ovata; *germina* pilosa. *Folia* superiora ± cinerascentia.

δ. PYGMÆIFLORUS. — Serratura acutissima, inaequalis; *inflorescentia* brevis, multiflora, armatissima, pedunculis patulis; *petala* parva, *stamina* brevissima, *germina* glabra.

GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz). — β. GALLIA : Haute-Savoie, supra Crapons (Schmidely). — γ. et δ. AUSTRIA : Silesia, Czeladnata, monts Beskides (Weeber).

F. — (T. CXCVI) — **R. conterminus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 84 (1900).

Turio pubescens, glaucescens, aculeis validis, rectis reclinatis armatus; *folia* 3-5-nata, supra sparsim pilosa, subtus pubescentia, argute serrata; *foliolum* caul. terminale (20) ovatum vel sèpe obovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *aculei* petiolares reclinati falcative; *inflorescentia* elongata, ± foliosa, breviter pilosa, aculeis tenuibus (21) vel mediocribus munita; *sepala* tomentosa, glandulosa, parce aculeata, in fructu erecta (22); *petala* alba vel leviter rosea; *stamina* alba stylos vulgo rubros vix æquantia; *germina* glabra.

β. **PILEOFRUCTUS** Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909); *R. pilinocephalus* Progel. *Hb. ex pte.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 604. — Serratura inæqualis, germina pilosissima.

γ. **ORTHOPUS**; *R. orthopus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 164 (1901). — Aculei caulinis petiolaresque validi, curvati; serratura inæqualissima; inflorescentia magna, laxa, aphylla; rachis pubescens, breviter glandulosa; pedunculi patuli, elongati; petala ovata; germina glabra.

δ. **SEMITICOLUS**; *R. semiticulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 163 (1901). — Turio glaber, aculeis obliquis, validis armatus; *folia* caul. 5-nata, subtus glabrescentia; *foliolum* terminale obovatum, basi integrum; *inflorescentia* armata, epilosa; *styli* virescentes; *germina* glabra.

ε. **ASPERNATUS**; *R. aspernatus* Sud. *I. c.* p. 163 (1901). — Turio glaber, sparsim aculeatus; *folia* caul. 3-nata, subtus parce pilosa, subæqualiter et simpliciter serrata; *foliolum* terminale obovatum; *inflorescentia* densa, parum armata, parce pilosa; *petala* pallide rosea; *stamina* alba stylos virescentes subæquantia; *germina* glabra.

ζ. **ORTHOPOIDES**; *R. decorus* f. *serpens* Utsch, Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9526; *R. Bayeri* Schmid., non Focke. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 754; Baenitz *I. c.* — Aculei sparsi; *folia* 3-nata, subtus glabrescentia; *foliolum* terminale oblongo-obovatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* parum armata, glandulis crebris, longis ± obsita; *stamina* stylis rubris breviora; *germina* glabra.

η. **SAXORUM**. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 605! — Turio angulatus, glaber; glandulae purpurascentes; *folia* argute serrata, subtus glabrescentia; *foliolum* terminale obovatum, cuspidatum; *inflorescentia* brevis, obtusa, laxa, parum armata, rachide pilosa; *stamina* stylis basi roseis breviora; *germina* glabra.

GALLIA: *Tarn*, Sérenac, Montirat, Lacaze, las Planques, Cambon-du-Temple; *Ariège*, St-Lizier-d'Ustou; *Hautes-Pyrénées*, Pailhac; **BAVARIA**: Waging (Progel). — β. *Tarn*, Paulin; *Haute-Garonne*, Buzet; **BAVARIA**: Traunstein, Waldmünchen (Progel). — γ, δ, ε. *Pyrénées* cent. Luchon. — ζ. **GERMANYA**: Badenia, Siegelau; **GALLIA**: Ain, Divonne; *Haute-Savoie*, Chapelle Rambaud (Schmidely). — η. **GALLIA**: *Haute-Garonne*, Arbas, in saxis calcareis.

OBS. — J'ai vu dans l'herbier de M. le Dr H. Sabransky, sous le nom de *R. neovestitus* Sabrs. et Waisb., des échantillons sans feuilles caulinaires qui paraissent appartenir à la var. β; d'autres, portant le même nom et provenant de la même localité (HUNGARIA : Ginsii), sont bien différents et à rapprocher du *R. mutabilis* Gen., si les fleurs sont roses, ce que j'ignore. Quoiqu'il en soit, le nom de *R. neovestitus* ayant été appliqué à deux formes distinctes, ne saurait être conservé.

HYBRIDÆ

R. CONTERMINUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus*; *R. STENOTRICHUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909). — Turio angulatus; *folia* 5-nata, discolora, grosse serrata; rachis pilosa; sterilis.

GALLIA: *Tarn*, via las Planques.

R. CONTERMINUS var. ζ × *OMALUS*; *R. PERFALCATUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Cons.* p. 458 (1903); *R. Bayeri* × *pilocarpus* Schmid. — Turio angulatus; aculei rameales validi, falcatissimi; *folia* subdiscolora, argute serrata; *stamina* brevia; sterilis.

GALLIA: *Haute-Savoie*, Aizery (Schmidely).

β. — (T. CXCVI) — *R. laceratus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 169 (1859); *R. rariflorus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) p. 79 (72).

Turio teres vel obsolete angulatus, glaber, glaucescens, aculeis rectis vel reclinatis munitus; *folia* pleraque 3-nata, utrinque glabrescentia, grosse et inæqualiter serrata; *petioli* aculei reclinati; *foliolum* terminale late obovatum (23), leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *ramus* parum armatus; *inflorescentia* parce pilosa, glandulis brevibus (24), aculeis tenuibus, sparsis munita; *sepala* patula vel erecta; *stamina* alba stylis roseis breviora (25); *germina* glabra.

β. **ERECTIFLORENS**; *R. erectiflorens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 172 (1901). — Folia obscure viridia; *foliolum* terminale obovato-rhombeum; *inflorescentia* angusta, elongata, subepilosa; *germina* pilosa.

γ. **TRICHOPOIDES**; *R. trichopoides* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 335; *R. Guentheri* v. *serratifolius* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9952. — *Foliolum* caul. terminale oblongo-obovatum, acuminatum, emarginatum; *inflorescentia* laxa, epilosa, glandulis rubris obsita. Parum fertilis.

δ. **TRICHOPUS**; *R. trichopus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 144 (1869); ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 112. — Exsicc. : *Ronc. vosg.* n. 129; *Assoc. rub.* n° 958. — Gracilis; aculei sparsi; *foliolum* terminale rhombeum; *inflorescentia* laxa, aphylla, diffusa, subinermis, glandulis brevibus munita; pedunculi tenues, divaricati.

ε. **INAEQUABILIFRONS**. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 606! — Turio glaber; *foliolum* caul. terminale late et breviter obovatum, cuspidatum; *inflorescentia* brevis, pedicellis elongatis, patulis; *styli* virescentes; *germina* pilosa. *R. inaequabilis* similis.

ζ. **LACERATIFORMIS** Sud. *Rub. Bav.* p. 26 (1912); *R. heterophyllus* var. *bifrons* Utsch. — Turio pilosus; *folia* subtus molliter pubescentia, superiora cinerascentia; *foliolum* terminale ellipticum; rachis aculeis validis, glandulis rubris munita; *stamina* stylos æquantia; *germina* pilosa.

GERMANYA: Alsacia, Lauterbach (Müller); **Silesia**: Münsterberg (Kinscher); **Badenia**; **HUNGARIA**: Bakabanya (S. Kupcok); **GALLIA**: *Haute-Savoie*, Mts Voirons (Schmidely); *Tarn*, Le Bousquet. — β. **GALLIA**: *Hautes-Pyrénées*, Fréchet-Aure, bois de Hèche. — γ. **GERMANYA**: Badenia, Siegelau (Goetz). — δ. **GALLIA**: *Vosges*, Gerbamont (Pierrat). — ε. **GALLIA**: *Tarn*, forêt de la Bassine. — ζ. **BAVARIA**: Freyung, Traunstein (Prechtelsbauer).

γ. — (T. CXCVII) — *R. HUMIFUSUS* Wh. in Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I. 685 (1825); W. et N. *Rub. germ.* 84, t. XXXV; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 608 (*excl. syn.*); *R. Betchei* Focke *Syn. Rub.* p. 361, *an Marsson?*; *R. breviceps* Kinscher *Repert.* VII (1909) p. 343.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 607 (*R. breviceps*!).

Turio obsolete angulatus vel teres, pilosus, epruinosus, aculeis reclinatis munitus; *folia* (1) 3-4-5-nata, utrinque parce pilosa, subtus viridia, grosse et inæqualiter serrata; *foliolum* caul. terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; *petiolatus* aculeis reclinatis falcatissime armatus; *ramus* glabrescens, aculeis mediocribus, reclinatis falcatissime munitus, foliis grosse serratis; *inflorescentia* brevis, subaphylla, pauciflora, laxe pilosa, glandulis crebris, aculeis tenuibus, luteis obsita (2); *sepala* pilosa, glanduloso-aciculata, diverse patula; *petala* oblonga, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia (3); *germina* glabrescentia.

$\beta.$ BRACHYSTACHYS; *R. brachystachys* P.-J. Müll. *Vers.* n° 189 (1859); *R. humifusus* v. *miliscanicus* Hofm. *Pl. crit. sax.* n° 267 (1906) (*nomen*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 608; *Rub. rar.* n° 151! — Turio glaber; folia ampla, subæqualiter serrata; foliolum terminale breviter petiolatum; inflorescentia brevis.

$\gamma.$ FONTICOLUS; *R. Preissmannii* (Hal.) var. *fonticulus* Sabrs. *Z.-B. Ges.* (1904) p. 547. — Turio angulatus, pilosus; folia ampla, tenuia; sepala laxe reflexa.

$\delta.$ TORRENTIUM; *R. torrentium* Sud. *Rub. Pyr.* p. 161 (1901); *R. cavatifolius* (P.-J. Müll.) N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 49 bis (*non* 49). — Validus; turio glaber, aculeis robustis, obliquis armatus; folia 5-nata, subtus glabrescentia, grosse et inæqualiter serrata; aculei petiolares validi, geniculati vel uncinati; foliolum terminale abrupte acuminatum; inflorescentia angusta, armatissima; germina pilosa.

$\epsilon.$ SÆVOIDES; *R. sœvoides* Kupcok et Sabrs. *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 243; *R. hirtus* \times *sœvus* eor. l. c.; *R. diffusus* Kupcok, *non* al.; *R. semitaram*, *bifrons* \times *hirtus* ej. in hb. Sud. — Folia caul. 3-nata; inflorescentia subaphylla, armatissima, apice obtusa; sepala erecta, germina glabra, rachis pilosa.

$\zeta.$ ACUMINATUS. — Turio pruinosis, pilosus; folia caul. 5-nata; foliolum terminale late oblongum, sensim acuminatum, cordatum; inflorescentia angusta, densa, armata, pedunculis e basi ramosis; germina glabra.

$\eta.$ HUMIFUSIFORMIS. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 609! — Turio fere glaber, aculeis crebris, mediocribus; folia pleraque 3-nata, grosse et subduplicato-dentata; foliolum terminale suborbiculare, cordatum; inflorescentia densa, breviter pilosa, parum armata; stamina basi rosea stylos carneos parum superantia; germina glabra.

GERMANY; AUSTRIA; GALLIA: Savoie. — $\beta.$ GERMANY: Alsacia, Weissemburg, entre St-Germain et le pont de Lauterbach (Müller); Saxonia, Loebau (Hofmann); BELGIA: Roanne. — $\gamma.$ AUSTRIA: Styria, Sœchau (Sabransky); HELVETIA: Thurgau (R. Keller). — $\delta.$ GALLIA: Hautes-Pyrénées, Aulon; Vosges, Thiéfosse (Pierrat). GERMANY: Silesia, Münsterberg (Kinscher). — $\epsilon.$ HUNGARY: Bakabanya, Steinbach, Prielozok (Kupcok). — $\zeta.$ AUSTRIA: Moravia, Wiedenam, Zwitta (Petrak). — $\eta.$ GALLIA: Saône-et-Loire, Roussillon-en-Morvan, vallée de la Canche (Gillot).

HYBRIDÆ

R. HUMIFUSUS var. ϵ \times *BIFRONS* Sud.; *R. SECRETUS* Kupcok; *R. candicans* \times *hirtus* ? ej. in hb. Sud. — Differt a var. ϵ foliis \pm discoloribus, glandulis sparsis, brevioribus, sepalis reflexis, fructu male evoluto.

HUNGARY: Bakabanya, Prielozok contra Zingaros (S. Kupcok).

R. HUMIFUSUS var. ϵ \times *TOMENTOSUS* (*Lloydianus*); *R. pseudosœvoides* Kupcok in hb. Sud. — Differt a *R. humifuso* var. ϵ foliis pallidis, superioribus \pm cinerascentibus, foliolis minus latis, glandulis sparsioribus, sepalis reflexis, floribus sterilibus.

HUNGARY: Bakabanya (S. Kupcok).

R. HUMIFUSUS \times *GREMLII* Sud.; *R. SCATURIGINUM* Sabrs. in hb. Sud.; *R. Gremlii* \times *mucronatus* ej. — Differt a *R. humifuso* Wh. aculei validiores, inflorescentia laxiore, floribus majoribus, sterilibus.

AUSTRIA: Styria orientalis, in silvis Kohegraben (Sabransky).

R. HUMIFUSUS \times *RADULA* Sud.; *R. BICOLORIFOLIUS* Kinscher in hb. Sud. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 610! — Differt a *R. humifuso* aculeis majoribus, foliis minute serratis, subtus \pm cinereo-tomentosis, inflorescentia magis armata, fructu imperfecto.

GERMANY: Silesia, Schersgrund prope Frankeinstein (Kinscher).

$\beta.$ — (T. CXCVII) — *R. irrfatus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 291; *R. pinetanus* Kinscher *Repert.* (1909) p. 342.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 611 (*R. pinetanus* Kinsch.!).

Differt a *R. humifuso* Wh.: aculeis minoribus, foliis caul. saepe 3-natis (4), serratura subæquali, simplici; foliolo caul. terminali basi rotundato, minus emarginato. — Inflorescentia breviter pilosa (5), parum armata; stamina longa (6); sepala \pm erecta; petala oblonga (7).

$\beta.$ STATUS; *R. status* Sud. *Rub. Pyr.* p. 162 (1901). — Serratura tenuis; folia caul. 5-nata, foliolis latis, terminali suborbiculari; inflorescentia magna, multiflora. *R. serpenti* Wh. similis.

$\gamma.$ RATIBORIENSIS; *R. ratiboriensis* Spribille *Verh. Bot. Ver. Prov. Brandg.* (1900) p. 169, p. p. — Turio glabrescens; serratura tenuis; folia 3-5-nata, foliolo terminali ovato, emarginato, acuminato; sepala subreflexa.

$\delta.$ ACUTIFRONS; *R. acutifrons* A. Ley *Journ. Bot.* (1893), 13, 45; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 90. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 101. — Turio glabrescens; folia caul. 5-nata, acute et inæqualiter serrata; inflorescentia elongata, breviter pilosa, pedunculis ascendentibus, pedicellis brevibus.

$\epsilon.$ LONGIPETIOLATUS; *R. obtuncatus* Sabrs. in hb. Sud., non P. J. Müll. — Serratura tenuissima; foliola longe petiolata, terminale suborbiculari, leviter emarginatum, cuspidatum; sepala laxe reflexa.

$\zeta.$ GRANDIFLORUS; *R. cordiger* Progel hb., non M. et Wirtg. — Folia 5-nata, argute serrata; foliolum terminale late ovatum, emarginatum, acutum vel breviter acuminatum, longe petiolatum; inflorescentia magna, laxa, glandulis relative brevibus, aculeis falcati; petala magna, suborbicularia; styli virentes, germina pilosa.

GALLIA: Vosges, Gérardmer, vallée de la Vologne, route de Saint-Dié (Müller); Tarn, Lacaune, Aussillon, Lacrouzette; HELVETIA: Fribourg, Fuyens, près de Romont (Jaquet); GERMANY: Bavaria, Silesia, Saxonia; BELGIA: Bruxelles. — $\beta.$ GALLIA: Pyrénées centr., Luchon. — $\gamma.$ GERMANY: Silesia, Ratibor, Aussicht (Spribille); AUSTRIA: Styria, Sœchau (Sabransky); Moravia, Weisskirchen (Petrak). — $\delta.$ BRITANNIA: Sellack, Herefordshire (A. Ley); GERMANY: Silesia, Münsterberg (Kinscher). — $\epsilon.$ AUSTRIA: Styria: Tautendorf (Sabransky). — $\zeta.$ BAVARIA: Waging (Progel).

H. — (T. CXCVII) — $\mathbf{R. inaequabilis}$ Sud. *Rub. Pyr.* p. 164 (1901); *R. harpaginetulus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 228, ex pte; *R. pseudupricus* Hayek *Fl. v. Steierm.*

Turio leviter angulatus, pubescens, epruinosus, aculeis validis, reclinatis armatus; folia grosse et inæqualiter serrata, caulinata, plerumque 5-nata; foliolum terminale (8) late ovatum, emarginatum, acuminatum; inflorescentia magna, aphylla, parce pilosa, aculeis crebris, reclinatis munita (9); sepala in fructu erecta (10); petala ovata (11); stamina alba stylis virescentibus breviora; germina glabra.

$\beta.$ STYLOSUS; *R. stylosus* Sabrs. in Hayek *Fl. Steierm.* I p. 801 (1909). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 612! — Turio angulatus; folia caul. 5-nata; foliolum caul. terminale orbiculare, cordatum, acuminatum; inflorescentia elongata, foliosa, laxe pilosa; petala suborbicularia; germina pilosa.

$\gamma.$ SPINOSELLUS; *R. spinosellus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 317; *R. condensatus* et *emarginatus* Goetz ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 8546, non Müll. — Folia 3-nata; aculei elongati, parum curvati; inflorescentia brevis, aculeatissima.

$\delta.$ ARISTISEPALUS; *R. aristisepalus* Sud. in hb. Müller; *R. velatus* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 92, non Let.; *R. scaber v. brachyadenius* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907), 248. — Exsicc. : *Set of Brit. Rub.* n° 130. — A typo differt: aculeis debilitibus, inflorescentia arcuata, minus armata, pedunculis \pm ascendentibus, sepalis appendiculatis. *R. serpenti* Wh. vel *R. rivulari* M. et Wirtg. similis.

e. FLAVIPES; *R. flavipes* Sud. *Diagn.* p. 55 (1906). — *Turio* dense pilosus; folia 3-nata; rachis tomentosa, epilosa, glandulis brevibus obsita. *R. tereticauli* P.-J. Müll. similis.

ζ. LARGUS; *R. Krasanii* var *largus* Sabrs. in Hayek *Fl. Steierm.* I p. 772. — Validus; inflorescentia breviter pilosa, glandulis relative brevibus, pedunculis elongatis, patulis; styli rubri. Cetera ut in typo.

η. GLABRIUSCULUS Sud. *Rub. Bav.* p. 26 (1912); *R. Antonii* Sabrs. in hb. Sud., an Borbas? — *Turio* glaber; folia subtus fere glabra, 3-nata; foliolum terminale late cordato-ovatum; rachis breviter pilosa, glandulis purpureis onusta; pedunculi patuli; flores parvi; stamina stylis subæquantia.

θ. INÆQUABILIFORMIS Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 750. — *Turio* glaber; folia 3-5-nata, subtus pubescentia; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, abrupte acuminatum; inflorescentia interrupta, foliosa, breviter pilosa, aculeis crebris, falcatis, longis onusta; pedicelli breves; glandulæ subruberæ; germina pilosa.

GALLIA: *Pyrénées centr.*, Sengouagnet, Luchon, val de Bure; *Vosges*; **GERMANIA**: *Badenia*, Siegelau (Goetz), *Silesia*, *Thuringia*; **STYRIA**: *HUNGARIA*: Bakabanya (Kupcok). — *β. AUSTRIA*: *Styria*, Sœchau (Sabransky); **BAVARIA**: Waging (Kaufmann). — *γ. GERMANIA*: *Badenia*, Siegelau (Goetz); *Saxonia* (Hofmann); **GALLIA**: *Vosges*; **STYRIA**: Sœchau (Sabransky). — *δ. GALLIA*: *Vosges*, *Saône-et-Loire*, (Sabransky). — *η. BAVARIA*: Traunstein, Siegsdorf-Mariaeck (Prechtelsbauer); **STYRIA**: Sœchau (Sabransky). — *θ. GERMANIA*: *Bavaria*, Nürnberg (Kaufmann), Traunstein (Scherzer).

OBS. — Le *R. megalanthus* Boul. et Pierrat (*nomen ineptum*) *Assoc. rub.* nos 297, 395 semble n'être qu'une variation du *R. inæquabilis*.

b. — (T. CXCVII) — *R. parvipetalus* Sud. *Rub. tarn.* p. 54 (1909).

Turio glabrescens, epruinosus; *folia* (12) grosse serrata; *rami* aculei validi; *rachis* sparsim pilosa (13); *sepala* reflexa (14); *petala* parva, orbicularia (15); *stamina* alba stylis virescentibus breviora; *germina* glabra. **GALLIA**: Tarn, Aussillon.

c. — (T. CXCVII) — *R. graciliflorens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 175 (1901).

Turio glabrescens, epruinosus; *folia* (16) 3-5-nata, argute serrata; *foliolum* terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* parva, densa, pilosa (17), pedunculis brevibus, patulis; *sepala* erecta (18); *petala* parva (19); *stamina* alba stylis virescentibus breviora; *germina* glabra.

GALLIA: *Pyrénées centr.*, Luchon, vallée du Lys; *Tarn*, Brassac, Sorèze, Hautaniboul; **BAVARIA**: Traunstein, Siegsdorf (Prechtelsbauer).

OBS. — Holuby a distribué sous le nom de *R. Slobodæ* Hol., de N. Podhrad (Hongrie), une forme très voisine du *R. graciliflorens*.

d. — (T. CXCVII) — *R. cæruleicaulis* Sud. *Diagn.* p. 47 (1906).

Turio glaber (20), pruinosus, aculeis rectis vel reclinatis munitus; *folia* mucronato-serrulata; *foliolum* caul. terminale late ovatum (21), subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* ampla, epilosa (22), subaphylla; *sepala* erecta (23); *petala* parva, obovata (24); *stamina* alba stylis roseis breviora.

GALLIA: Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes (de Lacroix); **AUSTRIA**: *Styria*, Sœchau (Sabransky); **BAVARIA**: Traunstein (Scherzer).

106 — (T. CXCVIII) — **R. BELLARDII** Wh. ap. Bluff et Fingrh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 688 (1825); W. et N. *Rub. Germ.* p. 97 t. XLIV; Wimm. et Grab. *Fl. Sil.* I, 2 p. 41, 54; Focke *Syn.* p. 382 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 610; Hal. *Oest. bromb.* p. 269; Rogers *Handb.* p. 86; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 46; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 120; non Gen. nec *Germ. excurs.* p. 607, non W. et K.; *R. hybridus* Auct. plur., non Vill.; *R. glandulosus* var. *Bellardii* Neum. in *Verh. Z.-b. Ges. Wien* (1854) p. 279; *R. hirtus* var. *glabratus* et *R. rubens* Neum. l. c.; *R. compactus* Utsch, ex pte; *R. Bellardii* × *Mikanii* et *R. Kœhleri* × *Bellardii* Utsch.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. 2 n° 47, 45 (*R. Guentheri*); ed. I n° 106 (ex pte, *R. Guentheri*), 108; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 35; G. Braun *Hb. rub. Germ.* n° 59; *Assoc. rub.* nos 192, 774, 959, 1105, 1109; *Rub. gall.* n° 44, 91, 146; Favrat *Rub. Helv.* n° 45; Baenitz *Hb. eur.* nos 9934, 9937, 9988, 10352; Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 14; Sud. *Bat. eur.* n° 44; *Set of Brit. Rub.* n° 73; Frid. et Gel. *Rub. dan.* n° 73; Ch. Magnier n° 1665.

Turio (1, 2) teres vel leviter angulatus, glaucescens, ± rubro-purpureus, in umbrosis pallidus, glabrescens, glandulæ folia 3-nata (3), rarissime 4-5-nata (s.-var. *declinatus* Holzfuss in hb. Sud.), utrinque parce pilosa, subtus viridia, argute et ginatum, abrupte acuminatum, petiolulo proprio triplo, quadruplo vel quintuplo longius; stipulae linear-lanceolatae; bus; *inflorescentia* (4) brevis, obtusa, folia parum superans, pedunculis superioribus valde patulis; *rachis* laxe hirsuta, aciculata (6), in fructu ± erecta (7); *petala* (8, 9) oblonga vel sublanceolata, inferne sensim attenuata, alba; *stamina* alba stylis virescentes vel basi roseos superantia; *germina* glabra; *receptaculum* pilosum. *Pollen* (10) satis imperfектum. — Julius-augustus.

δ. PYGMÆOMORPHUS Kinscher in hb. Sud. — Aculei majores, creberrimi, compressi; serratura inæqualis, acutissima. An *R. Bellardii* × *pygmæus*?

In locis silvaticis montosis. — **GERMANIA**, **AUSTRIA**, **HELVETIA**, **DANIA**, **SUECIA**, **BRITANNIA**, **BELGIA**, **GALLIA**: *Vosges*, Centre, Alpes. — *β. SILESIA*: Ratibor (Kinscher).

OBS. — Le *R. falciniacus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) 77 (70) est une variation du *R. Bellardii* Wh. à étamines dépassant à peine les styles.

HYBRIDÆ

R. BELLARDII × *FOLIOSUS* (gr.), *R. DETECTUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 155 (1905); *R. dumetorum* Cott. et Castella *Guide Frib.* p. 60, ex pte. — Aculei *R. Bellardii* Wh.; folia 5-nata; inflorescentia elongata, foliosa. Sterilis.

HELVETIA: Fribourg, entre Villarimboud et Lentigny (Perroud).

R. BELLARDII × *KÖEHLERI*; *R. SEMIBELLARDII* Sud.; *R. Kœhleri* × *Bellardii* Hofmann exsicc. — Diflert a *R. Bellardii* aculeis validiori-fructificatio non tota.

GERMANIA: *Saxonia*, Oberlausitz, Warnsdorfer Spitzberge (H. Hofmann).

R. BELLARDII × *TERETICAULIS*; *R. BELLARDIIFRONS* Sud. in hb. Kaufm. — Folia ut in *R. Bellardii* sed foliolum terminale basi emergit; cetera ut in *R. tereticauli*. Sterilis.

GERMANIA: **Bavaria**: Traunstein, prope Knappenfeld (E. Kaufmann).

107 — (T. CXCIX) — *R. RIVULARIS* P.-J. Müll. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 107 (1858); *Flora, B. Z.* XLII (1859) p. 237; Focke *Syn.* p. 367, *a typicus*; *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 618 (*excl. syn.*); N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 117 (*R. serpens* Sbsp. *rivularis*); Sud. *Rub. Pyr.* p. 167; *R. chrysacanthus* Timb.-Lag. *Bull. Soc. Sc. phys. et nat. Toul.* (1875) p. 90; *R. serpens* f. *appendiculata* Projel; Baenitz *Hb. eur. exsicc.*; *R. ithytrichus* Kupcok *exsicc.*; *R. hirtus amoë-nus* \times *tereticaulis* ej.; *R. lycopcarpus* Kupcok *exsicc.*; *R. serpens* \times *tereticaulis* ej.; *R. loetevirens* Projel *Ber. Bot. Ver. Landsh.* 85; *Form. in O. B. Z.* (1887) 128, *ex pte!*; *R. hercynicus* f. *lasiandra* ej. l. c. (1889), 10; *R. hirtus* var. *borealis* G. Braun *exsicc.*; *R. occultiflorus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 119 (1911).

Exsicc. — Virtg. *Herb. rub. rh. ed.* I n° 107; *ed. 2 n° 46*; Sud. *Bat. eur.* n° 613, 614.

Planta flavescenti-viridis, pallida. *Turio* (1) teres, pilosus, aculeis tenuibus, setis flavescentibus glandulisque dense obovatis; *folia* (2) pleraque 3-nata, tenuia, supra parce pilosa, subtus viridia, interdum subcinerascentia [*R. reversus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 253; *R. rivularis* \times *tomentosus* ej. l. c.], pubescentia, mucronato-serrulata; *foliolum* caul. terminale ovatum, emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *stipulae* lineares; *petiolis* pilosus, aculeis tenuibus munitus; *ramus* leviter angulosus, pilosus, flexuosus, aculeis debilibus, glandulis pallidis obovatis; *inflorescentia* (3) medicocris, \pm foliosa, pedunculus patulo-ascendentibus; *rachis* (4) laxe pilosa, glandulis tenuibus, elongatis, pallidis, setis longissimis, inaequalibus, flavescentibus, rectis falcatis dense onusta; *sepala* (5) tomentosa, dense glanduloso-aciculata, acuminata, in flore reflexa, in fructu \pm erecta (6); *petala* (7) elliptica, satis magna, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabrescentia; *receptaculum* pilosum. Pollen parum admixtum. — Julius.

β . *HIRTIFORMIS*; *R. hirtus* var. *rotundifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 88 (1900), an Bab. *Ann. Nat. Hist.* 40 (1848)? — *Exsicc.* : *Set of Brit. Rub.* n° 102. — Validus; turio leviter angulosus, laxe pilosus; aculei subcompressi; folia 3-5-nata; inflorescentia multiflora; sepala patula vel subreflexa.

γ . *FUNICULIFORMIS*; *R. funiculiformis* Pierrat in N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 115 (1868). — *Exsicc.* : *Ronc. vosg.* n° 98! *Assoc. rub.* n° 194; Baenitz *Hb. eur.* n° 9529. — Serratura acuta, profunda, inaequalis; inflorescentia angusta, arcuata.

δ . *FLEXISETUS*; *R. flexisetus* Sud. *Diagn.* p. 48 (1906); *R. Guentheri* f. *hirsuta* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 105; *R. asperifrons* Kupcok *exsicc.*; *R. hirtus* \times *metallicolus* ej. — Folium caul. terminale basi minus latum; inflorescentia foliosa, rachide laxe pilosa vel epilosa; stamna stylos parum superantia; germina glabra vel pilosa [*R. novus-oppidanus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 135 (1911)].

ϵ . *CYANEAULIS* Sud. *Diagn.* p. 48 (1906). — Turio pruinosus; folia caul. 5-nata, foliolis terminalibus vix emarginatis; inflorescentia magna, multiflora, foliosa; flores ut in typo.

ζ . *HUMILIFRONS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 335. — *Exsicc.* : Baenitz *Hb. eur.* n° 9955 (s. n. *R. humilis*, non Müll.). — Turio pruinosus, subrubus; folia 3-nata, foliolis angustis, inaequaliter serratis; inflorescentia pauciflora.

η . *OBROTUNDATUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 222; *R. pentagonifolius* Barber *Fl. Oberb.* III p. 111 (1911); *R. Kæhleri* Kovarff *exsicc. non Wh.* — Folia 3-nata; foliolum caul. terminale late et leviter obovatum, abrupte acuminatum; rachis subepilosa; setæ crebræ, longæ.

θ . *INURBANUS*; *R. inurbanus* Kupcok = *rivularis* \times *tereticaulis* ej. *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 229. — Turio teres, parce pilosus; serratura acuta, inaequalis; folia ramealia anguste obovata, longe acuminata; inflorescentia subepilosa, stricta, elongata, foliosa; germina pilosa. Ad *R. spinosulum* vergens.

In locis silvaticis montosis. — GERMANIA; BELGIA; GALLIA: *Vosges, Orne*; HUNGARIA. — β . BRITANNIA: *S. Somerset*, Chard Common; GERMANIA: *Silesia, Bavaria*. — γ . GALLIA: *Vosges, Gerbamont, Rochesson* (Pierrat); GERMANIA: *Badenia, Siegelau* (Goetz). — δ . GERMANIA: *Prov. rhenana, Coblenz* (Wirtgen); *Silesia*; *Bavaria*; HUNGARIA: *Bakabanya*; BELGIA. — ϵ . GALLIA: *Vosges*. — ζ . GERMANIA: *Badenia, Siegelau*. — η . MORAVIA: prope Saar (Kovarff); BELGIA: *Coo, la Gleize (du Pré)*; GERMANIA: *Silesia* (Kinscher). — ϑ . HUNGARIA: *Bakabanya* Sarkandistolna (Kupcok).

HYBRIDÆ

R. RIVULARIS? \times *ULMIFOLIUS*; *R. PUSTULIFER* Sud. *Diagn.* p. 50 (1906). — Validus; turio angulosus, scaber; aculei validi; folia 5-nata, leviter discolora; inflorescentia magna, epilosa; sepala reflexa. Sterilis.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon.

OBS. — Un spécimen de *R. vagus* Focke ! *ap.* Burnat *Fl. Alp. mar.* III (1899), 11 paraît être un *R. RIVULARIS* \times *PROCERUS*. — *Alpes-maritimes*, S. Sébastiano.

R. RIVULARIS \times *TOMENTOSUS* Lloydianus: *R. BAKABANYE* Borbas *Mag. Bot. Lap.* (1903) 41; Kupcok. l. c. (1907) p. 252. — Habitus *R. rivularis* sed foliis grosse serratis, \pm discoloribus, sepalis reflexis, floribus sterilibus diversus est.

HUNGARIA: Bakabanya, in valle Grunt prope Budacka (S. Kupcok).

R. RIVULARIS \times *FUSCUS*; *R. PSEUDO-HORRIDICAULIS* Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 155 (1905). — A *R. fuscus* Wh. differt: foliis 3-natis, glandulis longissimis, sepalis patulis, fructificatione non tota.

GALLIA: *Vosges* (Pierrat).

R. RIVULARIS \times *TERETICAULIS* Sud.; *R. SUPERFLUUS* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) 389; *R. hirtus* \times *tereticaulis* ej. l. c. — Aciculi crebri, flavescentes ut in *R. rivulari*, glandulæ breves ut in *R. tereticauli*.

AUSTRIA: *Styria*, Seehau, supra Ebersdorf (Sabransky).

R. RIVULARIS (gr.) \times *SCHLEICHERI* Sud. *ap.* Gdg. *Nov. Consp.* p. 155; *R. OREOPHILUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 166 (1859). — *Exsicc.*: Sud. *Hb. Rub. rar.* n° 42! — Aculei compressi; turio rachisque dense pilosa; inflorescentia densa, interrupta; sepalæ laxe reflexa; stamna stylis breviora. Parum fertilis.

GERMANIA: *Alsacia*, La Reissbach, prope Weissenburg (Müller).

R. RIVULARIS (gr.) \times *HIRTUS* (gr.); *R. CHLOROSTYLUS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 111 (1868) et *exsicc.* n° 93! (pr. sp.). — Differt a *R. rivulari* M. et W. inflorescentia glandulis longissimis, subfuscis munita, staminibus brevibus, floribus parum fertilibus.

GALLIA: *Vosges*, Gerbamont, à Lotnère (Pierrat).

R. RIVULARIS \times *e glandulosis*; *R. EUCLAMPTUS* = *carpaticus* \times *tereticaulis*? Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 233. — Habitus *R. rivularis* (*R. aculeolati* P.-J. Müll.) sed floribus sterilibus.

HUNGARIA: Bakabanya, Piesky prope Kasanka (S. Kupcok).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Turio distincte pilosus; inflorescentiae rachis \pm piloso-hirsuta.

A. — Foliorum serratura tenuis, vulgo aequalis.

- a. — Foliolum caulinum terminale ovatum, emarginatum, acuminatum.
 - 1. — Stamina stylos superantia.....
 - 2. — Stamina stylis breviora.....
 - b. — Foliolum caulinum terminale suborbiculare, cordatum.
 - 1. — Stamina stylos superantia.....
 - 2. — Stamina stylos vix sequantia.....
 - c. — Foliolum caulinum terminale ellipticum, obovatum, rhombeum vel oblongum; stamina longa.
 - 1. — Foliolum caul. terminale ellipticum, acuminatum.....
 - 2. — Foliolum caul. terminale oblongo-ellipticum, acutum.....
- B. — Foliorum serratura \pm grossa, inaequalis; sepala in fructu vulgo erecta.
- a. — Stamina stylos superantia.
 - 1. — Folia subtus glabrescentia.....
 - 2. — Folia subtus manifeste pilosa.....
 - b. — Stamina stylis breviora.
 - 1. — Folia subtus glabrescentia.....
 - 2. — Folia subtus dense pilosa.....

II. — Turio fere glaber; inflorescentiae rachis parum pilosa vel non.

A. — Foliorum serratura tenuis, vulgo aequalis.

- a. — Stamina stylos superantia; foliolum caul. terminale ovatum.....
 - b. — Stamina stylis breviora.....
- B. — Foliorum serratura grossa, inaequalis; stamina stylos vulgo non superantia.
- a. — Foliolum caul. terminale ovatum; stamna stylos sequantia vel parum superantia; rachis pilosa.
 - b. — Foliolum caul. terminale oblongo-rhombeum; rachis pilosa.....
 - c. — Foliolum caul. terminale suborbiculare vel late ovatum; rachis pilosa.....

b. — (CXCIX) — *R. angustisetus* Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 155; *R. rivularis* var. *vogesiacus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 118 (1900); *R. virescens* Boul. et Pierrat Assoc. rub. exsicc. n° 44 (1873); *R. clematitifolius* Timb.-Lag. *Bull. Soc. sc. ph. et nat. Toul.* (1875) p. 91 p. p.; *R. retroflexus* Boul. et Pierrat Assoc. rub. exsicc. n° 518 (1882); *R. Schleicheri* \times *serpens?* N. Boul. l. c. p. 131; *R. stramineus* N. Boul. Assoc. rub. n° 456 (1881) et ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 118; *R. antisotylus* Boul. et Pierrat Assoc. rub. (1877) ex pte; *R. fuscus* \times *serpens* N. Boul., ex pte; *R. serpens* var. *stenanthus* Sabrs. exsicc.; *R. flavescentispinus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), non Sud.; *R. suboxyphyllus* Kupcok, exsicc.; *R. rivularis* exsicc.; *R. rivularis* var. *speluncarum* ej. exsicc.; *R. bursonensis* Prog.; *R. stilbowphyllus* ej. p. p.

Characteres *R. rivularis* M. et W.: turio pilosus, serratura tenuis, foliolum caul. terminale ovatum, acuminatum, rachis pilosa, etc., sed stamna stylis breviora. Fertilis.

β . *SETIFER*; *R. setifer* Sud. *Diagn.* p. 49 (1906); *R. Bayeri* var. *acanthicus* (Beck) Sabrs. exsicc. — Folia mucronato-serriculata; foliala breviter et tenuiter cuspidata.

γ . *PARVISETUS*; *R. parvisetus* Sud. *Diagn.* p. 50 (1906); *R. hirtus* var. *floccosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 247; *R. echinaceus* Kerner exsicc. — Serratura tenuis; foliolum caul. terminale ovato-rhombeum; rachis pilosa.

δ . *ACCEDENS*; *R. accedens* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 329; *R. instans* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 221. — Foliolum caul. terminale latum; rachis parum pilosa; inflorescentia brevis; styli rubri.

ϵ . *HORRIDULIFORMIS*; *R. horriduliformis* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* p. 318 (1905); *R. horridulus* Baenitz *Hb. eur.* n° 8561, non P.-J. Müll. — Foliola abrupte acuminata; inflorescentia brevis, divaricata, armatissima; stamna brevissima.

ζ . *TENUISERRATUS*; *R. tenuiserratus* Sud. *Diagn.* p. 50 (1906). — Serratura tenuissima, inaequalis; foliola angusta, suboblonga, acuminata; rachis parum pilosa.

GALLIA: *Vosges*, *Haute-Savoie*, *Tarn*; GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*, *Prov. rhenana*, *Thuringia*; HUNGARIA, etc. — β . GALLIA: *Vosges*; STYRIA: *Schochau* (Sabransky); BAVARIA: *Traunstein* (Kaufmann). — γ . GALLIA: *Vosges*; GERMANIA: *Silesia* (Kinscher); HUNGARIA: *Bakabanya* (Kupcok). — δ . GALLIA: *Tarn*; GERMANIA: *Silesia*; HUNGARIA. — ϵ . GERMANIA: *Badenia* (Goetz), *Silesia*, *Munsterberg* (Kinscher). — ζ . GALLIA: *Vosges*; GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*.

B. — (T. CXCIX) — *R. setiger* Lef. et M. *Vers.* n° 158 (1859); *R. rivularis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 618, ex pte; *R. laetevirens* var. *racemulosus* Progel; *R. laetevirens* Progel p. p.

Exsicc. — G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 204 (*R. laetevirens*); Sud. *Rub. rar.* n° 153.

Validus; turio pilosus; folia caulinata 3-5-nata; serratura tenuis; foliolum caul. terminale (8) orbiculare, cordatum, satis abrupte acuminatum, lateralia ampla, marginibus sese tegentia; rachis laxe pilosa, armatissima (9); sepala laxe erecta; stamna stylos superantia; germina glabra.

β . *CORDIGER*; *R. cordiger* M. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 145 (1860); *ed. 2* n° 75. — Foliola ramealia orbicularia, cordata; inflorescentia valde multiflora; rachis breviter pilosa, glandulis relative brevibus munita.

γ . *FALCATUS*; *R. falcatus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 114 (1868) et exsicc. n° 96, non Kalt. (1845); *R. Schleicheri* \times *funiculiformis* vel *horridulus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 131. — Aculei caulinata ramealesque falcati; inflorescentia aphylla.

δ . *SPICULIFER*; *R. spiculifer* Sud. *Diagn.* p. 48 (1906). — Folia mucronato-serriculata, caulinata 3-nata; rachis epilosa.

? ϵ . *PROGELII*; *R. Progelii* Sabrs. *Oest. B. Z.* (1892), non *R. Progelii* Utsch (1895). — Folia subtus molliter pilosa, flaccida, caulinata 3-nata; turio leviter angulatus; fructificatio non tota.

GALLIA: *Valois*, bois de Tillet (Lefèvre), *Vosges*; GERMANIA: *Saxonia* (Hofmann), *Thuringia* Roda (Holzfuss), *Silesia* (Kinscher); *Bavaria* (Progel); HUNGARIA: *Bakabanya*. — β . GERMANIA: *Prov. rhenana*, prope Iseburg (Wirtgen). — γ . GALLIA: *Vosges*, *Rochesson*, à Plainfaing (Pierrat). — δ . GALLIA: *Vosges*, *Pyrénées*, *Luchon*; GERMANIA: *Bavaria*, *Freyung* (Prechtelsbauer). — ϵ . HUNGARIA OCCIDENT., Pressburg (Sabransky); GERMANIA: *Saxonia*, *Valtenberg* (Barber).

b. — *R. parvulipetalus* Sud. *Diagn.* p. 49 (1906); *R. vallicolus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 258 non P.-J. Müll.; *R. Guentheri* \times *sulcatus* ej. l. c.

Turio pruinosus, pilosus; *folia* subtilis parce pilosa, argute serrata, foliolis terminalibus cordato-suborbicularibus; *stamina* stylis breviora; *germina* vulgo glabra. *Flores* parvi.

β. CINEREUS; *R. crassus* Kupcok, non Hol.; *R. lamprophyllus* ej. non Gr. — *Folia* mucronato-serriculata, subtilis \pm cinerascentia.

γ. PILEOPHYLLUS Sud. *Bull. Ac. géog. bot.* (1911) p. 64; *R. gracilis* var. *anoplos* Progel, ex pte. — *Folia* utrinque manifeste pilosa, flaccida; foliolum terminale basi rotundatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum, *germina* pilosa.

HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); GALLIA: Vosges, Müller; BAVARIA: Freyung (Prechtelsbauer). — β. HUNGARIA: Pukanec (Kupcok); BAVARIA: Rieselwald (Progel). — γ. BAVARIA: Grenzgebirge, prope Dreiwappenfels (Progel).

C. — (T. CC) — **R. lusatius** Rostock ap. R. Wagner *Fl. Lœb. Berg. Progr.* (1886); Barber *Fl. Oberl.* III p. 123; *R. serpens* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 621, ex pte; *R. serpens* var. *algovicus* Progel.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9964; Sud. *Bat. eur.* n° 615.

A *R. rivulari* M. et W. dignoscitur: foliolo caul. terminali (2) anguste elliptico vel rhomboeo, basi integro vel vix emarginato, acuminato, breviter petiolulato. — *Turio* parce pilosus (1); *folia* 3-nata, minute serrulata; *rachis* pilosa; *stamina* stylis virescentes superantia; *germina* glabra.

β. HEIDEWILXENSIS; *R. hirtus* var. *heidewilxensis* Sprib. in hb. Sud. — Exsicc.: *Bat. eur.* n° 616! — *Turio* dense pilosus; frons pallidus; serratura tenuis, æqualis; foliolum terminale manifeste obovatum, abrupte acuminatum; inflorescentia brevis, obtusa, setis flavescensibus, rectis, crebris armata ut in *R. rivulari*, sed glandulis \pm fuscis ut in *R. hirtus*. Vergens ad. *R. nigricatum* M. et L.

γ. GORLICIENSIS; *R. gorlicensis* Barber *Fl. Oberl.* III p. 99 (1911). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 798! — Validus; *turio* angulatus; *folia* caul. 3-5-nata; foliolum terminale obovatum, basi subemarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia magna, multiflora, pedunculis e basi ramosis; sepala in fructu patula vel laxe reflexa. Ad *R. apricum* accedens.

GERMANIA: Silesia, Saxonia, Bavaria, Alsacia; HELVETIA; GALLIA: Puy-de-Dôme, Lezoux (Chassagne). — β. GERMANIA: Silesia, prope Heidewilxen (Spribile); Bavaria, Barnau, Weg z. Luzen (Prechtelsbauer); HUNGARIA: Bakabanya. — γ. GERMANIA: Silesia, Goerlitz, prope Charlottenhof (Barber).

b. — (T. CC) — *R. laurifolius* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9055 (1896).

Gracilis; *folia* obscure viridia, 3-nata, argute serrulata; *foliola* angusta, terminale (3) oblongo-ellipticum, basi integrum, acutum vel parum acuminatum; *inflorescentia* laxa, subaphylla, aculeis validis armata, rachide pilosa; *sepala* laxe erecta; *stamina* stylis superantia.

GERMANIA: Badenia, Siegelau (Goetz).

D. — (T. CC) — **R. incultus** Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 153 (1862); Focke *Syn.* p. 369; *R. pallidus* Caflisch *Beitr. Fl. Regbz. Schwab. u. Neub. in Jahrest. Nat.* V. XXII p. 174; *R. viridis* B. *incultus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 609 (1902); *R. stenothrysus* Holuby in *O. B. Z.* XXV (1875); *R. hirtus* var. Wimmer, exsicc.; *R. serpens* var. *glaucovillosus* Schmid. *Cat. p. 109* (1888); *R. hirtus* f. *virescens* Progel.

Exsicc. — Wirtg. l. c. ed. I n° 153, ed. 2 n° 106; Baenitz *Hb. eur.* n° 9999 (*R. Mihani*), 9072 (*R. Schleicheri* \times *serpens* Utsch); G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 164, ex pte; Sud. *Rub. rar.* n° 155.

Turio pilosissimus, dense glanduloso-aciculatus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia et sparsim pilosa, grosse et inæqualiter dentata; *foliolum* terminale (4) late ellipticum vel ovato-rhombeum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* pilosus, aculeis mediocribus, reclinatis munitus; *inflorescentia* densa, foliosa, obtusa, piloso-hirsuta, glandulis longis, aculeis crebris, validis obsita (5); *sepala* in fructu erecta (6); *stamina* stylis superantia; *germina* glabra.

β. SCABRIRAMUS Sud. *Rub. tarn.* p. 55 (1909); *R. scabbriramus* Sud. *Diagn.* p. 48 (1906); *R. callicomus* Kupcok exsicc.; *R. hirtus* f. *apricorum* \times *scaber* ej. — *Turio* laxe pilosus; dentes minus grossi, acutiores; foliolum terminale subobovatum; inflorescentia magna, laxa, subaphylla.

γ. ACANTHOPHORUS; *R. acanthophorus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 166 (1901). — Dentes grossi, acuti; foliolum caul. terminale obovatum, emarginatum; calyx reflexus; *turio* pruinosus.

δ. VIRIDIS Sud. *Rub. tarn.* p. 55 (1909); *R. viridis* Kalt. *Fl. Aach. Beck.* p. 284 (1845); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 609; *R. calycinatus* Kalt. l. c. p. 283; *R. argutifolius* Gen. *Mon.* p. 102, non Lef. et M.; *R. hirsutus* Wimm. p. p.; *R. lete-virens* f. *debitis* Progel; *R. serpens* var. *appendiculatus* Progel *Ber. Bot. Ver. Landsh.* (1889), 10, ex pte; *R. rivularis* Ssp. *prionophyllus* Progel p. l. c. (1882), 98; *R. posnaniensis* Spribble *Abh. Bot. Ver. Prov. Brandg.* XXXIX (1897) p. 49; R. Kmetii Kupcok. *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 252; *R. suaveolens* = *Bayeri* \times *nemorosus* ej. l. c. (1910) p. 228; *R. rivularis* Barber; *R. complicatus* Kupcok l. c. 267; *R. hirtus* \times *sulcatus* ej. — Exsicc.: Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 99, 100, ex pte; ed. 2 n° 41, 42, ex pte. — *Folia* 3-5-nata; foliolum caul. terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; inflorescentia laxa, glandulis aciculisque brevioribus munita; *turio* ramusque interdum \pm angulati. *R. rivulari* M. et Wirtg. similis. — Variat foliis grossissime dentatis [*R. decurrentis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 261].

ε. GLAUCOPHYLLUS; *R. glandulosus* Sbsp. *glaucophyllus* Celak. in *Jilzungsb. böhm. Ges. Wiss.* (1887) p. 634; *R. Bellardii* var. *glaucophyllus* Hal. Oest. *Bromb.* p. 270 (1891). — *Turio* pruinosus; aciculæ crebrae, longæ; *folia* subtilis glabrescentia glaucescentiaque; foliolum terminale late ovatum, emarginatum, abrupte et breviter acuminatum; *rachis* subepilosa.

ζ. SUBCOLLINUS; *R. subcollinus* Kupcok. *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 264. — *Foliolum* caul. terminale ovatum vel ellipticum, basi rodundatum; flores parvuli, staminibus stylis parum superantibus.

η. SUBINCULTUS. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 617! — *Turio* dense pilosus; serratura tenuis sed inæqualis; *folia* 3-5-nata, foliolo caul. terminali elliptico-ovato, longe acuminato; inflorescentia brevis, subepilosa, glandulis \pm rubris; *germina* pilosa.

GERMANIA: *Prov. rhenana*, Ahler Berg, prope Oberlahnstein (Wirtgen); *Pomerania* (Holzfuss); *Silesia*, Striegau (Wimmer), Frankenstein (Kinscher); *Bavaria*, Waldmünchen (Progel), etc., Nürnberg (Scherzer), etc.; BELGIA: La Roche (du Pré); HUNGARIA; AUSTRIA: *Styria*, Sœchau (Sabransky); GALLIA: Corrèze, Bort; Haute-Savoie, Monts Voiron; Morvan (Gillot); Tarn, Lacabarède. — β. GALLIA: *Tarn*, Albine, Gijounet; *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Cambey (N. Boulay); Savoie, Conflans (Perrier); GERMANIA: *Alsacia*, *Silesia*, *Bavaria*; BELGIA: *Styria*. — γ. GALLIA: Luchon; GERMANIA: *Alsacia*. — δ. GERMANIA: *Prov. rhenana*, Aix-la-Chapelle; *Gespalatia*, *Bavaria*; HUNGARIA; GALLIA: *Tarn*, *Haute-Vienne*; BELGIA: Frahau. — ε. BOHEMIA: Gratzen; *BAVARIA*: Waging, prope Traunstein (Progel). — ζ. HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok). — η. GERMANIA: *Silesia*, Hopfenberg, prope Frankenstein (Kinscher).

b. — *R. lamprophyllus* Gremli *O. B. Z.* XXI (1871) p. 94, p. p. ; Focke *Syn.* p. 381 ; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 618, p. p. ; *R. argutifolius* var. *ciliatus* Progel *Fl. Amis. Valdm.* II (1889), p. p. ; *R. argutifolius* v. *tomentellus* Progel l. c., p. p.

Turio dense pilosus, pruinosus ; *folia* caul. 3-nata, subtus pilis fulgentibus obsita ; *foliolum* terminale obovatum, subemarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* brevis, hirsuta, setis glanduliferis longis instructa ; *stamina* stylos parum superantia ; *germina* pilosa.

β. *CASSOVIENSIS* ; *R. cassoviensis* Borbas. — *Foliolum* caul. terminale ovato-rhombeum ; *folia* subtus leviter cinerascentia ; *germina* glabra.

HELVETIA : Zurichberg (Gremli) ; GERMANIA : *Bavaria*, Waldmunchen, Waging (Progel). — β. HUNGARIA : Bakabanya.

c. — *R. biserratus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 115 (1868) ; *R. Sendtneri* Progel p. p.

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 95 ! ; Baenitz *Hb. eur.* n° 9549 (s. n. *R. oreophili* non P.-J. Müll.

Folia grosse et duplicito-serrata, dentibus acutis ; *foliolum* caul. terminale ovatum, cordatum, acuminatum ; *inflorescentia* brevis, arcuata, hirsuta, pedunculis patulis ; *stamina* stylis rubris breviora.

δ. *ACRIDENTATUS* ; *R. acridentatus* Sud. *Diagn.* p. 49 (1906) ; *R. rivularis* f. *incisiferrata* Progel p. p. ; *R. neglectus* Kupcok non al. — *Folia* subtus pilosa ; dentes medios, acutissimi ; *foliolum* terminale leviter emarginatum ; *inflorescentia* ampla.

γ. *OBTUSIDENTATUS* ; *R. obtusidentatus* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 155 (1905) ; *R. viridis* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 148 et exsicc. n° 134 ; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 118, non Kalt. — Dentes obtusi, parum profundi ; *foliolum* terminale vix emarginatum ; *inflorescentia* parva, densa, *folia* parum superans ; *petala* ovata ; *styli* virentes.

δ. *INCOMPTUS* ; *R. incomptus* Boul. et Cornet *Assoc. rub.* n° 39 (1873) ; *R. muricatus* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 130. — *Foliolum* caul. terminale obovatum, leviter emarginatum, cuspidatum ; *styli* virentes.

ε. *LAMPROSTACHYS* ; *R. lamprostachys* Sud. *Diagn.* p. 50 (1906). — *Folia* subsimpliciter serrata ; *foliolum* terminale obovatum ; rachis dense piloso-hirsuta : pedunculi elongati, ascendentis.

ζ. *LECHEPOEUS* ; *R. lechepoeus* = *Guentheri* × *sævus* var. *terribilis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 242. — Serratura acuta ; *foliolum* terminale suborbiculare, basi rotundatum, emarginatum, apice cuspidatum ; *folia* subtus molliter pubescentia ; *styli* rubri.

GALLIA : *Vosges*, Gerbamont (Pierrat) ; *Savoie*, Conflans (Perrier) ; BELGIA : forêt de Soignes (du Pré) ; GERMANIA : *Badenia*, *Silesia*, *Bavaria*. — β. GALLIA : *Vosges*, Lotner (Pierrat) ; GERMANIA : *Bavaria*, Waging, Algau, Freyung, etc. ; HUNGARIA. — γ. GALLIA : *Vosges*, Basse-s.-le-Rupt, au Bambois-de-Planois (Pierrat). — δ. GALLIA : *Saône-et-Loire*, St-Léger-sur-Beuvray (Cornet) ; *Tarn*, inter Travanet et Arifat ; GERMANIA : *Silesia* (Kinscher). — ε. GALLIA : *Vosges*. — ζ. HUNGARIA : Bakabanya, Uhliska (Kupcok).

HYBRIDA

R. *BISERRATUS* var. δ. × *BIFRONS* ; *R. CANENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 53 (1909). — Glandulæ sparsæ ; *folia* 5-nata, discolora ; *inflorescentia* pyramidalis ; flores rosei ; *sepala* patula ; *stamina* brevia. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, bois d'Arifat.

d. — (T. CC) — *R. hispidissimus* Sud. *Diagn.* p. 50 (1906) ; *R. serpens* × *pyramidalis* ? ; *R. lusaticus* var. *viscosus* Barber.

Turiones, petioli, rami et rachis florifera dense piloso hirsuta ; *folia* 3-nata, subtus manifeste pilosa, pilis ad nervos pectinatis ; serratura acuta, composita ; *foliolum* terminale (7) ovatum vel oblongo-obovatum, basi integrum vel vix emarginatum, longe acuminatum ; *inflorescentia* magna, foliosa, armata ; *petala* ovata ; *stamina* stylis breviora ; *germina* glabra.

GALLIA : *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier) ; GERMANIA : *Saxonia*, Valtenberg (Barber).

E. — (T. CC) — *R. spinosulus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 84 (1909) ; *R. Michelianus*, p. p., et *aciculatus* Lej. (*prius*) ; *R. subacuteatus* Borbas, non Gandg. ; *R. Radula* Kupcok exsicc., *R. coriifolius* ej., non Liebm. ; *R. bifrons* × *pulchellus* ej. ; *R. serpens* var. *metanadenes* Progel, p. p. ; *R. serpens* v. *aciculatus* (= var. *algovicus* prius) Prog. ; *R. rivularis* f. *glabrescens* ej. ; *R. rivularis* var. *elegans* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 261 ; *R. tereticaulis* var. *peracuteatus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 218 ; *R. rivularis* var. *albolutescens* Kupcok l. c. p. 251.

Habitus *R. rivularis* M. et W. sed turio (8) glaber, ramus glabrescens, inflorescentiae rachis (10) epilosa, aciculis longis, crebris obsita, raro parce pilosa (*R. rivul.* var. *albolutescens* Kpk). — *Folia* pleraque 3-nata, argute serrulata ramealia quoque, subtus glabrescentia ; *foliolum* terminale (9) ovatum, raro rhombium, emarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* elongata ; *calyx* laxer erectus ; *stamina* alba stylis virentes superantia (11) ; *germina* glabra. Pollen fere purum.

ε. *DASYACANTHUS* ; *R. dasyacanthus* G. Braun exsicc. n° 20 ; *R. rivularis* var. *dasyacanthus* Focke *Syn.* p. 367 (1877). — *Folia* caul. 5-nata, foliolis longe petiolulatis ; serratura leviter inaequalis ; *germina* pubescentia.

γ. *EXACUTUS* ; *R. exacutus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 167 ; *R. amblyphyllus* Kupcok = *tereticaulis* × *vestitus* ej. *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 230. — Aculei sparsi in turione ; *folia* 3-5-nata ; *foliolum* caul. terminale late ovatum, cordatum, sensim et longe acuminatum ; dentes parum profundi, lati ; *inflorescentia* laxa ; *stamina* stylis parum superantia.

δ. *RIVULARIFORMIS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 222 ; *R. rivulariformis* Sud. *Diagn.* 49 (1906) ; *R. finitimus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 237, non Sud. ; *R. hirtus* × *scaber*, *R. obstrusus* ej. l. c. 257, *R. erythroxanthus* ej. l. c. 263 ; *R. Rabenau* Barber *Fl. Oberl.* III p. 126 (1911). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 156. — *Folia* caul. plerumque 3-nata ; *inflorescentia* brevis, *folia* parum superans ; aciculis graciles ; *calyx* erectus. Variat foliis ± glaucescentibus, subtus pallidis, glabrescentibus [*R. rivularis* var. *plumbeus* Kupcok et Sabrs. *Mag. Bot. Lap.* (1910), 252].

ε. *RUFISPINUS* Sud. in hb. Müll. et *Bull. Soc. Bot. Fr.* LVIII (1911) p. 274 ; *R. monstratus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 247 ; *R. apricus* × *tereticaulis* ej. ; *R. prionophyllus* f. *glabrior* Progel ; *R. chloroleucus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 87 (1911) ; *R. densiflorus* Barber *Jahr. Schl.* (1907-08), non GrL. ; *R. Bayeri* (Focke) Sud. *Rub. Pyr.* p. 26. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 799 (*R. chloroleucus* Barb.). — *Folia* 3-5-nata ; aculei rufi ; *inflorescentia* angusta, densa, mediocriter armata ; *sepala* in fructu patula vel laxa reflexa.

ζ. *AGLABRATUS* Sud. *Rub. Belg.* p. 222 (1910) ; *R. aglabratus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 308 (nomen) ; *R. serpens* Wh. ap. Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II p. 172 [1831] (ex pte)! ; *R. Bellardii* Libert exsicc. ! — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 157, 158. — *Folia* 3-nata, subtus fere glabra, mucronato-dentata ; *inflorescentia* foliosa, aciculis brevibus munita ; *sepala* laxa reflexa.

n. DISCOLOR ; *R. Mikanii* = *vestitus* \times *Bayeri* f. *Guentheri* Utsch ap. Baenitz *Hb. Eur.* n° 9542, ex pte ; *R. serpens* var. *subcanus* Prog. ; *R. foliosus* E. *lipopogon* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 575 (1902). — *Turio subangulatus*, *pruinosus* ; *folia magna*, *argute serrulata*, *superiora* \pm *cinerascentia* ; *inflorescentia magna*, *subaphylla* ; *cetera ut in typo*.

o. SUBCAUCASICUS ; *R. subcaucasicus* Sabrs. in hb. Sud. — *Folia caul.* 3-nata, *mucronato-serriculata*, *superiora discolora* ; *foliolum terminale late ovatum*, *profunde cordatum*, *acuminatum* ; *inflorescentia laxa*, *suberubescens* ; *petala ovata* ; *stamina stylos pallidos æquantia*.

t. CRENATUS ; *R. crenatus* Kupcok *exsicc.* ; *R. apricus* \times *scaber brachyadenius* ej. — *Turio parce pilosus*, *aculeis subcompressis* ; *folia inæqualiter et acute serrata* ; *cetera ut in typo* ; *forma vergens in R. aculeolatum* P.-J. Müll.

x. VINDOBONENSIS ; *R. vindobonensis* Sabrs. *Deutsch. bot. Monat.* (1889) 131 ; *Hal. Oest. br.* 271, non *Gandg.* (1887) ; *R. eury-thyrus* Sabrs. et Braun *O. B. Z.* (1887), 82, non G. Braun. — *Foliolum caul.* *terminale obovato-orbiculare*, *cordatum*, *cuspidatum*, *longe petiolulatum* ; *inflorescentia magna*, *laxa*, *pedunculis patulis*, *elongatis* ; *germina vulgo pilosa*.

GALLIA : in *Pyrenais centralibus*, Luchon, Ax, Aulus; GERMANIA : HUNGARIA. — β. GERMANIA : Harz, Oker, Harburg (G. Braun). — γ. GERMANIA : Alsacia, Weissenburg, Alsbach Müller); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — δ. GALLIA : Tarn, St-Paul-du-Dadoune, Albine, Labastide-Rouairoux; Ain, Valois, Auvergne; GERMANIA : Alsacia, Silesia; HUNGARIA : Bakabanya; BELGIA. — ε. GALLIA : Vosges, Pyrénées; GERMANIA : Saxonia, Silesia, Bavaria; HUNGARIA. — ζ. GALLIA : Marne, bois de Mersy et de Montchenot (Levent); Valois, Ivors (Questier); BELGIA; GERMANIA OCCIDENTALIS. — η. GERMANIA : Silesia, Mensgebirge (Baenitz); Bavaria (Progel). — θ. AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky). — ι. HUNGARIA : Bakabanya, Grunt (Kupcok); BAVARIA : Freyung (Prechtelsbauer) — κ. AUSTRIA : Wiener Landsteingebirge, Tullnerstrasse (Sabransky); HUNGARIA : Bakabanya, Grunt (Kupcok); HELVETIA : Zurichberg (R. Keller).

HYBRIDÆ

R. SPINOSULUS \times BIFRONS Sud. ; R. PERSETOSUS Sabrs. in Hayek *Fl. v. Steierm.* I. p. 791 (1909). — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 618 ! — Validus; *turio angulatus*, *aculeis compressis*; *folia superiora* \pm *discolora*; *inflorescentia laxa*; *fructificatio non tota*. *Cetera ut in R. spinosulus*.

STYRIA ORIENT. : Supra Tautendorf ad Sœchau (Sabransky).

R. SPINOSULUS \times TOMENTOSUS *Lloydianus* Sud. ; R. VIETUS Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 232; *R. tereticaulis* \times *tomentosus* ej. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 619 ! — *Habitus R. spinosuli sed folia grosse serrata*, *flavescenti-viridia*, *subtus pallida*, *subcinerascentia*, *sepala reflexa*, *flores steriles*.

HUNGARIA : Bakabanya, collis Nadimestom (S. Kupcok).

R. SPINOSULUS \times RADULA Sud. ; R. PETRICHOVICII Kupcok in hb. Sud. — *Habitus R. spinosuli sed turio rachisque laxe pilosa*, *aculei majores*, *folia caul.* 3-nata, *foliolis longe petiolulatis*; *sepala subreflexa*, *flores parum fertiles*.

HUNGARIA : Bakabanya, retro lateraria Slukæ (S. Kupcok).

b. — R. horridulus P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 112 (1868); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 118; *R. divexiramus* (P.-J. Müll.) B. *horridulus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 620; *R. Zieschit* Spribille in hb. Sud. ; *R. conunctus* Kupcok *exsicc.*; *R. apricus* \times *hirtus* ej.; *R. Guentheri* f. *cordifolia* Progel; *R. Guentheri* var. *sericeus* ej. p. p.; *R. bifrons* \times *bavaricus* Utsch. p. p.

Exsicc. : N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 94; *Assoc. rub.* n° 452.

R. spinosulo admodum similis, sed *stamina stylos roseos* vix *æquantia*. *Folia pleraque* 3-nata, *utrinque glabrescentia* vel *subtus pubescentia* (*R. abieticollinus* R. Keller), *acute serrata*; *foliolum caul.* *terminale ovatum* vel *subovatum*, *basi rotundatum* vel *leviter emarginatum*, *acuminatum*; *inflorescentia brevis*, *truncata*, *armatissima*; *germina pubescencia*.

β. HORRIDIPES Sud. *Rub. tarn.* p. 55 (1909); *R. horridipes* Sud. *Bat. eur.* p. 47 et *exsicc.* n° 147 ! (1905); *R. spinosulus* var. *pilosus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 165 (1901); *R. caudatifrons* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 243. — *Turio glaucescens*; *varia subtus pubescentia*; *inflorescentia ampla*, *elongata*, *armatissima*; *stamina stylis pallidis breviora*; *germina glabra*.

γ. VALDESPINOSUS ; *R. valdespinosus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 167 (1901); *R. densisetosus* = *apricus* \times *Guentheri* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 225. — Exsicc. : Sud. *Hb. rub. rar.* n° 14 ! — *Turio parce pilosus*; *folia magna*, 3-nata, *mucronato-denticulata*; *inflorescentia multiflora*, *aculeatissima*; *stamina brevissima*; *germina pilosa*.

δ. MUNDIFLORUS ; *R. mundiflorus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 166 (1901). — Validus; *turio leviter angulosus*, *glaucescens*; *foliolum caul.* *terminale ovato-suborbicularis*, *abrupte acuminatum*; *inflorescentia elongata*, *rachide pilosa*; *styli rubri*.

ε. HYSTRICIFORMIS ; *R. hystriciformis* Sud. *Diagn.* p. 49 (1906). — *Aculei creberrimi*, *longissimi in turione*, *petiolis ramisque*; *folia 3-nata*, *utrinque pilosa*, *mediocriter serrata*; *foliolum terminale suborbicularis*; *ramus pubescens*.

ζ. GOENCZYANUS ; *R. Goenczyanus* Borbas in *Vasvarm. Flor.* (1887) p. 295-7; *R. polysperus* = *apricus* \times *Guentheri* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 244, p. p. — *Folia subtiliter serrulata*, *utrinque parce pilosa*; *foliolum terminale cordato-orbicularis*; *inflorescentia angusta*, *arcuata*; *germina glabra*.

η. RIGIDATUS ; *R. rigidatus* Greml. *O. B. Z.* (1871) p. 98 et *Hb. norm.* n° 159 !; *R. juglandifolius* Timb.-Lag. *Bull. Soc. Sc. phys. et nat. Toul.* (1875) p. 91; *R. protensus* N. Boul. p. p., *Assoc. rub.* n° 583 (non 394); *R. calyculatus* Richter in *Verh. z.-b. Ges. Wien* (1887), non Kalt.; *R. Bellardii* var. *subalpinus* Hal. *Oest. bromb.* p. 270 (1891); *R. sudeticolus* Kinscher *Repert.* III (1906) p. 211 ! — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 620. — *Turio epruinosus*; *folia caul.* 3-5-nata; *foliolum terminale late rhombicum* vel *oblongo-rhombeum*, *basi integrum* vel *subemarginatum*; *stamina stylos æquantia*.

θ. SETULIFER. — Validus; *turio pruinosus*; *folia 3-5-nata*; *foliolum terminale oblongo-ovatum*, *longe cuspidatum*; *inflorescentia magna*, *laxa*, *armatissima*, *foliosa*; *petala pallide rosea*; *germina glabra*.

ι. CANIFOLIUS ; *R. canifolius* Hayek *Fl. v. Steierm.* I. p. 824 (1909); *R. candicans* \times *chlorostachys* Sabrs. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 621 ! — *Turio parce pilosus*; *folia minute serrulata*, *superiora* \pm *discolora*; *foliolum terminale ellipticum*, *basi integrum*; *inflorescentia laxa*, *elongata*, *pyramidalis*, *pedunculis patulis*; *styli pallidi*; *germina dense pilosa*.

κ. DEGENIANUS ; *R. Degentianus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 240. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 632 ! — *Folia ampla*, *subtus glaucescentia*, *parce pilosa*, *argute serrata*, *caulinata* 3-5-nata; *foliolum terminale suborbicularis*, *cordatum*, *abrupte acuminatum*; *ramus glabrescens*; *inflorescentia armatissima*, *glandulis* \pm *purpureis*; *germina glabra*.

GALLIA : Vosges, Rochesson, Gerbamont (Pierrat); Savoie, Conflans (Perrier); AUSTRIA : Styria; HUNGARIA; GERMANIA : Prov. rhénana, Bavaria, Silesia. — β. GALLIA : Pyrénées, Arbas, Luchon, Tarn, Isère, Vals; ITALIA : Liguria (Bicknell); GERMANIA : Silesia, Bavaria; HUNGARIA. — γ. GALLIA : Luchon; Ain, Hauteville; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — δ. GALLIA : Luchon, Tarn, Castelnau-de-Brassac. — ε. GERMANIA : Alsacia, Wattelouse (Müller). — ζ. HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok); GERMANIA : Silesia, Bavaria. — η. HELVETIA : Wülchingen (Greml); GALLIA : Vosges, St-Dié (Boulay); Tarn, Sorèze; AUSTRIA INF. : Prein (Richter); GERMANIA : Silesia, prope Thannendorf (Kinscher). — θ. ITALIA : Liguria, val Altomoro (C. Bicknell); GERMANIA : Silesia, Münsterberg (Kinscher). — ι. STYRIA : Köhegraben (Sabransky). — κ. HUNGARIA : Bakabanya, Grunt (Kupcok).

OBS. — N'ayant vu qu'un maigre fragment de la var. κ, j'avais rapporté cette forme à mon *R. impolitus* (Cf. p. 189), mais, après l'avoir étudiée sur de nombreux spécimens reçus depuis, j'ai reconnu qu'il y avait lieu de la rapprocher du *R. horridulus* P.-J. Müll.

HYBRIDÆ

R. HORRIDULUS var. $\beta.$ \times *ULMIFOLIUS*; *R. HETEROCOLOR* Sud. *Rub. Pyr.* p. 165 (1901). — Glandulæ breves; folia 5-nata, discolora; flores rosei, steriles.

GALLIA: in *Pyrenæis centralibus*, Luchon.

R. HORRIDULUS \times *KOEHLERI* (grex); *R. HORRIDULIFLORUS* Sud. et Biau. — Habitus *R. horriduli* sed turio angulatus, aculei majores, compressi, flores steriles.

GALLIA: Tarn, Le Banquet, rochers, en face l'usine électrique (Biau).

F. — (T. CC) — *R. aculeolatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 168 (1859); *R. rufus* Arrondeau non W. et N.; *R. rivularis* Sbsp. *R. prionophyllus* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) p. 98, p. p.; *R. rivularis* var. *subglabrifolius* Kinscher *Repert.* (1909) p. 81; *R. serpens* var. *definitus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 254.

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 181 (*R. Schleicheri*).

Turio glabrescens, subangulosus; *folia* 3-5-nata, grosse serrata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale (12) late ovatum vel ovato-rhombeum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, \pm pilosa (13), pedunculis patulis; *stamina* stylos æquantia (14). *Pollen* fere parum.

$\beta.$ *DANUBIALIS*; *R. danubialis* Borbas. — Folia ampla, superiora subtus pallido-cinerea; inflorescentia multiflora, aculeis validis, suberubescens armata.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, à l'Alsbach (Müller), *Bavaria*, *Silesia*; GALLIA: *Morbihan*, Vannes (Arrondeau); *Savoie*, Hauteluce (Perrier); BELGIA: Nafriture, Louette-St-Pierre (Gravet). — $\beta.$ HUNGARIA: Bakabanya (S. Kupcok).

b. — *R. leptobelus* Sud. *Bat. eur.* p. 31 (1904); *R. serpens* var. *opatoviensis* Spribille *Abh. Bot. Ver. Prov. Brandg. XLI* (1899), 214; *R. prionophyllus* f. *cavile glabriuscule* Progel; *R. heterophyllus* Utsch!, *ex pte*, non Wild.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 90!; *Assoc. rub.* n° 447 (*R. pilocarpus* f. *longifolius*).

Turio glaber, epruinosus; *folia* 3-5-nata, subtus pubescentia, satis grosse serrata; *foliolum* caul. terminale oblongo-rhombeum, sensim et longe acuminatum, breviter petiolatum; *rachis* epilosa; pedunculi patuli; *sepala* patula; *stamina* stylos pallidos æquantia; *germina* vulgo pilosa.

$\beta.$ *LEPTOCALYX*; *R. leptocalyx* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) p. 105, *pr. max. pte*; *R. metallicus* Kupcok *exsicc.*, an Borbas *Festeh. zu Asch. Geb.* (1904) p. 275? — *Turio* parce pilosus; *foliolum* caul. terminale late rhombeum; dentes grossi; *stamina* brevia, *germina* pilosa.

$\gamma.$ *HELVECONICUS*; *R. hebecaulis* Sbsp. *helveconicus* Kinscher *Allg. Bot. Zeit.* (1904) n° 4 — *Turio* pubescens, aculeis sparsis, glandulis rarisi; inflorescentia parce glandulosa, setis crebris, elongatis munita; *stamina* stylos superantia; *germina* glabra.

$\delta.$ *SERICEUS* Sud. *Bull. Ac. géog. bot.* (1911) p. 64; *R. gracilis* f. *sericea* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) p. 106. — *Turio* angulatus, glaber; *folia* grosse et duplicato-serrata, subtus sericea; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum, emarginatum; *stamina* stylos breviora, *germina* glabra.

BELGIA: Namur, Louette-St-Pierre (Gravet), Gd Coo (du Pré); GERMANIA: *Prov. rhenana* (Bodewig), *Posen* (Spribille), *Bavaria*, *Silesia*; GALLIA: *Vienne*, *Haute-Saône*, *Vosges*; HUNGARIA: Bakabanya; ITALIA: *Liguria*, prope Ormea (Burnat). — $\beta.$ HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*. — $\gamma.$ GERMANIA: Münsterberg, Höellenbusch (Kinscher). — $\delta.$ GERMANIA: *Bavaria*, Waldmünchen, Buchsvall (Progel).

HYBRIDÆ

R. LEPTOBELUS \times *BIFRONS* Sud.; *R. VRANYI* Kupcok = *thyrsoides* \times *scaber* ej. in hb. Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 623! — Differt a *R. leptobelo* aculeis compressis, glandulis brevioribus, foliis discoloribus, floribus roseis, sterilibus.

HUNGARIA: Bakabanya, prope Sarkandistolna (S. Kupcok).

R. LEPTOBELUS \times *KOEHLERI* Sud.; *R. CINNAMOMEUS* Barber *Fl. Oberl.* III p. 92 (1911). — Differt a *R. leptobelo* aculeis validioribus, inflorescentia laxa, sepalis reflexis, floribus substerilibus.

GERMANIA: *Saxonia*, Rotstein, prope Dolgowitz (Barber).

c. — *R. durotrigum* R. P. Murray *Journ. Bot.* (1892) p. 15; Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 85.

Exsicc. — *Set. of. Brit. Rub.* n° 24.

Turio leviter angulatus, glaber, epruinosus; *folia* 3-5-nata, grosse et inæqualiter dentata, subtus glabrescentia; *foliolum* terminale suborbiculare, emarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* densa, parce pilosa, arcuata; *stamina* stylos roseos fere æquantia; *germina* parce pilosa.

$\beta.$ *OLIGOTHRIX*; *R. oligothrix* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 448 (1881) (*nomen*); *R. rivularis* var. *eutrichus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 253; *R. peracanthus* Borb. et Waisb. — Inflorescentia laxior; *stamina* stylos breviora; *foliolum* terminale late ovatum, sensim acuminatum.

$\gamma.$ *WEIGELIOIDES* Spribille in hb. Sud.; *R. viridis* Auct. angl., p. p. — *Foliolum* caul. terminale late ovatum, vix emarginatum; pedunculi ascendentes.

$\delta.$ *HOLOVERUS*; *R. holoverus* Kupcok in hb. Sud. — *Folia* caul. 3-nata; *inflorescentia* laxa; *stamina* stylos virescentes leviter superantia; *germina* glabra.

BRITANNIA: *Dorset* (Murray); GERMANIA: *Silesia*, Mittelwalde (Kinscher); *Bavaria*. — $\beta.$ GALLIA: *Vosges*, Gerbamont (Pierrat), Tarn, Ariège, *Puy-de-Dôme*; HUNGARIA: Bakabanya, in valle Steinbach (Kupcok), Hammer (Waisbecker); GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*. — $\gamma.$ GERMANIA: *Silesia*, Schmiedeberg (Spribille); BRITANNIA (Murray); HUNGARIA. — $\delta.$ HUNGARIA: Bakabanya, Biela Bana (Kupcok), Borsod (Budai).

OBS. — Le *R. Preissmannii* Hal. *Oest. bromb.* p. 273 (1891); *R. Kœhleri* 3 *Preissmannii* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 599 (1902) m'est inconnu; il semble se placer ici: *Turio* teres, epruinosus, glaber (?); *folia* ampla, 5-nata, serrata (?); *foliolum* caul. terminale ellipticum vel obovatum, paulum emarginatum; *inflorescentia* laxa, pilosa; *sepala* laxe reflexa; *stamina* stylos vix superantia; *germina* pilosa. — AUSTRIA: Mariagrün, prope Graz (Halacsy). — Hybrida?

108 — (T. CCI) — *R. SERPENS* Wh. in Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II p. 172 (1831), *ex pte*; Focke *Syn.* p. 365; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 621, *ex pte*; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 112 (*serpens typicus*); *R. pallidus* Cott. et Castella *Guide Friib.* p. 76, *non Wh.*; *R. pallidicaulis* Boul. et Cornet *Assoc. rub.* exsicc.; *R. angustipetalus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 299 (1878); *R. pseudomacrophyllus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1908), 77 (70); *R. Pfuhlii* Spribille *exsicc.*; *R. brevicaulis* Greml. O. B. Z. (1871) p. 94?; *R. remotus* ej. l. c. p. 126?; *R. sordidus* ej. l. c. p. 98?; *R. hirtus* var. *sinuosus* Kupcok, *exsicc.*; *R. tereticaulis* Barber *Fl. Oberl.* III p. 117, *non* P.-J. Müll.

Exsicc. — *Assoc. rub.* n° 299, 451, 787, 789, 1104, 1105, 1106; *Rub. gall.* n° 190 (s. n. *R. tereticaulis*); Sud. *Bat. eur.* n° 192.

Planta flavescenti-viridis. *Turio* (1) prostratus, teres vel leviter angulatus, glaucescens, vulgo pilosissimus, glandulis crebris, pallidis, inaequalibus, aciculis sparsis, rectis vel reclinatis obsitus; *folia* (2) 3-5-nata, supra parce pilosa, subtus pubescentia, viridia, argute serrulata; *foliolum* caul. terminale ovatum, basi emarginatum, acuminatum, petiolulo proprio triplo vel quadruplo longius; *stipulae* lineares; *petiolus* pilosus glandulosusque; *ramus* pilosus, pallidus, aculeis tenuissimis, sparsis munitus, foliis minute serrulatis; *inflorescentia* (3) vulgo brevis, ± foliosa, saepe arcuata, pilosohirsuta, glandulis crebris, tenuibus, elongatis, pallidis, setis flavescentibus, sparsis, innoxiiis munita (4); *sepala* (5) tomentoso-viridia, glandulosa, inermia vel setis raris instructa, in flore reflexa, in fructu patula vel erecta (6); *petala* (7) oblonga, mediocria, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* vulgo glabra. — Julius.

o — Pollen fere purum.

α. PURIPULVIS Sud. *Bat. eur.* p. 61 (1906) et exsicc. n° 192; *R. puripulvis* ej. *Rub. Pyr.* p. 167 (1901); *R. approximatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 185 (1859), non Questier; *R. nutans* Lef. *Assoc. rub. exsicc.* n° 199 (1875), non Vest; *R. laetevirens*, *serpens* var. *subvelutinus* Progel, p. p.; *R. manifestarius* = *Kmetii* × *vestitus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 211; *R. hirtus* var. *sinuosus* ej. l. c. 247; *R. eu-hirtus* Barber *Fl. Oberl.* III p. 137! — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 192; *Rub. rar.* n° 159. — Foliolum caul. terminale (2) late ovatum, cordatum, acuminatum; stylis virescentes; pollen (8) purum vel parum admixtum. Rachis pilosa vel interdum cano-tomentosa [*R. diplotrichus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 221].

β. HETEROPHYLLOIDES; *R. heterophylloides* Sud. *Rub. Pyr.* p. 168 (1901); *R. heterophyllus* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9532, ex pte, (1898), non Willd.; *R. cerchoviensis* Progel hb. — *Turio* pruinosisimus; foliolum caul. terminale profunde cordatum; rachis parum pilosa; stylis rubri; pollen fere purum.

γ. PURPUREISTYLOS; *R. purpureistylus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 171. — *Turio* parce glandulosus; serratura mediocris; foliolum terminale basi rotundatum, emarginatum; stylis purpurei; pollen purum.

δ. ELEGANS; *R. elegans* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 170; *R. hylynomus* var. *elegans* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 114. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 624! — A var. praecedentibus dignoscitur: aculeis validioribus, foliolis minus latis, ramealibus longe acuminatis. Styli virescentes; pollen fere purum. Ad *R. corylinum* vergens.

ε. CALLIPHILLUS; *R. calliphillus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 168, n° 40. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 625! — *Turio* glabrescens; folia ampla, 5-nata, mediocriter et inaequaliter serrata, subtus glabrescentia; foliolum terminale basi leviter rotundatum, acuminatum; inflorescentia laxa, parum pilosa, pedicellis tenuibus, elongatis; stamina stylos vix superantia.

oo — Pollen imperfectum.

ζ. SPINULIGER Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910 p. 224; *R. spinuliger* Sud. *Diagn.* p. 51 (1906); *R. hercynicus* × *peltifolius*? Progel, Sud. p. p. — Exsicc. : *Rub. gall.* n° 147; *Rub. rar.* n° 160. — Folia caul. magna, 5-nata, argute serrulata; foliolum terminale suborbicularare, abrupte acuminatum.

η. GRATIFLORENS; *R. gratiflorens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 168 (1901); *R. strigatus* Kupcok, exsicc., ex pte. — Differt a var. α: foliolis minus latis, subtus glabrescentibus, inflorescentia elongata, laxa, pedunculis ascendentibus, germinibus pilosis. Pollinis gradus puritatis 3/4.

θ. TENELLUS; *R. tenellus* Lef. et Müll. *Vers.* n° 190 (1859); *R. terelicautis*? N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 131. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 161! — Gracilis; glandulae sparsae, breves; serratura inaequalis; inflorescentia laxa; petala dilute rosea; sepala patula vel reflexa, fructificatio non tota.

In locis sylvaticis montosis umbrosis. — GERMANIA, AUSTRIA, HUNGARIA, CAUCASUS, HELVETIA, DANIA, GALLIA, BELGIA. — β. GALLIA: Luchon; Savoie, Conflans; GERMANIA: Silesia, Bavaria. — γ. GERMANIA: Alsacia, Weissenburg, la Reissbach (Müller), Bavaria; GALLIA: Tarn, Laca-barède. — δ. GERMANIA: Alsacia, la Reissbach (Müller); Silesia, Münsterberg (Kinscher); GALLIA: Meurthe et Moselle, Pont-à-Mousson (Salle). — ε. GERMANIA: Alsacia Weissenburg, derrière le Pigeonnier, la Reissbach (Müller). — ζ. GERMANIA: Alsacia, Bavaria; BELGIA: STYRIA. — η. GALLIA: Pyrénées, Fréchet-Aure; HUNGARIA: Bakabanya. — θ. GALLIA: forêt de Retz, laie de Cuvergnon (Lefèvre); GERMANIA: Bavaria, Tettenhausen (Progel).

HYBRIDÆ

R. SERPENS × *BIFRONS*; *R. SUBRACEMOSUS* Sabrs. in hb. Sud.; *R. denticulatus* × *subrectus*? ej. — Differt a *R. serpentis*: turionibus angulatis, glabris, validis, foliis discoloribus, glandulis brevibus, sepalis reflexis. Sterilis.

AUSTRIA: Styria, Soechau (Sabransky); BAVARIA: Velburg (Prechtelsbauer).

R. SERPENS × *TOMENTOSUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 456; *R. BARTHIANUS* Borb.; *R. sericofrons* Kupcok *Adat. Bak. Rub.* p. 27 (1907); *R. scalaris*, *R. dumetorum* × *tomentosus* ej. — *Turio* *R. serpentis* Wh.; folia discolora, supra tomentella; glandulae breves. Sterilis.

TRANSILVANIA: Chodorman (Barth); HUNGARIA: Bakabanya, Lajtna (Kupcok); GERMANIA: Rheinpalfz (Honig).

R. SERPENS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. ap. Gdg. l. c. 456; *R. KUPCOKIANUS* Borbas (*sensu amplio*) ap. Kupcok *Adat. Bak. Rub.* in *Mag. Bot. Lap.* (1907) 255, n° 61; *R. strictivus* = *candidans* × *serpens*; *R. lobatus* ej. l. c. n° 67, *R. pulchrifrons* Kupcok l. c. n° 54, *R. congestus* ej. l. c. n° 21, non B. et Malb., *R. questus* ej. in hh. Sud.; *R. mesopolitus* Kupe. (*R. Guentheri* × *tomentosus*) et *R. lasiophyllus* ej. (*R. carpaticus* × *tomentosus* var. *cineratus* ej.). *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 203; *R. hungaricus* (Hol.?) Kupc. exsicc. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 626. — A praecedenti differt foliis supra glabris.

HUNGARIA: Bakabanya (S. Kupcok).

R. SERPENS × *INCANESCENS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1906) p. 47; *R. PESIANUS* Gremli p. p., in Burnat *Fl. Alp. mar.* III (1899); *R. vagus* Focke ap. Asch. et Gr., ex pte. — *Turio* glaber, paulum angulosus; folia discolora, rachis parum armata, pilosa glandulis brevibus munita; stamina stylos parum superantia; germina tomentosa. Sterilis.

ITALIA: Liguria, val-Pesio (Gremli).

R. SERPENS × *VESTITUS*; *R. LASIOGAULON* Boul. *Assoc. rub.* n° 382 (1880), pr. sp.; *R. vestitus* × *serpens* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 127, ex pte. — Differt a *R. serpentis* Wh.: floribus roseis, aculeis validioribus, fructu male evoluto.

GALLIA: Vosges, Saint-Dié (N. Boulay).

R. SERPENS × *DENSIPILUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 55 (1909); *R. INDECORUS* Sud. l. c. — *Turio* subangulosus; inflorescentia elongata, hirsuta; stamina stylos aequantia; sterilis.

GALLIA: Tarn, Grandval, vallée du Dadou.

R. SERPENS × *RADULA* Sud.; *R. PRIMORDIALIS* Kupcok; *R. Guentheri* × *Radula* ej. in hb. Sud. — Flavo-virens; glandulae breves, aculei compressi, validi; sepala reflexa. Sterilis.

HUNGARIA: Bakabanya, Prielozok, prope Zingaros (S. Kupcok).

R. SERPENS × *MENKEI*; *R. INASPECTUS* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 277, (pr. sp.); N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 135 et exsicc. n° 119. — Aculei tenuis *R. serpentis* Wh., sed glandulae breviores, sepala reflexa. Folia 3-nata, argute serrulata.

GALLIA: Vosges, Gérardmer, à droite du lac et au-dessus (Müller, Boulay).

R. SERPENS × *TERETICAULIS*; *R. LENISPICEUS* P.-J. Müll. (pr. sp.) in *Boul. Ronc. vosg.* p. 32 et exsicc. n° 26 (1866). — Inflorescentia magna, glandulis brevibus obsita; rachis pilosa. Sterilis.

GALLIA: Vosges, Gérardmer, route de Saint-Dié, après le pont sur la Vologne (N. Boulay).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — Turio pilosus; inflorescentiae rachis vulgo piloso-hirsuta.

- A. — Inflorescentia brevis, folia parum superans, interdum subelongata sed tum floribus androdynamis.
- a. — Foliolum caulinum terminale \pm late ovatum vel breviter obovatum.
1. — Stamina stylos superantia.
 - a. — Foliolum caul. terminale basi latum, cordatum.
 - o — Folia minute serrata.....
 - oo — Folia grosse serrata.....
 - b. — Foliolum caul. terminale basi rotundatum; folia grosse vel mediocriter serrata.
 - o — Folia subitus \pm manifeste pubescentia; foliolum terminale emarginatum.....
 - oo — Folia subitus glabrescentia; foliolum terminale basi integrum, obovatum; turio laxe pilosus.....
 2. — Stamina stylis breviora vel eos via sequantia.
 - a. — Folia minute serrata, ampla; inflorescentia \pm densa.....
 - b. — Folia mediocriter vel grosse serrata; inflorescentia laxa, pauciflora.
 - o — Foliolum caul. terminale late cordato-ovatum.....
 - oo — Foliolum caul. terminale anguste ovatum vel obovatum.....
- b. — Foliolum caul. terminale angustum, obovatum, oblongum vel sub lanceolatum; stamina stylos superantia.
1. — Folia subitus pubescentia; glandulae pallidæ.....
 2. — Folia utrinque glabrescentia; glandulae leviter erubescentes.....
- B. — Inflorescentia elongata, folia superans; stamina stylis breviora.
- a. — Folia subitus leviter pubescentia.
1. — Foliolum caulinum terminale ovatum vel obovatum, latum.
 - a. — Turio pilosissimus; foliolum caul. terminale leviter obovatum.....
 - b. — Turio pilosissimus; foliolum caul. terminale late cordatum; rachis hirsutissima.....
 - c. — Turio glabrescens.....
 2. — Foliolum caul. terminale angustum, elongatum, acuminatum.
 - a. — Serratura tenuis; folia supra appresse pilosa.....
 - b. — Serratura grossa; folia supra glabrescentia.....
- b. — Folia subitus molliter pilosa, inaequilatera serrata.
1. — Foliolum caul. terminale \pm obovatum; glandulae leviter erubescentes.....
 2. — Foliolum caul. terminale ovatum vel suborbiculare; glandulae pallido-flavescentes.....

II. — Turio fere glaber; rachis parum pilosa vel non; inflorescentia brevis.

- A. — Stamina stylos superantia.
- a. — Foliolum caul. terminale ovatum, obovatum vel ellipticum, emarginatum.....
 - b. — Foliolum caul. terminale orbiculare.....
- B. — Stamina stylis breviora.
- a. — Folia minute et aequaliter serrata.
 1. — Foliolum caul. terminale ovatum vel breviter obovatum, emarginatum.....
 2. — Foliolum caul. terminale anguste oblongum, basi integrum.....
 - b. — Folia grosse et inaequaliter serrata

o — Turio pilosus.

b. — (T. CCI) — R. longisepalus P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 297; R. hylynomus β . longisepalus N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 113 (1900); R. minutiflorus Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 103, ex pte, non P.-J. Müll.; R. argutifolius var. lamprophyllus, R. latifrons var. pruinopus, R. letevirens var. perspicibilis Progel. l. c. p. 10! p. p., var. galbeus p. p. Progel Fl. Amts. Waldm. (1889) p. 11!

Exsicc. — Assoc. rub. n° 458.

Turio minus pilosus quam in R. serpenti Wh.; folia 3-nata, dentibus latis; foliolum caul. terminale (9) late ovatum, breviter acuminatum; inflorescentia laxa, pyramidalis, pedunculis patulis; sepala viridia, acuminata, emarginatum, breviter acuminatum; inflorescentia densa. Fertilis.

β . DENSIFOLIUS; R. densifolius Pierrat Assoc. rub. exsicc. n° 250 (1871); R. fuscus \times serpens N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 129, ex pte; R. tereticaulis var. bebaiblastus Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 219. — Turio dense appresse pilosus; foliolum terminale minus latum; inflorescentia densa. Fertilis.

γ . MINUTIFLORENS; R. minutiflorens Sud. Diagn. p. 50 (1906); R. minutiflorus Wirtg. l. c. ed. I n° 103, ed. 2 n° 44, p. p. non P.-J. Müll. — Turio glabrescens; folia supra pilosa; dentes acuti; inflorescentia pauciflora.

δ . LUTESCENS Sud. Rub. tarn. p. 55 (1909); R. lutescens N. Boul. Ronc. vosg. p. 103 (1868) et exsicc. n° 84; Sud. Ronc. bret. p. 21; R. argutifolius Progel, ex pte, non L. et M.; R. argutif. var. frondosus ej. ex pte; var. lamprophyllus, p. p. ej.; R. letevirens ej. p. p.; R. pectinatus var. mizonodon Kinscher Repert. sp. (1906) p. 211; R. pullus Kupcok (non Sud.) Adat. Bahab. Rub. (1907) p. 251 (pro R. Bayeri \times plusiacanthus Borbas); R. tereticaulis Focke in hb. Sud., non P.-J. Müll.: R. subcoactus Kupcok exsicc. (pr. R. sinuosus \times tereticaulis). — Turio dense pilosus; folia 3-5-nata, foliolis longe acuminatis; inflorescentia flexuosa, \pm foliosa.

ϵ . RUFIGLANDULOSUS; R. rufiglandulosus Sud. Diagn. p. 51 (1906). — Turio foliaque ut in typo: inflorescentia angusta, parum pilosa; calyx patulus vel subreflexus.

ζ . SCOTOPHILUS Sud. Bat. eur. p. 61 (1906) et exsicc. n° 193!; R. scotophilus (pro R. Gremlii \times hirtus) Halacsy in Verh. z.-b. G. Wien (1885) p. 667; Oest. bromb. p. 260; R. hirtoides Sabrs. exsicc., prius. — Turio parum pilosus, subangulatus; folia 3-5-nata, serratura inaequalissima; foliolum terminale angustum, sensim acuminatum; inflorescentia foliosa, elongata.

η . TEPHRODES; R. tephrodes Kupcok exsicc.; R. hirtus iodes \times nemorosus ej. — Folia caul. 5-nata, foliolis marginibus sese tegentibus; foliolum terminale cordato-ovatum, acuminatum, petiolulo proprio 5-6-plo longius. Cetera ut in var. δ .

GALLIA: Vosges, extrémité N.-O du lac de Gérardmer (Müller); Tarn, Saint-Martin, vallée du Candour; GERMANIA: Bavaria (Progel, Prov. rhénane, prope Winningen (Wirtgen). — β . GALLIA: Vosges, Rochesson, forêt de Battion (Pierrat); Saône-et-Loire, Roussillon-en-Prov. Morvan (Gillot); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); GERMANIA: Bavaria, Waging (Progel), Freyung; Silesia, Münsterberg (Kinscher). — γ . GERMANIA: Prov. rhénane, Winningen (Wirtgen); Silesia, Breslau (Baenitz), Bavaria (Progel). — δ . GALLIA: Vosges, Saint-Dié (Boulay); Tarn, las Planques; Finistère, Huelgoat; GERMANIA: Hannover (Focke); Silesia (Kinscher), Bavaria (Progel); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); MORAVIA. — ϵ . GALLIA: Vosges, Valois. — ζ . AUSTRIA: Styria, Söchau (Sabransky); Wien (Halacsy); GERMANIA: Silesia (Kinscher), Saxonia (Hofmann). — η . HUNGARIA: Bakabanya, Grunt (Kupcok).

R. serpens Wh.
R. LONGISEPALUS P.-J. M. b.

R. NAPOPHILOIDES Sud. B.

R. CORYLINUS P.-J. M. Bb.

P. FLACCIDIFOLIUS P.-J. M. C.

R. OBROSUS P.-J. Müll. Ob.
R. VEPALLIUS Sud. E.

R. ANGUSTIFRONS Sud. D.
R. ANALOGUS M. L. Db.

R. CHLOROSTACHYS P.-J. M. F.
R. MITIGATUS P.-J. M. Fe.
R. LEUCADENES P.-J. M. Fb.

R. ELONGATIFOLIUS B. et G. Fd.
R. HYLONOMUS L. M. Fc.

R. CRINITUS Sud. G.
R. PERSERICANS Sabrs. Gb.

R. LEPTADENES Sud. H.
R. HUMOROSUS P.-J. M. Hb.

R. LONGIGLANDULOSUS Sud. Hc.
R. FLEXIRAMUS Sud. Hd.
R. OREADES M. et W. I.

HYBRIDÆ

R. LONGISEPALUS var. $\zeta \times BIFRONS$; *R. PSEUDO-DENTICULATUS* Sabrs. in hb. Sud. — *Turio glabrescens*; glandulæ breves, sparsæ; folia discolora, sepala reflexa, stamina longa. Sterilis.

AUSTRIA: Styria, Sœchau (Sabransky).

R. LONGISEPALUS var. $\delta \times ADSCITUS$; *R. ARRONDEAUNUS* Sud. Ronc. bret. p. 21 (1904). — Virescens, aculei compressi, serratura grossa, flores rosei, calyx patulus vel reflexus.

GALLIA: Finistère, Locmaria, bois de Huelgoat.

B. — (T. CCII) — ***R. napophiloïdes*** Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. LI (1904), 25; Bat. eur. p. 32; *R. lætevirens* Progel in VIII Ber. Bot. Ver. Landsh. 85; Form. in O. B. Z. (1887) 128, p. p. !; *R. argutifolius* var. *lamprophyllus* p. p., var. *tomentellus* p. p. Progel Fl. Amts. Waldm. p. 11 (1889); *R. serpens* var. *subvelutinus* ej. ex pte; *R. serpens* var. *fallax* ej. p. p.; *R. najas* ej.; *R. hirtus* v. *multisetosus* ej. *prius*; *R. galbeus* Progel p. p.; *R. hirtus* f. *villosa* Schmid. Cat. p. 207, p. p.; *R. Bellardii* \times *inserratus* ej.; *R. chlorocladus* Sud. in hb. Bor. non Sabrs.; *R. flaccidifolius* Rogers Handb. p. 89, non P.-J. Müll.; *R. mitis* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903), 79 (72), non Gremli O. B. Z. (1871) p. 98; *R. Mikantii* var. *variifolius* Spribille Beit. Rub. Schl. (1904) p. 348; *R. Schubei* Spribille l. c. 347; *R. irroratus* Progel l. c. (1882), ex pte; *R. tritobatus* = *brachytrichus* \times *hirtus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 256; *R. corrugatus* Barber Fl. Oberl. III p. 138 (1911).

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 91, 627, 628; Baenitz Hb. eur. n° 9061 (s. n. *R. napophili*), 9957 (s. n. *R. hylonomi*), 10386 (s. n. *R. microdoni*); Set of Brit. Rub. n° 129.

Differt a *R. serpenti* Wh. foliis satis grosse et inæqualiter serratis, subtus pilis micantibus obsitis, sæpe \pm glaucescentibus; foliolo terminali (1) ovato, basi rotundato, minus dilatato, vix emarginato, satis abrupte acuminato. — *Turio pilosus*, pruinosus; folia 3-5-nata; inflorescentia brevis, densa, \pm pilosa; sepala in fructu erecta; stamina stylos superantia (2); germina vulgo glabra, interdum pilosa (*R. mitis* Schmid., *R. corrugatus* Barb., *R. Schubei* Sprib., *R. irroratus* Progel p. p., etc.)

β . *PULLATIFOLIUS*; *R. pullatifolius* Sud. Rub. Pyr. p. 169 (1901); *R. corrugatus* Barber Fl. Oberl. III p. 133 (1911), p. p. — Foliolum caul. terminale suborbiculare, acutum; inflorescentia densa, elongata; germina pilosa.

γ . *NAPOPHILUS*; *R. napophilus* P.-J. Müll. Vers. n° 157 (1859). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 162! — Turio leviter angulatus; aculei validiores; folia ampla; inflorescentia brevis, laxa, conica, pedunculis elongatis, valde patulis.

δ . *HIRSUTULUS*; *R. hirsutulus* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1904) p. 95 (182). — Folia ampla, caul. 5-nata; foliolum terminale suborbiculare vel obovato-orbiculare, vix emarginatum; germina pilosa.

ϵ . *SERICEUS*; *R. lætevirens* var. *sericeus* Progel. — Folia subtus molliter piloso-velutina, \pm cinerea; foliolum terminale latum, breviter acuminatum.

ζ . *NAJAS*; *R. najas* G. Braun exsicc.; *R. callitrichus* = *lipopogon* \times *serpens* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 259. — Turio laxe pilosus; folia subtus parce pilosa; foliolum terminale ellipticum vel late obovatum, basi subemarginatum; glandulæ \pm fuscæ; germina glabra; inflorescentia foliosa.

η . *OBRONTUNDATUS*; *R. hirtus* var. *platyodontus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 249. — Folia magna, mucronato-serrulata; foliolum caul. terminale obovato-orbiculare vel late obovatum, emarginatum, cuspidatum; germina glabra. Cetera ut in typo.

θ . *MULTISETUS*; *R. multisetus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 151 et exsicc. n° 180 (1869). — Serratura tenuissima; foliolum caul. terminale breviter obovatum, abrupte et longe cuspidatum; inflorescentia glandulæ \pm fuscæ; germina pilosa. Ad *R. nitricatum* L. M. vergens.

GALLIA: Marne, Sarthe, Maine-et-Loire, Seine-et-Oise, Orne, Valois, Auvergne, Tarn, Pyrénées, Drôme, etc.; BRITANNIA: Woburn Sands, Bucks (E. F. Linton); GERMANIA: Alsacia, Badenia, Bavaria, Silesia; HELVETIA; STYRIA; BELGIA: Bouillon, la Hulpe. — β . GALLIA: Hautes-Pyrénées, Arreau, bois de Bédat; Corrèze, Bort. — γ . GERMANIA: Alsacia, la Buchbach, base du Gutenberg (Müller). — δ . GALLIA: Haute-Savoie, M. de Boisy (Schmidely). — ϵ . GALLIA: Tarn, Lacaune; Orne, Mage; GERMANIA: Silesia, Mückenberg (Kinscher); Bavaria: Waldmünchen (Progel). — ζ . GERMANIA OCCID.: Okerthal (Braun); Saxonia, Waldheim (Kinscher); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok). — η . HUNGARIA: Bakabanya, Kopanka (Kupcok); GERMANIA: Silesia, Mittelwalde (Kinscher). — θ . GALLIA: Vosges, Saint-Dié, forêt du Cambert (N. Boulay).

HYBRIDÆ

R. NAPOPHILOIDES \times *ULMIFOLIUS* Sud. Rub. tarn. p. 55 (1909); *R. MALACOXYLON* Sud. l. c. — Gracilis; turio pilosus; aculei compressi; folia leviter discolora; flores rosei, steriles.

GALLIA: Tarn, St-Martin-Laguépie, Sauveterre, Labastide-Rouairoux.

R. NAPOPHILOIDES \times *CALIGINOSUS*; *R. SEMICALIGINOSUS* Sud. — Habitus *R. napophiloïdis* sed glandulis brevioribus, turionibus fere glabris, sepalis laxe reflexis, floribus sterilibus dignoscitur.

GALLIA: Puy-de-Dôme, St-Rémy-s-Durolle, à la Monnerie (Chassagne).

b. — *R. corylinus* P.-J. Müll. in Flora p. 169 n° 41; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 121; *R. humifusus* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 605, ex pte.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 629!

Turio parum pilosus, leviter angulosus, aculeis compressis; folia pleraque 5-nata, grosse et inæqualiter serrata, subtus sparsim pilosa; foliolum terminale amplum, breviter obovatum vel obovato-orbiculare, basi integrum vel vix emarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia brevis, diffusa, piloso-hirsuta, glandulis relative brevibus obsita; pedunculi elongati, patuli; stamina stylos pallidos parum superantia. — Aculei compressi *R. Schleicheri* Wh. revocant, inflorescentia *R. serpentem* Wh.

β . *CORYLINIFORMIS*; *R. perspicibilis* Progel, pr. min. p. — Folia 3-nata, simpliciter serrata; foliolum terminale tenuiter et longe cuspidatum; pedunculi \pm ascendentes, glandulæ breves.

γ . *RECLINATISPINUS*. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 630! — Aculei caul. compressi, reclinati; folia 3-5-nata, grosse et inæqualiter dentata; foliolum terminale obovatum vel late obovato-rhombeum; inflorescentia pauciflora, breviter pilosa glandulosaque, parum armata.

GERMANIA: Alsacia, Alssbach, Reissbach, Lauterbach (Müller). — β . GALLIA: Saône-et-Loire, Autun, à la Creuse d'Auxy (Gillot); Bavaria, Pichlbachthal (Progel), Rabenshof, Traunstein (Kaufmann). — γ . GALLIA: Vosges, Gerbamont (Pierrat).

C. — (T. CCII) — **R. flaccidifolius** P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 300 ; N. Boul. Ronc. vosg. p. 103 et ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 114 ; **R. viridis** C flaccidifolius Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 609, selt. ex pte.

Exsicc. — Ronc. vosg. n° 83 ! ; Assoc. rub. n° 344 ; Baenitz Hb. eur. n° 9984 ; Sud. Bat. eur. n° 631.

Turio dense pilosus, aculeis brevibus, sparsis, debilibus munitus ; **folia** 3-5-nata, amplissima, utrinque parce pilosa, supra convexa, mucronato-serrata ; **foliolum** terminale (3) ovatum, basi rotundatum, leviter emarginatum, breviter acuminatum et petiolatum ; **inflorescentia** brevis, densa, foliosa, rachide piloso-hirsuta, subinermi ; **sepala** acuminata, patula ; **petala** parva ; **stamina** stylos virescentes vix æquantia (4) ; **germina** apice pilosa.

θ. EURYPHYLLUS ; **R. euryphyllus** P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 295. — Serratura acutior ; foliolum caul. terminale latum, suborbiculare, cordatum, cuspidatum ; rachis dense piloso-glandulosa ; stamna stylis breviora ; germina glabra.

γ. MEMBRANACEUS Sud. ; **R. peltifolius** Sabrs. exsicc., non Prog. ; **R. chlorostachys** Zinsmeist. exsicc. non P.-J. Müll. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 632. — Gracilior ; turio laxe pilosus ; folia membranacea, parva ; rachis parum pilosa ; inflorescentia laxior, germina vulgo pilosa.

δ. CLINOBOTRYS ; **R. clinobotrys** P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 75 (1867) et exsicc. n° 56, 56 bis. — Folia typi sed supra pilosiora quam subtus, mucronato-dentata ; inflorescentia angusta, arcuata, pauciflora ; stamna brevia, germina pilosa ; glandulæ ± erubescentes.

ε. DEFLEXISPINUS ; **R. deflexispinus** Sud. Diagn. p. 48 (1906). — Folia caul. 3-5-nata, æqualiter mucronato-serrulata ; foliolum terminale suborbiculare, acutum vel breviter acuminatum ; inflorescentia arcuata, folia superans, rachide parum pilosa ; stamna stylis breviora ; germina pilosa. Variat antheris pilosis (**R. tereticaulis** v. **lasianthus** Progel ; **R. gracilescens** f. **lasiantha** ej.).

ζ. GYMNOSTYLUS ; **R. gymnostylus** P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 306 — Folia 3-nata, inæqualiter serrata ; inflorescentia interrupta, ramulis densis ; stamna stylis roseis breviora.

η. INFLEXATUS ; **R. inflexatus** P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg p. 78 (1867) et exsicc. n° 58 (pr. max. pte). — Turio minus pilosus quam in var. præcedentibus ; folia 3-5-nata ; foliolum terminale late ovatum, cordatum ; dentes breves, inæquals ; inflorescentia flexuosa, arcuata ; stamna stylis pallidos æquantia.

θ. CAPITATUS ; **R. capitatus** Müll. et Pierrat Assoc. rub. n° 576 (1883) ; **R. fuscus** × **serpens** N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 129, p. p. — Folia minus ampla, subtus pilosiora quam in var. præcedentibus ; serratura leviter inæqualis ; inflorescentia contracta, angustissima, pauciflora, erecta.

ι. SABOIENSIS ; **R. saboiensis** Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903), 80 (73). — Turio subangulatus ; folia ampla, grosse et simpliciter serrata ; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, acutum ; inflorescentia densa, hirsuta, glandulæ brevibus, subfuscis obsita ; stamna stylis breviora ; germina pilosa.

κ. CORDATUS ; **R. cordatus** var. **inconcinus** Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903) (72) 79, p. p. ; **R. mitis** Gremli O. B. Z. (1871) p. 98, sec. Focke in hb. Progel ; **R. gracilis** × **peltifolius** Progel ; **R. erythroxanthus** var. **immerens** Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 264. — Folia subtus ± glaucescentia ; foliolum caul. terminale suborbiculare, basi cordatum, cuspidatum ; rachis breviter et laxe pilosa, germina glabra.

λ. KINSCHERI ; **R. Kinschieri** Spribille Allg. Bot. Zeit. (1906) n° 7/8. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 633 ! — Aculei caul. validi ; serratura inæqualis ; folia magna, 5-nata ; foliolum caul. terminale cordato-ovatum, longe acuminatum ; germina pilosa. **R. obroso** P.-J. Müll. affinis.

GALLIA : **Vosges**, Gérardmer (Müller), Gerbepal (Boulay) ; GERMANIA : Alsacia, la Reissbach, prope Weissenburg (Müller) ; SAXONIA : Badenia (Goetz) ; AUSTRIA : Styria, Seehau (Sabransky) ; BELGIA. — β. GALLIA : **Vosges**, Gérardmer (Müller). — γ. BAVARIA : Traunstein, Neuburg, Eissenstein ; SILESIA ; STYRIA : Seehau (Sabransky). — δ. GALLIA : **Vosges**, Gerbamont. à Lotnère (Pierrat) ; STYRIA : Sœchau (Sabransky) ; BAVARIA. — ε. GALLIA : **Vosges** ; BAVARIA, Rieselwald (Progel). — ζ. GALLIA : **Vosges**, Gérardmer, vallée de la Vologne, route de Saint-Dié (Müller). — η. GALLIA : **Vosges**, Rochesson, à Plainfaing (Pierrat) ; Pyrénées, mont Cagire ; HELVETIA ; GERMANIA : Silesia. — θ. GALLIA : **Vosges**, Cornimont, Gerbamont (Pierrat), Rehampal (Biau). — ι. GALLIA : Haute-Savoie, Césarze, prope Aizeray, les Brasses (Schmidely). — ς. GALLIA : Haute-Savoie, Mts Voirons (Schmidely) ; Isère, Gde Chartreuse (Gillot) ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok) ; GERMANIA : BAVARIA, Waldmünchen (Progel) ; HELVETIA : Schaffhouse (Gremli). — λ. GERMANIA : Silesia Moschwitz, Münsterberg (Kinscher).

HYBRIDA

R. FLACCIDIFOLIUS × FUSCUS ; **R. BIAU** Sud. — Turio angulatus, aculeis compressis ; folia 5-nata, foliolis terminalibus cordato-ovatis ; inflorescentia glandulæ longis, aculeis validis munita ; stamna brevia.

GALLIA : **Vosges**, Celles-s.-Plaine (Dr Biau).

β. — **R. obrosus** P.-J. Müll. Vers. n° 174 (1859) ; **R. polyacanthus** (Grl.) var. **micropetalus** Progel ; **R. hypomalacus** × **Bayeri** Progel.

Differt a **R. flaccidifolius** P.-J. Müll. ; **foliis** tenuioribus, inæqualiter serratis ; **foliolis** terminali late ovato, basi latiore, cordato, acuminato ; inflorescentia laxiore, pedunculis elongatis. **Rachis** pilosa ; **stamna** stylis roseis breviora ; **germina** glabra.

β. COMMISCIBILIS ; **R. commiscibilis** P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 301 ; **R. altisepalus** Kinscher Repert. VII (1909), 82 ; **R. hercynius** var. **aristatus** Progel ; **R. stilbophyllus** ej. p. p. — Glandulæ longiores, leviter erubescentes ; pedunculi patuli ; styli virentes.

γ. CUSPIDIGER ; **R. cuspidiger** Sud. Diagn. p. 52 (1906). — Foliolum terminale basi rotundatum, vix emarginatum, abrupte et longe acuminatum.

δ. BREVISTAMINEUS ; **R. brevistamineus** N. Boul. Ronc. vosg. p. 149 (1869) et exsicc. n° 136 ; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 116 ; **R. hercynicus** var. **fallax** Progel Fl. Amst. Waldm. (1889) 10. — Dentes acutissimi ; foliolum caul. terminale ovatum, longe acuminatum ; inflorescentia pauciflora, apice aphylla, pedunculis leviter ascendentibus ; styli virentes ; germina pilosa.

ε. CURTISTAMINEUS ; **R. curtistamineus** Sud. Rub. Pyr. p. 170 (1901) ; **R. entimverus** Kupcok = **candicans** × **pygmæus** ej. — Turio parce pilosus ; foliolum terminale suborbiculare, breviter acuminatum ; inflorescentia brevis, depauperata ; germina glabra.

ζ. BBEVICUSPIS Sud. Rub. tarn. p. 55 (1909). — Validus ; turio appresse pilosus, glandulæ brevibus ; folia obscure viridia, 3-5-nata ; foliolum caul. terminale orbiculare vel late ovatum, cordatum, acutum ; inflorescentiae glandulæ breves.

η. PERACUTUS ; **R. peracutus** Sud. Diagn. p. 52 (1906). — Foliolum caul. terminale anguste ovatum, sensim acuminatum ; serratura composita, acutissima ; rachis parum pilosa ; stamna stylis subæquantia ; germina glabra.

GERMANIA : Alsacia, Lauterbach prope Weissenburg ; Bavaria, Silesia ; BELGIA. — β . GALLIA : Vosges, Gérardmer (Müller) ; GERMANIA : Silesia, Hœlgenbusch (Kinscher) ; AUSTRIA : Styria, Soechau (Sabranisky). — γ . GERMANIA : Alsacia (Müller), Silesia, Bavaria. — δ . GALLIA : Vosges, Bambois-de-Planois (Pierrat), Raon-s.-Plaine (Biau) ; GERMANIA : Silesia, Bavaria. — ϵ . GALLIA : Hautes-Pyrénées, Fréchet-Aure, bois de Hèche ; GERMANIA : Silesia, Hirschenhäuser (Kinscher) ; Bavaria, Traunstein ; HUNGARIA : Bakabanya. — ζ . GALLIA : Tarn, le Sidobre, au pont de Luzières ; de Montirat à la Garde-Viaur. — η . GALLIA : Vosges ; BELGIA : Louette-St-ierre (Gravet).

D. — (T. CCII) — **R. angustifrons** Sud. Ronc. bret. p. 21 (1904) ; R elegans P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 256, non in Flora ; R. serpens Rogers Handb. Brit. Rub. p. 87, saltem ex pte ; R. serpens \times Bellardii N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 131, ex pte ; R. Bellardii N. Boul. l. c. ex pte ; R. serpens f. oblonga Kretzer ap. Baenitz Hb. eur. (1898) ; R. chlorocephalus Sud. in hb. Müller ; R. glandulosus var. fol. obovato-acum. Fischer-Ooster Rub. bern. p. 34 ; R. glandulosus v. umbrosus Godron ; R. pauciflorus Hal. Oest. bromb. p. 276 (1891) ? non Wallich ; R. glaucovirens var. bresiensis Spribille Verh. Bot. Ver. Prov. Brandg. (1900) p. 167 ; R. hirtus var. todes Kupcok exsicc. non N. Boul. ; R. latetivirens var. galbeus Progel, p. p. ; R. polytrichus ej. pr. p. ; R. budachensis = hirtus \times vestitus Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 270.

Exsicc. — Rub. gall. n° 92 (s. n. R. Bellardii), 183 ; Set of Brit. Rub. n° 74 ; Baenitz Hb. eur. n° 9571 ; Assoc. rub. n° 790 ; Sud. Rub. rar. n° 163.

Turio pilosus, \pm pruinosis ; folia 3-5 nata, argute serrata, supra parce pilosa, subtus pubescentia, viridia [interdum \pm cinerascentia (*R. sursumcanus* Borbas et Kupc.) ; *R. ampelopsis* Sabrs. et Borbas O. B. Z. (1912) p. 129] ; foliolum caul. terminale (7) anguste ellipticum vel elliptico-obovatum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum ; inflorescentia bevis, folia parum superans, rachide pilosa, pedunculis vulgo patulis ; sepala in fructu erecta ; petala angusta ; stamina alba virescentes superantia (8) ; pollen admixtum.

β . PALLIDISETUS ; *R. pallidisetus* Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 15 (1904) ; *R. divexiramus* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 86 non P.-J. Müll. ; *R. serpentiformis* = *apricus* \times *serpens* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 271. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 47. — Folia caul. 3-5-nata ; foliolum terminale obovatum, acuminatum ; serratura acuta ; glandulæ longissimæ, flavescentes ; pollen parum admixtum. *R. serpenti* var. δ . similis.

γ . SIEMIANICENSIS ; *R. siemianicensis* Spribille Zeit. Nat. Abt. (1902) p. 124 (44). — *Turio pilosissimus* sed parum glandulosus ; folia 5-nata, foliolis valde acuminatis ; inflorescentia glandulæ relative breves.

δ . CALLIGYNUS ; *R. calligynus* Sud. Rub. Pyr. p. 168 (1901). — *Turio epuruinosus* ; folia 5-nata ; foliolum terminale obovato-rhombeum ; inflorescentia magna, multiflora, pedunculis tenuibus ; stamina stylis rubros parum superantia.

ϵ . PEDEMONTANUS ; *R. pedemontanus* Pinkwart Deutsch. Bot. Monats. 16 (1898) et ap. Baenitz Hb. eur. n° 9550 (1897). — Folia 3-nata, ampla, grosse serrata ; inflorescentia brevis, laxa.

ζ . PUNGENS ; *R. pungens* Utsch ap. Baenitz l. c. n° 9562 (1898) ; *R. cercophyllus* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 622 (1902) ? — Aculei validiores quam in var. præcedentibus ; folia 3-nata, foliolis angustis ; foliolum caul. terminale anguste ellipticum, longe acuminatum ; inflorescentia brevis, laxa, aculeis sparsis, validis munita.

η . VOGESIACUS ; *R. vogesiacus* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 170 ; *R. lanceolatus* Waisbecker Flora Güns (1891) p. 61 ; *R. tereticaulis* var. *altimontanus* Spribille in hb. Sud. ; *R. epistios* Kupcok exsicc., *R. carpaticus* \times *tomentosus* ej. — Exsicc. : Baenitz Hb. eur. n° 8562. — Folia 5-nata, inæqualiter mucronato-serrata ; foliolum caul. terminale oblongum, subemarginatum, sensim acuminatum ; inflorescentia elongata, foliosia.

θ . GEROMENSIS ; *R. geromensis* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 185 ; *R. serpens* var. *geromensis* Focke Syn. p. 366 (1887) ; *R. serpens* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 621, ex pte ; *R. serpens* var. *botryoides* Barber Fl. Oberb. III p. 181 (1911). — Exsicc. : Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 104, ed. 2 n° 105. — A var. præcedentibus dignoscitur : serratura tenuissima ; foliis 3-5-natis, mucronato-serriculatis, foliolo terminali oblongo vel oblongo-obovato, leviter emarginato, acuminato. Pollen parum admixtum.

GALLIA : Tarn, Saône-et-Loire, Vosges, Valois ; HUNGARIA : Bakabanya ; GERMANIA : Hannover, Saxonia, Bavaria, Silesia ; BELGIA : BRITANNIA : Monmouthshire. — β . GERMANIA : Alsacia (Müller) ; BRITANNIA : Gloucestershire (Ley et Rogers) ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok). — γ . GERMANIA : Posen, Siemianicer (Spribille) ; SILESIA, Grochau (Kinscher). — δ . GALLIA : in Pyreneis central., Luchon, vallée du Lys ; THURINGIA : Steinach (Kincher). — ϵ . SILESIA, prope Goldberg (Pinkwart). — ζ . GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz). — η . GERMANIA : Alsacia, Alsbach, la Reissbach, prope Weissenburg (Müller) ; Silesia, (Spribille) ; HUNGARIA : Günz Waisbecker, Bakabanya (Kupcok) ; GALLIA : forêt de Villers-Cotterets (Questier) ; Tarn, Marssal. — θ . GERMANIA : Prov. rhénana, Montabaur Ehe, prope Ems ; Silesia, Iseregebirge (Barber) ; GALLIA : BELGIA : Vosges, Gérardmer (Müller) ; HELVETIA : Romont (Jaquet).

b. — *R. analogous* Müll. et Lef. Vers. n° 173 (1859) ; *R. Guentheri* Billot, non W. et N. ; *R. polyadenes* Boul. et Pierrat Assoc. rub. n° 123 (1874) ; *R. serpens* \times *Bellaridii* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 131, ex pte ; *R. serpens* Sbsp. effusus Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903), 79 (72), non *R. effusus* L. et M. (1859) ; *R. scaber* var. *entomus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 215.

Exsicc. — Billot Fl. Gall. et Germ. exsicc. n° 2057 ! 2257 ; Sud. Bat. eur. n° 634.

Differt a *R. angustifrons* foliis obscure viridis, utrinque glabrescentibus, inflorescentia erecta, breviter pilosa, staminibus stylis vix superantibus, sepalis diverse patulis. Folia caul. 3-nata ; foliolum terminale obovato-rhombeum, basi integrum, breviter acuminatum ; glandulæ suberubescentes.

β . HYLONOMOIDES ; *R. hylonomoides* Sud. Diagn. p. 51 (1906) ; *R. scabriformis* = *dasyacanthus* \times *scaber* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 262, non al. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 164 ! — Folia caul. 3-5-nata ; foliolum terminale leviter emarginatum ; inflorescentia laxior, elongata.

GALLIA : Valois, Buisson de Waligny (Questier), forêt de Retz (Lefèvre) ; Cher, Rhin-du-Bois ; Meurthe-et-Moselle, Pont-à-Mousson (Jordan) ; Haute-Savoie, Monts Voiron (Schmidely) ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok) ; GERMANIA : Silesia, Mückenberg (Kinscher). — β . Valois, Virlet, la Mentreille (Questier) ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok).

E. — (M. CCII) — **R. ve pallidus** Sud. Rub. Pyr. p. 175 (1901) ; *R. polyacanthus*, *graciliscescens* et *Bayeri* Progel, ex pte ; *R. laciniatus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 232 ; *R. transiens* ex pte et *laccosus* ej. ; *R. Guentheri* \times *heterophyllus* Utsch.

Exsicc. — Baenitz Hb. eur. n° 9546 (var.) ; Sud. Bat. eur. n° 635.

Gracilis et pallide viridis ; turio pilosus, glaucescens ; folia pleraque 3-nata, supra parce pilosa, subtus pubescentia, dentibus mediocribus, parum profundis ; foliolum terminale (5) ovatum, leviter obovatum vel subrhombium [s. var. *suhrhombeus* Kinsch. Repert. (1909), p. 81], \pm emarginatum, acuminatum ; inflorescentia parva, brevis, laxa, pauciflora, \pm nutans, folia vix superans, laxe pilosa ; calyx in fructu erectus ; petala parva ; stamina stylis breviora (6) ; germina glabra vel parce pilosa.

β . EPISTYLUS ; *R. epistylus* N. Boul. Ronc. vosg. p. 147 (1869) et exsicc. n° 133. — Foliolum caul. terminale ellipticum, basi integrum vel vix emarginatum ; serratura tenuis ; styli rosei ; germina glabra.

γ. BRACHYANDER ; *R. brachyandrus* Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 29 (1870) ; Focke *Syn. p. 365* ; *R. chlorostachys* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 623, ex pte.* — Foliolum caul. terminale ovato-rhombeum ; folia subtus glabrescentia ; rachis tomentosa, glandulis brevibus, aculeis sparsis munita ; stamina stylis virentibus breviora ; germina tomentosa.

δ. ROSTELLATUS ; *R. rostellatus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 79 (1867) et *exsicc.* n° 59. — Folia inaequaliter et acute serrata ; foliolum terminale ovato-rhombeum, satis abrupte acuminatum ; rachis pilosa, glandulis crebris, longis obsita ; stamina stylos virescentes aequalia ; germina glabrescentia.

ε. LEPTOSEPALUS ; *R. leptosepalus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 324. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9080 (s. n. *R. subinermis* non M. et L.). — Serratura tenuis ; foliola angusta, caul. terminale obovatum, integrum, abrupte acuminatum ; inflorescentia foliosa, interrupta ; sepala valde acuminata ; stamina brevissima ; germina glabra.

ζ. FLAVIFLORENS ; *R. flaviiflorens* Sud. *Rub. Pyr.* p. 171 (1901). — Pallide flavescens-viridis ; folia minute serrata, subtus pubescentia ; inflorescentia laxa, lata, folia superans, pedunculis elongatis, ascendentibus, 3-floris, glandulis longis praeditis ; styli virentes ; germina glabra.

GALLIA : Tarn, Vosges, Pyrénées ; HELVETIA : Fribourg, Zurich ; HUNGARIA : Rakabanya (Kupcok) ; AUSTRIA ; BELGIA ; GERMANIA. — β. GALLIA : Vosges, Gerbamont (Pierrat) ; GERMANIA : Silesia. — γ. HELVETIA : Schaffhouse (Gremli) ; GERMANIA : Silesia, Bavaria, Badenia. — δ. GALLIA : Vosges, Rochesson (Pierrat) ; GERMANIA : Bavaria (Progel). — ε. GERMANIA : Badenia, Fuchsloch. — ζ. GALLIA : Hautes-Pyrénées, Fréchet-Aure, bois de Hèche.

HYBRIDÆ

R. VEPALLIDUS × LASIOTHYRSUS ; *R. VEPALLIDIFORMIS*. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 163 ! — Differt a *R. vepallido* turione angulato, foliis subtus cinerascentibus, inflorescentiae glandulis brevioribus, sepalis laxe reflexis, floribus sterilibus.

GALLIA : Haute-Garonne, Aspet, via Sengouagnet.

R. VEPALLIDUS × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn.* p. 56 (1909) ; *R. NUDATUS* Sud. l. c. — Turio angulatus, aculei subæquales, folia subdiscolora, stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Grandval, vallée du Dadou.

R. VEPALLIDUS × FOLIOSUS flexuosus ; *R. SEMIVEPALLIDUS* Sud. ; *R. bifrons × flexuosus?* Schmid. *exsicc.* — Turio angulosus, aculei compressi, folia 3-nata, inflorescentia elongata, angusta, petala rosea, stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : Haute-Savoie, colline des Allinges (Schmidely).

R. VEPALLIDUS var. ζ × *SCHLEICHERI fissuraru*m ; *R. CORYMBULOSUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 172 (1901). — Differt a *R. vepallido* var. ζ aculeis leviter compressis, foliolis obovatis, staminibus longis. Sterilis.

GALLIA : Hautes-Pyrénées, Fréchet-Aure, bois de Hèche.

OBS. — On a appliqué le nom de *R. Bayeri* Focke [O. B. Z. XVIII p. 99 (1868), *Syn. p. 378*] à des plantes très diverses. La forme de Bavière, distribuée par A. Progel, et le n° 9995 de l'*Herb. eur.* de M. Baenitz, récolté en Silésie (*R. Mikaniif. serpens*) que M. Focke a déterminé *R. Bayeri*, appartiennent bien au *R. serpens* W.H. tel que je le comprends. Ces plantes ne diffèrent du *R. vepallidus* que par leurs feuilles 5-nées, à folioles terminales insensiblement et longuement acuminées, et leurs carpelles velus. M. Focke subordonne maintenant son *R. Bayeri* au *R. hirtus* W. et K. et lui attribue des glandes rougeâtres, ce qui n'est nullement le cas des exemplaires que je viens de citer.

F. — (T. CCII) — **R. chlorostachys** P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 303 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 20 et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 115 ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 623 (excl. syn.)* ; *R. brachypous* P.-J. Müll. *hb.*

Exsicc. — N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 17 ! ; *Assoc. rub.* n° 345 ; Sud. *Bat. eur.* n° 636.

Planta pallide viridis ; turio dense pilosus, subteres ; folia plerumque 3-nata, supra glabrescentia, subtus pilosa, minute serrata ; foliolum caul. terminale (9) ovatum, obovatum vel breviter ellipticum, leviter emarginatum, abrupte et breviter acuminatum ; ramus pilosus ; inflorescentia elongata, densa, ± arcuata, multiflora, folia longe superans, apice attenuata, rachide subrecta, breviter piloso-coactili ; pedicelli breves in pedunculis brevibus, patulis, multifloris (10) ; sepala in fructu erecta ; petala parva, erecta ; stamina alba stylis virescentibus breviora ; germina pubescentia.

β. CONVEXIFOLIUS ; *R. convexifolius* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 302 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 117. — Frons amplior ; foliola latiora, supra convexa ; pedunculi ± ascendentes.

γ. NEOSERPENS ; *R. neoserpens* Sud. *Diagn. p. 52* (1906). — Validus ; turio pruinosisimus ; folia 3-5-nata ; foliolum terminale latum, leviter obovatum ; inflorescentia laxior, pedunculis brevissimis e basi ramosis ; pedicelli longi ; germina pilosa.

δ. BREVIPES ; *R. brevipes* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 115 (1868) et *exsicc.* n° 97 ! ; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 116. — Foliolum caul. terminale cordato-ovatum ; inflorescentia subepilosa, angusta, elongata, ± erubescens quemadmodum tota planta ; germina glabra.

ε. GALBINIFOLIUS ; *R. galbinifolius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 85 (1900) ; *R. Bayeri* var. *luteolus* et *sericeus* Progel p. p. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* (an. 1893) s. n. *R. inermis* Hal. O. B. Z. (1892) n° 6, non Willd. — Turio pruinosisimus ; foliolum caul. terminale ovatum, emarginatum ; inflorescentia laxa, epilosa, pedunculis longis, patulis ; germina glabra.

ζ. GALBINIFRONS ; *R. galbinifrons* Sud. *Rub. Pyr.* p. 170 (1901). — Serratura tenuis, aequalis ; foliolum caul. terminale subobovatum ; inflorescentia brevis, laxa, pilosa ; germina glabra.

η. LEPTOPETALUS Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 624* (1902) ; *R. leptopetalus* Focke ap. Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 28 (1870) ; *R. aristipetalus* Müll. Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 520 (1882) ; *R. insidiosus* Progel *Ber. Bot. Ver. Landsh.* (1889) p. 15. — Foliolum caul. terminale angustum, rhombeum, acuminatum ; serratura acuta ; inflorescentia laxa, pedicellis ± divaricatis ; petala angusta, lanceolata.

GALLIA : Vosges, Gérardmer, Rochesson, etc. ; STYRIA : Söechau (Sabransky). — β. GALLIA : Vosges, Gérardmer, au Saut des Cuves (Müller). — γ. GALLIA : Vosges ; HELVETIA. — δ. GALLIA : Vosges, Basse-s.-le Rupt, Bambois-de-Planois (Pierrat) ; BAVARIA (Progel). — ε. GALLIA : Ariège, Orlu ; BAVARIA. — ζ. GALLIA : Pyrénées, Luchon ; Valois, forêt de Retz (Questier) ; GERMANIA : Silesia, Lewin (Barber). — η. GALLIA : Vosges, Vagney (Pierrat) ; HELVETIA, Schaffhouse (Gremli) ; BAVARIA : Rieselwald, Plattenberg (Progel), Freyung (Prechtelsbauer).

OBS. — M. Focke (ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 624*) rattache au *R. chlorostachys*, comme variétés, les *R. renifrons* Sabrs. O. B. Z. XLII (1892), 55, à foliole caul. terminale profondément cordée, et *populifolius* Sabrs. l. c. Je n'ai pas vu de spécimens de ces formes.

HYBRIDÆ

R. CHLOROSTACHYS × MACROPHYLLUS ? ; *R. MACROPHYLLOMORPHUS*. — Validus ; turio angulatus, glabrescens, parce glandulosus, aculeis validis ; folia ampla, 5-nata, inaequaliter serrata ; foliolum terminale obovatum vel ellipticum, infima aperte petiolulata ; inflorescentia grandis, dense pilosa, glandulis sparsis, aciculis debilibus munita ; petala alba vel roseola ; stamina stylos aequalia ; sepala patula. Sterilis.

STYRIA ORIENTALIS : Söechau, Kohlgraben (Sabransky s. n. *R. cunctator* F. ? in hb. Sud.)

R. CHLOROSTACHYS × VESTITUS ? ; *R. RENIFORMIS* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 442 (1881) ; *R. vestitus × serpens* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 127. — Foliolum caul. terminale orbiculare, aculei validi, inflorescentia laxa, stamina brevia.

GALLIA : Vosges, Basse-s.-Rupt, pré Bienschu, à Bambois (Pierrat).

R. CHLOROSTACHYS × PODOPHYLLUS holochlorus; *R. HOLOCHLOROPSIS* Sud. — Validus; turio subteres, glandulosus, pilosus, aculeis validis; folia tenuiter et simpliciter mucronato-serrulata, subitus molliter pubescentia, superiora ± cinerascentia; foliolum caul. terminale obovatum vel elliptico-obovatum; inflorescentia ampla, elongata, dense pilosa, glandulis crebris, pallidis, aciculis tenuibus; petala pallide rosea, stamina stylis superantia; sepala reflexa. Sterilis.

STYRIA ORIENTALIS : Soechau, Kohlgraben (H. Sabransky s. n. *R. cunctator* F. in hb. Sud.).

b. — (T. CCIII) — *R. leucadenes* P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 304; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 116.

Turio glabrescens, pruinosis; *folia* 3-5-nata, supra pilosa, acute et inaequaliter serrata; *foliolum* caul. terminale breviter obovatum vel obovato-orbiculare (1), cordatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* inferne foliosa, parce pilosa; *stamina* stylis pallidis breviora; *germina* tomentosa.

β. PYCNOTYLUS; *R. pycnostylus* P.-J. Müll. Bonpl. (1861) p. 293. — Foliola minus lata, longe acuminata, grosse serrata; rachis pilosa; stylis rosei; *germina* glabra.

γ. SEROTINUS; *R. serotinus* Boul. et Pierrat Assoc. rub. n° 342 (1879). — Foliola latiora, minute serrulata, cuspidata; stylis rosei; *germina* glabra.

GALLIA : Vosges, Gérardmer, route de Saint-Dié, en aval du pont (Müller). — β. GALLIA : Vosges, Gérardmer, cum typo; Morbihan, forêt de Couveau (Arrondeau). — γ. Vosges, Gerbamont (Pierrat).

c. — (T. CCIII) — *R. hyلونомus* Lef. et M. Vers. n° 161 (1859); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 113, ex pte.

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 166.

Validus; aculei subcompressi; *folia* caul. 5-nata, supra glabra, subtus glabrescentia, grosse et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (2) obovato-rhombeum, longe acuminatum, emarginatum; *inflorescentia* angusta, elongata, usque ad apicem foliosa, pedunculis subascendentibus; rachis laxe pilosa; *stamina* stylis virentibus breviora (3); *germina* glabra. *R. Schleicheri* Wh. similis.

GALLIA : Valois, forêt de Retz (Lefèvre), Virlet, à l'Espérance (Questier); Tarn, St-Amans, ruisseau de Peyralès; GERMANIA : Silesia, Münsterberg (Kinscher).

d. — (T. CCIII) — *R. elongatifolius* Boul. et Gillot Assoc. rub. n° 191 (1875); Boul. Rév. Rub. spect. et gland. p. 92; ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 117; *R. Guentheri* × *heterophyllus* Utsch. p. p.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 191; Rub. gall. n° 90, 184 (var.)

Diffr. a *R. chlorostachyo* P. J. Müll.; *foliis* mucronato-serrulatis, supra appresse pilosis, subtus manifeste pubescens-tibus; *foliolo* caul. terminali (4) augustiore, oblongo, emarginato, sensim acuminato; *ramis* flexuosis; *rachide* florifera multangula, inermi; *pedunculis* tenuioribus (6), longioribus; *petalis* (5) majoribus.

β. MOLLIS; *R. multiflorus* Sabrs. in hb. Sud. — Turio dense piloso-coactilis; folia mollia, flaccida; inflorescentiae glandulæ breviores; *germina* pilosa.

GALLIA : Saône-et-Loire, Haut-Folin (Gillot); BAVARIA : Bernau (H. Paul), Freyung, Traunstein. — β. STYRIA : Soechau (Sabransky)

e. — (T. CCIII) — *R. mitigatus* P.-J. Müll. in Boul. Ronc. vosg. p. 79 (1867); N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 116; *R. tereticaulis* Focke ap. et Gr. Syn. VI p. 569, ex pte.

Exsicc. — Ronc. vosg. n° 60; Assoc. rub. n° 255.

Diffr. a *R. chlorostachyo* P.-J. Müll.: *foliis* caul. plerumque 5-natis, utrinque appresse pilosis, minute et acute serriculatis; *foliolo* terminali (11) late cordato-ovato, abrupte acuminato; *inflorescentia* laxiore, leviter flexuosa, glandulæ brevioribus munita; *rachide* (12) dense et longe villosa, pilis glandulas superantibus; *pedunculis* patulo-ascendentibus, subinermibus. *Germina* glabra; *petala* anguste ovata (13).

β. MITIGATIFLORUS. — Serratura minus tenuis; foliolum terminale basi aperte cordatum, breviter cuspidatum; inflorescentia flexuosa, inferne foliosa, aciculis sparsis munita; *petala* bifida.

GALLIA : Vosges, Gerbamont, au Bambois-de-Faite (Boulay et Pierrat). — β. Sarthe, Traugé, bois de Pannetière (A. Henry).

G. — (T. CCIII) — **R. crinitus** Sud. Rub. Pyr. p. 169 (1901); Bat. eur. p. 14.

Exsicc. — Sud. Bat. eur. n° 43, 637.

Turio pruinosis, pilosus, pilis ± appressis; *folia* pleraque 3-nata, coriacea, supra appresse pilosa, subtus molliter piloso-velutina, ± cinerascentia, pilis ad nervos pectinatis, inaequaliter duplicito-serrata; *foliolum* terminale (7) ovatum vel plerumque obovatum, leviter emarginatum, satis abrupte acuminatum; *inflorescentia* elongata, ante anthesin nutans, dense piloso-hirsuta, glandulis subfuscis, aculeis tenuibus sparsis praedita; *sepala* hirsuta, in fructu erecta; *stamina* alba stylis breviora (8); *germina* glabra. A *R. hirta* W. K. glandulis leviter fuscis accedit.

GALLIA : Tarn, Cambon, Gijounet, la Bassine, Sales, Tanus; Hautes-Pyrénées, Tramezaïgues.

HYBRIDÆ

R. CRINITUS × *PERVAGUS*; *R. SEMICRINITUS* Sud. — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 167! — Validus et villosus; aculei subæquales, glandulæ sparsæ; folia caul. 5-nata; flores albi, staminibus brevibus. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Tanus, rive gauche du Viaur, au-dessous du viaduc.

R. CRINITUS × *VALLISPARSUS* Sud. Rub. tarn. p. 56 (1909); *R. PRÆFLORENS* Sud. l. c. — Diffr. a *R. crinito*: foliis minus pilosis, foliolis lationibus, glandulis brevioribus, floribus roseis.

GALLIA : Tarn, La Borie, prope Cambon.

b. — *R. persericans* Sabrs. in hb. Sud.

A *R. crinito* dignoscitur: turionibus pilosissimo-coactilibus, glandulis flavescentibus, foliis flaccidis, grosse serratis; foliolo caul. terminali ovato vel suborbiculari, inflorescentia apice attenuata, hirsuta.

β. SYMMETROS; *R. symmetros* Kupcok exsicc.; *R. Guentheri* × *vestitus* ej. — Folia minute serrata, subtus minus pilosa; rachis breviter pilosa; glandulæ ± fuscae.

AUSTRIA : Styria, Soechau (Sabransky). — β. HUNGARIA : Bakabanya, Grunt (Kupcok).

oo. — *Turio glaber*.

H. — (T. CCIII) — **R. leptadenes** Sud. ap. Gdg. Nov. Cons. p. 156 (1905); *R. echinatus* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 171, non Lindl.; *R. serpens* f. *latifolia* Utsch exsicc.; *R. serpens* var. *gabretanus*, ex pte, *serpens* v. *longepedunculatus*, ex pte, *serpens* var. *fallax*, ex pte, *serpens* var. *melanadenes* (Utsch) Progel, ex pte; *R. hirtus* f. *minor* Utsch; *R. trichoperus* Kinsch. Repert. (1909); *R. Bayeri* v. *acanthicus* (G. Beck ?) Kupcok Mag. Bot. Lap. (1907) p. 254.

Exsicc. — Sud. Rub. rar. n° 168!

Turio obsolete angulatus vel teres (9), \pm pruinosis, glaber, glandulosissimus; *folia* 3-5-nata, utrinque appresse pilosa, inæqualiter et acute serrata; *foliolum* caul. terminale (10) ovatum vel ellipticum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* pilosus, glandulis longis, crebris obsitus; *inflorescentia* oblonga, basi foliosa, densa, \pm arcuata, laxe pilosa, glandulis creberrimis, longissimis, inæqualibus prædicta (11); *pedunculi* breves, patulo-ascendentes, inermes, 2-3-flori; *sepala* in fructu erecta; *petala* angusta; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* vulgo glabra; *pollen* admixtum. Antheræ glabræ, raro pilosæ (*R. trichoperus* Kinscher).

$\beta.$ *CALLIPHYLLOIDES*; *R. calliphylloides* Sud. *Diagn.* p. 52 (1906); *R. viridis* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 85, non Kalt. — Exsicc.: *Set of Brit. Rub.* n° 23. — *Turio* epruinosis; *folia* 5-nata, grosse serrata; *foliolum* terminale ovato-rhombeum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* laxior.

$\gamma.$ *ELONGATICUSPIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 56 (1909); *R. calliphyllus* Gen. *Mon. p. p.*, non P.-J. Müll. — *Folia* 5-nata, grosse, inæqualiter et acute serrata; *foliolum* terminale abrupte et longe acuminatum; *inflorescentia* laxa, brevis.

$\delta.$ *ACUTISEPALUS*; *R. acutisepalus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 146 (1859). — *Folia* 3-nata, mucronato-serrata; *foliolum* caul. terminale obovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* laxa, foliosa, parce pilosa; *sepala* valde acuminata; *petala* magna, styli rosei, *germina* glabra.

$\epsilon.$ *LIVIDUS*; *R. lividus* G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 18; *R. serpens* var. *longepedunculatus* Prog. *Bot. Ver. Landsh.* (1889) 9; *R. tereticaulis* var. *iudicarum* Kupcok *Mug. Bot. Lap.* (1910) p. 218. — Exsicc.: *Soc. dauph. 2^e sér. n° 329*; Sud. *Bat. eur.* n° 638. — *Turio* pruinosis; *folia* plerumque 3-5-nata, glaucescentia, obscure viridia, subtus glabrescentia; *rachis* epilosa, aciculis sparsis munita.

$\zeta.$ *ERYTHROSTACHYOIDES*; *R. erythrostachys* Sud. *in hb.* Müller, non Sabrs. — *Folia* 3-nata, mucronato-serrata; *calyx* laxe reflexus; *stamina* rosea; *styli* flavescentes; *germina* glabra.

$\iota.$ *OBOVATUS* Sud. *Rub. tarn.* 56 (1909); *R. serpens* var. *obovatus* Sabrs. exsicc.; *R. latetivrens* var. *perspicibilis* Prog. *Bot. Ver. Landsh.* (1889) p. 10 p. p.; *R. serpens* var. *stenurus* Kinscher *Repert. VII* (1909) 82; *R. scaber* var. *curtidens* Kupcok *Mug. Bot. Lap.* (1910) p. 217; *R. katrekensis* ej. l. c. 267; *R. Koehleri* ej. exsicc. — *Folia* caul. 3-nata; *foliolum* terminale obovato-cuspidatum; *germina* glabra.

$\theta.$ *ERIOGYNUS*. — *Foliolum* terminale obovatum, acuminatum; *serratura* grossa; *germina* villosa-lanata.

$\iota.$ *ABETICOLUS*; *R. abeticolus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 176 (1901). — *Turio* pruinosis; *serratura* mediocris; *folia* 3-4-5-nata, *foliolis* terminalibus late ellipticis vel elliptico-obovatis, basi emarginatis, abrupte acuminatis; *inflorescentia* laxa, brevis, pedunculis gracilibus, patulis; *rachis* epilosa, flores parvi, *germina* glabra, pollen fere purum. Ad *R. Bellardii* Wh. vergens.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, Heiligenbach (Müller); *Silesia*, Münsterberg (Kinscher); *Bavaria* (Progel); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Questier); *Saine-Inférieure*, Turnale. — $\beta.$ GALLIA: *Valois* forêt de Retz (Questier); HUNGARIA: Presbourg (Sabransky), Borsod (Budai); BARTANNIA: *Surrey* (Murray); BELGIA: Verviers (du Pré). — $\gamma.$ GALIA: *Tarn*, Fabas, St-Paul-du-Dadoune; *Cher*, Alligny; BAVARIA: Walmünchen. — $\delta.$ GERMANIA: *Alsacia*, Carrefour de Lauterbach (Müller); *Saxonia* (Hofmann); *Silesia* (Kinscher). — $\epsilon.$ GERMANIA: *Saxonia*, *Silesia*, *Bavaria*, *Harz*, etc.; HUNGARIA; GALLIA: *Vosges*. — ζ et $\theta.$ GALLIA: Luchon. — $\iota.$ GERMANIA: *Saxonia*, *Bavaria*, *Silesia*; AUSTRIA: Presbourg (Sabransky); GALLIA: *Tarn*, *Pyrénées*, *Drome*. — $\iota.$ GALLIA: Luchon, Superbagneres.

HYBRIDÆ

R. LEPTADENES \times *SILVATICUS*?; *R. leptadenoides*. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 639! — Differt a *R. leptadeni* glandulis brevioribus, rachide dense villosa, staminibus longioribus, sepalis reflexis, floribus sterilibus, dilute roseis.

BELGIA: *Prov. de Namur*, Louette-St-Pierre, bois de hêtres (F. Gravet).

R. LEPTADENES var. $\pi.$ \times *FURVUS* var. Sud. *Rub. tarn.* p. 56 (1909); *R. membranaceus* Sud. l. c. — Differt a var. $\pi.$: *foliolis* latioribus, petalis roseis, staminibus rubris.

GALLIA: *Tarn*, Hautaniboul, au pas du Sant.

b. — *R. humorosus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 156 (1859).

Exsicc. — Sud. *Rub. rar.* n° 169!.

Turio glaber, pruinosis; *folia* caul. 3-5-nata; *foliolum* terminale suborbicularare, cordatum, abrupte et breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, laxa, \pm foliosa; *stamina* stylos pallidos superantia; *germina* glabra.

$\beta.$ *SETULOSUS*; *R. setulosus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 145 (1869) et exsicc. n° 131, non M. et Lef. — *Folia* mucronato-serrulata; *rachis* epilosa; *pedunculi* patuli.

GERMANIA: *Alsacia*, Lauterbach (Müller); GALLIA: *Valois*, forêt de Retz (Questier). — $\beta.$ GALLIA: *Vosges*, Saint-Dié, au Camberg (Boulay); GERMANIA: *Silesia*, Münsterberg (Kinscher).

c. — *R. longiglandulosus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 172 (1901); *R. serpens* var. *aciculatus* Progel *Ber. Bot. Ver. Landsh.* (1882), II, p. 95, exc pte; *R. serpens* var. *longepedunculatus* f. *petiliflorus* ej. l. c. (1889); *R. egeniflorus* Progel, l. c. (1889), *tir. à* p. p. 14; *R. serpens* var. *lencanus* Spribille *Zeit. Nat. Abt. Posen* (1902) p. 126 (46); *R. subcrenatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1904) 95 (132); *R. serpens* f. *planifolia* Utsch exsicc.; *R. peltasticus*, *hirtus* \times *scaber*, *scabroserpens* Kupcok.

Turio pruinosis, glaber; *folia* 3-5-nata, minute serrata; *foliolum* caul. terminale anguste ovatum vel leviter obovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, sparsim pilosa, pedunculis gracilibus, glandulis longis munita; *stamina* stylis breviora; *germina* glabra; *sepala* in fructu \pm erecta.

$\beta.$ *DECURTATUS*; *R. decurtatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 148 (1859). — *Folia* 3-nata, mucronato-serrulata; *foliolum* terminale obovato-suborbicularare, cuspidatum; *inflorescentia* densa, styli rosei.

$\gamma.$ *LUTEICAULIS*; *R. luteicaulis* Sud. *Bul. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 336. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9965 (*R. nemorensis* f. *serpens* Utsch). — Viridi-flavescens; *serratura* composita, acuta; *folia* 3-4-5-nata; *foliolum* terminale obovatum, acuminatum; *inflorescentia* elongata, angusta. Casu sterilis (*R. thaumasius* Kupcok = *Bayeri* \times *serpens* ej. in *hb.* Sud.).

$\delta.$ *ACUTIFOLIUS*; *R. acutifolius* P.-J. Müll. *Vers.* n° 149 (1859). — *Folia* 3-4-5-nata, minute serrulata; *foliolum* caul. terminale ovato-cordatum, longe acuminatum; *pedunculi* patentes; styli rosei.

$\epsilon.$ *SPINULICAULIS*; *R. spinulicaulis* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 305. — *Turio* spinosissimus; *folia* 3-5-nata, minute serrata; *foliolum* terminale amplum, obovato-orbiculare, cordatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* magna, foliosa, multiflora; styli virescentes; *germina* tomentosa.

$\zeta.$ *DENSIGLANDULOSUS*; *R. densiglandulosus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 171 (1901). — Pallide flavescenti-viridis; *folia* 3-5-nata, subtus glabrescentia, mucronato-serrulata; *foliolum* terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* angusta, interrupta; styli virentes; *germina* pilosa.

$\eta.$ *RACEMULOSUS*; *R. racemulosus* Schmid. (non Gandg.) var. *subconjunctus* in *Bull. Hb. Boiss.* (1903) p. 78 (71); *R. serpens* var. *glaucovillosus* \times *hirtus* Guentheri ej. — *Foliolum* caul. terminale cordato-orbiculare; *serratura* tenuis; *inflorescentia* parva, densa, arcuata, laxe pilosa; styli pallidi.

θ. STRICTELLUS ; *R. strictellus* Sabrs. in hb. Sud. [pro *R. serpens* (gr.) \times *thyrsoideus*]. — Folia inaequaliter et acute dentata, superiora subtus cinerascentia; foliolum terminale ovatum, cordatum, longe acuminatum; pedunculi ascendentes; germina glabra. Planta flavescenti-viridis.

ι. MOLLICOMUS ; *R. Vysokensis* var. *mollicomus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 260. — Gracilis; folia 3-nata, subtus \pm cinereo-pubescentia; flores parvi; germina pilosa. Cetera ut in typo.

GALLIA : Tarn, Anglés, Mazamet, Vabre, Tanus; Vosges, Pyrénées, Luchon; Haute-Savoie, M^e de Boisy; GERMANIA : Silesia, Bavaria; AUSTRIA : Moravia, Styria; HUNGARIA. — β. GERMANIA : Alsacia; Lauterbach (Müller); Badenia; GALLIA : Drôme, St' Agnan (Chatenier). — γ. GERMANIA : Badenia, Staufen; HUNGARIA. — δ. GERMANIA : Alsacia, Lauterbach (Müller); Silesia, Münsterberg (Kinscher). — ε. GALLIA : Vosges, Gérardmer, au Saut des Cuves (Müller). — ζ. GALLIA : Pyrénées, Luchon; GERMANIA : Silesia, Münsterberg (Kinscher); Bavaria. — η. GALLIA : Haute-Savoie, Monts Voiron (Schmidely); GERMANIA : Silesia, Hirschenhäusern (Kinscher). — θ. AUSTRIA : Styria, Soëchau (Sabransky). — ι. HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok).

HYBRIDÆ

R. LONGIGLANDULOSUS \times *DRYMOPHILUS* var. γ Sud. Rub. tñrn. p. 56 (1909); *R. TANUSENSIS* Sud. l. c. — Aculei subcompressi, serra-tura grossa, rachis hirsuta, stamina brevia. Parum fertilis.

GALLIA : Tarn, Tanus, bords du Viaur.

d. — *R. flexiramus* Sud. Rub. tñrn. p. 56 (1909).

Gracilis; *turio* glabrescens; *folia* 3-nata; *foliolum* terminale augustum, oblongum, basi integrum, acuminatum, breviter petiolatum; *ramus* multangulus; *inflorescentia* flexuosa, laxa, diffusa, pedunculis elongatis, patulis; *rachis* laxe pilosa; *stamina* stylis roseis breviora; *germina* glabra.

β. CANNABIFOLIUS; *R. cannabifolius* Sabrs. in hb. Sud. — Inflorescentia angusta, pedunculis ascendentibus.

GALLIA : Tarn, Lacaune, au Goure. — β. AUSTRIA : Styria, Soëchau (Sabransky).

I. — (T. CCIII) — *R. oreades* P.-J. Müll. et Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I n° 154 (1860); Focke Syn. VI p. 391; ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 632, non Gen. Mon.; *R. longisepalus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1907) p. 264, non P.-J. Müll.; *R. Bayeri* f. *bathyodontus* ej. l. c. (1910) p. 254; *R. excessus* = Guentheri \times tomentosus ej. in hb. Sud.

Exsicc. — Wirtg. l. c. n° 154; Baenitz Hb. eur. (an. 1882); G. Braun Hb. rub. germ. n° 200; Sud. Rub. rar. n° 170.

Turio teres, glaucescens, glaber ver pilis sparsis munitus; *folia* pleraque 3-nata, utrinque glabrescentia, grosse, acute et inaequaliter serrata; *foliolum* terminale (12) late cordato-ovatum, acuminatum, petiolulo proprio quadruplo longius; *stipulae* angustæ; aculei petiolares subrecti; *ramus* flexuosus, laxe pilosus, aculeis tenuibus, pallidis, reclinatis munitus; *inflorescentia* (13) brevis, foliosa, laxe pilosa, pedunculis \pm ascendentibus; *sepala* glandulosa, parce aciculata, appendiculata, in fructu erecta; *petala* (14) oblonga; *stamina* alba stylis breviora vel eos æquantia; *germina* glabra.

β. BREVISPICULATUS; *R. calyphyllus* Gen. p. p.; *R. heterophylloides* Sud. Rub. Hb. Bor. 81. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 640! — *Turio* parce pilosus; aculei crebri sed parvuli, reclinati; foliorum caulinorum serratura minus grossa; *foliolum* terminale basi rotundatum, leviter emarginatum; *inflorescentia* apice aphylla, pedunculis superioribus patulis; *styli* rosei. — Ad. *R. serpentem* var. *calliphylum* vergens.

γ. LAXIFLORUS; *R. laxiflorus* M. et Lef. Vers. n° 144 (1859). — Foliola minus lata, caul. terminale sensim et longe acuminatum; inflorescentia laxa, parum foliosa, pedunculis elongatis, ascendentibus; germina pilosa.

δ. INCLINANS Sud. Rub. tñrn. p. 56 (1909); *R. inclinans* Sud. Diag. p. 52 (1906). — Foliolum terminale obovatum, abrupte acuminatum; inflorescentia nutans, parum foliosa.

ε. MOLLIS; *R. serpens* var. *mollis* Utsch, exsicc. — Folia subtus molliter piloso-velutina; cetera ut in typo.

ζ. STENOPOUS Sud. et Sabrs.; *R. juglandifolius* Timb.-Lag. Bull. Soc. sc. phys. et nat. Tonl. (1875) p. 91 p. p. — Foliolum caul. terminale rhomboeo-obovatum, basi subintegrum; inflorescentia laxissima, pedicellis elongatis, patulis; *styli* virides; *germina* glabra.

GERMANIA : Guestphalia, Prov. rhenana. Badenia, Bavaria; BELGIA; HUNGARIA; AUSTRIA; GALLIA : Tarn, Pyrénées. — β. GALLIA : Marne, bois de Mersy (Levent). — γ. GALLIA : forêt de Retz (Lefèvre); BELGIA : Stoumont, Torgnon, Louette-Saint-Pierre; HUNGARIA. — δ. GALLIA : Tarn, la Bassine; HUNGARIA; GERMANIA : Alsacia. — ε. GERMANIA : Freudenberg (Utsch). — ζ. STYRIA : Soëchau, prope Spitzhart (Sabransky); GALLIA : Pyrénées, M^e Cajire (Timbal).

OBS. — La var. B. OREOCHARES Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 632 ne paraît pas différer sensiblement du type; la var. C. *frisicus* Focke l. c. appartient apparemment aux *R. tritiales* P.-J. Müll. Je n'ai pas vu de spécimens de ces deux formes.

109 — (T. CCIV) — *R. HIRTUS* W. et Kit. Pl. rar. Hung. II, 150 t. 114 (1805); W. et N. Rub. Germ. 95 t. XLIII; Focke Syn. Rub. germ. p. 371 et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 611; N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 121; Sud. Rub. Pyr. p. 27 et ap. Gandg. Nov. Consp. p. 157; *R. breviflorus* Gremli O. B. Z. (1871) p. 97?; *R. pulchellus* ej. l. c. p. 97?; *R. nigrescens* Form. O. B. Z. (1887), 207 sec. Halacsy; *R. dejectus* Kupcok exsicc.; *R. Guentheri* \times *bifrons*, *R. muttisetus* Progel, Bot. Ver. Landsh. (1882) 102; *R. roscidus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 234, ex pte; *R. incultus* \times *scaber* ej. l. c.; *R. hirtus* var. *microthamnus* ej. l. c. p. 248; *R. pravus* ej. l. c. 266, non Sud.

Exsicc. — Assoc. rub. n° 777; G. Braun Hb. rub. germ. n° 203.

Turio (1) teres vel obsolete angulosus, \pm pruinosis, dense pilosus, glandulis crebris, rubro vel violaceo-fuscis, aciculis et aculeis sparsis, tenuibus, rectis reclinatis intermixtis obsitus; *folia* 3-5-nata (2), obscure viridia, supra parce pilosa, subtus viridia, \pm pubescentia, raro cinerascentia (*R. plusioides* Kupcok, exsicc.; *R. bifrons* \times *tatiarensis* ej.), medio-criter vel minute mucronato-serrata; *foliolum* caul. terminale ovatum, emarginatum, acuminatum; *stipulae* lineares; *ramus* pilosus, glandulis crebris, purpureis, aciculis sparsis, reclinatis præditus; *folia* 3-nata, argute serrata, foliolis terminalibus ovatis, emarginatis, acutis vel breviter acuminatis; *inflorescentia* (3) mediocris, basi foliosa, ante anthesin \pm nutans, deinde erecta; *rachis* piloso-hirsuta, glandulis purpureis crebris, longis, aciculis sparsis obsita (4); *pedunculi* breves, patulo-ascendentes, multiflori; pedicelli breves; *sepala* (5) tomentoso-viridia, dense glanduloso-aciculata, in fructu erecta (6); *petala* (7) mediocria, obovata, alba; *stamina* alba stylis virescentes superantia; *germina* vulgo pilosa; *receptaculum* pilosum. Pollen leviter admixtum. — Julius-augustus.

β. PROPENDENS; *R. propendens* N. Boul. Ronc. vosg. p. 18 (1864) et exsicc. n° 16!; *R. pendulinus* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 121, ex pte; *R. argutifolius* v. *ciliatus* Progel Fl. Amts. Waldm. II (1889) p. p.; *R. hercynicus*. v. *parviflorus* Progel l. c. 10, ex pte. — Vulgo 3 foliola, caul. terminale late cordato-ovatum, satis abrupte acuminatum; dentes parum profundi, subinæquaes; rachis breviter pilosa; *styli* rubri; *germina* pilosa.

γ. *IODES* Sud. *Bat. eur.* p. 61 (1906) et *exsicc.* n° 194; *R. iodes* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 137 (1869) et *exsicc.* n° 121!; *R. pendulinus* N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 121, *ex pte*; *R. hirtus* E. *Kaltenbachii* IV *iodes* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 617. — Exsicc. : *Ronc. vosg.* n° 121; *Assoc. rub.* n° 290, 393, 517; *Bat. eur.* n° 194. — Folia 3-nata, mucronato-serrulata; foliolum terminale basi rotundatum, leviter emarginatum; inflorescentia densa, angusta, laxe pilosa; stamina stylos virentes vix superantia; germina glabra.

δ. *GYMNOCARPUS*; *R. gymnocarpus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 43, 294 (1873); *R. tiliifolius* Pierrat *in Boul. Ronc. vosg.* p. 141 (1869) et *exsicc.* n° 126, non alior.; *R. Guentheri* var. *setulosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 251. — Folia caul. plerumque 5-nata, minute mucronato-serrulata; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, breviter acuminatum; inflorescentia flexuosa, foliosa, laxa, parum pilosa, pedicellis tenuibus; stamina stylos virentes vix superantia; germina glabra.

ε. *ACRIDENTULUS*; *R. acridentulus* P.-J. Müll. *in Boul. Ronc. vosg.* p. 43 (1866) et *exsicc.* n° 33! — Billot *Fl. eas.* n° 3843. — Folia plerumque 3-nata, minute mucronato-serrulata; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, tenuiter acuminatum; inflorescentia obtusa, breviter pilosa, glandulis relative brevibus; stamina stylos roseos superantia; germina glabrescentia. Forma vergens in *R. tereticaule* P.-J. Müll.

ζ. *LANCEIPETALUS*; *R. lanceipetalus* P.-J. Müll. *Assoc. rub.* n° 445 (1881). — Exsicc. : Sud. *Hb. rub. rar.* n° 29! — Folia caul. 5-nata, mediocriter serrata; foliolum terminale obovato-orbiculare, leviter emarginatum, cuspidatum; inflorescentia laxa, brevis, pedunculis elongatis, subascendentibus; petala lanceolata, acuta; stamina stylos flavescens superantia; germina pilosissima.

η. *FLACCIDIFRONS*; *R. hirtus* var. *serviceus* Progel *Ber. Bot. Landsh.* VIII, *ex pte*; *R. malacophyllus* Sabrs. *exsicc.*; *R. insolatus* L. Richter *exsicc.*, p. p., non P.-J. Müll. — Folia 3-nata, flaccida, subtus molliter pilosa; foliolum terminale ovatum vel subobovatum, leviter emarginatum, longe acuminatum; inflorescentia magna, multiflora, foliosa; stamina stylos pallidos superantia; germina glabra vel pilosa [*R. concinnus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 255, non Focke]. — Variat stylis rubris, germinibus sparsis pilosis [*R. nigrescens* Focke *in G. Braun Hb. rub. germ.* n° 171; *Rub. sel. n° 82*], serratura inaequalis [*R. mucidus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 258], foliis supra parce aciculatis, dentibus ± glandulosis [*R. acanthodermis* Kupcok *l. c.* (1910) 255].

θ. *PERPETIOLULATUS* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), 78 (71). — Planta pallide flavescens-viridis; folia ampla, subaequaliter serrata, caul. 5-nata, subtus glabrescentia; foliolum terminale late ovatum, cordatum, acuminatum; inflorescentia magna, multiflora, parce pilosa, aciculis crebris sed tenuibus obsita; sepala patula; styli purpurei; germina glabra vel pilosa (*R. glaciatus* Kinscher *hb.*).

ι. *PSAMMOGENES* Kinscher *Repert.* (1909) p. 343. — Folia 5-nata, satis grosse et inaequaliter serrata, utrinque parce pilosa; foliolum terminale ovatum, cordatum, sensim et longe acuminatum; inflorescentia foliosa, breviter pilosa; styli carnei, germina ± pilosa.

In locis umbrosis regionum montosarum. — GERMANIA, AUSTRIA, RUSSIA, HELVETIA, BELGIA, GALLIA. — θ. GALLIA : *Vosges*, forêt de Saint-Gorgon (Boulay); GERMANIA : *Badenia*, *Bavaria*, Waldmünchen (Progel); HELVETIA. — γ. GALLIA : *Vosges*, Rochesson (Pierrat); HELVETIA; AUSTRIA. — δ. GALLIA : *Vosges*, Gerbamont (Pierrat); GERMANIA : *Silesia*, *Bavaria*; HUNGARIA. — ε. GALLIA : *Vosges*, Gerbamont (Pierrat); BELGIA : Huy; BAVARIA (Progel). — ζ. GALLIA : *Vosges*, Rambervillers, aux Aulnées (Boulay). — η. TRANSILVANIA : Budos (L. Richter); AUSTRIA; HUNGARIA; GERMANIA MERIDIONALIS. — θ. GALLIA : *Haut-Savoie*, Monts Voirons (Schmidely); GERMANIA : *Silesia*, prope Glatz (Kinscher). — ι. GERMANIA : *Silesia*, prope N.-uwalde (Kinscher); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok).

HYBRIDÆ

R. HIRTUS (gr.) × *OPERTUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 86 (1900); *R. FLEXIBILIS* Sud. *l. c.* — Aculei compressi, subaequales, glandulæ longæ, purpurascens, folia 3-5-nata, subtus viridia, sepala reflexa, flores albi, steriles.

GALLIA : in *Pyrenæis aurigeranis* : Aulus.

R. HIRTUS × *BIFRONS*; *R. ASPRATILIS* P.-J. Müll. *in Boul. Ronc. vosg.* p. 131 (1869) et *exsicc.* n° 415 (pr. sp.); *R. denticulatis* (Kerner) Focke *Syn.* 282 (1877), *ex pte*; Progel n° 228. — Turio angulosus, pilosus, glandulosus; aculei compressi, subaequales; folia subdiscolora, acute serrulata, foliolis latis; inflorescentia pyramidalis, glandulis rubris munita; sepala patula; stamina stylos vix æquantia. Fructus male evolutus.

GALLIA : *Vosges*, Saint-Michel (Boulay); BAVARIA (Progel).

OBS. — Le *R. LAXISSETUS* Kupcok, *R. bifrons* × *silesiacus* var. *tabanumontanus* ej., de Kiebes (Hongrie), a appare moment la même origine.

R. HIRTUS × *TOMENTOSUS* *Lloydianus*; *R. KODRUENS* Simk. *in Termesztraizi fiig.* XII p. 360 (1889); Sabrs. *O. B. Z.* (1891); *R. cancellatus* A. Kerner *in Hal. Oest. bromb.* p. 46 (1891); *R. reticulatus* A. Kerner (1871) non Wallich; *R. brigianorum* Greml. (1899); *R. vagus* var. Focke (1902). — Turio angulatus, glaber; folia discolora, grosse serreta, rachis hirsuta, dense glandulosa, sepala reflexa. Sterilis vel subfertilis [*R. paratropus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 213; *R. candicans* × *hirtus* ej.].

AUSTRIA, HUNGARIA, GALLIA, ITALIA.

OBS. — Les *R. Borbasiellus* Waisbecker *ap.* Baenitz *Hb. eur.* n° 8539 (1895) et *Sarkandi* Kupcok, *R. candicans* × *tereticaulis* ej. *exsicc.* (1909), semblent avoir la même origine. Peut-être en est-il de même du *R. trichothamnus* Dichl. *Deutsch. bot. Monatsch.* (1886), p. 131 d'Autriche?

R. HIRTUS (gr.) × *VESTITUS*; *R. DELPHINENSIS* Sud. — Differt a *R. hirta* W. et K. turione dense piloso, foliis coriaceis, subtus molliter piloso-cinereis, subtus appresso pilosis, glandulis brevioribus, petalis roseis. Sterilis.

GALLIA : *Isère*, Uriage, au-dessus de David (Gillot).

R. HIRTUS × *STYRIACUS* Sabrs. *in hb.* Sud.; *R. TROYERI* Hayek *Fl. Steierm.* I, 808 (1909); *R. carnegreanus* Sabrs. *exsicc.* — Turio angulatus, pilosus; folia grosse et inaequaliter serrata; rachis pilosa, glandulis purpureis; flores albi; sepala patula; fructus male evolutus.

AUSTRIA : *Styria orient.*, Tautendorf (Sabransky).

R. HIRTUS × *RADULA* *pallidiformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 86 (1900); *R. fœdus* Sud. *l. c.* — A *R. hirta* recedit: aculeis validioribus, foliis 5-natis, sepalis reflexis, floribus substerilibus. Habitus *R. Kähleri* Wh.

GALLIA : in *Pyrenæis aurigeranis*, Ascou, prope Ax.

R. HIRTUS × *PILOCARPUS*; *R. RUGOSULUS* Sabrs. *O. B. Z.* (1905). — Turio teres, pilosus; folia 3-nata, stamina brevia, germina glabra. AUSTRIA : *Styria*, Sœchau (Sabransky).

R. HIRTUS × *HYSTRIX* var. δ; *R. IMPERFECTUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 86 (1900). — Aculei crebri, validi; serratura tenuis; inflorescentia laxa, calyx reflexus, flores rosei, steriles.

GALLIA : in *Pyrenæis aurigeranis*, Aulus.

OBS. — Le n° 396 de l'*Assoc. rub.* (*R. horridulus*, non P.-J. Müll.) semble être un *R. HIRTUS* × *SCHEICHERI* (gr.); le *R. superfluous* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) 389, *R. hirtus* × *tereticaulis* ej. est un *R. ricularis* × *tereticaulis*.

OBS. — Le *R. diffusus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), 79 (72); *R. Bellardii* × *serpens glaucocillosus*? ej. *l. c.* est une forme peu fertile qui dérive du *R. hirtus* W. et K. par variation ou croisement: Folia caul. 3-nata, minute serrata; foliolum terminale ovatum, sensim acuminatum; inflorescentia subinermis, glandulis longis munita. — GALLIA : *Haute-Savoie*, M^{ts} Voirons (Schmidely).

Conspectus speciei, subspecierum et microgenerum

I. — *Turio distincte pilosus.*

A. — *Foliolum caulinum terminale latum, ovatum vel suborbiculare, basi vulgo emarginatum.*

a. — *Stamina stylos superantia.*

1. — *Inflorescentia inermis vel parum armata.*

- a. — Serratura tenuis vel mediocris ; foliolum terminale ovatum, emarginatum.....*
- b. — Serratura grossa ; foliolum caul. terminale breviter obovatum.....*
- c. — Serratura grossa, inaequalis ; foliolum caul. terminale orbiculare.....*

2. — *Inflorescentia aculeis crebris, validis armata.....*

b. — *Stamina stylis breviora vel raro eos æquantia.*

1. — *Inflorescentia rachis aculeis crebris armata.*

- a. — Foliolum caulinum terminale ovatum.....*
- b. — Foliolum caulinum terminale suborbiculare.....*

2. — *Inflorescentia rachis inermis vel parce aciculata.....*

B. — *Foliolum caulinum teuminale obovatum, ellipticum vel rhombeum.*

a. — *Stamina stylos superantia.*

1. — *Serratura tenuis vel mediocris ; sepala in fructu erecta.*

- a. — Foliolum caul. terminale anguste obovatum.....*
- b. — Foliolum caul. terminale breviter et late obovatum ; folia subtus glaucescentia.....*

2. — *Serratura grossa, inaequalis ; sepala in fructu reflexa.....*

b. — *Stamina stylis breviora ; serratura vulgo tenuis.*

1. — *Folia subtus glabrescentia vel parce pilosa.....*

2. — *Folia subtus molliter pilosa.....*

II. — *Turio glaber vel sparsim pilosus.*

A. — *Foliolum caul. terminale late ovatum vel orbiculare, basi cordatum, dilatatum.*

a. — *Stamina stylos superantia.*

1. — *Folia subtus appresse albo-tomentosa, minute mucronato-serrulata.....*

2. — *Folia subtus viridia, raro leviter cinerascentia.*

- a. — Pollen perfectum ; turio pruinosisimus, serratura tenuissima.....*
- b. — Pollen admixtum ; inflorescentia inermis vel parum armata.....*
- c. — Pollen admixtum ; inflorescentia aculeis crebris, validis armata (Cf. *R. hercynicus* G.).*

b. — *Stamina stylis breviora.*

1. — *Folia subtus viridia, glabrescentia.....*

2. — *Folia subtus molliter pilosa, cinereo-tomentosa.....*

B. — *Foliolum caul. terminale obovatum, ellipticum vel rhombeum.*

a. — *Stamina stylos superantia.*

1. — *Folia minute et squaliter serrulata.*

- a. — Foliolum terminale latum, breviter obovatum vel obovato-orbiculare.....*
- b. — Foliolum caul. terminale angustum, acuminatum.*

o — Rachis laxe pilosa vel non ; sepala erecta.....

oo — Rachis dense hirsuta ; sepala in fructu reflexa.....

2. — *Folia grosse et inaequaliter dentata.....*

b. — *Stamina stylis breviora.*

1. — *Folia minute et subæqualiter serrata ; foliolum caul. terminale latum.*

- a. — Folia subtus viridia, parce pilosa.....*
- b. — Folia subtus pubescentia, ± cinerascentia.....*

2. — *Folia grosse et inaequaliter dentata ; foliolum terminale sèpe angustum.*

- a. — Foliolum terminale rhombeum, basi integrum ; rachis armata.....*
- b. — Foliolum caul. terminale basi emarginatum.....*

R. hirtus W. K.
P. PIERRATII N. Boul. b.
R. COMPACTILIS Sud. c.
R. OFFENSUS P.-J. M. d.

R. GUENTHERI W. N. B.
R. CRASSUS Hol. Bb.
R. ANOPLOCLADUS Sud. Bc.

R. NIGRICATUS M. et L. C.
R. HERCYNICUS G. Br. var G.
R. POSONIENSIS Sabrs. D.

R. MINUTIDENTATUS Sud. Ch.
R. PECTINATUS S. et Gr. Ce.

R. CAUCASICUS Focke Cf. H.

R. GLAUCINELLUS Sud. E.
R. KALTENBACHII Metsch. F.
R. RUBIGINOSUS P.-J. M. Fb.

R. MINUTIFLORUS P.-J. M. Fc.
R. HYPODASYPHYLUS Sud. Fd

R. HERCYNICUS G. Br. G.

R. TENUIDENTATUS Sud. H.
R. RECONDITIFORMIS Sud. Hb.
R. TRACHYADENES Sud. He.

R. INTERRUPTUS Sud. Hd.
R. ELEGANTULUS Sud. Hc.

R. ANISACANTHOIDES Sud. Hf.
R. DECLIVIS Sud. Hg.

b. — *R. Pierratii* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 108 (1868) ; ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 122; *R. hirtus* var. *chamaemorifolius* Sabrs. exsicc.; *R. hirtus* var. *sericeus* Progel, ex pte.

Exsicc. — *Ronc. vosg.* n° 891; *Assoc. rub.* n° 119, 784, 856 (*forma*); *Rub. gall.* n° 45.

Differt a *R. hirta* W. K.: serratura profunda, grossa, composita; sepalis longe acuminatis. — *Turio pilosus*; *folia* 3-5-nata; *foliolum* terminale breviter obovatum, basi rotundatum vel vix emarginatum, longe acuminatum; *inflorescentia* arcuata, laxe pilosa, subinermis; *stamina* alba stylos roseos superantia; *germina* pilosa.

GALLIA: *Vosges*, Rochesson (Pierrat); *Manche*, Mortain (Henry); *Rhône*, Monsols (Gillot); *Tarn*, Saint-Cirgue; HUNGARIA, Pukanec (Kupcok); STYRIA, Sœchau (Sabransky); HELVETIA; BAVARIA.

HYBRIDA

R. HIRTUS Pierratii × *CONSOBRINUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 56 (1909); *R. NIGRANS* Sud. l. c. — *Folia* 3-nata, subtus viridia, glandulæ rubræ ut in *R. Pierratii*; sed aculei validi, subæquales. Steriles.

GALLIA: *Tarn*, Saint-Cirgue, au pont de Gignac.

c. — (T. CCIV) — *R. compactilis* Sud. hb.; *R. compactus* Utsch (*ex pte, non Benth.*) f. *concolor*, ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9033.

Exsicc.: Baenitz *Hb. dendr.* n° 237.

Turio pruinosis, pilosus; *folia* 3-5-nata (8), inaequaliter et acute serrata; *foliola* lata, marginibus sese tegentia, terminale orbiculari-cordatum, apice attenuato-deltoidium, breviter petiolatum, lateralia subsessilia; *inflorescentia* parva, densa, pauciflora, subinermis, glandulis relative brevibus obsita; *stamina* stylos rubros superantia; *germina* glabra; *pollen* fere purum.

GERMANIA: *Silesia*, Mensegebirge, prope Alt-Heide (Baenitz).

d. — (T. CCIV) — *R. offensus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 286; *R. pilocarpus* var. *Focke* in *hb.* Sud.; *R. Weiheanus* Focke ap. Greml. *Beitr.* p. 32 (1870); *R. luxuriosus* = *hirtus* var. *X bifrons* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 268.

A *R. hirta* W. K. distinguitur: aculeis validioribus, inflorescentia armatissima. *Turio* pilosus; *folia* caul. 3-5-nata, inaequaliter mucronato-serrata; *foliolum* terminale (9) late ovatum vel obovatum, basi rotundatum et leviter emarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* piloso-hirsuta, glanduloso-aciculata, aculeis crebris, validis (10) armata; *stamina* stylos virentes superantia; *germina* pilosa.

β. SPINULIFLORENS Sud. *Rub. tarn.* p. 56 (1909). — Aculei validi; folia minute serriculata; inflorescentia pyramidalis, sepala patula, styli virescentes, germina glabra.

γ. ATRICOLOR; *R. atricolor* Sud. *Rub. Pyr.* p. 23 (1899). — Planta obscure viridis; folia 5-nata, foliolum terminale late ovatum; rachis epilosa; stamina stylos basi roseos vix superantia, germina pilosa vel glabra [*R. afficitius* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 269].

δ. SPINULIFOLIUS; *R. spinulifolius* Gremli *O. B. Z.* XXI (1871) p. 127. — Exsicc.: Gremli *Hb. norm.* n° 164!; *Assoc. rub.* n° 780. — Folia 3-nata, grosse serrata; foliolum terminale ovatum vel ovato-rhombeum; folia ramealia superiora spinulis glanduliferis supra ± obsita; aculei validi; stamina stylos roseos parum superantia; germina pubescens vel glabra.

ε. GRACILESCENS Sud. *Rub. tarn.* p. 57 (1909); *R. pulchellus* Holuby, non Gremli. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9968 (s. n. *R. orbiculata*, non Müll.). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 641! — Gracilis; folia mucronato-serriculata; foliolum terminale late ovatum, cordatum; inflorescentia brevis, laxa, aphylla; germina glabra.

ζ. GUESTPHALICUS Sud. *Rub. Belg.* p. 225 (1910); *R. serpens* Wh. ex pte; *R. immitis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) 235 non Bor. — Folia grosse et inaequaliter serrata; foliolum terminale late ovatum, cordatum; inflorescentia laxa, aphylla, laxe pilosa, pedunculis patulis, elongatis; germina glabra.

η. FLAVULUS; *R. hirtus* var. *hebetatus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 249. — Folia flavescenti-viridia, pallida, subtus glaucescenti-cinerascentia; serratura grossa; foliolum caul. terminale late ovato-rhombeum; germina glabra; stamina stylos æquantia.

θ. SUBRUBGINOSUS Sud. *Rub. Bav.* p. 30 (1912). — Folia caul: 5-nata, subsimpliciter dentata; foliolum terminale ovatum, subemarginatum, acuminatum; inflorescentia brevis, epilosa, pedunculis mediis patulis; styli virescentes, germina glabra. *R. rubiginoso* Müll. similis sed turio pilosus.

ι. SUBCRASSUS. — Folia crassa, grosse serrata, subtus molliter pubescens; foliolum terminale orbiculare, cordatum, acutum vel breviter acuminatum; foliola ramorum latissima, marginibus sese tegentia, dentibus ± glandulosis; rachis et germina pilosa; inflorescentia densa.

GALLIA: *Vosges*, Longemer (Müller); *Pyrénées*; HELVETIA: Schaffhouse (Gremli), Bulli, etc...; GERMANIA: *Saxonia*, *Silesia*, *Bavaria*; AUSTRIA: *Styria*; HUNGARIA: Pukanec (Kupcok); BELGIA. — β. GALLIA: *Tarn*, Pont-de-Cirou; *Sarthe*, Loué; HELVETIA: Thurgau (R. Keller). — γ. GALLIA: *Hauts-Pyrénées*, Cauterets; *Loire*, Le Bessat (Charbonnel); GERMANIA: *Bavaria*, Freyung; HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok). — δ. HELVETIA: Schaffhouse, Wilchingen (Gremli); GERMANIA: *Prov. rhénana*, Saarbrücken (Winter); *Saxonia*, *Silesia*, *Bavaria*. — ε. GALLIA: *Tarn*, *Haute-Saône* (Madiot); GERMANIA: *Badenia*; HUNGARIA: Bakabanya. — ζ. GERMANIA: *Guestphalia* (Lejeune), *Bavaria*; HUNGARIA: GALLIA: *Tarn*. — η. HUNGARIA: Bakabanya, Sarkandistolna (Kupcok). — θ. GERMANIA: *Bavaria*, Neumark (Scherzer). — ι. GERMANIA: *Silesia*, Vudowa Pfarrberg (E. Barber); HELVETIA: Aargau (R. Keller).

D. — (T. CCV) — **R. Guentheri** Wh. in Bluff et Fingerh. *Comp. Fl. Germ.* I p. 679 (1825); Wh. et N. *Rub. Germ.* p. 65, tab. XXI; Wimm. et Grab. *Fl. Sil.* I, 2 p. 54; Focke *Syn.* p. 376; *R. hirtus* D. Guentheri Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 615 (1902), ex pte; *R. attenuata* Gremli *O. B. Z.* (1871) p. 96; *R. inclinabilis* ej. l. c. 124?; *R. erythrinellus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 341; *R. Mikani v. serpens* × *Guentheri* f. *viridis* *cuneata* Baenitz *Hb. eur.* (an. 1899); *R. Mikani v. vestitus* × *Schleicheri* f. *viridis* Baenitz l. c.; *R. transiens* = *hirtus* × *lipopogon* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 271, p. p.; *R. oligacanthus* ej. l. c. p. 222, p. p., non Stev.; *R. Kallenbachii* Barber *Fl. Oberb.* III p. 142.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 1887 (s. n. *R. gracilis*), 10368; *Assoc. rub.* n° 779.

Planta obscure viridis, glandulis atro-purpureis onusta. Turio laxe pilosus; folia pleraque 3-nata, satis grosse et inaequaliter dentata; foliolum caul. terminale (1) ovatum vel ovato-rhombeum, leviter emarginatum, acuminatum; inflorescentia interrupta, foliosa, flexuosa, parce pilosa vel non, aculeis crebris, mediocribus munita; sepala dense glanduloso-aciculata, in fructu erecta; petala parva, obovata, alba; stamina alba stylis vulgo rubris breviora (2); germina glabra vel puberula [Var. *rugulosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) 251].

β. ARACHNITES; *R. arachnites* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 298 (1878); *R. phyllomanes* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 343 (1879); *R. erythrostachys* Sabrs. p. p. — Turio dense pilosus; serratura profunda, inaequalissima, dentibus interdum glandulosis; foliola acuminata; inflorescentia valde foliosa, pilosa, aciculis crebris armata.

γ. LIVESCENS; *R. Bayeri* var. *livescens* Spribille in hb. Sud.; *R. dichromus* Prog. p. p. — Serratura tenuis, inaequalis; folia subtus glauco-cinerascentia, foliolis longe acuminatis; inflorescentia glandulis longis obsita.

δ. IODOSTACHYS; *R. iodostachys* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 291 (1878). — Aculei crebri; serratura tenuissima; foliolum caul. terminale late ovato-rhombeum, basi rotundatum; stamina brevissima; germina glabra. Planta atropurpurea.

ε. TENUIDENS; *R. tenuidens* Sud. *Diagn.* p. 53 (1906); *R. dichromus* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882), 106, pr. min. p.; *R. Guentheri* f. *glabrescens* Schmid.; *R. longipetiolulatus* ej. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) 79 (72), pr. min. p. !; *R. Bayeri* f. *hirtipes* (Borbas) Baenitz *Hb. eur.* n° 8588; *R. Mikani* (Köhler) var. *Guentheri* × *vestitus* f. min. dent. Baenitz l. c.; *R. flavescens* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 257, non Lef. et M. — Serratura tenuis; foliolum caul. terminale ovatum, rachis ± pilosa, styli basi ± rosei. Variat floribus parvulis (*R. Guentheri* var. *micranthus* Progel), antheris pilosis (*R. Guentheri* var. *lasianthus* Progel).

ζ. CALLICARPUS; *R. rivularis* var. *callicarpus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 253. — Turio parce pilosus; serratura grossa, inaequalis; inflorescentia flexuosa, foliosa, epilosa; styli basi purpurei, germina pilosa. Forma ad *R. minutiflorum* vergens.

η. LENGYELLII; *R. Lengyellii* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 235; *R. candicans* × *Guentheri* ej. l. c. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 642! — Folia ampla, subtus pallida vel subcinerascentia, grosse et inaequaliter dentata; rachis epilosa, mediocriter armata, styli ad basi rubentes, germina pilosa. Frons pallidus; fructus debilis.

θ. LONGIARISTATUS Sud. et Barber. — Turio pilosus; folia 5-nata, subtus parce pilosa, acute et subæqualiter serrata; foliolum terminale anguste ovatum, sensim et longe acuminatum; inflorescentia elongata, usque apicem foliosa, bracteis foliaceis longe acuminatis; rachis pilosa, mediocriter armata, glandulis relative brevibus; germina glabra.

GERMANIA, AUSTRIA, HELVETIA, GALLIA. — β. GALLIA: *Vosges*; HUNGARIA: AUSTRIA: *Moravia*, *Styria*; GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*. — γ. GERMANIA: *Silesia*, *Bavaria*; HUNGARIA: Bakabanya. — δ. GALLIA: *Vosges*; GERMANIA: *Bavaria*, Freyung. — ε. GALLIA: *Vosges*, *Tarn*; HELVETIA; GERMANIA: *Bavaria*, *Silesia*, *Badenia*; AUSTRIA: *Styria*; HUNGARIA. — ζ. HUNGARIA: Bakabanya, Tatiar (Kupcok); BAVARIA: Traunstein. — η. HUNGARIA: Bakabanya, Priozok (Kupcok); GERMANIA: *Silesia*, Lewin (Barber). — θ. GERMANIA: *Silesia*, Lewin (Barber).

HYBRIDÆ

R. GUENTHERI × *ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 179 (1901); *R. BIGENERIS* Sud. *l. c.* — *Turio pruinosus, angulosus; aculei validi, compresi, inaequales; folia discolora; rachis ± glandulosa; flores ± rosei, stamina brevia. Sterilis.*

GALLIA : *Tarn*, Saint-Amans; *Pyrenées*, Luchon.

R. GUENTHERI × *BIFRONS*; *R. ILLEGITIMUS* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) n° 8. — Differt a *R. Guentheri* Wh. glandulis brevioribus, foliis subdiscoloribus, sepalis patulis vel reflexis. Fructus male evolutus.

AUSTRIA : *Styria*, Sœchau (Sabransky).

OBS. — Le *R. SANGUINEUS* Kupcok *Ad. Bakab. Rub.* (1907) p. 23, non Friv., semble dériver du *R. Guentheri*, mais l'autre parent est douteux. — HUNGARIA, Hampnoch (Kupcok).

R. GUENTHERI × *INCANESCENS* Sud. *Rub. tarr.* p. 57 (1909); *R. GUENTHERIFORMIS* Sud. *l. c.* — *Turio angulosus, pruinosus, glaber; folia discolora, rachis hirsuta; flores albi, magni; stamina brevia. Sterilis.*

GALLIA : *Tarn*, inter Burlats et Salvages.

R. GUENTHERI × *TOMENTOSUS* (*Lloydianus*) Sud.; *R. RASOVSKIENSIS* Kupcok in hb. Sud. — Differt a *R. Guentheri* turionibus angulatis, subglabris, aculeis compressis, flavescensibus; foliis superioribus subtus ± cinerascentibus, floribus sterilibus.

HUNGARIA : Bakabanya, sub Rasovskie.

OBS. — Le *R. fuscidulus* Hal. *Verh. z.-b. Ges. Wien* (1885) 666; *Oest. bromb.* p. 252, est peut-être un *R. GUENTHERI* × *VESTITUS*? Je n'en ai pas vu de spécimens. — AUSTRIA : Ober-Tullnerbach (Halacsy).

R. GUENTHERI × *RADULA* Sud.; *R. CONSANGUINIS* Schmid. (*R. consanguineus* prius, non Sud.) *Bull. Hb. Boiss.* (1903) n° 1 p. (69) 76. — *Turio angulosus, folia 5-nata ut in R. Radula* Wh.; *cetera ut in R. Guentheri* Wh.

HELVETIA : *Valais*, Fuis-Hauts (Schmidely).

OBS. — Le n° 9951 de l'*Herb. eur.* de M. Baenitz a les apparences d'un *R. GUENTHERI* × *SCHLEICHERI* (gr.). — GERMANIA : *Badenia*, Siegelau (Goetz).

R. GUENTHERI × *BELLARDII*; *R. DEFLEXIDENS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 144 (1869) et *exsicc.* n° 125; *R. Bellardii* × *hirtus* N. Boul. *ap.* R. et C. Fl. Fr. VI p. 131. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 96. — Glandulæ *R. Guentheri* sed folia ut in *R. Bellardii*; stamina stylos æquantia. Parum fertilis.

GALLIA : *Vosges*, Rochesson (Pierrat).

R. GUENTHERI × *RIVULARIS* Sud.; *R. RIPENSIS* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 263; *R. apricus* × *rivularis* ej. in hb. Sud. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 643! — Foliorum figura, glandulæ ± purpureæ, stamina brevia ut in *R. Guentheri*; aculei crebri, flavescentes ut in *R. rivulari*. Fructus imperfectus.

HUNGARIA : *Hont*, Bakabanya, loco « Stupy » dicto in ripa rivuli (S. Kupcok).

R. GUENTHERI × *SERPENS*; *R. PILEOCARPUS* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 102 et *exsicc.* n° 82 (1868), *pr. sp.* — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 444. — *Turio pilosus, folia grosse serrata, inflorescentia angusta, stamina brevia, germina pilosa; fructificatio non tota.*

GALLIA : *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Camberg (Boulay).

OBS. — Les *R. serriger* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1901), 95 (102), à turion glabre, à feuilles velues-veloutées et grises en dessous, à inflorescence étroite, et *fuscescens* Schmid. *l. c.* (1903), 78 (71), à turion velu, inflorescence lâche, sont des formes stériles qui dérivent aussi du *R. Guentheri* Wh. et de quelques formes de *R. serpens* Wh. à déterminer sur place. — GALLIA : *Haute-Savoie*, Mt^e Voiron (Schmidely).

b. — (T. CCV) — *R. crassus* Holuby *O. B. Z.* (1873) p. 381; Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 621, non Kupcok *exsicc.*

*Turio pilosus; folia 3-5-nata, magna, argute serrata, subtus glabrescentia; foliola lata, marginibus sese tegentia, terminale (3) orbiculare, emarginatum, acuminatum, breviter petiolulatum; rachis aculeata, laxe pilosa (4); stamina stylis breviora; germina glabra. Variat floribus parvis [R. Guentheri] var. *micranthelus* Kupcok et Sabrs. *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 251.*

β. *PSEUDO-GUENTHERI*; *R. pseudo-Guentheri* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 581 (1883); *R. anisostylus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 295 (non n° 254); *R. impendens* R. Keller *Mitt. Nat. G. Wint.* (1906) 41; *R. peltæfolius* Progel *ex pte.* — Exsicc. : G. Braun n° 168. — Folia tenuia, argute serrulata; inflorescentia elongata, angusta, laxe pilosa; germina pilosa.

γ. *ANGULATUS*; *R. angulatus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 145 et *exsicc.* n° 138 (1869). — *Turio angulatus; folia ut in var. β; inflorescentia pilosa, styli rosei; germina pilosa.*

δ. *RICHTERIANUS*; *R. glandulosus* L. Richter *exsicc.* — *Serratura inaequalis; foliolum caul. terminale orbiculare, cordatum, acutum, longe petiolulatum; inflorescentia multiflora, magna, pilosa, foliosa; germina glabra.*

ε. *INTERMIXTUS*; *R. intermixtus* Sud. *Diagn.* p. 54 (1906). — *Serratura tenuissima, aequalis; folia utrinque pilosa; foliolum caul. terminale obovato-orbiculare vel orbiculare, basi emarginatum, cuspidatum; rachis tomentosa, breviter pilosa, glandulis brevibus; germina glabra. Forma vergens in R. tereticaulem.*

ζ. *PELTIFOLIUS* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 621 (1902); *R. peltæfolius* Progel *Ber. B. V. Landsh.* VIII (1882), 107, *p. p.*; *R. gracilis* v. *sericeus* ej. *p. p.* — *Turio pruinosus; folia 3-5-nata, subtiliter serrulata, subtus sericeo-pilosa, cinerascentia; inflorescentia densa, breviter pilosa, glandulis longis, rufis; styli virides, germina fere glabra.*

η. *ADENODON*; *R. erythrostachys* var. *adenodontus* Sabrs. *Z. b.-Ges.* (1904), 54; *R. amabilis* Kupcok, non Focke. — *Serratura mediocris, subæqualis; foliolum terminale late cordato-ovatum, acuminatum; folia ramealia dentibus glandulosis; inflorescentia laxa, glandulis purpureis longissimis onusta; germina vulgo glabra.*

θ. *GLANDULIFER*; *R. Guentheri* W. N. var. *glandulifer* Sud. *Rub. tarr.* p. 57 (1909). — *Turio angulatus; folia grosse et inaequaliter serrata; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, acuminatum, longe petiolulatum; inflorescentia laxa, brevis, tomentosa, epilosa, armatissima; petala magna; styli rubri; germina pilosa. Forma vergens in R. Kœhleri.*

ι. *ASPERIFOLIUS*. — *Turio dense pilosus; folia magna, grosse dentata, utrinque piloso-aspera; foliolum terminale orbiculari, cordatum, breviter acuminatum; inflorescentia breviter pilosa; petala ovata, styli rubri, germina glabra.*

HUNGARIA : Com. Trencin, N.-Podhrad (Holuby); Bakabanya (Kupcok); GERMANIA : *Bavaria* (Progel); CAUCASUS. — β. GALLIA : *Vosges*; *Tarn*; GERMANIA : *Bavaria*; HELVETIA. — γ. GALLIA : *Vosges*, Saint-Dié, forêt du Camberg (N. Boulay); Drôme, St-Jean-en-Royans (Chatenier). — δ. TRANSSYLVANIA : Budos (L. Richter); STYRIA : Sœchau (Sabransky); SILESIA : Lewin (Barber)! — ε. GALLIA : Basses-Pyrénées, Eaux Bonnes (de Lacroix); HELVETIA; BAVARIA : Traunstein (Kaufmann). — ζ. GERMANIA : *Bavaria*, Waldmünchen (Progel); *Silesia*; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok); GALLIA : Haute-Savoie, Le Gorin, propre Conflans (Perrier); Alpes-Maritimes, Entraque (Burnat); Pyrénées, Ardas; HELVETIA. — η. AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky); HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok); GERMANIA : *Silesia*, Saxonie. — θ. GALLIA : *Tarn*, Tanus; GERMANIA : *Bavaria*, Waging (Progel); *Badenia*, Herrenalb (Kaufmann); HUNGARIA : Borsod (Budai).

HYBRIDA

R. CRASSUS var. × *BIFRONS*? Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1912) p. 67; *R. CZORNEBOGENSIS* Barber *Fl. Oberl.* III p. 85 (1911) (*pr. spec.*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 800! — Differt a *R. crasso* turione angulato, aculeis compressis, foliis subtus cinerascentibus, floribus roseolisis, sterilibus vel ± fertilibus.

GERMANIA : *Saxonia*, Bautzen, Czornebog (Barber).

OBS. — Le *R. brevipes* Gremli O. B. Z. (1871) p. 96, non Boul., appartient probablement à ce groupe. Il n'a été que très imparfaitement caractérisé et m'est inconnu. Le *R. fonticola* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 234, non Sabrs.; *R. Bayeri* *vestitus* ej. n'est apparemment qu'une forme accidentellement stérile du *R. crassus*. N'a rien du *R. vestitus*! — *Hungaria*: Bakabanya.

c. — *R. anoplocladus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 337; *Diagn.* 54; *R. rubifactus* et *pseudo-pendulinus* P.-J. Müll. *hb.* *ined.*; *R. brevipetiolatus* Schmid. p. p.; *R. hercynicus* var. *parvisporus* Progel p. p.; *R. hirtus* f. *umbrosa* Utsch; *R. hirtus* var. *multisetosus* Projel p. p.; *R. pluridigitatus* Kinscher *Repert.* (1909) p. 82.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9979 (s. n. *R. rubiginosi*), 9501 (var.).

Turio pilosus, sparsim aculeatus; *folia* pleraque 3-nata, mediocriter, acute et inæqualiter serrata; *foliolum* terminale ovatum vel obovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* pubescens, aculeo tenuibus, raris munitus, foliis satis grosse dentatis; *inflorescentia* laxa, ± pilosa, subinermis; *stamina* stylis rubris breviora; *germina* glabra.

β. *DELICATULUS*; *R. delicatulus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 109 (1868), non de Martr.-D. (1864); *R. Guentheri* var. *ericetorum* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 250. — Exsicc. : *Ronc. vosg.* n° 901; *Assoc. rub.* n° 253. — Gracilis; serratura profunda, acuta; petala parva; *stamina* stylis rubros subæquantia; *germina* pilosa.

γ. *PENTAPHYLLUS*; *R. pentaphyllus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 289; *R. Guentheri* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 123, *ex pte.* — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 398 (s. n. *R. gymnostyli*, non P.-J. Müll.). — Validus; *folia magna*, *caul.* 5-nata, mucronato-serrata; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* elongata, foliosa, breviter pilosa; *stamina* stylis rubris breviora; *germina* glabra.

δ. *LEPTOCLADUS*; *R. leptocladus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 299; *R. erosus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 516 (1882). — *Folia* 3-5-nata, ampla, mucronato-serrulata; *foliolum* terminale ovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* laxa, foliosa, flexuosa, epilosa, ramulis elongatis, ascendentibus; *stamina* stylis virentibus breviora; *germina* glabra.

ε. *MICROTHYRSUS*; *R. microthyrsus* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 516 (1882). — *Folia* 3-nata, mediocriter serrata; *foliolum* terminale ovatum, cordatum, sensim acuminatum; *inflorescentia* angusta, elongata, nutans, pilosa, dense glandulosa; *stamina* stylis rubris breviora; *germina* glabra.

ζ. *PENDULINUS*; *R. pendulinus* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 290; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 121, *ex pte.*; *R. gracilis* var. *anoptos* Progel *Bot. Ver. Landsh.* 1882 (106) p. p. — *Folia* 3-nata, subtiliter mucronato-serrulata, etiam ramealia; *foliolum* terminale breviter obovatum, subemarginatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* angusta, arcuata, interrupta, foliosa; *stamina* stylis roseos vix æquantia; *germina* tomentosa.

η. *MALACADENES*; *R. malacades* Sud. *Diagn.* p. 54 (1906); *R. begoniifolius* Holuby, *ex pte.* — *Folia* ut in var. ζ sed *inflorescentia* angusta, valde foliosa, glandulæ longissimæ, *stamina* brevia, *germina* glabra.

θ. *EMERSIDENS*; *R. emersidens* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 145 et exsicc. n° 130 (1869). — *Folia* 3-5-nata, acute serrulata; *foliolum* terminale orbiculare, cordatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* foliosa, brevis, densa, pilosa; *stamina* stylos roseos æquantia; *germina* pilosa.

ι. *FASCICULIFLORUS*; *R. pseudo-Guentheri* *Assoc. rub.* n° 661, non 581; *R. Guentheri* × *peltifolius*? Progel; *R. Guentheri* f. *cordifolia* Projel, p. p. — *Folia* minute serrata; *foliolum* terminale cordato-orbiculare; *inflorescentia* elongata, usque apicem foliosa, ramulis ascendentibus; *stamina* stylis rubris breviora; *germina* glabra.

κ. *VARIICOLOR*; *R. variicolor* Kinscher *Repert.* (1909) p. 343. — *Folia* discolora, minute serrulata, *caulina* 5-nata; *foliolum* terminale orbiculare vel obovato-orbiculare, cordatum, cuspidatum; *rachis* breviter pilosa; *styli* rubri, *germina* glabrescentia.

GALLIA: *Vosges*, *Loire*, *Tarn*; GERMANIA; HUNGARIA. — Β. GALLIA: *Vosges*, *Bambois-de-Planois*, *Gerbamont*, *Couchetat* (Pierrat); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); HELVETIA: *Toggenburg* (R. Keller). — γ. GALLIA: *Vosges*, *Gérardmer*, *vallée de la Vologne* (Müller). — δ. GERMANIA: *Alsacia*, *Munster*, *derrière Stossiwir* (Müller). — ε. GALLIA: *Vosges*, *forêt du Salen*, à *Vagerey* (Pierrat); *Loire*, *Noirétable* (Arbost), *Pilat* (Charbonnel); HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); HELVETIA. — ξ. GALLIA: *Vosges*, *Gérardmer*, extrémité N.-O. du lac de *Gérardmer*; GERMANIA: *Bavaria* (Progel); HELVETIA. — η. GALLIA: *Vosges*; HELVETIA. — θ. GALLIA: *Vosges* *Haut-du-Tôt* (Pierrat); MORAVIA: *Saar*; GERMANIA: *Bavaria*, *Silesia*; HELVETIA: *Regelstein* (R. Keller); HUNGARIA: *Borsoa* (Buda). — ι. GALLIA: *Vosges*, *Rochesson* (Pierrat); GERMANIA: *Bavaria*, *Rieselberg* (Progel). — ζ. GERMANIA: *Silesia*, *Nesselgrund* (Kinscher).

C. — (T. CCV) — *R. nigricatus* M. et Lef. *Vers.* n° 142 (1859); N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 123; *R. tenuiglandulosus* Gremli O. B. Z. (1871) p. 97; *R. hirtus* A. d. *tenuiglandulosus* Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 613 (1902); *R. letevirens* var. *incomptus* Progel p. p., f. *fuscescens* ej.; *R. dasycanthus* Progel, p. p., non G. Braun; *R. polytrichus* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) 102, p. p.

Exsicc. — Billot *Fl. Gall. et Germ.* n° 2056 p. p. (s. n. *R. hirti*); Baenitz *Hb. eur.* n° 9581; p. p.; Sud. *Bat. eur.* n° 644 ! 645; Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. n° 54.

Turio teres, glaucescens, dense pilosus, glandulis setisque purpureis obsitus; *folia* pleraque 3-nata, utrinque appresse pilosa, minute, æqualiter et simpliciter mucronato-serrata; interdum dentibus glandulosis [*R. adenophyllus* G. Braun *Hb. rub. Germ.* n° 166 (1880)]; *foliolum* *caul.* terminale (5) obovatum, ellipticum vel oblongo-obovatum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum; *ramus* dense pilosus, foliis minute serratis; *inflorescentia* inferne foliosa, apice truncata, pilosa, glandulis longis, purpureis, setis crebris obsita; *pedunculi* breves, ramosi; *pedicelli* elongati (6), inferiores ascendentes, superiores patuli; *sepala* dense glandulosa, parce aciculata, in fructu erecta, interdum subreflexa (*R. Guentheri* v. *reversa* Schm. *Cat.* 189, p. p.); *petala* oblonga; *stamina* alba stylos basi rubros leviter superantia; *germina* glabra.

β. *PERSIMILIS*; *R. persimilis* Boul. et Pierrat *Assoc. rub.* n° 397 (1880) 515, 782; *R. hirtus* var. *lucidus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 248. — *Foliolum* *caul.* terminale manifeste obovatum, abrupte acuminatum; *inflorescentia* angusta.

γ. *GERARDII*; *R. hirtus* F. Gérard *Pl. Vosg. in Rev. Bot.* VIII, p. 73, non W. K.; *R. Mikantii* v. *Guentheri* Utsch in Baenitz *Hb. eur.* n° 9994; *R. Bellardii* var. *styl. purpur.* Schmid. *Cat.* p. 205 (1888). — Exsicc. : Ch. Magnier n° 2453! — *R. hirtus* var. *subrhombicus* Spribille in *hb.* Sud. — Habitus typi sed serratura acutior, inæqualis. Variat dentibus glandulosus.

δ. *ÆGOCALYX*; *R. ægocalyx* P.-J. Müll. *hb.*, *ined.* — Dentes acuti; *foliolum* terminale abrupte et tenuiter acuminatum; *inflorescentia* aculeis crebris armata; *sepala* acuminatissima, cuspide patula.

ε. *OBLONGULUS*; *R. oblongulus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 338; *R. serpens* var. *lanceolatus* Sabrs. exsicc. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9987 (s. n. *R. vogesiact*). — *Folia* 3-5-nata, acute et inæqualiter serrata; *foliola* angusta, *caul.* terminale oblongo-ellipticum, acuminatum; *inflorescentia* laxa, flexuosa.

ζ. *BURNATII*; *R. Burnatii* Favrat *Bull. Soc. Vaud. sc. nat.* XXI, 26 (1881) et exsicc. n° 44; *R. gracilicaulis* B. Burnatii Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 619; *R. Guentheri* f. *villosa* Schmid. *Cat.* — *Folia* acute et inæqualiter serrata; *foliola* angusta, *caul.* terminale oblongum vel anguste rhombeum, acuminatum; *inflorescentia* flexuosa; *sepala* longe acuminata; *stamina* stylos vix superantia.

n. GLAUCUS; *R. glaucus* F. Kretzer ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9047 (1898); *R. grunensis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1907) p. 259; *R. bifrons* \times *hirtus* Sabrs. — Serratura grossa; folia subtus pubescentia; foliolum caul. terminale rhombeum; inflorescentia \pm foliosa, armata; glandulæ relative pallidæ. *R. serpenti* similis.

o. CELTIDIFOLIUS; *R. celtidifolius* Focke ap. Gremli *Beit. Fl. Schw.* (1870), 33; Gremli *O. B. Z.* XXI (1871) p. 97. — Turio pruinosis; serratura profunda; foliola terminalia. folia *Celtis australis* revocant; flores magni, styli rosei, germina pilosa. — Mihi novus est.

p. AXILLARIS; *R. erythrostachys* (Sabrs.) var. *infuscatus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 268. — Folia utrinque pubescentia, mucronato-serriculata, foliolis terminalibus anguste obovatis, cuspidatis; inflorescentia angusta, flexuosa, usque apicem foliosa, ramulis ascendentibus; flores parvi, staminibus stylos vix superantibus; germina glabra.

q. PERMOLLIS; *R. permollis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 213; *R. bifrons* \times *scaber* ej. l. c. — Folia subtus molliter pubescentia, cinerascentia, supra appresse pilosa; turio tomentosus, rachis epilosa, germina glabra.

r. SUBAXILLARIS. — Serratura tenuis, inæqualis; foliolum terminale anguste ovato-rhombeum; inflorescentia flexuosa, angusta, usque apicem longe foliosa; stamina stylos basi roseos parum superantia; germina glabra. Folia utrinque parce pilosa.

GALLIA: *Aisne* et *Oise*, forêt de Retz, Thury, Betz; *Orne*, forêt du Perche; BELGIA: HELVETIA: AUSTRIA: GERMANIA. — β . GALLIA: *Vosges*, Gerbamont, aux Xards (Pierrat); *Haute-Savoie*, M^e Voiron; *Tarn*, pont de Luzières. PYRÉNÉES: HUNGARIA: monte Tatiar (Kupcok); GERMANIA: *Silesia*, Meisenberg (Kinscher). — γ . GALLIA: *Vosges*, Granges (F. Gérard); *Saône-et-Loire*, Meurthe-et-Moselle, *Haute-Savoie*, *Savoie*, *Puy-de-Dôme*; GERMANIA: AUSTRIA: HELVETIA. — δ . GALLIA: *Vosges*, Gérardmer (Müller), Raon-l'Etape (Biau); GERMANIA: *Silesia*, Landech (Kinscher); HELVETIA: Iddaberg (R. Keller). — ϵ . GERMANIA: *Badenia*, *Bavaria*; AUSTRIA: *Styria*, Seeschau (Sabransky); *Moravia* (Petrak); GALLIA: PYRÉNÉES, Arbas, Cauterets. — ζ . GERMANIA: *Badenia*, *Silesia*, *Bavaria*; HELVETIA: *Vaud*, M^e Gourlet (Schmidely). — η . GERMANIA: *Braunschweig*, Solingen (F. Kretzer); *Silesia*, Münsterberg (Kinscher); *Bavaria*, *Alsacia*. — θ . HELVETIA: prope Kreuzlingen (Gremli). — ι . HUNGARIA: *Bakabanya*, in valle Chorvat-dolina (Kupcok). — κ . HUNGARIA: *Bakabanya*, Zlata studnickas (Kupcok), Borsod (Budai). — λ . HUNGARIA: Borsod (Budai).

HYBRIDÆ

R. NIGRICATUS \times *WINTERI* Sud; *R. DIVEXISCANDENS* Kupcok in *hb. Sud.* = *asperifrons* \times *bifrons* ej. — Habitus *R. Winteri* P.-J. Müll. sed subvirescens, inflorescentia glandulæ rubris munita.

HUNGARIA: Bakabanya, Potkanka (S. Kupcok).

R. NIGRICATUS \times *FOLIOSUS* *flexuosus*; *R. SEMIFLEXUOSUS* Sud. *Diagn.* p. 53 (1905). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 471! — Differt a *R. nigricato* M. et L. turionibus subangulosis, inflorescentia interrupta, elongata, foliosa, flexuosa, pedunculis ascendentibus, fasciculatis, foliis superis subdiscoloribus. Sepala patula.

GALLIA: *Valois*, Saint-Martin (Questier).

OBS. — Le *R. brachypetalus* Gremli *O. B. Z.* XXI (1871) p. 96, à carpelles velus et à foliole caul. terminale brièvement acuminée; le *R. tristis* Gremli l. c. 97 et le *R. umbraticolus* Gremli l. c. p. 97 se placent apparemment dans le voisinage du *R. nigricatus* M. et L. Je n'en ai pas vu de spécimens et les descriptions trop sommaires qui en ont été données ne me permettent pas de les interpréter sûrement.

b . — *R. minutidentatus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 323; *R. reconditus* f. *denticulata* Schmid. in *hb. Sud.*; *R. intermedius* Spribille *exsicc.*, non G. Br.; *R. Kaltenbachii* Progel var. *subalpinus*; *R. leptocalyx* Progel p. p.; *R. dichromus* ej. p. p. Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9062 (s. n. *R. pendulinus*).

A *R. nigricato* M. et L. dignoscitur: inflorescentia parva, pauciflora, folia vix superanti, staminibus stylis brevioribus. *Folia* 3-nata, subtus sparsim pilosa, minute denticulata; *foliolum* terminale anguste rhombeum vel elliptico-obovatum, basi subintegrum, acuminatum; *germina* glabra.

β . *LINGUIFOLIUS*; *R. Lamyi* Kupcok non Gen. — Serratura tenuissima; foliolum terminale elongatum, oblongo-rhombeum; inflorescentia subinermis, glandulæ relative brevibus; germina pilosa.

γ . *PEGUERICUS*; *R. peguericus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 28 (1898). — Turio leviter angulatus; foliolum terminale breviter obovatum, cuspidatum; inflorescentia arcuata, aphylla, parum armata.

δ . *ACULEATIPES*; *R. aculeatipes* Sud. *Diagn.* p. 53 (1906); *R. longicuspis* Gen. ex pte, non Müll. — Turio pruinosis; aculei validi, subcompressi; serratura inæqualis; inflorescentia armatissima; stamna stylos æquantia. *R. nigricato* M. L. etiam similis.

ϵ . *ALPIGENUS*; *R. Guentheri* \times *pilocarpus* Schmid. *Assoc. rub.* n° 783. — Turio angulosus; folia minute serriculata; foliolum terminale manifeste obovatum, cuspidatum; pedunculi elongati, ascendentis, aculeis crebris armati.

ζ . *HYPOGLAUCUS*. — Folia subtus pallida, cinereo-glaucescentia; serratura tenuissima; foliolum terminale elliptico-obovatum; inflorescentia subinermis, glandulæ relative brevibus munita; flores parvi, germina glabra.

GERMANIA: *Badenia*, Siegelau (Goetz); *Silesia*, Ratibor (Spribille); *Bavaria* (Progel); HUNGARIA: Bakabanya, Borsod; GALLIA: *Ain*, Sergy (Schmidely); HISPANIA: vallée d'*Aran*; HELVETIA. — β . HUNGARIA: Bakabanya, Stampoch (Kupcok). — γ . GALLIA: *Hautes-Pyrénées*, Cauterets, mont Pégue; *Ariège*, Orlu; *Tarn*, Lacabarède; BELGIA: *Louette-St-Pierre*; GERMANIA: *Silesia* (Kinscher); *Bavaria* (Progel). — δ . GALLIA: PYRÉNÉES, Arbas; *Cher*, Allogny, Rhin-du-Bois; GERMANIA: *Silesia*, Frankenstein (Kinscher); HUNGARIA. — ϵ . GALLIA: *Haute-Savoie*, M^e Voirons (Schmidely). — ζ . HELVETIA: Thurgau, prope Kalchrain (R. Keller).

c . — *R. pectinatus* Sud. et Gravet *Bat. eur.* p. 33 (1904).

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 94!

Differt a *R. nigricato* M. L. : foliis subtus molliter pubescentibus, pilis ad nervos pectinatis; inflorescentia brevi, pauciflora, staminibus stylis brevioribus. *Folia* 3-nata, minute serrata; *rachis* pilosa, parum armata; *germina* glabra.

β . *ARISTIFER* Sud. *Rub. tarn.* p. 57 (1909). — Folia mucronato-serrulata; rachis hirsuta; inflorescentia laxa, subaphylla, pedunculis patulis; sepala longe acuminata.

γ . *BILOBUS*; *R. bilobus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 80 (1868) et *exsicc.* n° 80! — Serratura acuta, subinæqualis; foliolum terminale oblongo-rhombeum, acuminatum; petala biloba, styli virentes, germina pilosa; sepala patula.

δ . *BAKABANYENSIS*; *R. bakabanyensis* Borbas sec. Kupcok in *hb. Sud.* — Aculei plerique flavescentes, crebri, sed inflorescentiæ glandulæ purpureæ; folia mucronato-serrulata; foliolum terminale obovatum vel ovato-rhombeum, breviter acuminatum; glandulæ longissimæ, crebræ; stamna stylos pallidos æquantia; germina glabra. *R. rivulari* M. et W. similis.

ϵ . *HIRTISSIMUS* Sud. *Bat. eur.* p. 61 (1906) et *exsicc.* n° 197!; *R. hirtus* var. *hirtissimus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905), n° 8. — Folia ampla, mucronato-denticulata; foliolum terminale cordatum, longe acuminatum; inflorescentia armatissima; stamna brevia; germina glabra.

ζ. CHLOROSERICEUS ; *R. chlorosericeus* var. *pachypus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905) p. 394. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 646 ! — *Turio* dense pilosus ; folia subtus molliter piloso-velutina, acute serrulata ; stamina brevia, germina glabra.

η. ADENONEURUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 647 ! — Serratura acuta, composita, inæqualis ; foliorum nervi glandulosi ; inflorescentia elongata, multiflora, aciculis crebris ; stamina stylis pallidis breviora, germina glabra ; petala parvula, ovata.

θ. CRINITIFORMIS. — Foliolum terminale subovatum ; inflorescentia subinermis, pedunculis ascendentibus, rachide dense hirsuta ; flores parvi ; styli virescentes, germina pilosa. Ad. *R. crinitum* vergens.

ι. HENRYANUS. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 648 ! — Serratura grossa, inæqualis ; inflorescentia dense glanduloso-aculeata ; petala angusta, stamina alba stylis virescentibus breviora. Cetera ut in typo.

BELGIA : Namur, Louette-Saint-Pierre (Gravet) ; HELVETIA : GERMANIA : *Silesia*, Spitzberg (Kinscher) ; TIROLIA : Wildschoenau (Progel). — β. GALLIA : Tarn, las Planques. — γ. GALLIA : *Vosges*, Rochesson, à Plainfaing (Boulay) ; HELVETIA : Torny, Villarimbold. — δ. HUNGARIA : Bakabanya ; GERMANIA : *Silesia*, Mittelwalde (Kinscher) ; *Bavaria*, Freyung. — ε. et ζ. AUSTRIA : *Styria*, Seehau (Sabransky). — η. GALLIA : Tarn, Lacauane, aux Vidals. — θ. GALLIA : *Haute-Garonne*, Arbas, mail de Bourrusse ; HELVETIA. — ι. GALLIA, *Sarthe*, forêt de Perseigne (A. Henry).

OBS. — Le *R. polyacanthus* Greml. *O. B. Z.* (1871) p. 90, non Boul. (1838), des environs de L'icerne, est apparemment voisin du *R. pectinatus*. Je n'en ai pas vu de spécimens.

D. — (T. CCV) — ***R. posoniensis*** Sabrs. *Verh. Z. B. G. Wien XXXVI* (1886) p. 90 ; *R. hirtus* A. II. *posoniensis* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 612 (1902).

Turio obsolete angulatus, epruinosus, pilosus, aculeis subcompressis ; *folia* caul. 5-nata, supra fere glabra, subtus pubescentia, grosse et inæqualiter subinciso-serrata ; *foliolum* terminale (7) rhombeum, basi integrum vel vix emarginatum, sensim et longe acuminatum, petiolulo proprio quadruplo vel quintuplo longius, infima petiolulata ; *inflorescentia* magna, foliosa, multiflora, erecta ; *rachis* pilosa, glandulis longis, aculeis reclinatis, pallidis vel fusco-rubris dense obsita ; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, multiflori ; *pedicelli* elongati, valde patuli ; *sepala* pilosa, laxe reflexa (8) ; *petala* angusta ; *stamina* alba stylis virescentes superantia ; *germina* glabra. — Internodus fere inter *R. foliolatum* L. et M. et *R. hirtum* W. K.

HUNGARIA OCCIDENTALIS : circa Pressbourg (Sabransky).

OBS. — Le *R. adenodes* Dichtl in *Deutsch. bot. Monat.* (1886) p. 132 pourrait peut-être prendre place ici : *Folia* 3-nata, *sepala* reflexa, *germina* pilosa. — AUSTRIA, prope Wien. — Mihi novus est.

E. — (T. CCV) — ***R. glaucinellus*** Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 341.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 10370 (s. n. *R. Guentheri* f. *pruinosa*), 10371 (*R. Guentheri* f. *pruinosa turionigena*).

Turio pruinosissimus, glabrescens, glandulis brevibus obsitus ; *folia* (9) ampla, utrinque sparsim pilosa, subtiliter et simpliciter mucronato-serriculata ; *foliolum* terminale late ovatum, breviter obovatum vel suborbiculare, basi emarginatum, acuminatum ; *ramus* pubescens, glandulis rubris, brevibus, aculeis tenuibus, sparsis munitus, foliis subtiliter serriculatis ; *inflorescentia* ampla, sèpè usque apicem foliosa, parum pilosa vel non, glandulis relative brevibus, purpurascens, aculeis crebris, tenuibus onusta ; *pedunculi* medii elongati, patuli, multiflori ; *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, aculeata, fructum laxe amplectentia ; *petala* obovata, alba ; *stamina* alba stylis virescentes superantia (10) ; *germina* pubescentia. *Pollen* fere purum. — A *R. hirta* W. K. glandulis crebris, purpureis accedit, serratura tenuissima, turiones pruinosi, glandulæ breves *R. glaucinellum* revocant. Polline fere puro præsertim conspicuus est.

GERMANIA : *Silesia*, prope Branil (Baenitz) ; GALLIA : *Loire*, Pierre-sur-Haute (Jordan).

F. — (T. CCV) — ***R. Kaltenbachii*** Metsch *Rub. Henneb.* p. 82 in *Linnæa XXVIII* (1856), 170 p. p. ; Focke *Syn.* p. 375 ; *R. scaber* Kalt. *Fl. Aach. Beck.* p. 239, non Wh. ; *R. perplexus* P.-J. Müll. in *Wirtg. exsicc.* ; *R. hirtus* E. *Kaltenbachii* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 616 ; *R. rutilus* Caflisch *hb.* ; *R. hirtus* var. *blandus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 250 ; *R. hirtus* var. *paucipilus* ej. l. c. 248.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 42 bis, 92, 155 (s. n. *R. perplexa*) ; ed. 2 n° 31, 72 (*R. scaber*) ; Baenitz *Hb. eur.* n° 9048 (*R. bifrons* × *Guentheri* Utsch.).

Turio inferne teres, superne angulatus, glaucescens, glabrescens, glandulis aciculisque brevibus, pallide fuscis munitus ; *folia* 3-5-nata, supra sparsim pilosa, subtus glabrescentia, mediocriter et inæqualiter serrata ; *foliolum* terminale (11) anguste ovatum, cordatum, sensim et longe acuminatum ; *ramus* flexuosus, pubescens, aculeis tenuibus, sparsis munitus, foliis grosse serratis, foliolis acuminatis ; *inflorescentia* foliosa, interrupta, laxa, parce pilosa, glandulis relative brevibus, aciculis sparsis praedita ; *pedunculi* medii elongati, patulo-ascendentes, 1-3-flori ; *sepala* viridia, glanduloso-acute, in fructu patula vel laxe erecta ; *petala* obovata, alba ; *stamina* alba stylis basi roseos superantia (12) ; *germina* glabra.

β. ANOPLON Sud. et Gravet *Bat. eur.* p. 61 (1906) et exsicc. n° 196 ! — *Turio* glaber ; serratura inæqualior ; inflorescentia inermis, magis elongata, minus laxa, pedunculis brevioribus, ascendentibus ; stamina longiora.

γ. BRAUNII ; *R. Braunii* T. Braecker *Deut. Rub. Art.* (1882) p. 72 ; *R. hirtus* var. *apricorum* Kupcok l. c. 249 ; *R. ruderalis* = *bifrons* × *Guentheri* ? Kupcok l. c. 236, non Chab. — *Foliolum* caul. terminale ovatum ; serratura grandis ; inflorescentia purpurea, valde foliosa.

δ. GRACILENTUS ; *R. gracilentus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 187 (1859). — *Turio* glaber, pruinosus ; folia mucronato-serrulata ; inflorescentia parum foliosa, pedunculis patentissimis, pedicellis longis, tenuibus, divaricatis ; styli virescentes. *R. tereticaula* P.-J. Müll. similis.

ε. ATROCALYX ; *R. atrocalyx* Sud. *Diagn.* p. 53 (1906) ; *R. glandulosus* v. *fol. cord.-rotund.* Fischer-Ooster *Rub. bern.* ; *R. hirtus* var. *melanochlamys* Progel exsicc. Assoc. rub. n° 659 (1884) ; *R. duplex* v. *brevicuspitatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) ; *R. Bellardii* × *ilocarpus* ej. l. c., p. p. ; *R. setiferatus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 256 ; *R. hirtus* var. *sericeus* Progel, ex pte ; *R. erythroconus* var. *divaricatus* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) 103 p. p. — A typo differt : foliolis latioribus, minus longe acuminate, inflorescentia angusta, folia superanti, subinermis, glandulis obscure fuscis vel atris onusta.

ζ. ERYTHRAENES ; *R. erythraenes* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 288 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 107 et exsicc. n° 88 ; *R. brachyurus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), 72 (79) p. p. ; *R. Bellardii* × *Guentheri* ej. l. c. et Cat. p. 196. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9023, 9950. — *Turio* glaber ; folia ut in var. ε ; inflorescentia laxa, flexuosa, subinermis, pedunculis patulis ; stamina stylos roseos superantia.

η. ANOPLOSTACHYS ; *R. anoplostachys* P.-J. Müll. *Bonpl.* (1861) p. 292 ; *R. orthocladius* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 242 et exsicc. n° 127 (1869). — *Turio* parce pilosus ; stamina stylos pallidos æquantia. Cetera ut in var. ζ.

θ. SUBGLABER ; *R. subglaber* Sud. *Diagn.* p. 42 (1902). — *Turio* glaber, glaucescens ; foliola lata, breviter acuminata ; aculei validi in turione ramoqué ; rachis epilosa, leviter armata.

R. orbiculatus; *R. orbiculatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 147 (1859). — Folia 3-nata, mucronato-serrulata; foliolum caul. terminale orbiculare vel obovato-orbiculare, cordatum, cuspidatum, petiolulo proprio duplo longius; inflorescentia subterminalis, parum foliosa, pedunculis patulis; styli virentes.

R. CURVIFOLIUS Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), 78 (71); *R. atroviridis* Kupcok = *R. bifrons* \times *tereticaulis* var. ej. *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 240. — Folia acute serrata; foliolum terminale late obovatum vel ovatum, cordatum, abrupte acuminatum; inflorescentia elongata, foliosa.

R. latifrons Progél, ex pte. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 649 ! — Folia 3-nata, utrinque appressa, pilosa, inæqualiter et acutissime serrata ; foliolum terminale ovatum, cordatum, acuminatum ; rachis laxe pilosa, aculeis tenuibus, sparsis, glandulis longis munita ; germina glabra.

v. ERYTHRODERMIS Sud. *Rub. tarn. p. 57* (1909). — Folia minute mucronato-serrulata, subtus cinereo-tomentosa; inflorescentia densa, multiflora; stylis virentes. Planta rubro-purpurea.

GERMANIA : Prov. *rhenana*, *Bavaria*; BELGIA ; GALLIA : *Tarn*, *Pyrénées*, *Loire*; HUNGARIA ; CAUCASUS. — β. BELGIA : *Namur*, Nafraire (Gravet). — γ. GERMANIA : Derschlag; *Silesia*, *Bavaria*; GALLIA : *Tarn*, *Loire*, *Isère*; HUNGARIA ; HELVETIA. — δ. GERMANIA : Alsacia, Alschbach prope Weissenburg (Müller); GERMANIA : *Bavaria*, Freyung, Zwickling. — ε. GALLIA : *Tarn*, *Isère*, *Vosges*, *Rhône*; ITALIA : *Liguria* (Bicknell); HELVETIA : GERMANIA : *Bavaria*; HUNGARIA. — ζ. GALLIA : *Vosges*, *Pyrénées*; GERMANIA : *Badenia*, *Bavaria*. — η. GALLIA : *Vosges*, Gérardmer; *Saône-et-Loire*, Autun (Gillot). — θ. GALLIA : *Tarn*, *Vosges*, *Pyrénées*. — ι. GERMANIA : Alsacia, Lauterbach (Müller); *Saxonia*. — ι. GALLIA : *Vosges*, Gérardmer, vallée de Granges (Müller). — λ. GALLIA : *Haute-Savoie*, M^{ts} Voirons (Schmidely); HUNGARIA : Bakabanya (Kuncok). — μ. GALLIA : *Puy-de-Dôme*, Ambert (Brevière); GERMANIA : *Bavaria*, Rieselberg (Progel). — ν. GALLIA : *Tarn*, Crespinet.

Obs. — Le *R. coloratus* Gremli O. B. Z. XXI (1871) p. 126 ; *R. hirtus* E. Kaltenbachii III *coloratus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 617 semble se rapprocher de la var. *erythradenes*. M'est inconnu.

HYBRIDA

R. KALTENBACHII var. ν \times *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. *Rub. tenu.* p. 57 (1909); *R. HEMIERYTHRODERMIS* Sud. *t. c.* — A var. ν . distinguuntur: turione angulato, foliis grosse serratis, discoloribus, inflorescentia laxa, pilosa; sepalis reflexis. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, cum var. *erythrodermi*.
Ore — *I.e.B.* *mirandus* — *hirtus* \times *scaber* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 237, qui est stérile, semble n'être qu'une anomalie du *R. Kalten-*

b. — (T. CCVI) — *R. rubiginosus* P.-J. Müll. in *Flora XLII* (158) p. 166; *R. hirtus* A. c. *rubiginosus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI*, 613 (1902); *R. hirtus* var. *ruberistylus* Sud. *Rub. Pyr.* p. 86 (1900); *R. rivularis* var. *dasyacanthus* Progel ex pte; *R. erythrocomus* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1883) p. 103, p. p.; *R. rivularis* var. *dolichacanthus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 254; *R. minatorius* Kupcok = *apricus* × *vestitus* ej. l. c. 244; *R. inusitatus* = *Guentheri* × *pulchellus* ej. l. c. 262; *R. calhanus* ej. l. c. 243.

R. galbanus ej. t. c. 243.
Exsic. — Sud. Rub. rar. n° 172 !
Differt a *R. Kaltenbachii* Metsch : glandulis longioribus, crebrioribus ; aculeis validioribus, numerosis ; inflorescentia (2) glandulis longis, setis aciculisque vulnerificis dense obsita. *Turio* fere glaber ; *folia* mediocriter mucronata, dentata ; *foliolum terminale* obovatum vel cordato-ovatum, acuminatum ; *inflorescentia* ampla, multiflora, laxa, epilosa ; *sepala* dense aculeata, in fructu laxe reflexa vel patula ; *stamina* stylos roseos superantia ; *germina* glabra. — *Turionum et ramorum aculei pallidi R. rivulariem* M. et W. revocant, sed inflorescentia manifeste colorata ut in *R. hirta*. — W. K.

R. micropetalus N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 136 (1869) et *exsicc.* n° 120 ! — Folia grosse et acute serrata ; inflorescentia angusta, pedicellis brevibus ; calyx laxe erectus.

7. TRICHACANTHUS ; *R. trichacanthus* P.-J. Müll. in Billot *Ann. Fl. Fr. et All.* (1862). — Exsicc. : Billot n° 2056, *ex pte* ; Sud. Bat. eur. n° 650 ! — Turio glabrescens ; folia 3-5-nata, minute mucronato-serriculata, etiam ramealia ; foliolum caud. terminale ovatum vel subobovatum, breviter emarginatum ; inflorescentia elongata, erubescens, dense glandulosa, setis tenuibus, longis, rectis, dense obsita ; pedunculi brevissimi ; pedicelli elongati, ascendentibus ; calyx erectus. Folia ramealia supera supra spinulifera.

Rameana supera supra spinulosa. — *R. lilacinus* Wirtg. *Hb. rub. rh.* ed. 1 n° 152 (1860); ed. 2 n° 80; *R. hirtus* E. V. *lilacinus* Focke ap. Asch. §. *LILACINUS*; *R. lilacinus* Wirtg. — *Folia mucronato-serrulata, subtus pubescentia; foliolum caul. terminale cordato-ovatum, et Gr. Syn. VI p. 617 (1902).* — *Folia mucronato-serrulata, subtus pubescentia; foliulum caul. terminale cordato-ovatum, sensim acuminatum; aculei sparsi in turione ramoque; inflorescentia pyramidalis, parum foliosa, leviter armata; flores dilute rosei.*

s. ADAUCTUS Sud. *Rub. tern.* p. 57 (1909) ; *R. adactus* Boul. et Pierrat Assoc. rub. n° 121 (1874) ; *R. Guentheri* × *Villarsianus* Schmid. Cat. p. 197 p. p. (a super-*Guentheri*) ; *R. Chenevardianus* Schmid. Bull. Hb. Boiss. (1903), 80 (73) ; *R. hirtus* f. *aculeatissima* Rub. gall. n° 93 ; *R. Aethiops* Kupcok in hb. Sud. — Folia minute serrata ; foliolum caul. terminale latum, cordato-suborbiculare ; inflorescentia erubescens, aculeis mediocribus ; sepala laxe erecta.

t. RICHTERI; *R. Richteri* Halacsy *Oest. bromb.* p. 268 (1891); *R. hirtus* A. d. 2. *Richteri* Focke *ap.* Asch. et Gr. *Syn. VI*, p. 614 (1902). — *Turio* +*pruinosus*; *folia* lâete *viridia*, *subtus* leviter pubescentia, subtiliter mucronato-denticulata; *folium* terminale cordato-ovatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, laxa; *styli* pallidi.

n. ACICULIFOLIUS. — Folia grosse et inæqualiter dentata, superiora supra pilosa, aciculifera; foliolum terminale late cordato-ovatum, acuminatum, inflorescentia terminalis, cuncta foliis: germina glabra.

GERMANIA : Alsatia, Weissenburg, lignes du Pigeonnier, Lauterbach (Müller) ; BAVARIA ; BELGIA : Coo (du Pré) ; HUNGARIA ; GALLIA : Tarn, Pyrénées. — B. GALLIA : Vosges, forêt du Camberg (Boulay) ; HELVETIA. — γ. GALLIA : Valois, St-Martin, Craisne, Waligny, le Cuvret (Questier). — δ. GERMANIA : Prov. rhénana, Eifel (Wirtgen), Freudenberg (Utsch). — ε. GALLIA : Vosges, Tarn, Haute-Savoie ; BELGIA ; HUNGARIA : SATORIA. — ζ. AUSTRIA. drope Gloggnitz (Richter). — η. HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok) ; THURINGIA : Steinach (Kinscher).

HYBRIDÆ.

R. RUBIGINOSUS var. γ . \times *OBTRUNCATUS* *horrens* Sud. ; *R. ACICULARIS* L. et M. *Vers.* n° 141 (1859). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 651 ! — Differt a var. γ . *turionibus pilosis, foliis 5-natis, acute serratis, superis subdiscoloribus; aculeis validioribus, sepalis patulis. Fructus male evolutus.*

Calvia: Valais, bois de Lévignen, de Collimance, la Mentreolle (Questier, Lefèvre).

R. RUBIGINO SUS × MUTABILIS?; *R. CUNICULICOLUS* Kupcok = *bifrons × rivularis* ej. in hb. Sud. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 632! — Differt a *R. rubiginoso* P.-J. Müll. aculeis validioribus, foliis superioribus subdiscoloribus, serratura inæquali, petalis læte roseis, sepalis patulis, fructu imperfecto.

HUNGARIA : Bakabanya, ad cuniculum Sarkandistolna (S. Kupcok).

c. — *R. minutiflorus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 176 (1859), non Wirtg. exsicc. ; *R. brachyurus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903), 72, p. p. ; *R. glaucidulus* Sabrs. exsicc. ; *R. Guentheri* f. *brachyadenes* Progel ; var. *cordifolius* ej. ; *R. Guentheri* f. *cordifolia* ej. ; *R. melanothrysus* Kupcok Mag. *Bot. Lap.* (1910) p. 282 ; *R. Guentheri* × *scaber* ej. l. c. ; *R. melanaxis* = *Guentheri* × *tereticaulis* ej. l. c. 224.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 653! ; *Assoc. rub.* n° 985.

A *R. Kallenbachii* Metsch differt præsertim staminibus stylis brevioribus. — *Turio* glabrescens, glaucescens ; *folia* caul. 3-5-nata, argute serrata, utrinque glabrescentia, interdum amplissima [*R. Guentheri* var. *majorifolius* Kinscher *Repert.* (1909), p. 344] ; *foliolum* caul. terminale late ovatum, cordatum, acuminatum ; *ramus* glabrescens, parum armatus ; inflorescentia ovata, obtusa, laxissima, basi foliosa, parce pilosa, pedunculis patulis, multifloris, parce aciculatis ; *sepala* virescentia, acuminata, inermia vel parce aciculata, in fructu erecta ; *petala* oblonga, angusta ; *stamina* alba stylis basi roseis vel purpureis (*R. Guentheri* var. *cruentistylus* Kupcok) breviora ; *germina* glabra.

S.-var. *dispulsiflorus* ; *R. dispulsiflorus* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906). — Inflorescentia conica, valde diffusa.

β. *PLATYPHYLLUS* ; *R. platypyllus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 155 (1859). — Foliola breviora, latiora ; inflorescentia armatior ; folia ramealia grosse serrata ; stamina stylos pallidos subæquantia.

γ. *STENOCALYX* Sud. *Rub. tarn.* p. 57 (1909). — Folia subtus obscure viridia, parce pilosa, inæqualiter dentata ; foliolum terminale subobovatum ; inflorescentia lata, parum erubescens, subviridis ; sepala longe acuminata, ± foliacea.

δ. *HUMILIDENS* Sud. *Rub. tarn.* p. 57 (1909). — Differt a typō : inflorescentia magis elongata, apice attenuata, densiore, pedunculis brevioribus, ± ascendentibus, aciculis crebris munitis. Styli virescentes ; germina glabra.

ε. *HUMILIFORMIS* Sud. l. c. ; *R. humiliiformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 179 (1901). — Serratura tenuis ; foliola ± obovata ; inflorescentia aculeis crebris munita ; styli virentes ; germina pilosa.

ζ. *HORRIDIFACTUS* Sud. l. c. ; *R. horridifactus* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906) ; *R. gruntensis* Kupcok Mag. *Bot. Lap.* (1907) p. 259 f. *acanthophylla*. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 654. — Inflorescentia elongata, dense glanduloso-aciculata ; folia et germina ut in typō.

η. *SPINIFER* Sud. l. c. ; *R. spinifer* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 343 ; *R. scaber* var. *sursumnitens* Kupcok l. c. (1910) p. 216 ; *R. Bayeri* var. *ochraceus* Weeber. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 10877, 10890, 9996, non *Herb. dendr.* — Serratura inæqualis ; foliolum terminale ovato-rhombeum ; inflorescentia foliosa, armatissima ; germina glabrescentia.

θ. *VIOLACEUS* ; *R. violaceus* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 44 (1866) et exsicc. n° 34. — Serratura tenuis ; folia supra sparsim pilosa ; foliolum caul. terminale suborbicularis, cordatum, acuminatum ; inflorescentia pauciflora, flexuosa, armatisima ; styli rosei ; germina glabra.

ι. *EMERSISTYLUS* ; *R. emersistylus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 74 (1867) et exsicc. n° 55 ; *R. gracilescens* Prog. *Bot. Ver. Landsh.* (1882) p. 104, ex pte, n° 643. — Inflorescentia subinermis, glandulosa relative brevibus ; styli lutescentes vel basi rosei ; cetera ut in var. θ.

κ. *REUSSI* ; *R. Reussii* Holuby O. B. Z. XXV (1875) 314. — Serratura tenuis ; foliolum caul. terminale suborbicularis, acutum vel cuspidatum ; inflorescentia obtusa, pedicellis gracilis, longis ; germina glabrescentia.

λ. *SUBIMBRICATUS* ; *R. subimbricatus* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1904) 71 (78) ; *R. Guentheri* × *serpens* *glaucovallosus* Schmid. l. c. — Foliola lata, marginibus sese tegentia, caul. terminale cordato-orbicularis ; inflorescentia angusta, foliosa, pedicellis brevibus ; styli rubri.

μ. *LAMYI* ; *R. Lamyi* Gen. *Mon.* p. 92 (1880), ex pte. — Folia grosse, acute et inæqualiter dentata, subtus manifeste pilosa ; foliolum terminale cordato-ovatum, acuminatum ; inflorescentia laxa, pilosa, glandulosa relative brevibus ; sepala patula vel subreflexa ; petala ovata ; stamina stylos subæquantia ; germina glabra. Parum fertilis. Hybrida?

ν. *SUBOREADES*. — Turio pruinosis ; folia grosse et duplicito-subinciso-serrata ; foliolum terminale late cordato-ovatum, acuminatum ; inflorescentia flexuosa, foliosa, parum armata ; germina tomentoso-lanata.

GERMANIA : *Alsatia*, la Alschbach (Müller); *Silesia*; *Bavaria*; HUNGARIA : Bakabanya; AUSTRIA : *Styria*; GALLIA : *Tarn*, *Vosges*, *Haut-Savoie*, Ariège, *Haut-Garonne*; ITALIA; CAUCASUS. — β. GERMANIA : *Alsatia*, la Alschbach (Müller). — γ. GALLIA : *Tarn*, Lacabarède, Paulin, Hautainboul, Tels, le Sidobre; GERMANIA : *Badenia*. — δ. GALLIA : *Tarn*, Esperausses, Berlats; *Pyrénées*, Luchon, Ax; HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok); BAVARIA Traunstein (Kaufmann). — ε. GALLIA : *Pyrénées*, Luchon, Arbas; *Tarn*, Lacauane. — ζ. GALLIA : *Pyrénées*, Mérènes, Luchon; *Tarn*, Saint-Amans, Tanus; *Vosges*; HUNGARIA; GERMANIA : *Silesia*, Mittelwalde (Kinscher); *Bavaria*, Bernau. — η. GALLIA : *Tarn*, las Planques, le Sidobre, le Banquet; AUSTRIA : *Styria*, Seechau (Sabransky); HUNGARIA; GERMANIA : *Badenia*, *Bavaria*, *Silesia*; HELVETIA. — θ. GALLIA : *Vosges*, *Haut-Savoie*, Ardèche. — ι. GALLIA : *Vosges*; GERMANIA : *Bavaria*. — ς. HUNGARIA : Bakabanya (Kupcok), Pod hrad (Holuby); SAXONIA. — λ. GALLIA : *Haut-Savoie*, M¹ Voiron (Schmidely); *Vosges*, Gérardmer; HELVETIA : Thurgau (R. Keller). — μ. GALLIA : *Haute-Vienne*, Saint-Sulpice-Laurière (Lamy); GERMANIA : *Bavaria*, Inntal, Rotholz. — ν. GERMANIA : *Silesia*, Mittelwalde, Hirschenhäuser (Kinscher).

HYBRIDÆ

R. MINUTIFLORUS × *BIFRONS*; *R. BRACHYSTEMONOMORPHUS* Sud. et Sabrs. — Turio angulatus, aculei compressi, folia discolora, argute serrata *R. bifrontem*; glandulæ purpureæ, stamina brevia, sepala patula vel erecta *R. minutiflorum* P.-J. Müll. revocant. Sterilis.

AUSTRIA : *Styria orientalis*, inter Bruck et Demeldorf (Sabransky).

R. MINUTIFLORUS var. × *PODOPHYLLUS holochlorus* Sud.; *R. HOLOPHORUS* Sabrs. O. B. Z. (1903) n° 8. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 655! — Turio glabrescens; serratura tenuissima; folia subtus pubescens, ± cinerascentia; foliolum terminale breviter obovatum vel obovato-orbicularis; stamina brevia; glandulæ ut in *R. minutifloro*. Fructificatio non tota.

AUSTRIA : *Styria orientalis*, inter Seechau et Hatzendorf (Sabransky).

R. MINUTIFLORUS × *GREMLII*; *R. SEMIGREMLII* Sud. — Turio appresse pilosus, angulatus, aculeis pallidis, compressis ut in *R. Gremlii*; folia caul. 3-4-nata, inflorescentia laxa, breviter pilosa, glandulosa brevibus munita; stamina brevia, sepala patula. Parum fertilis.

GERMANIA : *Bavaria*, Traunstein (E. Kaufmann).

R. MINUTIFLORUS var. × *OBSCURUS* (gr.) Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909); *R. SPARSIGLANDULUS*; *R. sparsiglandulosus* Sud. l. c. non Hayek. — Turio glaber; aculei compressi, rachis hirsuta, sparsim glandulosa; flores rosei; stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-Cirou.

R. MINUTIFLORUS var. × *VALLISPARSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909); *R. NIGER* Sud. l. c. — Differt a *R. minutifloro* turione angulato, glandulæ brevioribus, floribus roseis. Sterilis et atro fuscis.

GALLIA : *Tarn*, bois d'Assac, sous Montredon.

R. MINUTIFLORUS × *RIVULARIS* (grex); *R. FULVESCENS* Sud.; *R. reconditus* Kupcok non al. — Differt a *R. minutifloro* P.-J. Müll. aculeis ± flavescensibus, floribus sterilibus.

HUNGARIA: Bakabanya, Prielozok ad viam in tuniculas (S. Kupcok).

OBS. — Des spécimens de Pukanec (Hongrie), distribués par M. Kupcok et déterminés *R. pilocarpus* par Hobuby (non Gremli), dérivent apparemment de la var. *Reussii* par croisement avec quelque forme de la série des *R. Hystrices*.

d. — *R. hypodasyphyllus*; *R. hypodasys* Sud. *Bull. Ac. géog. bot.* (1911) p. 53, non R. Keller; *R. peltifolius* Progel pr. min. p. (n° 906); *R. hirtus* var. *sericeus* Progel (n° 936) p. p.; *R. gracilis* var. *sericeus* ej., pr. p., *Bot. Ver. Landsh.* (1882) 106.

Turio pruinosis, glaber; *folia* 3-5-nata, tenuiter mucronato-serriculata, flavescens-viridia, supra sparsim, subtus molliter pilosa, cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum; *rachis* tomentosa, breviter pilosa, parum armata; *stamina* stylis breviora; *germina* pilosa.

β. *RUDERICOLUS*; *R. rudericolor* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 220; *R. candicans* × *scaber* var. *laxiflorus* Kupcok in hb. Sudre. — Serratura inæqualissima; inflorescentia aculeata.

GERMANIA: Bavaria, Waldmünchen, Rieselwald, Tiefen Graben (Progel); Saxonie. Polenzthal (Hofmann), Empfing (Kaufmann). — β. HUNGARIA: Bakabanya, Biela bana (S. Kupcok); HELVETIA: Saint-Gall, Richen (R. Keller).

G. — (T. CCVI) — **R. hercynicus** G. Braun in Focke *Syn.* 370 (1877); *R. hirtus* β *Harcynicus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 614 (1902); *R. Wittingii* Hal. *Oest. bromb.* p. 271 (1891)?; *R. hirtus* f. *cordifolia major* Progel.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 8560; *Soc. dauph.* n° 5390; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 19, 140.

Turio teres, pruinosis, erubescens, parce pilosus; *folia* pleraque 3-nata, supra glabrescentia, subtus glaucescentia et sparsim pilosa, mediocriter vel tenuiter et subsimpliciter serrata; *foliolum* terminale (3) ovato-orbiculare vel late obovatum, leviter emarginatum, breviter acuminatum; *ramus* parce pilosus; *inflorescentia* erecta, saepe usque apicem foliosa, in umbrosis pallida, in apricis purpureo-fusca; *rachis* epilosa, dense glandulosa, aciculis sparsis vel crebris minuta; *pedunculi* medii patulo-ascendentes, multiflori; *sepala* tomentoso-viridia, dense glandulosa, parce aciculata, in fructu patula vel erecta; *petala* ovata, alba; *stamina* alba stylos superantia (4); *germina* glabra.

β. *PUBESCENS* Sud. *Bat. eur.* p. 61 (1906) et exsicc. n° 195!; *R. hercynicus* et *begonifolius* Progel pr. max. p.; *R. hercynicus* var. *lasiocladus* ej. *Bot. Ver. Lands.* (1889), p. p.; *R. tatiarensis* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 265. — *Turio* ramusque pilosi; serratura tenuissima. Forma vergens in *R. nigricatum* vel in *R. rivulare*.

γ. *BEGONIIFOLIUS*; *R. begonifolius* Holuby *O. B. Z.* XXV (1875), 315, p. p. — Folia ampla, 3-5-nata, inæqualiter serrata; aculei ± pallidi. *R. rivulari* M. et W. similis.

GERMANIA: Harz, Silesia, Saxonie, Thuringia, Bavaria; AUSTRIA; HUNGARIA; GALLIA: Tarn, Mazamet; Vosges, Luvigny (Biau); HELVETIA: Aargau (R. Keller). — β. GERMANIA: Saxonie, Bavaria; BOHEMIA (Hofmann); HUNGARIA. — γ. HUNGARIA: N. Podhrad (Holuby), Presbourg (Sabransky).

OBS. — Le *R. hercynicus* G. Braun est intermédiaire entre le *R. hirtus* W. K. et les *R. serpens* Wh. et *rivularis* M. et W. Je n'ai pas vu de spécimens du *R. Wittingii* Halacsy.

HYBRIDA

M. Hofmann a récolté à Polenzthal (Saxe) une forme paraissant mal fructifier et qui pourrait être un *R. hirtus Guentheri* × *hercynicus*.

H. — (T. CCVI) — **R. temuidentatus** Sud. *Rub. Pyr.* p. 92 (1900); *R. hebetispinus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 152 (*nomen sol.*) (1869); *R. Bayeri* var. *macrander* Frid. et Hofm. exsicc.; *R. serpens* var. *prigodicensis* Spribille Abh. *Bot. Ver. Prov. Brandg.* XLI (1899), 214 et var. *sublividus* ej. in hb. Sud.; *R. Kaltenbachii*? var. *Zimmermannii* Spribille in hb. Sud; *R. tristis* Schmid. *Bull. Hb. Boiss.* (1903) p. 79 (72), p. p., an Gremli?; *R. truncifolius* × *serpens* Goetz exsicc.; *R. hercynicus* × *instidiosus* Progel; *R. aspreticulus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 259, non M. et Lef.

Exsicc. — Boul. *Ronc. vosg.* n° 139; Baenitz *Hb. eur.* n° 10403.

Turio glaber vel parce pilosus, glaucescens, teres; *folia* 3-5-nata, utrinque parce pilosa, minute et simpliciter mucronato-serrulata; *foliolum* caul. terminale (5) oblongo-obovatum vel ellipticum, integrum vel leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* glabrescens; *inflorescentia* elongata, erecta, foliosa, pedunculis patulo-ascendentibus; *rachis* parce pilosa vel non; *sepala* glanduloso-aciculata, in fructu erecta, [raro reflexa, *R. hirtus* var. *reversus* Schmid. *Cat.* p. 208 (1888)]; *petala* ovata vel oblonga; *stamina* alba stylos pallidos superantia (6); *germina* fere glabra.

δ. *MELANOCHLAMYS*; *R. melanochlamus* Progel ap. G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 202 (1881); *R. scaber* var. *ramulosus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 217; *R. Guentheri* Barber *Fl. Oberl.* III p. 145. — Frons obscurus; *folia* mucronato-serrulata, foliolis obovatis; *inflorescentia* laxa, subinermis, glandulis crebris, longis, purpureo-fuscis onusta; *pedunculi* patuli.

γ. *JACTABUNDUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 177 (1902); *R. rufescens* Sud. l. c. p. 27, non L. et M. — Exsicc. : Sud. *Bal. eur.* n° 93!; *Rub. rar.* n° 173! — Foliola angustiora, subtiliter mucronato-serrulata, etiam in ramis; *inflorescentia* elongata, densa, pedunculis patulis.

δ. *RUBRISSETUS*; *R. rubrisetus* Borbas, sec. Kupcok. — Foliolum terminale obovato-rhombeum, basi integrum; sératura tenuis, inæqualis; glandules crebræ, longissimæ; *sepala* setis glandulisque dense hirsuta. Variat *inflorescentia* angusta, pedunculis brevibus [*R. minax*] Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 246].

ε. *ALBINUS*; *R. varius* Focke var. *albinus* Hofmann *Pl. crit. sax. exsicc.* n° 177. — Folia subtiliter serrulata; *inflorescentia* inermis; *stamina* stylos rubros æquantia.

ζ. *PREHENSIBILIS*; *R. prehensibilis* Timbal-Lag. *Bull. Soc. sc. ph. et nat. Toul.* (1875) p. 89. — Foliolum terminale breviter et late obovatum, cuspidatum; *inflorescentia* multiflora, armata; *stamina* basi rosea stylos carnosus superantia; *germina* glabra.

GALLIA: Pyrénées, Alpes, Vosges, Valois, Languedoc; GERMANIA: Saxonie, Silesia, Bavaria, etc.; BELGIA; MORAVIA; HELVETIA; CAUCASUS; HUNGARIA. — β. GERMANIA: Bavaria (Progel), Saxonie; HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok). — γ. GALLIA: Pyrénées, Eaux-Bonnes, Cauterets, etc., Tarn, Manche. — δ. HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok); STYRIA (Sabransky); SILESIA (Kinscher); BAVARIA. — ε. GERMANIA: Saxonie, vallis Albis (Hofmann). — ζ. GALLIA: Pyrénées, Arbas, Juzet, Luchon.

OBS. — Le *R. Lorenzii* Hofmann (*R. hercynicus* × *chaerophyllus* ej.) *Pl. crit. suz.* (1906) n° 269 paraît n'être qu'une forme *umbrosa* du *R. tenuidentatus*.

HYBRIDÆ

R. TENUIDENTATUS var. γ. × *QUESTIERI* Sud. *Rub. Pyr.* p. 178 (1901); *R. UMBRACULORUM* Sud. l. c. — *Turio* angulatus; aculei subæquales; glandulas sparsæ, breves; *folia* 5-nata; *sepala* reflexa; flores rosei. Sterilis.

GALLIA: Basses-Pyrénées, les Eaux-Bonnes, promenade du Gros-Hêtre.

R. TENUIDENTATUS × *BIFRONS*; *R. tenuidentatum* sed glandulis brevioribus, foliis discoloribus, rachide pilosa, sepalis laxe reflexis. Parum fertilis.

GERMANIA: Silesia: Celadnatal, monts Beskides (Weeber).

R. TENUIDENTATUS × INCANESCENS; *R. CANDIDULUS* Sud. *in hb.* Bicknell. — Habitus *R. tenuidentati* sed folia albo-tomentosa. Sterilis. ITALIA: Liguria, val Altomoro (C. Bicknell).

R. TENUIDENTATUS × APICULATUS var. *schistophilus*; *R. AULONENSIS* Sud. *Rub. Pyr. p. 177* (1091). — Differt a *R. tenuidentato* foliolis lato-rubris, obovato-orbicularibus, glandulis breviribis, fructu male evoluto.

GALLIA: Hautes-Pyrénées, vallée d'Auron.

OBS. I. — Le *R. microsetus* Borbas, Holuby, exsicc., a les apparences d'un *R. TENUIDENTATUS × SERPENS*. — HUNGARIA.

OBS. II. — *R. caucasicus* Focke Abhandl. d. Wissens. Ver. Bremen IV p. 183 (1874), *R. glandulosus* var. *canescens* Boissier II, 693. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 10409; *Hb. Fl. Ross. mus. Petrop.* n° 875. — *R. tenuidentato* valde similis sed foliis discoloribus, foliolis latioribus, mucronato-serrulatis diversus est. — ROSSIA: Ossetia, Alagir (Marcowicz); Bakouchinjara (Alboff); Borstom, Batum, etc.

HYBRIDA

R. CAUCASICUS × SANCTUS; *R. SEMICAUCASICUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr. LVIII* (1911) p. 35. — Differt a *R. caucasico* F. aculeis compresiis, foliis coriaceis, inaequaliter serratis, supra sparsim pilosis, glandulis sparsioribus, floribus vive roseis, sterilibus.

CAUCASUS: Abchazia, Tzebeida, prope Furjenskoje (G. Woronow).

b. — *R. reconditiformis* Sud. *Rub. Pyr. p. 178* (1901); *R. reconditus* Sud. l. c. p. 18, non Schmid.

Turio glabrescens; *folia* 3-nata, minute serrulata; *foliolum* terminale obovatum vel rhombicum, basi integrum, acuminatum; *inflorescentia* elongata, foliosa, erecta, subinermis, dense hirsuta, breviter glandulosa; *sepala* reflexa; *stamina* stylos superantia; *germina* glabra.

GALLIA: Pyrénées: Cauterets, les Eaux-Bonnes.

HYBRIDA

R. RECONDITIFORMIS × SAXETANUS Sud. *Rub. Pyr. p. 178* (1901); *R. PROVISUS* Sud. l. c. — Serratura tenuis, rachis non hirsuta, glandulae breves, sepala patula. Substerilis.

GALLIA: Basses-Pyrénées, Eaux-Bonnes.

c. — (T. CCVI) — *R. trachyadenes* Sud. *Rub. tarn. p. 58* (1909); *R. hirtus* var. *ciliatus* et var. *sericeus* Progel ex pte; *R. erythrocomus* Progel, pr. min. p.

Turio glaber; *folia* grosse et inaequaliter duplicito-serrata, subtus ± pubescens vel sericea; *foliolum* caul. terminale (7) rhombicum vel obovato-rhombicum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* multiflora, glandulis longis, aculeis mediocribus praedita; *rachis* breviter pilosa; *sepala* erecta, *stamina* longa, *germina* glabra.

β. GLABRESCENS; *R. hirtus* var. *sepinculus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1907) 250; *R. microcarpus* ej. l. c. (1910), 231, non Gen.; *R. omnivagans* Barber Fl. Oberi. III p. 98 (1911). — Exsicc.: Sud. *Hb. eur.* n° 656; *Rub. gall.* n° 148. — Folia subtus glabrescentia, rachis epilosa, aciculis ± pallidis.

γ. COLORATIFORMIS. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 8545 (*R. coloratus* non Greml.). — Glandulae purpureae, crebræ, longissimæ; *inflorescentia* laxa, foliosa; serratura acutissima; cetera ut in var. β.

GALLIA: Tarn, Haute-Garonne, Finistère; GERMANIA: Prov. rhenana, Bavaria, Silesia, Thuringia. — β. GERMANIA: Bavaria, Silesia; HUNGARIA: GALLIA: Ariège, Ascou, Tarn. — γ. AUSTRIA; HUNGARIA: Bakabanya (Kupcok), Borsod; GALLIA: Vosges; HELVETIA; GERMANIA: Badenia, Waldkirch (Goetz).

HYBRIDA

R. TRACHYADENES × ULMIFOLIUS Sud. *Rub. tarn. p. 58* (1909); *R. TRACHYADENOIDES* Sud. l. c. — Folia 5-nata, subdiscolora; aculei subæquales; glandulae brevissimæ; flores rosei, steriles.

GALLIA: Tarn, St-Martin-Laguépie, vallée du Viaur.

d. — (T. CCVI) — *R. interruptus* Sud. *Rub. Pyr. p. 28* (1899); *R. hirtus* × *Guentheri* et *Guentheri* × *Bellardii* × *bavaricus* Utsch; *R. Guentheri* var. *sericeus* Progel, p. p.; *R. Bayeri* var. *umbrosus* Sud. *Rub. Pyr. 27*.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9538.

Turio glaber vel glabrescens, glaucescens; *folia* 3-5-nata, subtus sparsim pilosa, inaequaliter et acute dentata; *foliolum* caul. terminale (8) obovatum vel elliptico-obovatum, latum, leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* parce pilosus, leviter armatus; *inflorescentia* angusta, interrupta, sœpe usque apicem foliosa, subepilosa, parum armata; *stamina* stylis vulgo rubris breviora (9).

β. VALIDIPES; *R. validipes* Sud. *Diagn. p. 53* (1906). — Foliolum caul. terminale obovato-rhombicum, basi integrum; ramus validus; rachis pedicellique crassa; stama stylis subæquantia; *germina* pilosa; glandulae relative breves.

γ. LONGIPES; *R. longipes* N. Boul. Ronc. vosg. p. 106 (1868) et exsicc. n° 87. — Folia subtus glabrescentia, mucronato-serrata; foliolum terminale ovato-oblongum vel subobovatum; inflorescentia diffusa, pedunculis longis, tenuibus, divaricatis, subinermibus.

δ. STELLATIFLORUS; *R. stellatiflorus* P.-J. Müll. *in Boul. Ronc. vosg. p. 76* (1867) et exsicc. n° 57. — Folia utrinque sparsim pilosa, simpliciter serrata; foliolum caul. terminale ellipticum, subemarginatum, acuminatum; inflorescentia pyramidalis, flexuosa, parum armata, pedunculis patulis; stama stylis roseos subæquantia; *germina* glabra.

ε. ERYTHROSTACHYS; *R. erythrostachys* Sabrs., ex pte, O. B. Z. XXXVI (1886), 289; *R. gracilis* Holuby O. B. Z. XXIII (1873), 380, non Roxb.; *R. longistylus* Borbas Vasvar. flor. (1887), 300; *R. vinodorus* Sabrs. *in Deut. b. Monat.* (1890), 6. — Folia ampla, utrinque parce pilosa, subinæqualiter serrata; foliolum terminale late ovatum vel ovato-suborbicularare, cordatum, acuminatum; inflorescentia foliosa, glandulis crebris, longis onusta.

ζ. SETULIFER. — Folia simpliciter mucronato-serrulata; foliolum terminale obovatum, basi integrum, tenuiter acuminatum; pedunculi tenues, ascendentes, setis longis obsiti. Folia superiora supra spinulifera.

η. OBTUSIFLORENS Sud. *Rub. tarn. p. 58* (1909). — Foliolum caul. terminale late obovatum, cuspidatum; inflorescentia brevis, obtusa; *germina* pilosa.

θ. SUBSTELLATIFLORUS Sud. *Rub. Bav. p. 32* (1912). — Folia tenuiter serrulata, subtus glabrescentia; foliolum caul. terminale ellipticum, basi subemarginatum, acuminatum; inflorescentia laxa, pedunculis elongatis, patulis, aculeis crebris armata; flores parvi; stama stylis virides æquantia; *germina* glabra.

ι. PUBIFOLIUS. — Folia coriacea, supra parce, subtus molliter pilosa; stama alba stylis virescentibus breviora; *germina* pilosa.

κ. SUBHORRIDULUS. — Serratura tenuissima; foliolum caul. terminale obovatum, basi subintegrum; inflorescentia magna, subaphylla, multiflora, aciculis flavescentibus, glandulis purpureis densissima onusta; stama stylis pallidis breviora; *germina* laxe pilosa.

GALLIA : Pyrénées, Tarn, Vosges, Isère, Savoie, Ain, etc. ; HELVETIA ; HUNGARIA ; AUSTRIA ; GERMANIA : Bavaria, Saxonia, Silesia. — β . γ . δ .
 GALLIA : Vosges. — ϵ . HUNGARIA : Trencin (Holuby) ; HELVETIA : St-Gall, Regenstein (R. Keller). — ζ . GALLIA : Valois, foret de Retz (Questier) ;
 BELGIA : Marchin ; HUNGARIA : THURINGIA : Steinach (Kinscher). — π . GALLIA : Tarn, Pyrénées ; HELVETIA : Regelstein (R. Keller). —
 θ . GERMANIA : Bavaria, Silesia, Thuringia ; HELVETIA. — ι . GALLIA : Pyrénées, Arbas, à Pène Blanque. — κ . GALLIA : Pyrénées, Luchon, route
 forestière de Superbagères.

Obs. — Le *R. pendulinus* R. Kell. M. N. G. Wint. (1906) p. 54, non Müll., est un *R. interruptus*. Le *R. rufescens* R. Kell. l. c. p. 38, non L. et
 M., correspond à la var. *stellatiflorus*.

HYBRIDÆ

R. INTERRUPTUS var. π . \times *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909) ; *R. HORRIDITHYRSUS* Sud. l. c. — Differt a var. π foliis 5-natis, aculeis
 subæqualibus, validis, glandulis sparsis, inflorescentia armatissima.

GALLIA : Tarn, Gijoune.

R. INTERRUPTUS \times *TOMENTOSUS* *Lloydianus* Sud. ; *R. IDDABERGENSIS* R. Keller *Nat. Ges. Wint.* (1912) p. 9 ; (*R. tomentosus* \times *cæsius*)
 \times *foliosus* ej. — Differt a *R. interruptus* aculeis majoribus, foliis \pm discoloribus, rachide pilosa, glandulis brevioribus, pallidis, floribus
 sterilibus.

HELVETIA : Saint-Gall, Iddaberg, prope Fischingen (R. Keller).

e. — *R. elegantulus* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909).

Turio glabrescens ; *folia* minute serrata, subitus valde pubescentia, \pm cinereo-tomentosa ; *foliolum* caul. terminale
 obovatum, subemarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* mediocris, pilosa, armata ; *stamina* stylis breviora, germina
 glabra.

β . *PACHYPHYLLUS* Sud. l. c. — Folia coriacea; aculei validi; inflorescentia armatissima, pedunculis patulis; germina
 pilosa.

γ . *PACHYPHYLLOIDES* Sud. l. c. ; *R. symmetricus* var. *chladnensis* Kupecok *Mag. B. Lap.* (1910) p. 212. — Inflorescentia
 parum armata glandulis brevibus obsita; petala ovata; styli rubri, germina fere glabra. *R. tereticauli* P.-J. Müll. similis.

GALLIA : Tarn, Crespinet, Pont-de-Ciroi ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupekok). — β . Tarn, Ambialet ; BAVARIA : Traunstein (Scherzer). —
 γ . GALLIA : Tarn, Crespinet ; GERMANIA : Silesia, Nesselgrund (Kinscher) ; HUNGARIA : Bakabanya, in colle Cladna (Kupekok).

f. — (T. CCVI) — *R. anisacanthoides* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 328 ; *R. Lamyi* Progel p. p., non Gen.

Exsicc. — Baenitz *Hb. eur.* n° 9527 (s. n. *R. decurtata*).

Turio glabrescens ; *folia* subtus viridia, parce pilosa, inæqualiter et acute dentata ; *foliolum* terminale (10) anguste
 rhomboeum, basi integrum vel subemarginatum, longe acuminatum ; *inflorescentia* angusta, foliosa, epilosa, aculeis
 crebris, validis armata, glandulis longis obsita (11); pedunculi ascendentis, fasciculati ; *stamina* stylis rubris breviora ;
 germina glabra.

β . *EURYACANTHUS* ; *R. euryacanthus* G. Braun ; Braeucker *Rub. Art.* p. 73 (1882). — Inflorescentia minus glandulosa ;
 pedicelli non fasciculati ; *stamina* stylis subæquanta.

GALLIA : Haute-Garonne, Arbas, à Pène Blanque ; GERMANIA : Badenia, Siegelau (Goetz) ; Bavaria, Waldmünchen (Progel), Freyung,
 Traunstein, Altdorf (Scherzer). — β . Prov. *rhenana*, Derschlag (Braeucker).

g. — (T. CCVI) — *R. declivis* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909) ; *R. Guentheri* Sud. exsicc., non W. et N. ; *R. Reuteri* de
 Martr.-D. Fl. Tarn p. 207, non Merc.

Exsicc. — *Rub. gall.* n° 46 ! (*R. Guentheri*) ; Ch. Magnier Fl. set. n° 3758 ! ; Bat. eur. n° 657 !

Turio leviter angulatus, glaber, glaucescens ; *folia* subtus parce pilosa, grosse et inæqualiter duplicato-serrata ;
foliolum terminale (12) anguste ovatum vel oblongum, basi emarginatum, longe acuminatum ; *inflorescentia* parva,
 pauciflora, ante anthesin nutans, parce pilosa, mediocriter armata ; *stamina* stylis rubris breviora (13) ; *germina* glabra.

β . *ERYTHROSTACHYOIDES* ; *R. erythrostachys* Sabrs. p. p., exsicc. — Aculei crebri, validi, longi, præsertim in inflores-
 centia dense glandulosa. *R. anisacanthoides* similis.

γ . *OBLONGUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909). — Foliola angusta, terminale oblongo-acuminatum ; inflorescentia parum
 armata.

δ . *MELANOPSIS* Sud. l. c. 58 ; *R. Guentheri* var. *coloratus* Progel, ex pte ; *R. bararicus* \times *Guentheri*, *R. austro-bararicus*
 Utsch. p. p. — Folia obscure viridia, foliolis latioribus ; inflorescentia multiflora, folia superans ; petala parva, ovata ;
 stamina brevissima.

ϵ . *RAVUS* : *R. Guentheri* var. *ravus* Kupecok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 250. — *Turio* teres, breviter et parce glandulosus ;
 inflorescentia laxa, elongata, aculeulis sparsis, debilibus munita, pedunculis tenuibus, elongatis, ascendentibus ; styli
 virides, germina glabra. Ad *R. tereticaula* vergens.

*GALLIA : Tarn, Cambon, St-Martin-Laguépie, Montalet ; CAUCASUS ; HUNGARIA. — β . AUSTRIA : Styria, Sœchau (Sabransky) ; GERMANIA :
 Silesia, Silberberg (Kinscher) ; Bavaria ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupekok). — γ . GALLIA : Tarn, Anglès, la Vieille-Morte ; GERMANIA : Bavaria,
 Algov (Caffisch). — δ . GALLIA : Tarn, Mazamet ; GERMANIA : Prov. *rhenana*, Derschlag (Bodewig) ; Bavaria, Silesia ; HUNGARIA : Bakabanya.
 — ϵ : HUNGARIA : Bakabanya, Prielozok (Kupekok).

HYBRIDÆ

R. DECLIVIS \times *FAGICOLA* Sud. *Rub. tarn.* p. 58 (1909) ; *R. MONTALETICUS* Sud. l. c. — *Turio* pilosus ; glandulae brevissimæ, stamina
 brevia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, roe de Montalet.

R. DECLIVIS \times *ULMIFOLIUS* Sud. l. c. ; *R. DECLIVIFORMIS* Sud. l. c. 59. — Glandulae brevissimæ; folia grosse serrata, subdiscolora ;
 flores rosei, stamina brevia. Sterilis.

GALLIA : Tarn, sous Teulet.

R. DECLIVIS \times *LACERTOSUS* Sud. l. c. ; *R. VIDUATUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 206 (1898). — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 658 ! — Discolor;
 aculei subæquales, glandulae subnullæ, stamina longa. Sterilis.

GALLIA : Tarn, Cambon.

Sect. V. — TRIVIALES P.-J. Müll.

R. Triviales P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 176 ; *Bonpl.* (1861) p. 307 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* p. III et ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 36 ; Gen.
 Mon. p. 2 ; *R. glaucobatus* Dumort. Mon. *Ronc. Belg.* (1863) ; *R. corytifolii* Focke in *Abh. N. V. Bremen* I, 277 (1868) ; *Syn.* p. 79, 387 ; ap.
 Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 624 ; *Halaesy Oest. bromb.* p. 281.

110 — (T. CCVII) — **R. CÆSIUS** L. Sp. pl. ed. I, 706 (1753) ; W. et N. *Rub. germ.* 102, tab. XLVI (var.
agrestis, non W. et K.) ; Focke *Syn.* p. 407 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 626 ; Rogers *Handb.* p. 97 ; N. Boul. ap. R. et C.
Fl. Fr. VI p. 132 ; *R. ligerinus* Genev. *Monog.* p. 19 ; *R. cæsius* var. *glandulifer* Wirtg. exsicc. ; *R. umbrosus* et *collin-*
colus Opiz *Sezn.* p. 86.

Exsicc. — Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* 1 n° 68, 114, 166, 167 ; *ed.* 2 n° 87, 88, 89, 90, 109 ; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 20 ; Assoc. *rub.* n° 58, 59, 207, 405, 406, 407, 471, 527, 664, 914, 1121, 1122, 1123 ; *Rub. gall.* n° 50 ; Baenitz *Hb. eur.* n° 8541 [*R. cæsius* × (*Guentheri* × *macrophyllus*) Utsch], 9031 [*R. cædicans* × (*Guentheri* × *cæsius*) Utsch], 9509 [*R. cæsius* × *Mikanii* f. *Guentheri* Utsch], 10353 ; Sud. *Bat. eur.* n° 48 ; *Set of Brit. Rub.* n° 133 ; *Soc. Cénom.* n° 135.

Turio debilis (1), teres, prostratus vel in dumetis ± erectis, glaber, pruinosis, glandulis brevibus, sparsis, aculeis debilibus, leviter inaequalibus, reclinatis falcatiis munitus ; *folia* 3-nata (2), supra parce pilosa, subtus viridia, ± pubescens, grosse et inaequaliter dentata, dentibus compositis ; *foliolum* caul. terminale late ovato-rhombeum, interdum trilobum, basi leviter emarginatum, acutum vel subacuminatum, breviter petiolatum, infima subsessilia, sèpe biloba ; *stipulae* late lanceolatae, eglandulose vel parce glandulosae ; *petiolus* supra sulcatus, aculeis brevibus, falcatiis munitus ; *inflorescentia* (3) brevis, pauciflora, corymbosa, pedunculis ascendentibus ; *pedicelli* graciles, longi, pube brevi, glandulis tenuibus, aculeis sparsis praediti ; *sepala* cinereo-virescentia, albo marginata, ovato-lanceolata, abrupte acuminata, ± glandulosa, in flore reflexa, fructum amplectentia (4) ; *petala* (5) late ovata vel suborbicularia, alba ; *stamina* alba stylis virescentes æquantia ; *germina* glabra ; *receptaculum* glabrum. *Pollen* perfectum (6). *Fructus* acidulus e drueolis plerumque paucis, majusculis, nigris, pruinosis compositus. — Maius-september.

β. AQUATICUS W. et N. *Rub. germ.* p. 105 (1827) ; *R. cæsius* v. *umbrosus* Rchb. *Fl. excurs.* 608 (1832) ; *R. cæsius* II *aquaticus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 627. — *Turio* glaber ; *folia* ampla, tenuia, subtus glabrescentia, grosse subinciso-serrata ; *pedicelli* sepalaque glandulosae.

γ. MITISSIMUS ; *R. mitissimus* Rip. ap. Genev. *Ess. Mon.* p. 11 (1869) ; *Mon.* p. 16 ; *R. cæsius* var. *umbrosus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 29, non Rchb. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 659. — *Folia* ut in var. β. ; *pedicelli* (7) elongati, graciles, inermes, fere eglandulosi ; *sepala* angusta, inermia, subeglandulosa ; *petala* roseola vel alba.

δ. ARVALIS Rchb. *Fl. Germ. exs.* 608 (1832) ; *R. retrogressus* Gen. *Ess. mon.* p. 20 (1869) ; *Mon.* p. 20 ; *R. polychætus* Boul. et Letendre *Assoc. rub.* n° 131 (1874) ; *R. cæsius* f. *armata* Baenitz *Hb. eur.* (an. 1884). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 1124, 1185. — *Turio* glaber, aculeis crebris, aduncis armatus (8) ; *inflorescentia* aculeis crebris, validis munita ; *pedicelli* patuli ; *sepala* aculeata. Interdum *folia* superiora subtus ± tomentosa [*R. validulus* Gen. *Ess. mon.* 1^{er} *Suppl.* p. 20 (1872) et *Mon.* p. 12].

ε. DUNENSIS Noeldeke *Abh. N. V. Bremen* III, 139 (1872) ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 627 ; *R. validulus* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 25, *pl.* VII (1887). — *Gracilis* ; *turio* pubescens, aculeis crebris, aduncis armatus ; *folia* parva, subtus pubescentia vel ± cinerascentia ; *pedicelli* breves ; *sepala* tomentosa, ± glandulosa.

ζ. RIVALIS N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 133 (1900) ; *R. rivalis* Gen. *Ess. mon.* p. 16 (1869) et *Mon.* p. 17. — *Folia* (9) ampla ; *foliolum* caul. terminale suborbicularia, cordatum ; *inflorescentia* parce glandulosa, sparsim aciculata ; *sepala* (10) lata, parce glandulosa vel eglandulosa (*R. cæsius* Gen. *Mon.* p. 4 ; *R. dumetorum* var. *umbrosus* Wirtg. *Hb. rh. ed.* I n° 113 ; *ed.* 2 n° 49) ; *petala* suborbicularia (11). Interdum *inflorescentia* aculeis longis, crebris munita [s.-var. *spiculatus* Boul. et Bouvet (pr. sp.) *Assoc. rub.* n° 50 (1873) ; *Gen. Mon.* p. 11. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 100].

η. MOLLIFOLIUS ; *R. agrestis* Auct. plur. an W. et Kit. *Pl. Hung.* III p. 297, t. 268 (1805) ? — *Habitus* var. ζ. sed *folia* subtus molliter pubescentia, ramealia superiora subvelutina ; *turio* vulgo glaber, interdum pubescens (*R. polychætus* Boul. et Letendre, *ex pte, Assoc. rub.* n° 247).

Ad ripas rivulorum et fluviorum, longitudinem murorum et margines agrorum, in veteretis calcareis vel argilliosis, silvaticis humidis, præsertim in regionibus inferioribus. In locis siliceis et in montibus rarus. — EUROPA TOTA, ASIA BOREALIS.

β. — *R. sabulosus* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 244 (1899) et exsicc. ; *R. cæsius* × *nemorosus* = *malacus* (non Sud.) Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 273.

A *R. cæsio* L. differt : *turione* aculeique validioribus ; *foliis* amplis ; *foliolو* terminali suborbiculari, cordato ; *petalis* orbicularibus, roseis ; *staminibus* roseis stylos roseos superantibus *Pollen* purum ; *fructus* pruinosis.

β. PUSILLIFORMIS ; *R. pusilliformis* Sud. *Rub. Pyr.* p. 209 (1903) ; *R. pusillus* Sud. l. c. p. 90, non Rip. — *Foliolum* caul. terminale orbiculari-reniforme, cuspidatum ; dentes divaricati ; *stamina* alba.

In locis sabulosis vel glareosis. — GALLIA : *Tarn*, Albi, Castelnau-de-Lévis ; HUNGARIA : Bakabanya (Kupek) ; CAUCASUS : Abchazia, proper Chulo (G. Woronow et Popow). — β. GALLIA : Ariège, Aulus.

HYBRIDÆ e R. CÆSIO

I. — × e Suberectis

R. SUBERECTUS × *CÆSIUS* ; *R. suberectiformis* Sud. ; *R. Wahlbergii* God. ap. Gr. et God. *Fl. Fr.*, p. p., non Arrh. ; *R. Holandrei* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) *Bemerk.* (nomen), (pr. min. p.) ; Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 85, non Chaboiss. nec Genev. ; *R. tiliifolius* J. Harmand *Rev. Bot.* VI p. 315 t. 12 (1887), non alior. ; *R. centiformis* (K. Frid.) var. *pomeranicus* Holzfuss *Alg. Bot. Z.* (1901) (pr. p.) ; non *R. semisuberectus* Sabrs.

Turio obsolete angulatus, glaber, glaucescens, aculeis debilibus, conicis, subæqualibus munitus ; *folia* ampla, caul. pleraque 5-nata, argute serrulata, subtus viridia ; *foliolum* terminale suborbicularia, cordatum, breviter acuminatum ; ramus glabrescens ; *inflorescentia* subinermis, breviter pubescens, glandulis rarissimis, brevibus munita ; *sepala* tomentosoviridia, post anthesin ± patula ; *flores* albi vel dilute rosei ; *petala* suborbicularia ; *stamina* alba stylos parum superantia. *Fructus* male evolutus.

GALLIA : *Vosges*, Granges, au pré Genest et au Tayou (F. Gérard) ; *Meurthe-et-Moselle*, Nancy (Godron) ; *Valois*, forêt de Retz (Questier) ; GERMANIA : *Pomerania*, Stettin (Holzfuss) ; *Bavaria*, Rabenshof prope Schnaittach (Kaufmann), Höhenberg (Scherzer).

OBS. — J'avais d'abord appliqué le nom de *R. Holandrei* à cet hybride, qui correspond en partie au *R. Wahlbergii* de Godron ; mais Müller, en créant cette dénomination, avait visé le *R. plicatus* Holandre (non W. et N.), plante dont j'ai maintenant des spécimens authentiques et qui est un *R. procerus* × *cæsius*. D'autre part Chaboisseau, qui a le premier donné une description du *R. Holandrei* [Bull. Soc. Bot. Fr. VII (1860) p. 267] a appliqué ce terme à une forme qui me paraît bien avoir la même origine que le *R. plicatus* Holandre. C'est donc au *R. procerus* × *cæsius* qu'il convient de rapporter le nom de *R. Holandrei* Müll.

(T. CCVIII) — *R. SULCATUS* × *CÆSIUS* ; *R. sulcatiformis* Sud. *Bat. cur.* p. 34 (1904) et exsicc. n° 97 ; ap. Gandg. Nov. *Consp.* p. 158 ; *R. virgultorum* P.-J. Müll. *Vers.* n° 217 (pr. min. p.) ; *R. roseiflorus* N. Boul. *Ronc. vosg.* exsicc. n° 18^{bis}, non P.-J. Müll. ; *R. cæsius* × *fruticosus* Greml. *Beitr.* p. 24 ; *R. cæsius* × *sulcatus* Schmid. *Cat.* p. 217 ; *R. nemorosus* var. *glabratus* Cott. et Castella *Guide Frib.* p. 59 ; *R. centiformis* (K. Frid.) var. *pomeranicus* Holzfuss *Alg. Bot. Z.* (1901), pr. p. ; *R. dumetorum* f. *orthostachys* G. Braun exsicc. n° 144 (1879).

Turio angulatus, faciebus planis vel leviter concavis, glaber, fere pruinosis, eglandulosus, aculeis compressis, subæqualibus armatus ; *folia* plerumque 5-nata, subtus viridia, inaequaliter serrata ; *foliolum* caul. terminale (1) magnum, cordato-orbicularia, acuminatum ; *inflorescentia* pauciflora, parum pilosa, inermis vel aculeis sparsis, brevibus munita,

pedunculis \pm ascendentibus, eglandulosis vel glandulis brevibus, raris instructis; *sepala* tomentoso-viridia, inermia, post anthesin patula vel laxa reflexa (2); *petala* (3) alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia. *Fructus* male evolutus vel abortivus.

GALLIA: Haute-Savoie, Cravans (Schmidely); Puy-de-Dôme, Cantal; HELVETIA: Fribourg (Perroud); GERMANIA: Harz (G. Braun, F. Kretzer), Alsacia (Müller), Pomerania (Holzfuss), Posen (Spribile), Silesia (Kinscher).

R. CÆSIUS \times *SULCATUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 158; R. MAXIMUS Marsson Fl. Neuvopom. 151 (1869); Focke Syn. p. 405 et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 629; R. centiformis var. *simulatus* Frid. et Gel. Bot. Tidssk. XVI, 121 (1887); R. *semisulcatus* H.-L. Krause in Prahl Kril. Fl. v. Holst. II (1889), 114.

A præcedenti differt turionibus subteretibus, aculeis subconicis, foliolis latioribus, sese tegentibus, terminali breviter petiolulati, sepalis in fructu \pm erectis.

GERMANIA: Pomerania, Alsacia; SUECIA MERIDIONALIS.

(T. CCVIII) — *R. PLICATUS* \times *CÆSIUS* Sud. Bat. p. 33 (1904); R. BAHUSIENSIS Scheutz Oefvers. af Kongl. Vet.-Ak. Handb. (1880) 2 p. 62; Aresch. Som. Obs. g. Rub. p. 91, var. *nitens* (Lindg. 1885); R. *dissimulans* Lindg. Act. Soc. sc. Golhob. XX, Bih. 32 (1884); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 641; R. *Wettsteinii* Franz Petrik Mag. Bot. Lap. (1907) p. 308. — Exsicc.: Hofmann Pl. crit. sax. n° 131; Sud. Bat. eur. n° 95; Baenitz Hb. eur. n° 9029.

Turio obsolete angulatus, sursum acutangulus, glaber, subepruinosus, aculeis mediocribus, compressis, subconformibus, glandulis nullis vel raris brevibusque munitus; *folia* R. *plicatum* revocant, plerumque 5-nata, subtus viridia, inæqualiter dentata, \pm plicata, foliolis latis, sese tegentibus; *foliolum* caul. terminale (5) suborbiculare vel late ovatum, cordatum, acuminatum, infima sessilia; *inflorescentia* pauciflora, parce glandulosa, pedunculis ascendentibus, aculeis tenuibus munitis; *sepala* viridia, albo-marginata, post anthesin patula (6) vel erecta; *petala* (7) alba vel dilute rosea; *stamina* stylos pallidos æquantia. Substerilis. — Variat foliis subtus nitentibus, utrinque glabrescentibus (var. *nitens* Lindbg.), parce pilosis, supra opacis (var. *obumbratus* Lindbg.), vel aculeis tenuibus [var. ? *lamprococcus* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. IV p. 642 (1903); *R. lamprococcus* Focke in Abh. N. V. Bremen I. 307 (1868)].

SUECIA MERIDIONALIS, DANIA, GERMANIA BOREALIS: *Saxonia*, Schleswig-Holstein, Silesia, Bavaria, etc.

R. NITIDUS \times *CÆSIUS*; R. *SERRULATUS* Lindbg. (pr. sp.) Hb. Rub. Scand. n° 46 (1884); Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 641; R. *bahusiensis* var. *serrulatus* Aresch. Some obs. g. Rub. p. 93 (1887); R. *Scherzeri* Utsch.; R. *centiformis* var. *macranthus* Holzfuss Allg. bot. Zeits. (1901); R. *apitanus* ej. in hb. Sud. — Exsicc.: Hofmann Pl. crit. sax. n° 82; Sud. Bat. eur. n° 660.

Turio angulatus, glaber, subepruinosus, eglandulosus, aculeis compressis, subconformibus; *folia* 5-nata, subtus viridia, \pm inæqualiter serrata; *foliolum* terminale late ovatum, basi rotundatum vel leviter emarginatum, breviter acuminatum, infima breviter petiolulata; *ramus* angulatus, glabrescens; *inflorescentia* laxa, parce pilosa, glandulosa raris, brevibus, aculeis mediocribus vel tenuibus instructa; *sepala* viridia, post anthesin patula vel reflexa; *petala* dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes parum superantia. Sterilis vel parum fertilis. Foliorum figura *R. nitidum* revocat.

GALLIA, SUECIA, DANIA, GERMANIA, BELGIA.

R. INTEGRIBASIS \times *CÆSIUS*; R. *SCABROSIFORMIS* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 85 (1902); R. *scabrosus* Gen. Mon., non P.-J. Müll.; R. *ambiguus* P.-J. Müll. (pr. min. p.). — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 661. — A *R. serrulato* differt foliis amplioribus, staminibus sylos superantibus.

GALLIA; GERMANIA: Pomerania (Holzfuss); BELGIA.

R. HOLERYTHRUS \times *CÆSIUS*; R. *LUMCTORUM* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 86 (1902); Bat. eur. p. 33; R. *Mougeotii* Gen. Mon., p. p., non Billot; R. *corylifolius* var. *fl. roseis* Focke in hb. Sud. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 96. — Differt a *R. serrulato*: foliolis latioribus, terminalibus profunde cordatis; foliis superioribus subtus \pm pubescenti-subcinerascens; inflorescentia magis armata, floribus roseis.

GALLIA OCCIDENTALIS: Vendée, Evrunes; Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroy (Bouvet); BRITANNIA MERID.

R. AFFINIS \times *CÆSIUS*; R. *LUNDII* Sud.; R. *Wahlbergii* Lund exsicc., non Arrh.

Habitus *R. affinis* W. et N. *Turio* angulatus, glaber, eglandulosus, aculeis æqualibus; *folia* 5-nata, subtus \pm cinereo-pubescentia, grosse serrata; *foliolum* caul. terminale orbiculare, cordatum, acuminatum; *ramus* glabrescens, aculeis validus armatus; *inflorescentia* armata, eglandulosa; *sepala* viridia, reflexa; flores albi.

SUECIA: Smolandia, Westervik (A. Lund.)

R. CÆSIUS \times *AFFINIS*; R. *MARITIMUS* L. Iter scan. p. 272; Aresch. Some obs. g. Rub. p. 87 (var. *ovatus*); R. *Lagerbergii* Lindbg. in Göt. Kungl. (1884) p. 3.

Turio inferne teres, superne obtusangulus, aculeis crebris, conicis, rectis armatus; *folia* ampla, caul. 3-5-nata; *foliolum* terminale cordato-acuminatum; *ramus* armatus, foliolis acuminatis; *sepala* subvirescentia, albo-marginata; *petala* orbicularia, alba; *stamina* stylos parum superantia.

SUECIA MERIDIONALIS: Scania, Halland, Bohuslan, etc.

R. SENTICOSUS \times *CÆSIUS* Sud. Bat. eur. p. 62 (1906); R. *HOFMANNII* Sud. l. c.; R. *corylifolius* Sbsp. *centiformis* Hofmann, exsicc.; K. Frid., ex pte. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 198!

Turio subteres, glaber, \pm pruinosis, aculeis subconformibus; *folia* 3-5-nata, supra glabra, subtus viridia, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale suborbiculare, leviter emarginatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, parce pilosa, sparsim glandulosa, aculeis crebris armata; *sepala* tomentoso-viridia, parce glandulosa aculeataque, in fructu patula; flores albi; *stamina* stylos parum superantia; germina glabra. Fructus male evolutus.

GERMANIA: *Saxonia*, prope Diesbar et Niederwartha (Hofmann); *Bavaria*; Prov. *rhenana* (Bodewig); *Guestphalia*, Hausberge (G. Braun, exsicc. n° 176 var. c.).

II. — \times e *Silvaticis*

A. — \times e *Gratis*

a. — \times ex *Eu-gratis*

R. CARPINIFOLIUS \times *CÆSIUS*; R. *DEMANDIANUS* Sud. hb.; R. *cæsius* \times *montanus* (Utsch) Demandt, exsicc.

Habitus *R. carpinifolii* Wh. sed turio obtusangulus, rachis parum pilosa, sepala in fructu \pm erecta, petalis latioribus.

GERMANIA: *Guestphalia*, Holzwickède (Demandt).

R. VULGARIS \times *CÆSIUS* Sud.; R. *STRUGENSIS* Spribile (pr. sp.) Abh. Bot. Ver. Prov. Brandb. XXXIX (1897) p. 55; Zeit. Nat. Abt. (1902) p. 138 (58).

Turio obtusangulus, sparsim pilosus, aculeis subæqualibus, compressis, glandulis nullis vel raris; *folia* 5-nata, plerumque subtus viridia; *foliolum* caul. terminale late ovatum vel ovato-rhombeum, leviter emarginatum; *inflorescentia* brevis, breviter pilosa, sparsim glandulosa, aculeis crebris, validis, ± falcatis armata; *sepala* tomentosa, parce aculeata, in fructu erecta; *flores* albi, staminibus longis. Parum fertilis.

GERMANIA: Posen, Ostrowo (Spribile); Prov. rhenana, Gremberg-Cöln (Bodewig).

(T. CCVIII) — *R. GRATUS* × *CÆSIUS* Sud.; *R. GOTHICUS* Frid. et Gel. Bot. Tidsskr. XVI, 115 (1887), pr. sp.; Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 643; *R. nemorosus* Arren. Mon. p. 45, non Hayne; *R. nemoralis* Aresch. in Blytt Norges Flora p. 1168; Some Obs. g. Rub. p. 49, non P.-J. Müll.; *R. acuminatus* Lindg. Act. Gotob. (1884), non Smith; *R. Warnstorffii* Focke, p. p.; *R. lamprocaulis* G. Braun Hb. rub. germ. n° 116. — Exsicc.: Rub. gall. n° 199; Sud. Bat. eur. n° 662.

Turio ± angulatus, subepruinosus, glaber, sparsim glandulosus vel eglandulosus, aculeis validis, compressis, subconformibus; *folia* 5-nata, subtus viridia et pubescentia, interdum superiora subcinerascentia, inæqualiter duplicato-serrata; *foliolum* caul. terminale (8) ovato-rhombeum, basi integrum vel emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* interrupta, foliosa, laxe pilosa, parce glandulosa, pedunculis ascendentibus; *sepala* tomentoso-viridia, in fructu ± patula; *flores* albi vel rosei; *stamina* stylos pallidos superantia (9). Fere sterilis.

SUECIA; DANIA; BELGIA; GERMANIA: Schleswig-Holstein, Thuringia, Saxonia, Prov. rhenana.

R. SCIAPHILUS × *CÆSIUS* Sud.; *R. MORTENSENII* K. Frid. et Gel. Bot. Tidsskr. XVI p. 120 (1887); Rés. fr. p. 26. — Exsicc.: Baenitz Hb. eur. (an. 1891)! — *Turio* subteres, glaber; *folia* subtus glabrescentia, grosse serrata; *foliolum* terminale cordato-orbiculatum; *inflorescentia* brevis, pedunculis ascendentibus; *sepala* laxe reflexa.

DANIA: Seeland, Jutland.

R. DANICUS × *CÆSIUS* Sud.; *R. HELIOCHARIS* (Holzfuss); *R. sentus* (K. Frid.) var. *heliocharis* Holzfuss Allg. Bot. Zeit. (1901).

Turio appresse pubescens, aculeis æqualibus munitus; *folia* 5-nata, minute serrata, subtus molliter pubescentia; *foliolum* caul. terminale obovato-orbiculare, basi subintegrum, longe petiolulatum; *inflorescentia* foliosa, breviter pilosa, glandulis sessilibus, raris instructa; *petala* rosea; antheræ glabrae; *sepala* in fructu ± erecta. Substerilis.

GERMANIA BOREALIS: Pomerania, prope Rützenhagen (Holzfuss).

b. — × e Sprengelianis

R. BRACTEOSUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIBRACTEOSUS* Sud. Rub. Belg. p. 226 (1910).

Habitus *R. bracteosii* sed *turio* ± pruinosis, aculei recti, *folia* caulinis plerumque 3-nata, inflorescentia brevis, petala latiora. Inflorescentia breviter glandulosa, *sepala* viridia.

BELGIA: fossés, à Neer-Oeteren; Torgny.

(T. CCVIII) — *R. SPRENGELII* × *CÆSIUS* N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 134; *R. SEMISPRENGELII* Sud. Bull. Soc. Belg. (1910) p. 227; *R. cæsius* × *Sprengelii* Focke in Abh. N. V. Bremen II, p. 468; Syn. p. 246; *R. cyclophyllus* f. *Hülseni* Holzfuss Allg. Bot. Zeit. (1902). — Exsicc.: Rub. Gall. n° 196; Sud. Bat. eur. n° 663.

Turio leviter angulatus vel subteres, parce pilosus, sparsim glandulosus; *folia* (10) 3-4-5-nata, subtus viridia; *foliolum* terminale ovato-oblongum vel late ovatum; *inflorescentia* brevis, pauciflora, laxe pilosa; *petala* (12) lata, rosea; *stamina* (11) stylos æquantia; *calyx* patulus.

GALLIA: Nord, forêt de St-Amand (Boulay); Oise, Compiègne (Salle); Eure, Verneuil (Jourdes); GERMANIA: Bremen (Focke), Rathenow (Hülsen); Saxonia (Hofmann); Pomerania (Holzfuss); Bavaria (Scherzer); BELGIA: Vierves (Marchal).

OBS. — Le *R. dryadeus* Rip. in Genev. Ess. mon. p. 28 (1869); Mon. p. 29, est peut-être un *R. immutabilis* var. *nemorivagus* × *cæsius*; je n'en ai pas vu de spécimens. — *Turio* obtusangulus, pilosus, eglandulosus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia, pilosa; *inflorescentia* hirsuta, eglandulosa; flores laxe rosei; *sepala* ± erecta. — GALLIA: Cher, forêt d'Allogny (Ripart).

R. HEMISTEMON × *CÆSIUS* Sud.; *R. INTRICATUS* P.-J. Müll. Vers. n° 292 (1859); *R. divaricatus* × *cæsius* Sud. ap. Gandg. Nov. Consp. p. 158 (1905).

Serratura inæqualis, aculei rameales curvati, flores albi, *stamina* brevia *R. hemistemonem* revocant; sed turionibus glabris, obsolete angulatis, foliolis terminalibus late ovatis, cordatis, inflorescentia multiflora, breviter glandulosa, minus pilosa, sepalis laxe erectis diversus est.

GERMANIA: Alsatia, mur méridional du cimetière de Bobenthal (Müller); Freudenberg (Utsch); BELGIA: fossés, à Neer-Oeteren.

R. MYRICÆ × *CÆSIUS*; *R. MYRICIFORMIS* Sud. — Habitus *R. myricæ* Focke sed aculei leviter inæquales, *turio* glaucescens, inflorescentia glandulosa, *petala* latiora.

GERMANIA: Hamburg, Langenhorn (Kinscher).

R. AXILLARIS × *CÆSIUS* Sud.; *R. HALLANDICUS* Gabrielson in Erichsen Verh. N. V. Hamburg VIII, 48 (1900); *R. maritimus* var. *hallanicus* Aresch. Some Obs. g. Rub. p. 89 (1886); *R. dissimilans* C. hallanicus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 642 (1902).

Turio angulatus, glaber, epruinosus, aculeis crebris, inæqualibus, subconicis munitus; *folia* plerumque 5-nata, subtus viridia, glabrescentia, grosse serrata; *foliolum* terminale late ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *rachis* hirsuta, aculeis crebris, pallidis, falcatis, glandulis sparsis obsita; *sepala* pilosa, viridia, foliacea, in fructu laxe erecta; *stamina* stylos pallidos æquantia.

SUECIA: Halland (Gabrielson); GERMANIA: Hambourg (Erichsen).

B. — × ex Euvirescentibus

a. — × e Calvescentibus

R. MAASSII × *CÆSIUS* Sud.; *R. HADROACANTHUS*; *R. dumetorum* f. *hadroacanthus* G. Braun Herb. rub. germ. n° 177 (1880); *R. dumetorum* f. *tapeinos* F. Kretzer (an G. Braun?) ap. Baenitz Hb. eur. ann. 1893.

Turio obtusangulus, glaber, epruinosus, eglandulosus, aculeis subæqualibus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia et parce pilosa, minute serrata; *foliolum* caul. terminale late ovatum, emarginatum, breviter acuminatum; *ramus* glabrescens, aculeis rectis armatus; *inflorescentia* epilosa, parce glandulosa, aculeis sparsis, validis munita; *sepala* tomentosa, laxe reflexa; *flores* albi vel roseoli. *Fructus* male evolutus.

GERMANIA: Oker (G. Braun), Heiserbrück (F. Kretzer).

R. OXYANCHUS × CÆSIUS; *R. HEMIOXYANCHUS* Holzfuss in hb. Sud. — Gracilis; turio parce pilosus, sepala glandulosa, patula vel erecta; cætera ut in *R. hadroacantho*.

GERMANY: Pomerania, Stettin, Glamberk-Sée (E. Holzfuss).

R. QUESTIEI × CÆSIUS; *R. QUESTIERIFORMIS* Sud. *Diagn.* p. 56 (1906).

Turio glaber, *folia* caul. 5-nata, subtus viridia glabrescentia elongata, foliosa, aculeis validis armata. *R. Questieri* L. et M. revocant; sed *turione* obtusangulo, *aculeis* leviter inæqualibus, *foliolis* caulinis latioribus, *petalis* albis, suborbicularibus, *pedicellis* glandulosioribus diversus est. Calyx laxe reflexus; fructificatio non tota.

GALLIA: Valois, forêt de Retz, à St-Martin (Questier); Seine-et-Oise, Ergal (M^{me} Bélèze).

R. ROTUNDATUS × CÆSIUS; *R. ROTUNDATIFORMIS* Sud. — Habitus *R. rotundati* P.-J. Müll. sed turio subteres, glaucescens; foliorum caulinorum foliola infima sessilia, inflorescentia brevior, petala latiora.

BELGIA: la Hulpe (Crépin).

R. STENOACANTHUS × CÆSIUS; *R. STENOACANTHOIDES* Sud. *Diagn.* p. 57 (1906). — Differt a *R. stenoacantho* M. et L. *turionibus* faciebus planis vel convexis; *foliis* 3-5-natis, foliolis amplioribus, terminali late ovato, cordato, acuminato; *inflorescentia* subcorymbosa, sparsim glandulosa; *petalis* suborbiculari, *sepalis* patulis. Parum fertilis; subepruinosus; aculei tenues, subæquales.

GALLIA: Valois, forêt de Retz, laie Pierrot (Questier).

R. FAGICOLA × CÆSIUS Sud. *Rub. tann.* p. 59 (1909); *R. DONOSIANUS* Sud. l. c.

Validus; aculei robusti, crebri ut in *R. fagicola* de Martr.-Don. sed subinæquales. *Turio* obtusus, epruinosus, glaber; *folia* 5-nata, subtus viridia, grosse serrata; *foliolum* caul. terminale suborbicularare, cordatum, cuspidatum, infima petiolata; *ramus* heteracanthus, glabrescens; *inflorescentia* laxa, multiflora, epilosa, parce glandulosa, aculeis crebris, instructa; *sepala* patula; *petala* orbiculata, alba; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra.

GALLIA: Tarn, inter Bourgnounac et Montirat.

R. RHOMBIFOLIUS × CÆSIUS Sud.; *R. ZINSMEISTERI* Erdner in *Mitt. d. Bayer. Bot. Ges.* I p. 544 (1906); *R. cæsius × epipsilus* Zinsmeister exsicc., an Focke?; *R. cæsius × tomentosus* Seurich exsicc. (1898); *R. dumetorum f. platypetalus* G. Braun, exsicc. n° 179 (1878). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 644!

Turio angulosus, epruinosus, glaber, eglandulosus, aculeis subconformibus; *folia* 5-nata, subtus viridia pubescentia; que, argute et inæqualiter serrata; *foliolum* caul. terminale late rhombeum, basi integrum vel vix emarginatum; *inflorescentia* pauciflora, laxe pilosa, subeglandulosa, aculeis tenuibus munita; *sepala* tomentoso-viridula, inermis, eglandulosa, in fructu patula; *petala* late ovata, alba; *stamina* stylos superantia; *germina* glabra. *Stipulae* angustæ.

GERMANY: Brandenburg, Lychen; Saxonia, Hohenstein, Ernthal (Seurich); Braunschweig (G. Braun); Thuringia, Bavaria, Neuburg (Zinsmeister); Pomerania, Bisdorf (Holzfuss); AUSTRIA: Znaim (Oborny).

(T. CCVIII) — *R. SILESIACUS × CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 159; *R. WARNSTORFI* Focke (pr. sp.) in Hallier-Wohlfarth Koch's *Syn.* 789 (1892); *R. Wahlbergii* C. Warnstorfi Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 648, p. p. (1908); *R. Weihei* Kœhl. in Wimmer et Grab. *Fl. Siles.* I, 2 p. 31 (1829)?; *R. dumetorum f. squarrosa* Baenitz *Hb. eur.* (an. 1886); *R. cæsius × thyrsanthus?* var. *litorinus* Holzfuss, exsicc.; *R. cæsius × Kœhleri* Ütsch in Baenitz *Hb. eur.* n° 8542. — Exsicc.: Hofmann *Pl. crit. sax.* n° 241; Sud. *Bat. eur.* n° 665.

Aculeis mediocribus, inæqualibus, glandulis pedicellatis præsertim in ramo intermixtis, foliis grosse et inæqualiter serratis *R. silesiacum* Wh. revocat. *Turio* glaber, obtusus, heteracanthus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia; *foliolum* terminale (15) ovatum, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, foliosa, aculeis crebris, glandulis pallidis instructa (14); *petala* late pilosa, parce glandulosa, in fructu patula vel reflexa; *stamina* magna, alba; *stamina* alba stylos pallidos superantia. Substérilis.

GERMANY: Saxonia (Hofmann), Hercynia, Pomerania, Silesia, Thuringia, Bavaria.

OBS. — Il est fort probable que le *R. Weihei* Kœhl., au sujet duquel M. Focke (*Syn.* p. 401) dit: « *R. silesiaco* admodum similis », est un *R. silesiacus × cæsius*; dans ce cas c'est le nom de Kœhler qui devrait servir à désigner cet hybride.

R. VALLICOLUS × CÆSIUS Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 159 (1905); *R. RUPESTRIS* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 55, non Gen. Mon. — Habitus *R. vallicoli* P.-J. Müll., sed *foliis* subtus molliter pubescentibus, dentibus latis, *inflorescentia* piloso-hirsuta, glandulosa; *stipulis* latioribus, *petalis* orbiculatis, albis, *fructu* male evoluto diversus est. *Sepala* tomentosa, pilosa, glandulosa aculeataque, laxe reflexa. Planta pallide viridis.

GERMANY: Alsacia: Weissenburg, campagne Loyseau, près de Weiler (Müller).

b. — × e Piletoxis

(T. CCVIII) — *R. PYRAMIDALIS × CÆSIUS* Sud.; *R. SEMIPYRAMIDALIS* Sud. *Diagn.* p. 57 (1906); *R. Wahlbergii* Godr. ex pte. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 666.

Folia subtus molliter pilosa, pilis ad nervos pectinatis *R. pyramidalem* Kalt. revocant. — *Turio* obtusangulus, fere *foliolum* terminale (15) ovatum, cordatum, acuminatum; *ramus* glabrescens, aculeis rectis, validis; *inflorescentia* brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis rectis instructa (16); *sepala* pilosa, parce glandulosa, post anthesin patula; *petala* lata, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra; *fructus* male evolutus.

GALLIA: Nancy; Valois, bois de Fontaine (Questier); Manche, Piron (Lebel); Eure, Mandres (Jourdes); Vosges, St-Dié (Boulay); GERMANY: Alsacia, Weissenburg (Müller); Pomerania, Rützenhagen (Holzfuss); Silesia; Prov. rhénana, Coeln (Bodewig); BELGIA: Namur (Gravet); Spiennes; BRITANNIA: Dorset (E. F. Linton, s. n. R. Balfourianus).

R. DUMNONIENSIS × CÆSIUS; *R. NAMNETICUS* Sud. — Habitus *R. dumnoniensis* Bab. sed turio rachisque parce glandulosa, foliola latiora, subtus minus pilosa, aculei rameales recti, inflorescentia brevis, parce pilosa, *sepala* patula, *petala* latiora. *Stamina* stylique pallida. Parum fertilis.

GALLIA: Loire-inf., Auverné (de l'Isle); Côtes-du-Nord, val André (Coilliot); GERMANY: Pomerania, Stettin (Holzfuss).

[X] — (T. CCIX) — *R. BALFOURIANUS* Bloxam in *Fasc. of Rub.* (1846), (nom. sol.); Bab. *Ann. N. H.* XIX, 68 (1847); Brit. *Rub.* p. 255, salt. ex pte; Genev. *Mon.* p. 27; *R. tenuiarmatus* Lees *Malv.* 51 (1852), sec. Bab.; *R. dumetorum f. vulgaris* Braecker *Deut. Rub. Art.* p. 94 (1882); *R. nemorosus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 185, ex pte; *R. ciliolentus* Kinscher *Bull. Assoc. pyr.* n° 407 (1909): *R. cæsius × Balfourianus* ej. l. c.; *R... ? × CÆSIUS*. — Exsicc.: *Rub. gall.* n° 49 (*R. nemorosus*!); Sud. *Bat. eur.* n° 667, 668 (*R. ciliolentus*!).

Turio planus vel obtusangulus, pubescens, epruinosus, subeglandulosus, aculeis subconformibus, leviter compressis munitus; *folia* plerumque 5-nata, subtus viridia et parce pilosa, mediocriter et inæqualiter dentata; *foliolum* terminale (1) late ovatum vel ovato-rhombeum, emarginatum, acuminatum, infima petiolulata; *ramus* pubescens; *inflorescentia* interrupta, foliosa, laxe pilosa, sparsim glandulosa, inermis vel aculeis raris munita, pedunculis ascendentibus; *sepala* cinereo-virentia, pilosa, parce glandulosa, in fructu patula vel erecta (2); *petala* (3) violacea, magna, ovata; *stamina* ± rosea stylos violaceos æquantia vel parum superantia; *antheræ* pilosæ (4); *germina* glabra vel apice parce pilosa; *fructificatio* non tota.

BRITANNIA ; GALLIA OCCIDENTALIS : Loire-inf., Vendée, Cher, Sarthe, Maine-et-Loire, Vosges. etc. ; GERMANIA : Schleswig-Holstein, Hambourg (Erichsen), Westphalia (Demandt), Silesia (Kinscher), Prov. rhenana (Bodewig) ; SUECIA MERIDION. (Erichsen) ; BELGIA : Watermael (du Pré).

OBS. — Babington et d'autres botaniques anglais ont apparemment confondu sous le nom de *R. Balfourianus* Blox. plusieurs formes distinctes. La plante de France, qui est le *R. Balfourianus* Gené., est identique à celle de Warwick (leg. Kirk) ; elle se rapproche de l'hybride suivant, mais en diffère par ses fleurs à organes colorés et ses anthères poilues. Elle est vraisemblablement un hybride fixé dont l'origine reste douteuse. — Le *R. maximus* var. *mixtus* Aresch. Some Obs. p. 75 (1886) semble n'être qu'une variation à anthères glabres du *R. Balfourianus* Blox.

R. MACROPHYLLUS × *CÆSIUS* Sud. ; *R. UMBELLIFORMIS* M. et Lef. *Vers.* n° 209 (1859) ; *R. amblycaulon* N. Boul. *Ronc. vosg.* p. 116 (1868), *nomen et exsicc.* (pr. sp.) ; *R. anceps* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 124 (1874) ; *R. elegans* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 28 (1887), *ex pte, non P.-J. Müll.* ; *R. nemorosus* Godr. ! p. p. ; N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 185, *ex pte* ; *R. dumetorum* × *vulgaris* Holuby. — Exsicc. : Billot *Fl. Gall. et Germ.* n° 1471 (s. n. *R. Balfourianus*) ; *Ronc. vosg.* n° 100 ; *Assoc. rub.* n° 124 ; Baenitz *Hb. eur.* n° 9932 ; *Rub. gall.* n° 200 ; Sud. *Bat. eur.* n° 669 !

Validus ; *turio* obtusangulus, pubescens, epruinosus, subeglandulosus, aculeis subæqualibus, leviter compressis munitus ; *folia* 5-nata, ampla, subtus viridia pubescentiaque, mediocriter et inæqualiter serrata ; *foliolum* caul. terminale late ovatu n, cordatum, acuminatum, infima petiolulata ; *ramus* pubescens, subeglandulosus ; *inflorescentia* interrupta, foliosa, breviter pilosa, glandulis rarissimis, brevibus, aculeis sparsis, debilibus instructa ; *sepala* tomentosa, pilosa, subeglandulosa, post anthesin patula vel erecta ; *petala* alba vel dilute rosea, late ovata ; *stamina* alba stylis virescentes superantia ; *anthereæ* glabrae ; *germina* glabra ; *receptaculum* pubescens.

GALLIA : Aisne, bois de Montigny-Lallier (Questier) ; Oise, Antilly (Lefèvre) ; Meurthe-et-Moselle, Nancy (Godron) ; Seine-et-Oise, Montmorency (B. de Lesdain) ; Seine-inf., Aumale (Questier) ; Vosges, St-Dié (Boulay) ; GERMANIA : Silesia (Baenitz) ; Saxonia (Hofmann) ; Prov. rhenana, Malmédy (Bodewig) ; Pomerania.

OBS. — Le *R. amblycaulon* N. Boul. se rapproche du *R. Balfourianus* Blox. par son inflorescence glanduleuse, ses pétales roses, mais à les anthères glabres ; il semble bien dériver aussi du *R. macrophyllus*.

R. CÆSIUS × *MACROPHYLLUS* ; *R. BAENITZII* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 316. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 8543 ! ; *Herb. dendr.* n° 1455.

Turio subteres, glaucescens, parce pilosus ; *folia* 3-5-nata, foliolis latis, sese tegentibus ; *foliolum* terminale suborbiculare ; *inflorescentia* parce glandulosa ; *sepala* in fructu erecta.

GERMANIA : Silesia, Breslau (Baenitz) ; Prov. rhenana, Adenau-Leimbach (Bodewig).

R. EGLANDULOSUS × *CÆSIUS* ; *R. SEMIEGLANDULOSUS* Sud. *Diagn.* p. 57 (1906). — Habitus *R. eglandulosi* M. et Lef. sed *turio* subteres, glaber ; *aculei* subinæquales, parum compressi ; *ramus* parce glandulosus, heteracanthus, aculeis subrectis ; *inflorescentia* brevis, parce glandulosa ; *sepala* glandulosa, patula vel laxa reflexa ; *petala* orbiculata. Parum fertilis.

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

R. ORBIFOLIUS × *CÆSIUS* ; *R. PERACUTIFRONS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 159 (1905). — Exsicc. : *Assoc. rnb.* n° 300 (s. n. *R. vinealis* non M. et T.), 400, 463, 593 (s. n. *R. discoidae*, non P.-J. Müll.). — Validus ; *turio* obtusangulus, pilosus, eglandulosus, aculeis subæqualibus ; *folia* pleraque 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia, argute serrata ; *foliolum* terminale cordato-orbiculare, breviter acuminatum, omnia sese tegentia ; *inflorescentia* laxa pilosa, parum armata, parce glandulosa vel eglandulosa ; *sepala* tomentosa, in fructu reflexa vel ± erecta ; *petala* magna, orbiculata, alba vel dilute rosea ; *stamina* stylique ± colorata ; *germina* glabra. *Fructus* male evolutus.

GALLIA : Saône-et-Loire, Monthelon (Gillot) ; Villadieu, près le Creuzot (Quincy) ; Mont (Basset).

R. SCHLECHTENDALII × *CÆSIUS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 159 (1905) ; *R. PUBICAULIS* M. et Lef. *Vers.* n° 210 (1859), non Gen. Mon. p. 55 ; *R. amictiformis* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 56 (1902). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 174 ; *Hb. rub. rar.* n° 35 !

Turio obtusangulus, dense pilosus, eglandulosus, aculeis tenuibus, pallidis, subæqualibus munitus ; *folia* 5-nata, supra parce pilosa, subtus viridia, pubescentia, mediocriter dentata ; *foliolum* terminale suborbicularis, cordatum, acuminate, infima subsessilia ; *ramus* pilosus, parce glandulosus ; *inflorescentia* subinermis, densa, laxa pilosa, parce glandulosa ; *sepala* tomentosa, inermia, laxa reflexa vel ± erecta ; *petala* alba, ovata ; *stamina* alba stylis virescentes superantia. Substerilis.

GALLIA : Oise, bois de Fontaines, près de Neufchâtel, forêt de Retz (Lefèvre) ; Marne, bois de Mersy (Levent) ; Aisne, Solembray, près Longueval (Malinvaud) ; BELGIA : Torgny (Dolisy).

c. × e Nemorensibus

R. SILVATICUS × *CÆSIUS* Sud. ; *R. FLAVICOMUS* Boul. et Malbranche *Assoc. rub. exsicc.* n° 258 (1877), pr. sp. ; *R. Friesii* G. Jensen *Bot. Tidsskr.* XVI, 112 (1887) ; *R. nemorosus* B. Friesii Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 639.

Gracilis ; *turio* teres, epruinosus, glabrescens, eglandulosus, aculeis subconicis, inæqualibus munitus ; *folia* 3-5-nata, grosse serrata, subtus viridia ; *foliolum* caul. terminale ovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum ; *inflorescentia* brevis, laxa, glandulosa, parum pilosa, aculeis sparsis, debilibus munita ; *sepala* tomentosa, glandulosa, ± erecta ; *flores* albi.

GALLIA : Seine-Inf., Rouen (Malbranche) ; Eure, Verneuil (Jourdes) ; GERMANIA BOREALIS : Slesvig (K. Friderichsen) ; Pomerania, Lauenburg (Holzfuss).

R. NEMORENSIS × *CÆSIUS* Sud. ; *R. SEDINENSIS* Holzfuss *Allg. Bot. Zeit.* (1909) n° 6. — Exsicc. Sud. *Bat. eur.* n° 670 ! — Habitus *R. nemorensis* L. et M. sed foliola breviter petiolulata, rachis glandulosior, petala majora, latiora. Sepala reflexa ; *stamina* longa.

GERMANIA : Pomerania, Stettin (Holzfuss).

R. EGREGIUS × *CÆSIUS* ; *R. EGREGIUSCULUS* K. Frid. et Gel. *ex pte, Rub. Dan. Slesv.* p. 121 (1888).

Gracilis ; *turio* glabrescens, epruinosus, parce glandulosus, aculeis tenuibus, inæqualibus munitus ; *folia* 3-4, interdum 5-nata, subtus viridia, grosse serrata ; *foliolum* terminale obovatum vel ovatum ; *rachis* parum pilosa, glandulis brevibus, aculeis sparsis instructa ; *sepala* glandulosa ; *flores* albi ; *stamina* longa.

GERMANIA BOREALIS : Slesvig (Friderichsen et Gelert) ; Pomerania, Zershoet (Holzfuss).

B. — × e Discoloroidibus

a — × e Subvirescentibus

(T. CCIX) — *R. VILLICAULIS* × *CÆSIUS* N. Boul. *ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 136 (1900) ; *R. WAHLBERGII* Arrhen. *Rub. Suec.* 43 (1840) ; Focke *Syn.* p. 400 et *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 646 ; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 62 ; *R. fructicosus* var. *intermedius* Wahlenb. *Fl. Suec.* ed. II vol. 1 p. 330 ; *R. corylifolius* Hartm. *Scand. Fl. ed.* III p. 120, p. p. — Exsicc. : *Rub. gall.* n° 197 ; Cl. Magnier *Fl. sel.* n° 1661.

Robustus; *turio angulatus*, subepruinosus, fere glaber, aculeis validis, subæqualibus, compressis instructus; *folia* (5) *caul.* 5-nata, supra glabra, subtus pallida, cinereo-pubescentia, grosse et inæqualiter srrata; *foliolum terminale* *cordato-orbiculare*, acuminatum, infima subsessilia, omnia lata, sese tegentia; *ramus angulosus*, pubescens, leviter heteranthus, aculeis validis munitus, foliis \pm cinereo-pubescentibus; *inflorescentia* laxe pilosa, aculeis validis, crebris, glandulis sparsis munita (6); *sepala* tomentoso-viridia, parce glandulosa aculeataque, in fructu reflexa vel patula; *petala* (7) magna, pallide rosea; *stamina* alba stylos virentes superantia; *germina* glabra.

SUECIA MERIDIONALIS, DANIA, GERMANIA BOREALIS, GALLIA : Nord, Phalempin (Boulay).
 Obs. — Je n'ai pas vu de spécimens de la var. *columnifolius* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 647 (1903), qui croît en Bohême et en Hongrie et dont l'origine est probablement différente.

R. CAESIUS × *VILLICAULIS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspl. p. 159 (1905); *R. PRUINOSUS* Arrhen. Rub. Suec. Mon. 15 (1840) ex pte; Focke Syn. p. 405; *R. eu-pruinosis* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 630; *R. maximus* var. *pruinosis* (1840) ex pte; Focke Syn. p. 79; *R. maximus* v. *coriatus* et var. *angiocarpus* Aresch. l. c. 71; *R. acutus* Lindbg. in Aresch. Some Obs. g. Rub. p. 79; *R. maximus* v. *inhorrens* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI, 630 (1902); *R. treviranioides* Kinscher Goetel. Kungl. Vet. Vitt. (1884) p. 6; *R. inhorrens* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI, 630 (1902); *R. treviranioides* Kinscher Goetel. (1900) — Exsicc. Sud. Bat. eur. n° 671.

Repert. (1909). — *Exsicc.* : Sud. *Bul. Eur.* II-671.
Turio subteres, prostratus, pruinosis, glaber, ± erubescens, aculeis brevibus, subconicis, inaequalibus munitus; folia 3-5-nata *R. Wahlbergii* revocant, sed foliolis breviter petiolulatis; *inflorescentia* parce glandulosa; *sepala* in fructu laxe erecta; *flores* albi. Substerilis.

SUECIA MERIDIONALIS. GERMANIA BOREALIS: *Silesia, Pomerania.*

R. INSULARIS × *CÆSIUS* K. Frid. et Gel. *Rub.* *Dan. Rés.* fr. p. 25; *R. CYCLOPHYLLUS* Lindg. *Hb. rub.* *Scand.* n° 48, 49. — Exsic. : *Rub.*

SUMMA PREDICIONALIS

R. LANGEI × *CÆSIUS* Sud. ; *R. CILIATUS* Lindbg. *Hb. rub. Scand.* n° 50, 51 (1883) ; *K. Frid. et Gel. Rub. Dan. Rés. fr. p. 28* ; *R. divergens* Neuman *Oevers. K. Vet. Akad. Foerh.* (1883) n° 8 p. 79; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 640, non P.-J. Müll.* (1838); *R. Balfourianus* Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 60, non Blox. ; *R. nemorosus* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI p. 135, p. 8,* *an Hayne in Arzngw.* III t. 10 (1813) ? ; *Exsicc. : Lindebg. l. c. ; Rub. gall. n° 198*; G. Braun n° 145. — *Turio obtusangulus*, *R. dumetorum* f. *campostachys* G. Br. *Hb. rub. germ.* — *Emarginatum*, *acuminatum* ; *ramus pubescens*, *aculeis debilibus munitus* ; *inflorescentia parum armata*, *glandulosa* ; *sepala glandulosa*, *glaucescens*, *glaber*, *aculeis inaequalibus* ; *folia 5-nata*, *supra glabra*, *subtus ± cinereo-pubescentia* ; *foliolum terminale late ovatum*, *emarginatum*, *acuminatum* ; *petala alba vel pallide rosea* ; *stamina alba stylos pallidos superantia* ; *antheræ pilosæ*.

SUECIA MERIDIONALIS DANIA GERMANIA BOREALIS.

b = x e Subdiscoloribus

R. ARGENTEUS \times *CÆSIUS*; *R. ARGENTEIFORMIS*. — Habitus *R. argentei* W. sed parum discolor, foliola latiora, inflorescentia corymbosa, petala suborbicularia, calyx erectus vel patulus.

Scleropodium touzani, circa Coeln, Felderhoferbrücke (Bodewig).

R. CÆSIUS × *ARLEGEGTEUS*?; *R. WARMINGII* G. Jensen *Bot. Tidsskr.* XVI (1887) p. 122; Frid. et Gel. *Rub. Dan.* p. 122; *Rés. fr.* 27; Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI, 629. — *Exsicc.*; Baenitz *Hb. eur.* (ann. 1889). — *Turio pilosus* subteres; *folia* inæqualiter dentata, subtus pubescentia, superiora ± cinerascentia, caulina 3-5-nata, foliolis termina-*libus cordato-orbicularibus*; *inflorescentia* breviter pilosa, glandulis raris vel nullis; *flores* albi, spectabiles; *germina* pilosa.

DANIA : Jutland : GERMANIA BOREALIS : Schleswig-Holstein.

R. CÆSIUS × CONSOBRINUS; R. DIVIXIS Sud. in hb. Bor. et in Bouvet Rub. Anj. (1903) p. 688. — *Turio teres*, glaber, aculeis subconformibus; *folia* superiiora subtus \pm cinerascentia; *foliola lata*; *inflorescentia* laxe pilosa, glandulis brevibus, sparsis, aculeis validis instructa; *sepala* tomentosa, pilosa, inermia. Sterilis.

GALLIA : Maine-et-Loire, Ste-Gemmes-s.-Loire (Genevier) ; Angers, à S'Nicolas (Bouvet).

R. INCARNATUS \times *CÆSIUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 88 (1902) ; *R. CALLIANTHUS* P.-J. Müll. in *Pollich.* 16 p. 294 (*nomen*) ; in *Flora B. Z.* (1859) p. 237 (*pr. sp.*) ; *Focke Syn.* p. 401 ; *R. bifrons* \times *cæsius* *Focke l. c.* 402. — *Exsicc.* : *Wirtg. Hb. rub. rk. ed.* 1 n° 26 (*R. dumetorum v. velutinus*) , 110 ; *ed.* 2 n° 83 ; *Sud. Rub. rar.* n° 175. — *Habitus R.. incarnati* P.-J. Müll. sed *turio obtusus* glabrescens, *ramus teres*, *pedunculi tomentosi*, *petala lata*, *stipula lanceolata*. *Folia* 5-nata, *argute serrata*, *supra glabra*, *subtus cinerea* vel *albo-tomentosa* pubescentiaque ; *foliolum terminale* late ovatum, *leviter emarginatum*, *acuminatum*, *intima petiolata* ; *inflorescentia* eglandulosa, *aculeis* *falcatis* *munita* ; *sepala* tomentosa, reflexa vel patula ; *petala* rosea ; *antheræ* glabre. — *Localité* : *Saale-Elbe* (Hesse) ; *Akazie* Weiß-

GERMANY: Prov. *rhenana*, Hecken, prope Niederlahnstein (Wirtgen); Bergheim (Bodewig); *Guestphalia* (Hasse); *Alsacia*, Weis-
senburg (Müller); **GALLIA**: *Seine-inf.*, Aumale; *Valois*, forêt de Villers-Cotterets (Questier).

R. CÆSIUS × INCARNATUS Sud. ap. Gandg. Nov. Consip. p. 159 (1905); R. CARNEISTYLUS P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 179, non Genev. Mon. 15; R. nemorosus N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI p. 135, ex pte. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 672! — Turio subteres, fere glaber, subglabris, inaequaliter cressens, glandulis nullis vel raris, aculeis compressis, subconformibus munitus; folia 5-nata. subtus subviridia et parce pilosa, inaequaliter dentata; foliolum terminale ovatum vel suborbicularie, cordatum, acuminatum; ramus eglandulosus, pubescens; inflorescentia brevis, foliosa, breviter pilosa, glandulis sessilibus, aculeis brevibus, falcatis instructa; sepalata tomentosa, subeglandulosa, ± patula; petala dilute rosea; stamina alba stylos carneos parum superantia; antheræ ± pilosæ; germina glabra. R. Balfouriano Blox. similis a quo differt turionibus teretibus, glaucis, subglabris, inflorescentia eglandulosa.

GERMANY: Alsacia, bords de la Lauter, vis-à-vis Saint-Germain; clairières au Bienwald, près de Weissenburg (Muller).

R. CRYPTADENES × *CÆSIUS*; *R. CRYPTADENOMORPHUS* Sud. — Habitus *R. cryptadenis* sed turio glaucescens, aculei recti, folia subtus viridie, petio alba orbicularia, sena patula vel erecta.

Sainte-Cécile, à 15 km d'Epfig, près Montfort-l'Amaury, route de la Renardière aux Bréviaires, parc de Dampierre (M^e Bélèze).

R. CRYPTADENES var. *flexicaulis* \times *CÆSIUS*; *R. SEMIFLEXICAULIS* Sud. et Bouvet in Bouv. *Rub. Anj.* (1907) p. 79. — *Habitus R. cryp.* var. *flexicaulis* sed aculei debiliores, inæquales, foliola latiora, inflorescentia brevis, laxa, appresse pilosa, petala orbicularia. Parum fertilis.

Musca lata Montfaucon, au bas des coteaux de la Mayenne (Bouvet).

GALLIA : Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay, au bas des coteaux de la Mayenne (Bouc).
R. OPLOTHYRSUS × CÆSIUS; *R. oplothyrsoides* Sud. in hb. Gentil. — Exsicc.: Sud. Bat. eur. n° 673! — *Turio angulosus*, glaber, glaucescens, glandulis brevibus, sparsis, aculeis validis, compressis, subconformibus munitus; *folia* 5-nata, subtus cinereo-tomentosa, pubescens; *foliolum* terminale cordato-ovatum, acuminatum; *ramus* pubescens, parce glandulosus; *inflorescentia* brevis, pilosa, parce glandulosa, aculeis validis armata; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa, laxe reflexa; *petala* alba vel dilute rosea; *stamina* alba, longiora, rara, raro exserta; *carpellus* glabra.

stylos virentes vix superantia; germina glabra.

R. GNEISSOGENES × *CÆSIUS*; *R. PSEUDO-GNEISSOGENES* Sud. *Rub. tain.* p. 59 (1909). — *Turio angulosus*, glaber, parce glandulosus aculeis inæquibus munitus; *folia* 5-nata, subtus cinereo-tomentosa, pubescentia; *foliolum* terminale obovatum vel ovatum; *inflorescentia* glandulosa, aculeis crassibus munita; *sepalum* tomentosa, in fructu + erecta; *flores* albi. Sterilis.

obtusa, multiflora, glandulosa, aculeis crebris in-

R. POLYANTHEMUS × CÆSIUS; *R. WARRENII* Sud. *Obs. Set. of Brit. Rub.* n° 132 (1904); *R. dumetorum* var. *concin-nus* Warren *Journ. Bot.* (1870), 158; Rogers *Handb.* p. 95.

Turio angulatus, epruinosus, glabrescens, glandulis raris, aculeis subconformibus, validis munitus; *folia* 3-5-nata, minute serrulata, subtus pilosa, superiora ± cinerascentia; *foliolum* terminale late ovatum, leviter emarginatum, tenuiter acuminatum; *inflorescentia* laxe pilosa, sparsim glandulosa aculeataque; *sepala* patula; *petala* pallide rosea; *germina* glabra.

BRITANNIA: *S. Derbyshire*, Bradley (W. R. Linton); *Surrey*; *Leicester*, Lancaster, York, etc. (sec. Rogers); GERMANIA: *Pomerania*, Zatnick (Holzfuss).

R. LASIOTHYRSUS × CASIUS; *R. HEMIASIOTHYRSUS* Sud. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 674! — *Turio* pubescens, glaucescens, aculeis compressis; *folia* 3-5-nata, argute serrata, utrinque pilosa, subtus cinerascentia; *foliolum* terminale suborbicularare, cordatum; *rachis* pilosa, breviter glandulosa; *flores* albi; *petala* orbicularia; *sepala* patula vel reflexa.

GALLIA: *Haute-Garonne*, circa Aspet.

R. CÆSIUS × LASIOTHYRSUS; *R. OLEIVIRENS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 91 (1900).

Turio teres, glaucescens, dense pilosus, subglandulosus, aculeis brevibus, inæqualibus; *folia* pleraque 3-nata, argute serrata, subtus viridia; *foliolum* terminale late ovatum, basi integrum, cuspidatum; *inflorescentia* elongata, pilosa, glandulis brevibus, aculeis debilibus munita; *sepala* patula. Sterilis.

GALLIA: *Ariège*, vallée du Salat, en amont de Seix.

R. ALBIFLORUS × CÆSIUS; *R. SEMIALBIFLORUS* Sud. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 675.

Turio angulatus, fere glaber, subepruinosus, parce glandulosus, aculeis subconformibus munitus; *folia* 5-nata, magna, flaccida, inæqualiter dentata, subtus cinerascentia pubescentiaque; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbicularare, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* laxe hirsuta, sparsim glandulosa, subinermis; *sepala* tomentosa, pilosa, laxe reflexa; *flores* albi; *stamina* styllos pallidos superantia.

GALLIA: *Saône-et-Loire*, Bourg-le-Comte (Château), Mont (Basset); *Côte d'Or*, La Roche-en-Breuil (Gillot); *Cantal*, Massiac (Charbonnel); *Ardèche*, St-Jean-de-Muzols (Revol); HELVETIA: *Thurgau*, Rodenberg, Schaffhouse (R. Keller).

R. ALTERNIFLORUS × CÆSIUS; *R. SEMIALTERNIFLORUS* Sud. *Diagn.* p. 57 (1906).

Habitus *R. alterniflori* L. et M. sed *turio* glaber, aculei subinæquales, *inflorescentia* brevis, *petala* lata. *Sepala* reflexa, *inflorescentia* breviter glandulosa.

GALLIA: *Valois*, four à chaux de Thury (Questier); *Seine-inf.*, Rouen (Malbranche); BRITANNIA, *Cheshire* (Wolley-Dod).

R. OREIGENUS var. *pubescens* × *CÆSIUS*; *R. INFRAPALLENS* Sud. *Diagn.* p. 57 (1906). — Habitus *R. oreigeni* var. *pub.* sed aculei recti, debiliores; *foliolum* terminale latiore, *inflorescentia* brevis, glandulosior. — *Turio* pubescens, parce glandulosus; *serratura* tenuis, *rachis* breviter pilosa, parum armata.

GALLIA: *Valois*, Lévignen (Questier).

OBS. — Le *R. corylifolius* Sm. *Fl. Brit.* 542 (1800); *R. sublustris* Lees in *Steele*. 54 (1847); *R. corylifolius* a *sublustris* Leight. in *Phyt.* 161 (1848); Bab. *Brit. Rub.* p. 362; Rogers *Handb.* p. 96, tel qu'il est représenté par le n° 106 de *Set of Brit. Rub.*, paraît être un *R. ALTERNIFLORUS herefordensis* × *CÆSIUS* Sud. *Obs. Set.* p. 30. — *Turio* teres, glaucescens, glaber, subglandulosus, aculeis parum inæqualibus munitus; *folia* 3-5-nata, minute et inæqualiter serrata, supra subtus cinereo-tomentosa pubescentiaque; *foliolum* caul. terminale cordato-orbicularare, acuminatum, infima sessilia; *inflorescentia* tomentosa, parce pilosa, subinermis, glandulis subsessilibus sparsis instructa; *calyx* reflexus; *petala* alba; *stamina* stylos pallidos superantia; *germina* leviter pilosa. — BRITANNIA: *S. Derby*, Ednaston (W. R. Linton), etc...? — On a donné le nom de *R. corylifolius* aux formes les plus diverses!

R. SUEVIACUS × CÆSIUS; *R. SEMISUEVIACUS* Sud. — Pubes et tomentum ut in *R. sueviaco* Sud.; *inflorescentia* parce glandulosa, *sepala* ± erecta.

GERMANIA: *Bavaria*, Wengen, prope Neuburg (Zinsmeister).

R. PHYLLANTHOIDES × CÆSIUS; *R. LACAUNENSIS* Sud. *Rub. tarn.* p. 59 (1909). — Exsicc.: Sud. *Rub. rar.* n° 176! — *Turio* subteres, parce glandulosus, aculeis inæqualibus; *folia* 5-nata, subtus pilosa, cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale cordato-orbicularare, acutum; *ramus* aculeis validis, glandulis brevibus munitus; *sepala* glandulosa, reflexa; *flores* albi. Sterilis.

GALLIA: *Tarn*, Lacaune, infra Bel-Air.

R. VALDEPROXIMUS × CÆSIUS; *R. MURIVAGUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 180 (1902). — *Turio* teres, glabrescens, parce glandulosus, aculeis inæqualibus; *folia* 5-nata, subtus pilosa, cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale orbicularare, cordatum, acutum; *ramus* aculeis validis, glandulis brevibus munitus; *sepala* glandulosa, reflexa; *flores* albi. steriles.

GALLIA: *Hautes Pyrénées*, vallée de Louron, à Bordères.

R. OBVALLATUS × CÆSIUS; *R. CEREINUS* Sud. *Bull. Soc. bot. Fr.* (1904) p. 26 — *Turio* teres, glaber, glaucescens, aculeis inæqualibus munitus; *folia* 5-nata, superiora subdiscolora; *foliolum* terminale suborbicularare vel ovatum; *ramus* glabrescens, glandulis sparsis munitus; *inflorescentia* parum pilosa, sparsim glandulosa; *calyx* patulus vel reflexus; *flores* albi, substeriles.

GALLIA: *Puy-de-Dôme*, Chassaignes, prope Thiers (Arbost); *Cantal*, inter Polminhac et Vic.-s.-Cère; *Tarn*, Lacaune, prope l'Ouradou.

c. — × ex Imbricatis

R. IMBRICATUS × CÆSIUS; *R. IMBRICATIFORMIS* Sud. ap. Bouvet *Rub. Anj.* p. 688 (1903); *R. Mougeottii* Gen. Mon. 62; *R. rotundifolius* ej. prius, non P.-J. Müll. p. p., non Billot; *R. tuberculatus* J. W. White exsicc., non Bab. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 676.

R. imbricatus Hort admodum similis a quo differt: foliolis latioribus, tegentibus, caulinus terminali cordato-orbiculari; *inflorescentia* parce glandulosa, sepalis in fructu laxe erectis, petalis suborbicularibus. *Turio* teres, epruinosus. Substerilis.

β. *SEMISAXONICUS*; *R. imbricatus* var. *saxonicus* × *cæsius*. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 677! — Validus; *turio* angulatus; *folia* magna, subtus cinereo-tomentosa, *sepala* reflexa.

GALLIA: *Maine-et-Loire*, St-Christophe-des-Bois (Genevier); *Vendée*, Mortagne, la Châtaigneraie (Charrier); BRITANNIA: *Somerset* (White). — β. GERMANIA: *Saxonia*, Bosel, prope Meissen (Hofmann).

R. RECOGNITUS × CÆSIUS; *R. PSEUDO-RECOGNITUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 59 (1909). — *R. cognito* similis, sed *turio* subteres, glaucescens, parce glandulosus; stipulae latæ, *inflorescentia* brevis, parce glandulosa, *petala* latiora. *Folia* subdiscolora, *flores* albi, parum fertiles.

GALLIA: *Tarn*, Villefranche, via Alban.

R. CARDIOPHYLLUS × CÆSIUS; *R. VALESIENSIS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 88 (1902). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 678 !

Robustus; *turio* obtusangulus, glaber, aculeis validis, subæqualibus armatus; *folia* ut in *R. cardiophyllum* sed foliolis latoribus, breviter petiolulatis, terminali cordato-orbiculari, cuspidato; *folia* superiora discolora; rachis breviter pilosa, sparsim glandulosa; calyx reflexus. Sterilis.

GALLIA : *Valois*, bois de Thury, Gros Aulnoy (Questier).

III. — X e Discoloribus

A. — X e Gypsocaulonibus

[X] — (T. CCIX) — *R. MARTRINII* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1899) p. 95; *Rub. Pyr.* p. 88, 179; *R. bifrons* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 203, non Vest. — Exsicc. : *Rub. gall.* n° 97; *Bat. eur.* n° 679 !

Robustus; *turio* obtusangulus, glaber, glaucescens, eglandulosus, aculeis subæqualibus, rectis, compressis armatus; *folia* caul. 5-nata, supra obscure viridia et fere glabra, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa, argute mucronato-serrata; *foliolum* terminale (8) obovato-orbiculare, leviter emarginatum, cuspidatum, infima subsessilia; ramus obtusus, glaucescens; *inflorescentia* interrupta, foliosa, densa, obtusa, subepilosa, eglandulosa, aculeis debilibus munita; pedunculi ascendentis; pedicelli breves; *petala* tomentoso-viridia, inermia, eglandulosa, in fructu reflexa(9); *petala* suborbicularia, rosea; *stamina* alba vel dilute rosea stylos virescentes vel roseos parum superantia; *germina* glabra. *Fructus* ater, magnus, epruinosus. — Habitus *R. imbricati* Hort.

GALLIA : *Tarn*, in regione montosa frequens; *Aveyron*; *Pyrénées*.

OBS. — Apparemment hybride fixé des *R. ulmifolius* et *cæsius*; toutefois se distingue toujours aisément du *R. AMPLIFOLIATUS*.

R. MARTRINII × ULMIFOLIUS; *R. PERSPIRIUS* Sud.; *R. spurius* Sud. *Rub. Pyr.* p. 89 (1900), non Halacsy. — Turio angulatus, folia discolora, inflorescentia multiflora. Sterilis.

GALLIA : *Ariège*, Ax-les-Thermes, à l'O. du Teich.

R. MARTRINII × TOMENTOSUS Lloydianus; *R. RECIPES* Sud. *Rub. tarn.* p. 59 (1909). — Folia albo-tomentosa, grosse serrata; pedicelli elongati, graciles; flores albi, steriles.

GALLIA : *Tarn*, La Garde-Viaur.

R. MARTRINII × TOMENTOSUS ancophilus; *R. PSEUDO-MARTRINII* Sud. *l. c.* 59. — Differt a *R. Martrinii* foliis discoloribus, rachide pilosa, floribus albis, sterilibus.

GALLIA : *Aude*, inter Escouloubre et Usson (Sudre et Marty).

R. MARTRINII × glandulosis; *R. MARTYI* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1910) p. 292. — Differt a *R. Martrinii* turionibus gracilioribus, heterocanthis; inflorescentia brevi, subcorymbosa, glandulosa; floribus albis, staminibus brevibus, sepalis laxe erectis, fructu abortivo.

GALLIA : *Aude*, inter Escouloubre et Usson (Sudre et Marty).

R. MARTYI × ULMIFOLIUS; *R. ATACICUS* Sud. *l. c.* (1910) p. 292. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 177 ! — Validus et subeglandulosus; *turio* pruinosus; folia 5-nata, subtus viridia vel leviter cinerascentia; inflorescentia multiflora; flores vive rosei, steriles; calyx reflexus.

GALLIA : *Aude* (Atax), inter Escouloubre et Usson.

R. MARTRINII × CÆSIUS; *R. MONTICULORUM* Sud. *Rub. Pyr.* p. 90 (1900). — A *R. Martrinii* distinguitur: foliis subviridibus, aculeis minoribus, sepalis patulis, floribus pallidis, sterilibus.

GALLIA : *Ariège*, Ax; *Tarn*, Cambon.

(T. CCIX) — *R. ULMIFOLIUS × CÆSIUS*; *R. AMPLIFOLIATUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 204 (1898); *Rub. Pyr.* p. 29, 181; *Rub. Hb. Bor.* p. 89; Bouvet *Rub. Anjou* (1907) p. 83; *R. sepium* Rip. in Gen. *Mon.* p. 45, p. p.; *R. patens* Merc. in Reut. *Cat. pl.* Genève, 2^e ed. 265 (1861), p. p.; *R. Mousseotii*, *callianthus*, *psammophilus*, *dyscolus*, *titanophilus*, *diversifolius*, *degener*, *discoideus* Gen. *Mon.*, sali. ex pte.

Formæ validæ; *turio* glaucescens, obtusangulus, glabrescens, subeglandulosus, aculeis validis, subconformibus munitus; *folia* 5-nata, supra glabra, subtus cinereo-tomentosa (in umbrosis subviridia); *foliola* (10) ampla, marginibus sese tegentia, terminale latum; *inflorescentia* ± corymbosa, parce pilosa, subeglandulosa; *sepala* vulgo patula; *flores* plerumque rosei, substeriles.

α. *VULGARIS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 89; *R. chalarostachys* M. et Timb. *Bonpl.* (1861, *nomen sol.*); *R. arenarius* M. et Timb. *exsicc.*; *R. vinealis* M. et Timb. *Assoc. rub.* n° 47; *R. dilatatus* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 302; *R. latifolius* Boul. et Bouv. *Assoc. rub.* n° 203; Gen. *Mon.* p. 66. — Exsicc. : *Bat. eur.* n° 46, 680. — Foliolum caul. terminale suborbicularis, cordatum, cuspidatum; inflorescentia ampla, brevis. Variat foliis subtus viridibus, serratura tenui [R. Hochstetterorum Seubert *Fl. Azor.* p. 48 (1844)].

β. *THAMNOCHARIS* Sud. *l. c.* p. 89; *R. thamnocharis* P.-J. Müll. *Vers.* n° 205 (1859); Gen. *Mon.* p. 65, p. p. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 681 ! — Foliolum caul. terminale minus latum, leviter emarginatum, cuspidatum; serratura tenuis; inflorescentia ± elongata; *stamina* stylique rosea.

γ. *EUBELOPHORUS* Sud. *Diagn.* p. 58 (1906). — Differt a var. β. foliolo terminali obovato, inflorescentia eglandulosa, aculeis crebris, validis, rectis armatissima.

δ. *THAMNOPHILUS* Sud. *Diagn.* p. 58 (1906). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 178 ! — Differt a var. β. foliis amplioribus, discoloribus, grosse serratis, inflorescentia latiore.

ε. *ACANTHOPHORUS* Sud. *l. c.* 58. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 682 ! — Foliolum terminale latum, cordatum; inflorescentia elongata, armatissima; flores albi.

ζ. *ACEROSUS* Sud. *l. c.*; *R. acerosus* P.-J. Müll. *ined.* — Exsicc. : Sud. *Hb. Rub. rar.* n° 18 ! — Folia discolora, minute serrata; inflorescentia armatissima, glandulosa; *sepala* ± aculeata.

η. *INAEQUIDENTATUS* Sud. *l. c.* — Foliola lata, grosse et inæqualiter dentata; inflorescentia elongata, parum armata, foliosa.

GALLIA, HELVETIA, ITALIA, BELGIA, HISPANIA, LUSITANIA, etc.

(T. CCIX). — *R. CÆSIUS × ULMIFOLIUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 30; *Rub. Hb. Bor.* p. 90; *R. ASSURGENS* Boul. et Bouvet (*sensu amplio*) *Assoc. rub.* n° 54, 401 (1873); Gen. *Mon.* p. 24 (*pr. sp.*); Bouvet *Rub. Anj.* p. 80 (1907); *R. flagellaris* Lef. et M. Vers. n° 202 (1859) non Willd.; *R. patens* Merc. ex pte; *R. leptocaulon* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 56 (1873); *R. conglomeratus* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 57, 129; *R. rubriflorus* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 130, 303, 304; *R. debilitatus* Rip. ap. Genev. *Mon.* p. 13, ex pte; *R. uncinellus* Gen. *Mon.* p. 5, ex pte; *R. stelliger* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 51, 32, 53, 132, 133, 134, 305, 306, 350, 351, 352, 353; *R. adventitius* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 55, 354, 525; *R. depressus* Boul. et Tuezk. *Assoc. rub.* n° 135, 307; *R. crenulatus* Boul. et Luc. *Assoc. rub.* n° 403; *R. sepium* Rip. in Gen. *Mon.* p. p.; *R. rosetflorus* Gen. *Mon.* p. 6, p. p., non P.-J. Müll.; *R. deltifolius* Gen. *l. c.* p. 7; *R. Lecogii* Gen. 1^{er} suppl. p. 27 (1872); *R. Provostii* Gen. *Ess. mon.* p. 21 (1869); *Mon.* p. 21; *R. latebrosus* Rip. in Gen. *Mon.* p. 25; *R. laxatus* Rip. et Gen. *Mon.* p. 30 (1880); *R. vinosus* Boul. et Luc. *Assoc. rub.* n° 349; *R. reflexicalyx* Boul. et Let. *Assoc. rub.* n° 206 (1875); Ch. Magn. n° 530.

Rubi ± debiles; *turio* pruinosus, obtusangulus vel teres, aculeis inaequalibus munitus; *folia* caul. (11) 3-5-nata, subtus viridia; inflorescentia tomentosa, epilosa, ± glandulosa; sepala in fructu ± erecta (12); flores vulgo rosei, steriles vel parum fertiles.

a. VULGARIS Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 90; *Bouv. Rub. Anj.* (1907) p. 80. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 54, 401, 587; Sud. *Bat. eur.* n° 98. — Aculei caulinis subaequales; folia argute serrata; foliolum caul. terminale (11) breviter obovatum, cuspidatum; inflorescentia glandulosa; flores rosei. Variat aculeis creberrimis (s.-var. *ferox* Sud. *Rub. Pyr.* p. 30), inflorescentia eglandulosa (*R. Provostii* Gen. — Exsicc. *Bat. eur.* n° 683).

b. UNCINELLUS; *R. uncinellus* Lef. et M. Vers. n° 233 (1859). — Aculei petiolares ra mealesque adunci; inflorescentia brevis, corymbosa, subglandulosa; flores albi. Cetera ut in var. *a.*

c. POLYADENES Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 90 (1902); *R. pusillus* Gen. *Mon. p. p.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 684. — Differt a var. *a* aculeis crebrioribus, inaequalibus; turione glanduloso; inflorescentia aculeis crebris, glandulis longis, rubris, inaequalibus obsita.

d. ARVINUS Sud. *in hb.* Müller: *R. arvinus* Lef. et M. Vers. n° 232 (1859). — Folium caul. terminale ovatum, emarginatum; serratura grossa; inflorescentia elongata, dense glanduloso-aculeata; flores dilute rosei.

e. BELLIATUS Sud. *l. c.*; *R. bellatus* P.-J. Müll. *ined.* — Folia caul. 3-nata, argute serrata; foliolum terminale orbiculato-deltoideum, emarginatum, acutum; aculei inaequales, inflorescentia brevis, glandulosa; flores pallidi.

f. CARNEISTYLUS Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 91 (1902); *R. carneistylus* Gen. *Mon. p. p.*, non P.-J. Müll. — Folium caul. terminale latum, cordatum; inflorescentia brevis, pauciflora; stylus carni, fructus subpruinosus.

g. PUSILLUS Sud. *l. c.*; *R. pusillus* Rip. *in Genev. Mon. p. 14, ex pte.* — Gracilis; aculei conici, inaequales; folia 3-nata, grosse serrata; foliolum terminale ovato-orbiculare; inflorescentia brevis, laxa, pauciflora; stylus rosei; fructus pruinosus.

h. PARVULUS Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 91; *Bouv. Rub. Anj.* (1907) p. 82; *R. parvulus* Gen. *Mon. p. 6, p. p.* — Differt a var. *g.* foliis subtus cinerascentibus, inflorescentia parva, densa, subglandulosa; staminibus stylisque pallidis.

EUROPA OCCIDENTALIS, cum parentibus.

R. GODRONII × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160; *R. AMBIGUUS* P.-J. Müll. *Vers. n° 199* (1859), *pr. max. p.*; *R. dumetorum A. genuinus* a *glabratu*s God.; *R. deltifolius* N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 99, non P.-J. Müll. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 686!

Habitus *R. Godronii* Lec. et Lmt.; *turio* obtusangulus, pruinosus, glaber, aculeis subaequalibus, leviter conicis, glandulis sparsis munitus; *folia* pleraque 5-nata, mucronato-serrata, supra subtus cinereo-tomentosa; *foliolum* caul. terminale cordato-rotundatum; *ramus* subcylindricus, appresse pilosus; *inflorescentia* breviter pilosa, aculeis sparsis, glandulis subsessilibus obsita; *sepala* inermia, tomentosa, post anthesin patula vel refleva; *petala* rosea; *stamina* alba stylis basi dilute roseos superantia; *germina* glabra. Substerilis.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, entre la chapelle de Weiler et St-Germain, à mi-côte; *Prov. rhenana*, Felderhof (Bodewig); GALLIA: coteaux des environs de Nancy (Godron, Boulay).

R. CÆSIUS × *GODRONII* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *R. DELTIFOLIUS* P.-J. Müll. *Vers. n° 197* (1859). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 179!

Differt a *R. ambiguo* P.-J. Müll. foliis caul. saepe 3-natis, subtus viridibus, foliolo terminali lato, orbiculato-deltoideo, cordato; inflorescentia brevi, parce glanduloso, stylis pallidis.

GERMANIA: *Alsacia*, haie d'un verger, au bas du rempart, près de la porte de Bitche! Doerrenbach (Müller).

R. GODRONII grandibasis × *CÆSIUS*; *R. PLATYDELTUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905) et *in hb.* Müller. — Habitus *R. grandibasis* sed aculei subaequales, inflorescentia sparsim glandulosa, petala latiora. *Folia* ampla, 5-nata; *foliolum* terminale cordato-orbiculare, acuminatum; *folia* ramealia superiora subtus cinerascentia.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, à la Buchbach (Müller).

R. AMPLISTIPULUS × *CÆSIUS*; *R. Costei* Sud. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 180! — Validus; *turio* pruinosus, subteres; *folia* ampla, 5-nata, subtus molliter cinerascentia; *foliolum* terminale late cordato-ovatum; *inflorescentia* eglandulosa; *sepala* reflexa; *flores* pallide rosei; ± fertilis.

HISPANIA: Val d'Aran, à Viella, Tréodos, Salardu, etc...

R. WINTERI × *CÆSIUS*; *R. discoideus* P.-J. Müll. *in hb.* Levent.; *Gen. Ess. mon. p. 58* (1869) et *Mon., ex pte*; *R. macrostemon* × *cæsius* Sud. *in hb. Bor.*; *R. gloggnitzensis* Hal. *in Verh. z.-b. Ges. Wien* (1885) p. 66; *Oest. bromb.* p. 287; *R. rorulentus* × *cæsius* Hal. *l. c.* — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 798 (s. n. *R. macropetalum*). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 686! — Validus; *turio* pruinosus, glabrescens, eglandulosus, aculeis compressis, subaequalibus armatus; *folia* 5-nata, argute serrata, supra glabra, subtus pubescens et cinereo-tomentosa; *foliolum* caul. terminale suborbicular, emarginatum, cuspidatum, omnia sese tegentia; *inflorescentia* densa, tomentosa, laxa pilosa, eglandulosa, aculeis ± falcatis armata; *petala* dilute rosea; *stamina* longa; *sepala* in fructu reflexa; *germina* glabra; ± fertilis.

GALLIA: *Marne*, bois de Mersy (Levent); AUSTRIA: Gloggnitz (Halacsy); BELGIA: Watermael (Durand).

R. CÆSIUS × *WINTERI*; *R. duricorioides* Gen. 1^{er} *Suppl.* (1872) p. 23; *Mon. p. 35, ex pte.* — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 687. — *Turio* teres, glaucescens, glaber; aculei inaequales; folia acute serrata ut in *R. Winteri*, viridia vel superiora subdiscolora; *foliolum* terminale ovatum, subemarginatum; *inflorescentia* brevis, parce glandulosa vel eglandulosa, aculeis ± crebris armata; *sepala* patula vel erecta; *flores* albi, steriles.

GALLIA: *Allicr.* Veauce; *Puy-de-Dôme*, Fontainebleau, prope Riom (Lamotte); Croptes, près Lezoux (Chassagne); *Cantal*, Massiac (Charbonnel).

R. WINTERI × *CÆSIUS* *sabulosus* var. *β.*; *R. LANGUIDUS* Sud. *Rub. Pyr.* p. 54 (1900). — Differt a *R. Winteri* turionibus obtusis, aculeis inaequalibus, foliolis latioribus, sepalis patulis, stylis rubris. Sterilis.

GALLIA: *Ariège*, Aulus.

R. PROPINQUUS × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *R. MACROPETALUS* M. et Lef. *Vers. n° 195* (1859), non Boul. ap. R. et C. Fl. Fr. VI, p. 142; *R. Holandrei* et *corylifolius* Gen. p. p. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 688. — Validus; *turio* obtusangulus, pruinosus, parce pilosus, subglandulosus, aculeis compressis, subconformibus armatus; *folia* 5-nata, subtus pubescentia, ± cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale suborbicular, ± emarginatum, cuspidatum vel breviter acuminatum; *inflorescentia* tomentosa, laxa pilosa, vulgo parce glandulosa, mediocriter armata; *sepala* reflexa; *petala* vulgo dilute rosea; *stamina* stylis pallidos superantia. Substerilis.

GALLIA: *Oise*, Aisne, Vienne, Sarthe, Vendée; BRITANNIA: Hunts, Buckden (W. R. Linton).

R. CÆSIUS × *PROPINQUUS*; *R. BREVIERI* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 27. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 181. — A praecedenti differt: graciliore, foliis subvirescentibus, grosse serratis, foliolis breviter petiolatis, aculeis minoribus.

GALLIA: *Puy-de-Dôme*, Dore-l'Eglise, au Montel; Riom (Lamotte), Thiers; Sarthe (Gentil); *Cantal*, Massiac (Charbonnel).

B. — X e Hedycarpis

R. BIFRONS × CÆSIUS; *R. VELUTINATUS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 313 (1904). — Exsicc. : Sud. *Hb. rub. rar.* n° 20. *Feliorum figura, serratura tenuis R. bifrontem* Vest revocant; sed turio obtusangulus, aculei tenuiores, inflorescentia parce glandulosa. *Folia 3-5-nata, discolora; flores albi, sepala reflexa.* Sterilis.

GERMANY: Alsacia, Weissenburg, chemin du Raedling, après le chemin de la Steinebrück (Müller), Forbach; Bavaria, Nürnberg (Kaufmann); GALLIA: Tarn, Lacrouzette, Tanus; Seine-et-Oise, Montfort-l'Amaury (M^{me} Bélèze).

(T. CCIX) — *R. CÆSIUS × BIFRONS*; *R. MOUGEOTII* Billot in F. Schultz *Arch. Fl. Fr. Allem.* 166 (1850) et exsicc. n° 541; *R. roseiflorus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 179 n° 53; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 18, 18^{ter}, non Gen. Mon. p. 6; *R. bifrons × cæsius* N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 140, ex pte; *R. semibifrons* Sabrs. O. B. Z. (1891); *R. cæsius × bifrons* Greml. *Beitr.* 22, p. p.; *R. Aschersonii* Spribille *Jahr. Bot. Ver.* (1898-99) p. 14; *R. dumetorum* var. *platypetalus* G. Br. exsicc.; *R. megalanthus* Kupcok *Mag. Bot. Lap.* (1910) p. 274; *R. virgitorum* f. *magnifica* ej. l. c. 278; *R. clandestinus* ej. — Exsicc. : *Rub. gall.* n° 98; *Bat. eur.* n° 689 (*Mougeotii!*), 690 (*roseiflorus!*), 691 (*Aschersonii!*), 692; *Wirgt. Hb. rub. rh.* ed. 2 n° 49 (*R. dumet. v. umbrosus*); ed. 1 n° 66.

Turio obtusangulus, glaucescens, glaber; aculei tenues, inaequales; *folia* pleraque 5-nata, subtus viridia vel supra subcinerascens; *foliolum* caul. terminale (18) cordato-ovatum; *inflorescentia* corymbosa, epilosa, parum armata (14), glandulis sessilibus obsita; *sepala* inermia, eglandulosa, patula; *petala* suborbicularia, dilute rosea; *stamina* alba stylos pallidos superantia; *germina* glabra. Substerilis.

GALLIA boreali-orientalis, GERMANY, AUSTRIA, HELVETIA, HUNGARIA.

R. GILLOTII × CÆSIUS; *R. SEMIGILLOTII* Sud. — Habitus *R. Gillottii* N. Boul. sed turio subteres, pruinosus, aculei breviores, flores albi, steriles.

GALLIA: Cantal, Brezons (Charbonnel).

R. CÆSIUS × GILLOTII; *R. CHATEAUI* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 26; *Bat. eur. exsicc.* n° 199!

Turio subteres, pruinosus, pubescens, parce glandulosus; aculei inaequales; *folia* 3-5-nata, supera subtus pubescens, ± cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale ovatum, ± emarginatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, pilosa, parce glandulosa, aculeis crebris, reclinatis munita; *sepala* patula vel reflexa; *petala* orbicularia, rosea; *stamina* stylos pallidos superantia. Sterilis.

GALLIA: Cantal, Aurillac; Puy-de-Dôme, Riom (Lamotte); Royat (Charbonnel); Saône-et-Loire, Bourg-le-Comte (Château).

R. CUSPIDIFER × CÆSIUS Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160; *R. APERTIONUM* Lef. et M. (pr. sp.) *Vers.* n° 194 (1859); N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 143, ex pte; *R. thyrsoideus × cæsius* N. Boul. l. c., ex pte; *R. macropetalus* N. Boul. l. c. non M. et Lef. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 48 (*R. orbifolius*); Ch. Magnier *Fl. sel.* n° 825; Sud. *Rub. rar.* n° 182. — Validus; *turio* angulatus, erupinus, parce pilosus, subglandulosus, aculeis compressis, subconformibus armatus; *folia* 5-nata, ampla, supra parce pilosa, subtus cinereo-tomentosa pubescens, inaequaliter serrata; *foliolum* terminale orbiculare, cordatum, longe cuspidatum; *inflorescentia* magna, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis validis, reclinatis falcativis, munita; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa, in fructu patula vel laxe reflexa; *petala* magna, suborbicularia, alba vel dilute rosea; *stamina* alba stylos virescentes superantia; *germina* glabra; *fructificatio* non tota.

GALLIA: Valois, Antilly, Châvres, Lévignen (Lefèvre), Bourneville (Questier); Seine-Inf., Rouen (Letendre), Aumale (Questier); Eure, Mandres (Jourdes).

R. CÆSIUS × CUSPIDIFER; *R. SIMILIFRONS* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909).

A praecedenti differt: graciliore; aculeis tenuioribus, inaequalibus; foliis subvirescentibus, sepalis laxe erectis.

GALLIA: Tarn, Espérausses, via Brassac.

R. LEPIDUS × CÆSIUS Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *R. RIGENS* P.-J. Müll. *hb.* — Habitus *R. lepidi* P.-J. Müll. sed stipulae lanceolatae, foliola latiora, aculei rameales reclinati, inflorescentia parce glandulosa, petala suborbicularia. Sterilis.

GERMANY: Prov. rhenana, Merzig-s.-Saar (J. Schuhler).

R. PUBESCENS × CÆSIUS Sud. *Rub. Bavar.* p. 33 (1912); *R. SEMIPUBESCENS* Sud. l. c.; *R. cæsius × (pubescens × candicans)* Utsch. — Habitus *R. pubescens* Wh. sed turio glaber, glaucescens, stipulae lanceolatae, foliola latiora, inflorescentia brevis, petala ovata, fructus male evolutus.

GERMANY: Bavaria, Graefenberg (Kaufmann).

R. EVAGATUS × CÆSIUS; *R. EVAGATIFRONS*. — A *R. evagato* differt turione pruinoso, subtereti, foliis parum discoloribus, floribus sterilibus, petalis latioribus.

GALLIA: Cantal, Chabriac (Charbonnel).

R. EMOLLITUS × CÆSIUS; *R. EMOLLITIFOLIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *Diagn.* p. 58 (1906). — Habitus *R. emolliti* turionibus pallidis, erupinus, pubescens, foliis flaccidis, molibus, subtus cinereo-tomentosis, pubescens, sed foliolis latioribus, inflorescentia minus pilosa, parce glandulosa, petalis orbicularibus diversus est. Aculei subaequales; flores albi, steriles; calyx reflexus.

GALLIA: Tarn, Lavaur, Carmaux, Rosières, Labastide-Dénat, etc.; Lot-et-Garonne, Agen; Indre-et-Loire, Loches (*R. sepium* Gen. p. p.), Cantal; Gers; HELVETIA: Fribourg.

R. STENOPETALUS × CÆSIUS; *R. HEMISTENOPETALUS* Sud. *Diagn.* p. 58 (1906). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 693. — Foliola obovata, argute serrata discolora, *R. stenopetalum* L. et M. revocant; sed turio obtusangulus, glaber, aculei recti, inflorescentia epilosa. Eglandulosus; calyx reflexus; sterilis.

GALLIA: Valois, Lévignen, le Gros Aulnoy, Collimances, Autheuil (Questier).

R. FLACCIDUS × CÆSIUS Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *R. CONFINS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 203 (1859), pr. sp. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 183! — *Turio* obtusangulus, pubescens, suberpuinosus, aculeis subaequibus munitus; *folia* 3-5-nata, molia, subtus pilosovetulina, ± cinereo-tomentosa; *foliolum* caul. terminale oblongo-rhombeum, submarginatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, tomentosa, epilosa, subinermis, eglandulosa; *sepala* reflexa; *petala* alba vel dilute rosea. Sterilis. *R. flaccido* admodum similis!

GERMANY: Alsacia, Weissenburg, lignes du Pigeonnier (Müller).

R. GENICULATUS × CÆSIUS; *R. BODEWIGI* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 228. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 184. — Frons et aculei *R. geniculati* Kalt. sed turio subteres, aculei inaequales, foliolum terminale latiore, inflorescentia obtusa, parce glandulosa, petala orbicularia; calyx subreflexus.

GALLIA OCCIDENTALIS: Lentendorf (Bodewig); BELGIA: Watermael (du Pré), Juprelle (Durand).

(T. CCX) — *R. PROCERUS* × *CÆSIUS*; *R. HOLANDREI* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) *Bemerk (nomen) pr. max. p.*; Chabois. *Bull. Soc. Bot. Fr.* VII (1860) p. 267; *Gen. Mon.* p. 49, *ex pte*; *R. vespicum* P.-J. Müll. *ap. Wirtg. Hb. rub. ed. I* n° 160 (1860); *R. plicatus* Holandre! *Fl. Mos.*, non W. et N.; *R. persolutus* Schmid. (*pr. cæsio* × *Mercieri*); *R. cæsius* × *pubescens* × (*Sprengelii* × *villicaulis*) Utsch *ap. Baenitz Hb. eur.* n° 9513; *R. cæsius* × (*villicaulis* × *candicans*) Baenitz *l. c.* n° 9030; *R. apertiorum* Sud. *in hb. Bor.*; Boul. et B. de Lesd. *Rub. gall.* n° 99, *non L. et M.*; *R. althæifolius* Borbas, *an Host?*; *R. dumetorum* s. *tomentosus* Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg.* II 162, (1831)!; *R. nemorosus* var. *præcox* Holuby *exsicc.* n° 20; *R. dumetorum*, *carloviciensis* et *nemorosus* Kupcok *exsicc.*

Robustus; *turio* angulosus, faciebus planis, fere glaber, vulgo epruinosus, eglandulosus, aculeis validis, subæqualibus munitus; *folia* 5 nata (1), grosse serrata, subitus pubescentia, cinereo vel albo-tomentosa; *foliolum* terminale late ovatum vel suborbiculare, cordatum, acuminatum; *ramus* glabrescens, angulatus; *inflorescentia* brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis reclinatis falcatives instructa; *sepala* tomentosa, pilosa, laxe reflexa (2); *petala* orbicularia, alba vel dilute rosea; *stamina* alba styllos virescentes superantia. Substerilis.

GALLIA: Vienne, Vendée, Sarthe, Valois, Meurthe-et-Moselle, Savoie, etc.; **GERMANIA**: Silesia, Bavaria, Alsacia, Prov. rhenana; **HUNGARIA**; **BELGIA**.

R. CÆSIUS × *PROCERUS* Sud.; *R. DUMALIS* Hal. in *Verh. z.-b. Ges. Wien* (1885) p. 659; *R. macrostemon* × *cæsius* Focke *Syn.* p. 195; *R. discolor* × *cæsius* Hal. *Oest. bromb.* p. 287; *R. macrostemonoides* Fritsch in *Verh. z.-b. Ges. Wien* (1888) p. 780; *R. semidicolor* et *pseudo-Wahlbergii* Sabrs. *O. B. Z.* (1891); *R. nemorosus* Holuby *O. B. Z.* (1873) p. 377, *non Hayne*; *R. althæifolius* et *sebesensis* Simk. *sec. Sabrs.*; *R. centiformis* K. Frid. (*p. p.*); Sud. *Rub. Pyr.* p. 181 et *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 160; *R. Holandrei* et *rotundifolius* Gen. *Mon.*, *p. p.*; *R. deltoideus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I* n° 111, *non P.-J. Müll. in Flora*.

Folia pleraque subtus viridia; calyx patulus vel erectus. A *R. Holandrei* P.-J. Müll. differt: aculeis inæqualibus, foliolis breviter petiolulatis, inflorescentia breviore, latiore.

GALLIA, **GERMANIA**, **BELGIA**, **AUSTRIA**, **HELVETIA**, passim, cum parentibus.

R. ARRIGENS × *CÆSIUS*: *R. SEMIARRIGENS* Sud. — Differt a *R. Holandrei* P.-J. Müll. turione glabro, aculeis crebrioribus, inflorescentia magis armata, pedunculis patulis. Flores albi.

GALLIA: Cantal, Massiac, via St-Victor (Charbonnel); Tarn.

R. LACERTOSUS × *CÆSIUS*; *R. EXOTERICUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1899) p. 94; *R. corylifolius* de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 204, *non Sm.* — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 694! Pallide viridis; *turio* obtusangulus, epruinosus, glaber, glandulis sparsis, aculeis inæqualibus instructus; *folia* ampla, plerumque 5-nata, inæqualiter serrata, subitus pubescentia, cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale orbiculare, cordatum, acuminatum, omnia lata, sese tegentia; *inflorescentia* brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis ± crebris munita; pedunculi ascendentes; *sepala* laxe reflexa; *petala* magna, suborbicularia, alba; *stamina* alba styllos virescentes superantia. Substerilis.

GALLIA: Tarn, in regionibus inferioribus frequens; Gers; Indre-et-Loire; **BELGIA**: Louvain.

C. — × e Canticibus

R. PHYLLOSTACHYS × *CÆSIUS*; *R. HEMIPHYLLOSTACHYS*. — Turio ± parce pilosus; aculei subæquales; inflorescentia valde foliosa; cætera ut in *R. ambifario* P.-J. Müll.

GALLIA: Puy-de-Dôme; **GERMANIA**: Prov. rhenana, Eremberg (Bodewig); Bavaria (Schwerzer); Silesia (Kinscher, sub. *R. hiaricus* = *constrictus* × *cæsius*); **AUSTRIA**: Moravia, Krasna (Petrak).

(T. CCX). — *THYRSOIDEUS* *candicans* × *CÆSIUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 94 et *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 160; *R. VIRGULTORUM* P.-J. Müll. *Vers.* n° 217 (1859), *pr. max. pte* (*sensu amplio*); *Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I* n° 109; *R. calcareus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858); *R. fasciculatus* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 182, n° 58, *p. p.*; *R. depauperatus* P.-J. Müll. *Vers.* n° 219 [1859]; *R. sepicolus* Lef. et M. *Vers.* n° 218 (1859); *R. nemorosus* var. *glabratus* Questier in Billot *exsicc.* n° 1868; *R. Laschii* Focke *Syn.* p. 402 (1877), *non Braun, exsicc.*; *R. eu-Laschii* Focke *ap. Asch. et G. Syn.* VI p. 642; *R. Dethardingii* H. E. L. Krause *Rub. Rostoc.* p. 203 (1880); *R. czarnunensis* Spribille *Abh. Bot. Ver. Prov. Brandg.* XL. (1898) p. 18; *R. cæsius* × *pubescens* Utsch in Baenitz *Hb. eur.* n° 10354; *R. macrocladus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905); *R. semisubrectus* Sabrs. *O. B. Z.* (1905); *R. cæsius* × *candicans* Laseh., O. Kunze, *Reform.* p. 69; *R. hemithyrsioideus* E. H. L. Krause in *Pralh Krit. Fl. v. Schl.-Holst.* 2, *Th. p. 82*; *R. montanus* × *cæsius* Halacsy *Oest. bromb.* p. 286; *R. Fionæ* K. Frider. *Bot. Tidsskr.* XVI, 115 (1887); *R. gothicus* B. Fionæ Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 643; *R. corylifolius* Auct. plur. *non Sm.*; *R. Lidforssii* Gel.; *R. psilocaulon* R. Kell. et *leiophyllus* ej. N. G. Wint. (1912) p. 43. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9028, 9507, 9511, 9512, 10354; Billot, n° 540, 1468; Sud. *Bat. eur.* n° 200! Ch. Magnier n° 2175.

Turio ± angulatus (3), glaber, vulgo epruinosus, subeglandulosus, aculeis compressis, subæqualibus munitus; *folia* (4) pleraque 5-nata *R. candicanus* Wh. revocant, grosse serrata, supra subtus ± cinereo-tomentosa, pubescentia; *inflorescentia* vulgo angusta (*R. sepicolus* Lef. et M. = *R. Laschii* Focke), interdum brevis, pauciflora (*R. depauperatus* P.-J. Müll.) vel elongata, multiflora, foliosa (*R. fasciculatus* P.-J. Müll. *p. p.*; Sud. *Bat. eur.* n° 695), laxe pilosa, parum armata, glandulis brevibus munita, pedunculis ± ascendentibus (5); *sepala* tomentosa, patula vel reflexa; flores albi, substeriles.

EUROPA MEDIA et **OCCIDENTALIS**, cum parentibus.

R. THYRSANTHUS × *CÆSIUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 93 et *ap. Gandg. Nov. Consp.* p. 160; *R. AMBIFARIUS* P.-J. Müll. *ap. Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I* n° 162 (1860) (*sensu amplio*); Sud. *I. c.*; *R. pruinosis* Arrhen. *Mon.* 45, *ex pte*; *R. fasciculatus* var. *ambifarius* K. Frid. *Beitr. Rub. Coryl.* p. 20 (1897); *R. dumetorum* a. *vulgaris* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I*, n° 23, 24 *p. p.*; *R. nemorosus* Wirtg. *Hb. pl. sol. fl. rhen.* n° 40; *R. nemorosus* var. *glabratus* Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I*, n° 28; *R. corylifolius* Anders. *exsicc.*; *Lange Handb. Dansk. Flora* ed. 3; *R. multiflorus* E. H. L. Krause *R. Berol.* p. 19; *R. Dethardingii* f. *nostras* Frid. et Gel. *exsicc.* n° 84; *R. commixta* Frid. et Gel. a. a. O. et Assoc. *rub.* n° 1043, 1193, *non P.-J. Müll.*; *R. maximus* var. *raduloides* Aresch. in *Blytt Norw. Fl.* 1168; *Some Obs. g. Rub.* p. 74; *R. Schnelleri* Holuby *O. B. Z.* (1873) p. 377; *R. thyrsanthus* B. Schnelleri Focke *ap. Asch. et Gr. Syn.* VI p. 488; *R. grandifrons* Borbas in *Vasvarm. flor.* p. 306, z.-b. *Ges.* (1886) p. 96; *R. rosthochinensis* E. H. L. Krause *Rub. Rost.* p. 205 (1880)?; *R. cæsius* × (*macrophyllus* × *candicans*) Utsch in Baenitz *Hb. eur.* n° 9027; *R. Bayeri* × *thyrsanthus* Utsch *l. c.* n° 9504; *R. cæsius* × *serpens* × *thyrsanthus* Utsch *l. c.* n° 9516; *R. cæsius* × *thyrsanthus* ej. *l. c.* n° 9933; *R. leiocarpus* Lindg. *exsicc.*; *R. dumetorum* Gen. *p. p.*; *R. semisutatus* Sabrs. *in hb. Sud.*; *an E. H. L. Krause?*; *R. tolpnensis* Holzfuss *in hb. Sud.* — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 696. A præcedenti differt: validiore; foliis amplioribus, foliolis latioribus ut in *R. thyrsantho* F.

β. *SENTICETORUM*; *R. senticetorum* P.-J. Müll. *Vers.* n° 196 (1859); *R. thyrsanthus* v. *Grabowskii* × *cæsius* Sud. — *Foliolum* terminale cordato-orbiculare; *folia* discolora, amplissima.

EUROPA MEDIA et **OCCIDENTALIS**, passim, cum parentibus. — β. **GERMANIA**: Alsacia, circa Weissenburg (Müller).

Obs. — Le *R. viretorum* P.-J. Müll. *Vers.* n° 220 (1859), de Cusci (Alsace), se rattache apparemment au groupe *R. thyrsanthus* × *cæsius*. Je ne l'ai pas vu dans l'herbier de Müller et fut sans doute détruit par Favrat, qui brûla un grand nombre de ballots de *Rubus* de la collection du catalogue alsacien.

R. CONSTRICTUS × *CÆSIUS*; *R. SEMICONSTRICKTUS* Sud. *ad amic.* (1910); *Rub. Bavar.* p. 33. — Aculei recti, inæquales; foliola marginibus sese tegentia, terminale cordato-ovatum, acuminatum. Cetera ut in *R. constricta*.

HELVETIA: Schaffhouse (Keller); **HUNGARIA**: Bakabanya. Grunt, ad rivum (S. Kupcok); **GERMANIA**: Pomerania, Stettin (Holzfuss); **GALLIA**: Puy-de-Dôme, Besse-Leroux (Chassagne); *Cantal*, S. Pouey (Charbonnel).

R. GONIOPHYLLOIDES × *CÆSIUS*; *R. DEFECTIVUS* Sud. *Fl. Toul.* p. 76 (1907). — *Turio* angulosus, epruinosus, glandulis brevibus, aculeis inæqualibus munitus; *folia* 3-5-nata, inæqualiter serrata, subitus cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale orbiculato-rhombeum; *inflorescentia* breviter pilosa, glandulosa, aculeis crebris obsita, pedunculis patulis; *flores* albi vel dilute rosei; *sepala* patula. Sterilis.

GALLIA: Haute-Garonne, La Salvetat.

D. — X e Subtomentosis

R. ARDUENNENSIS × *CÆSIUS*; *R. SEMIARDUENNENSIS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1911), p. 36. — Habitus *R. arduennensis* Lib. sed turio obtusangulus, aculeis inæqualibus; folia subtus viridia, superiora subcinerascentia; aculei rameales subrecti; inflorescentia brevis, tomentosa; petala suborbicularia. Sterilis vel parum fertilis.

BELGIA: Fraipont (C. Aigret).

R. MALACUS × *CÆSIUS*; *R. RHOMBOIDALIS* Sud. in Bouvet *Rub. Anj.* (1907) p. 86. — Tomentum et foliorum figura *R. malacum* revocant; sed turio planus, foliola sese tegentia, inflorescentia corymbosa, parce glandulosa, sepala patula, petala latiora. Sterilis.

GALLIA: Tarn, Albi; Maine-et-Loire, Thouarcé (Bouvet).

R. MOESTUS × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160; *R. CLYPEATUS* Sabrs. *O. B. Z.* (1891); *R. cæsius* × *mæstus*? Sabrs. l. c. — Habitus *R. mæsti* Holuby a quo differt turionibus minus angulatis, glaucescentibus, inflorescentia breviore, glandulis subsessilibus munita, sepalis imperfecte reflexis, petalis orbicularibus. Fructus male evolutus.

HUNGARIA OCCIDENT.: Pressburg (Sabransky); Bakabanya (Kupcok).

R. SUBVILLOSUS × *CÆSIUS*; *R. SEMISUBVILLOSUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909). — *R. subvilloso* similis a quo differt: inflorescentia parce glandulosa, stipulis foliolisque latioribus, petalis orbicularibus. Turio pilosus, folia discolora.

GALLIA: Tarn, Le Bruc, prope Montdragon.

R. CÆSIUS × *SUBVILLOSUS* var. *Schultzii* Sabrs.; *R. DOLOMITICUS* Holuby; Sabrs. *O. B. Z.* (1891-92). — HUNGARIA, prope Halucic (Holuby). — Mihi novus est.

IV. — X ex Appendiculatis

A. — X e Tomentosis

(T. CCX) — *R. TOMENTOSUS* × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 (1905); *R. DIVERGENS* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 59, p. 182, non Neuman (1883) nec Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI, 640; *R. semicinereus* Borbas in *Varnar. Fl.* p. 305; *R. cæsius* × *tomentosus* Auct. plur., ex pte. — Exsicc.: N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 38 (*R. fasciculatus*) p. p.; Sud. *Hb. rub. rar.* n° 22!; *Rub. rar.* n° 185!

Turio angulatus, epruinosus, glandulosus, glaber, aculeis compressis, inæqualibus munitus; folia 3-5-nata, flaccida, grosse et inæqualiter dentata, subtus cinereo vel albo-tomentosa, supra supra tomentella; foliolum terminale late ovatum (6) vel rhombicum, emarginatum, acutum; inflorescentia brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, bracteis lati, aculeis validis (7), flavescentibus munita; pedunculi patuli; sepala tomentosa, pilosa, glandulosa, aculeata, laxe reflexa; petala alba, suborbicularia; stamina alba stylos virescentes parum superantia; germina glabra. Sterilis. — Variat: turione canaliculato, foliis 5-natis, acute serratis, sepals inermibus, staminibus longis [*R. dubiosus* P.-J. Müll. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 164 (1860)], turione plano, valido, subglandulosus, foliolo terminali late cordato, inflorescentia armatissima *R. robustus* P.-J. Müll. revocant (*R. malacophyllum* P.-J. Müll. ap. Wirtg. l. c. n° 161 = *R. ambifarius* var. *apricus* Wirtg. l. c. ed. I n° 163); inflorescentia elongata, multiflora, pedunculis ascendentibus, fasciculatis, pedicellis brevibus (*R. fasciculatus* P.-J. Müll., pr. min. p.; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 387; *R. patens* Merc. ! p. p.; *R. dumetorum* var. *althæfolius* Fisch.-Oester *Rub. Bern.* p. 38), etc., etc...

GALLIA, HELVETIA, AUSTRIA, GERMANIA, etc.

R. CÆSIUS × *TOMENTOSUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160 et Auct. plur. ex pte; *R. LEUCOPHÆUS* P.-J. Müll. *Vers.* n° 206 (1859); *R. dumetorum* A. genuinus × *tomentosus* God.; *R. dumetorum* × *tomentosus* Holuby *O. B. Z.* XXIII p. 337; *R. semicinereus* Borb. l. c., p. p.; *R. cæsius* × *vestitus* × *santus* Utsch ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9514; *R. cæsius* × *serpens* × (*pubescens* × *bifrons*) Utsch l. c. n° 9961; *R. agrestis* W. et Kit. *Pl. rar. Hung.* III p. 298? p. p. — Exsicc.: Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 159; Sud. *Bat. eur.* n° 697! 698; Baenitz *Hb. Dendrol.* n° 235.

A *R. divergenti* differt turionibus minus angulatis, glaucescentibus; aculeis debilioribus; foliis plerumque 3-natis, minus discoloribus, foliolis latioribus, terminali suborbiculari-rhomboeo; inflorescentia minus armata, pauciflora, pedunculis ± ascendentibus.

EUROPA MEDIA et OCCIDENTALIS, cum parentibus.

R. TOMENTOSUS Lloydianus × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 161; *R. DELTOIDEUS* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) n° 57, p. 181, non ap. Wirtg. *Hb. rub. rh.*; *R. cæsius* × *tomentosus* Auct. plur., ex pte., *R. leptocaulon* Boul. et Let. p. p.; *Assoc. rub.* n° 528. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 699; *Assoc. rub.* n° 528, 1197. — Folia supra fere glabra; cetera ut in *R. divergenti* P.-J. Müll.

EUROPA MEDIA et OCCIDENTALIS, passim, cum parentibus.

R. CÆSIUS × *TOMENTOSUS Lloydianus*; *R. PSEUDO-DEGENER* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* (1901) et ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160; *R. cæsius* × *tomentosus* Auct. pl. ex pte. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 700!; *Rub. rar.* n° 186. — Folia supra fere glabra; cetera ut in *R. leucophæo* P.-J. Müll. — Variat: foliolo caul. terminali suborbiculari (*R. neglectus* P.-J. Müll. ap. Wirtg. *Hb. rub. rh. ed.* I n° 165, ex pte) vel angusto, rhomboeo, parum discolori [*R. Lamottei* Gen. *Mon.* p. 36 (1880)], etc., etc.

EUROPA MEDIA et OCCIDENTALIS, passim.

(*R. CÆSIUS* × *TOMENTOSUS Lloydianus*) × *ULMIFOLIUS*; *R. ALBIGENSIS* Sud. *Bull. Assoc. pyr.* n° 203 (1898); *Rub. Hb. Bor.* p. 44; *R. Bosquetianus* Timb. et M. *Assoc. rub.* n° 78, non ap. de Martr.-D. *Fl. Tarn* p. 211. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 701! — Stipulae latae, foliola sese tegentia, petala suborbicularia ut in *R. trivialis*; folia flaccida, grosse serrata, albo-tomentosa *R. Lloydiani* Gen.; aculei validi, folia 5-nata, flores pallide rosei *R. ulmifolium* revocant. Steriles.

GALLIA: Tarn, Peyroulié, prope Albi; Haute-Garonne, Balma.

R. ANCOPHILUS × *CÆSIUS*; *R. EREMICOLTS* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909). — *R. ancophilo* similis a quo differt: turione glaucescenti, foliolis latioribus, inflorescentia obtusa, minus hirsuta, sepalis patulis, petalis orbicularibus. Substerilis.

GALLIA: Tarn, Bourdariès, prope Lacaze.

B. — X e Vestitis

a — X e Hypoleucis

(T. CCX) — *R. VESTITUS* × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 160; *R. SCABROSUS* P.-J. Müll. in *Flora* (1858) p. 185 (sensu amplio); *R. campestris* P.-J. Müll. *Vers.* n° 231 (1859); *R. degener* P.-J. Müll. in *Boul. Ronc. vosg.* p. 52 (1866) et exsicc. n° 39; *R. Leguei* Gen. *Mon.* p. 31 (1880); *R. slesvicensis* J. Lange *Fl. Dan.* t. 2905; *Bot. Tidssk.* XIV, 139 (1885). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 702!; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 142 (*R. horridus*).

Turio obtusangulus, epruinosus, parce pilosus glandulosusque, aculeis inæqualibus nonnullis tuberculiformibus instructus; folia (8) 5-nata, supra aperte appressa pilosa, subtus ± cinereo-tomentosa, molliter pubescentia, inæquilater serrata; foliolum caul. terminale suborbicularare, cordatum, acutum vel breviter acuminatum; ramus pilosus;

inflorescentia brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis validis vel mediocribus munita; *sepala* tomentosa, glandulosa, parce aculeata, patula vel reflexa; *petala* orbicularia, alba vel dilute rosea; *stamina* stylos pallidos superantia. Substerilis. Variat foliis ramealibus supra subtomentellis (*R. degener*), serratura tenui (*R. campestris*).

GERMANIA: *Alsacia* (Müller), *Guestphalia* (Braun); GALLIA, HELVETIA, AUSTRIA, BELGIA, etc.

R. CÆSIUS × *VESTITUS*; *R. OREARUM* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905); Diagn. p. 59; *R. cæsius* var. *ferox* Wirtg. Hb. rub. rh. ed. n° 114; *R. agrestis* W. et K. ex pte? Auct. plur. ex pte. — Exsicc.: Sud.: Rub. rar. n° 187; Herb. Rub. rar. n° 37. — A præcedent differt: graciliore, turione tereti, glaucescenti; foliolis latioribus, marginibus sese tegentibus, terminali breviter petiolulato; calyce vulgo erecto.

EUROPA MEDIA et OCCIDENTALIS, cum parentibus.

R. LEUCOTRICHUS × *CÆSIUS*; *R. HEMILEUCOTRICHUS* Sud. — A *R. scabroso* P.-J. Müll. distinguitur foliis minute serrulatis, subtus viridibus, foliolis cuspidatis, aculeis tenuioribus.

GALLIA: *Sarthe*, Le Mans, Pontlieue, S-Marc-la-Bruyère (Gentil).

R. MACROSTACHYS × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905); *R. marginum* P.-J. Müll. Vers. n° 216 (1859); *R. trigonodontus* Boul. Rong. voss. p. 152 (1869) et exsicc., n° 140. — Exsicc.: Sud. Hb. Rub. rar. n° 24.

Habitus *R. macrostachyi* P.-J. Müll. *Turio* obtusangulus, glaucescens, parce pilosus glandulosusque, aculeis inæqualibus munitus; *folia* 5-nata, ampla, tenuia, inæqualiter serrata, subtus pubescentia, cinereo-tomentosa; *foliolum* terminale ovatum, basi integrum vel subemarginatum, acuminatum; *inflorescentia* brevis, laxe pilosa, parce glandulosa, aculeis sparsis, tenuibus, pallidis munita; *sepala* tomentosa, pilosa, parce glandulosa, laxe reflexa; *flores* albi; *stamina* stylos pallidos superantia. Sterilis.

8. *VEPRETORUM*; *R. macrostachys* v. *scabridus* × *cæsius*; *R. vepritorum* P.-J. Müll. Vers. n° 221 (1859). — Exsicc.: Sud. Rub. rar. n° 188. — Pedunculi patuli; foliolum terminale latiore.

γ. *ADENANTHOIDES* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905); *R. macrostachys* v. *adenanthus* × *cæsius*; *R. cuspidatus* Assoc. rub. n° 460, 427, non P.-J. Müll. — *R. marginum* admodum similis.

GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg, via Schleithal (Müller); Ste-Marie-aux-Mines (Boulay). — β. *Alsacia*, cum typo. — γ. GALLIA: Saône-et-Loire, Saint-Emiland; Haute-Saône, Champagney.

OBS. — J'ai appellé *R. PURIPES*, in hb. Müller et ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905), une forme qui paraît être un *R. cæsius* var. *dunensis* × *macrostachys*. — Gracilis; turio pilosus; folia 3-nata, parva; foliola angusta. — GERMANIA: *Alsacia*, Weissenburg (Müller).

R. STYRIACUS × *CÆSIUS*; *R. SEMISTYRIACUS* Sabrs. — Habitus et aculei *R. styriaci*, sed foliala lata, sepala patula.

AUSTRIA: *Styria*, Sœchau (Sabransky).

OBS. — Le *R. VALLIGENUS* Sabrs. O. B. Z. (1891-92), tir. à p. p. 7, n'est inconnu. — AUSTRIA: Pressburg (Sabransky). — Le *R. DIVERSIPILUS* = *nemorus* × *epipilus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 275 est vraisemblablement un *R. Caffischii* × *cæsius*. — HUNGARIA: Bakabanya, valle Chorvat (Kupcok).

R. PODOPHYLLUS × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905); *R. SCYTOPHYLLUS* F. Gérard Pl. Voss. in Rev. Bot. VIII p. 75 (1890); *R. corifolius* F. Gér. prius, non Liebm.

Turiones, folia minute mucronato-denticulata, subtus fere viridia, inflorescentia glandulis longis munita *R. podophyllum* P.-J. Müll. revocant; sed foliolis caulinis terminalibus obovato-orbicularibus, stipulis latioribus diversus est.

β. BELEZEI; *R. podophyllum* var. *lutetianus* × *cæsius*. — Folia discolora.

GALLIA: *Vosges*, Granges, aux Chappes, au Pré Genest (F. Gérard); *Puy-de-Dôme*, Riom, à Chasseron (Lamotte). — β. Seine-et-Oise, la Queue, près de Montfort (M^{le} Béleze).

OBS. — M. Sabransky a distribué sous le nom de *R. semitomentosus* (Borbas) une forme qui est vraisemblablement un *R. holochlorus* × *cæsius*. — STYRIA: Sœchau.

R. BOREAUANUS × *CÆSIUS*; *R. OBROTUNDATUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905); Bouvet Rub. Anj. (1907) p. 87! — Exsicc. Assoc. rub. n° 595 (s. n. *R. dumetorum* gr.).

Turio subteres, glabrescens, subscaber, aculeis inæqualibus; *folia* subtus cinereo-tomentosa, pubescentia, mediocriter serrata; *foliolum* terminale obovato-orbicularare vel late ovatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* breviter pilosa, glandulosa, parum armata; *sepala* patula; *petala* alba vel pallide rosea; *stamina* stylos æquantia.

GALLIA: Maine-et-Loire, Beaucouzé, à la Queue de l'étang de la Haie (Bouvet); Manche, Cherbourg (Le Jolis).

R. ADSCITUS × *CÆSIUS* Sud. Rub. Hb. Bor. p. 95 (1902); *R. LEGRANDIANUS* Sud. l. c.; *R. Holandrei* Gen. p. p., non Müll.; *R. corylifolius* var. *fasciculatus* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 95, p. p. — Exsicc.: Set of Brit. Rub. n° 50.

Turionibus ± pilosis, aculeis tenuibus, foliis grosse serratis, subtus cinereo-tomentosis, pilosis, *R. adscitum* Gen. revocat, a quo differt stipulis latis, foliolis latioribus ± brevioribusque, inflorescentia brevi, minus hirsuta, petalis latioribus, sepalis patulis. Substerilis.

GALLIA: Indre, Déols (Legrand); Valois, bois de Thury (Questier); BRITANNIA: Warwickshire, Hedges, Curdworth (Bagnall).

R. SCUTULIFOLIUS × *CÆSIUS*; *R. pubidorsus* Sud. Diagn. p. 59 (1906). — A *R. scutulifolio* differt turionibus glabrescentibus, aculeis rectis, foliolis terminalibus orbiculatis, petalis latis, dilute roseis.

GALLIA: Seine-inf., Aumale (Questier).

R. DENSIPILUS × *CÆSIUS*: *R. DENSIPILIFORMIS*. — Exsicc.: Sud. Rub. rar. n° 200! — *Turio* pilosus, glandulosus, folia discolora, foliolis obovatis ut in *R. densipilo*, a quo differt foliolis brevioribus, stipulis latis, petalis albis, suborbicularibus. Sterilis.

GALLIA: Haute-Garonne, Dremil-Lafage, à la Serre.

R. MACROTHYRSUS × *CÆSIUS* Sud.; *R. EXIMIUS* Erichsen Verh. N. V. Hamburg VIII (1900); tir. à p. p. 57. — Habitus *R. macrothyrsi* Lge sed turio glabrescens, folia subtus viridia, aculei recti, petala suborbicularia, sepalæ ± erecta.

HOLSATIA: Pinneberg, Piersdorf, prope Hamburg (Erichsen).

b. — × e Virescentibus

R. MUCRONIFER × *CÆSIUS* Sud.; *R. IMITABILIS* K. Frider. (pr. sp.) Bot. Tidssh. XVI, 111 (1887); *R. oreogeton* *imitabilis* K. Frid. Beitr. Rub. Coryl. p. 14 (1897); *R. diversifolius* B. *imitabilis* Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 655 (1902); *R. tuberculatus* Auct. angl., ex pte; *R. polycarpus* G. Braun, exsicc., non Holuby. — Exsicc.: Rub. Dan. et Slesv. n° 23; Assoc. rub. n° 917; Bat. eur. n° 703, 704.

Turio ± angulatus, glabrescens, glandulosus, aculeis inæqualibus; *folia* 3-5-nata, subtus viridia pubescentiaque, minute et æqualiter serrulata; *foliolum* caul. terminale orbiculare, cordatum, cuspidatum; *inflorescentia* pubescens, glandulosa, aculeis tenuibus munita; *sepala* patula vel erecta; *flores* albi. *Fructificatio* non tota.

DANIA: *Fonia*; GERMANIA: *Slesvig* (K. Friderichsen), *Harz* (Kretzer), *Hannover* (Spribille); BRITANNIA: *Cheshire* (Wolley-Dod).

R. CENOMANENSIS × *CÆSIUS*; *R. SEMICENOMANENSIS* Sud. — *Turio et serratura tenuis ut in R. cenomanensi; foliolum terminale orbiculare, abrupte acuminatum; inflorescentia breviter glandulosa; petala alba, suborbicularia; sepala in fructu ± erecta.*

GALLIA: Sarthe, St-Mars-les-Brièvre, vers Champagné (Gentil).

R. MUELLERI × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. Nov. Consp. p. 161 (1905); *R. ASPRETICOLUS* Lef. et M. Vers. n° 200 (1859). — Exsicc.: G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 178 a (*R. dumetor. f. brachyadenos*); Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I* n° 65 (*R. dumet. var. glandulosus*); Sud. *Bat. eur.* n° 705!

Habitus *R. Muelleri* Lef. sed *turio glabrescens, obtusangulus, subpruinosus; petala latiora, rosea, stamina stylique pallida vel dilute rosea. Sepala laxa reflexa.*

GALLIA: Aisne, forêt de Retz, au champ familial: Oise, bois du Roi, près de Fresnoy-Boissy (Lefèvre); Ardennes, le Chesne, 1^{re} écluse (Callay); GERMANIA: Holze, Braunschweig (G. Braun), Lentendorf, Koenigsforst (Bodewig).

Obs. — Le *R. lucorum* M. et Lef. Vers. n° 201, de Montlevron, champs de Chavres (Oise), diffère du précédent par son inflorescence plus lâche; il a probablement la même origine.

R. SPLENDIDUS × *CÆSIUS*; *R. SEMISPLENDIDUS* Sud. Diagn. p. 59 (1906). — Differt a *R. splendido* M. et L. turione subtereti, dentibus minus latis, inflorescentia brevi, calyce erecto. Flores pallide rosei, steriles.

GALLIA: Valois, Bourneville (Questier).

R. COLEMANII × *CÆSIUS*; *R. CHARBONNELLI* Sud. — Habitus *R. Colemannii* Blox. sed aculei recti, foliola latiora, inflorescentia parum pilosa, petala orbicularia, sepala patula vel subreflexa.

GALLIA: Cantal, haies, à St-Pouey (Charbonnel).

R. GREMLII × *CÆSIUS* Sud.; *R. INFORMIS* Sabrs. O. B. Z. (1905); *tir à p. p. 18; R. cæsius* × *Gremlii*? ej. l. c.; *R. dolichotrix* = *carpaticus* × *senticosus* Kupcok Mag. Bot. Lap. (1910) p. 239. — *Turio angulatus, aculeis crebris, inæqualibus munitus; folia 5-nata, subtus viridia; foliolum terminale cordato-orbiculare; inflorescentia breviter pilosa, parce glandulosa; calyx reflexus.*

AUSTRIA: Styria, Sœchau (Sabransky); Moravia, Znaim (Oborny); HUNGARIA: Bakabanya, Chladnou (S. Kupcok); HELVETIA: Saint-Gall, Schenboden (R. Keller).

R. HALACSYI × *CÆSIUS* Halacsy Oest. bromb. p. 287 (1891). — *Turio glaber; folia 5-nata, subtus viridia, pubescentia; calyx erectus.* — Mihi novus est.

AUSTRIA: inter Klamm et Semmering (Richter).

R. ERIOSTACHYS var. *ferrariarum* × *CÆSIUS*; *R. MODESTUS* Rip. ap. Gen. Mon. p. 8 (1880). — *Turio teres, pilosus, aculeis tenuibus, inæqualibus; folia 3-nata, grosse serrata, subtus viridia, pubescentia; foliolum terminale late ovatum, emarginatum, acuminatum; inflorescentia subinermis, pilosa, glandulosa; sepala patula; flores albi.*

GALLIA: Cher, Bourges, haies des vignes d'Aulon (Ripart).

c. × e Hebeaulibus

R. SCHMIDELYANUS × *CÆSIUS*; *R. ECHINULATUS* Sud. — Habitus *R. Schmidelyani* Sud. sed *turio glabrescens, foliola latiora, terminale suborbicularie, cordatum, petala orbiculata. Parum fertilis.*

GALLIA: Tarn, Trébas.

Obs. — Une forme récoltée à Montreuil-s.-Loir (Maine-et-Loire), par M. Bouvet, a les apparences d'un *R. Borreri* × *cæsius*.

R. HEBECAULIS × *CÆSIUS*; *R. CHATENIERI* Gen. in Chatenier Bull. Soc. Sc. nat. S.-E. (1885), *tir à p. p. 16; R. silvulicola* Progel hb. — Habitus *R. hebecaulis* sed *turio glabrescens, rachis breviter pilosa, glandulis brevibus. Flores parvi.*

BAVARIA: inter Waging et Teisendorf, prope Traunstein (Progel); Bernbach prope Fürth (Kaufmann); GALLIA: Isère, Dionay, au Mouchet (C. Chatenier); HELVETIA: Thurgau (R. Keller), Romont (Jaquet).

C. — × e Radulis

a. — × e Micantibus

(T. CCX) — *R. RADULA* × *CÆSIUS* Sud. Bat. eur. p. 34 (1904) et ap. Gandg. Nov. Consp. p. 161; *R. CUSPIDATUS* P.-J. Müll. in Flora (1858) p. 180 n° 54 (pr. max. p.), non N. Boul. Ronc. vosg., nec Genev.; *R. delectus* P.-J. Müll. et Wirtg. *Hb. rub. rh. ed. I* n° 157 (1860); *R. fossicola* Holuby! O. B. Z. XXIII (1873), 381; *R. polycarpus* (G. Braun) var. *tomentosus* F. Kretzer ap. Baenitz *Hb. eur.* (1892); *R. flaccidus* × *cæsius* Goetz ap. Baenitz l. c. n° 10363; *R. hirtus* × *Lindleyanus* Utsch. ap. Baenitz l. c. (an. 1890); *R. oreogoton* f. *viridis* F. Kretzer ap. Baenitz (1895). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 99 ! 706.

R. Radula Wh. similis. *Turio obtusangulus, glaucescens, glabrescens, scaber; folia caul. (9) 5-nata, duplicato-serrata, subtus cinereo-tomentosa pubescentiaque; foliolum terminale late cordato-ovatum, acuminatum; ramus angustus; folios, pilosus, glandulosus; inflorescentia ± pyramidalis, hirsuta, dense glandulosa, aculeis validis, pallidis armata (10); stylus pallidos superantia. Parum fertilis.*

GERMANIA: Alsacia, Weissenburg, lignes du Pigeonnier, Saint-Paul (Müller); Prov. rhenana (Wirtgen); Bavaria, Aschaffenburg, Nürnberg; Badenia; Harz; GALLIA: Valois; BELGIA.

R. CÆSIUS × *RADULA* Sud. ap. Gandg. Nov. Consp. p. 161 (1905); *R. SPINESCENS* P.-J. Müll. hb. — Gracilis, heteranthecissimus; *turio teres; folia subtus viridia vel subcinerascens; foliolum terminale cordato-orbiculare; inflorescentia brevis, parum pilosa, dense glandulosa.*

GERMANIA: Alsacia, Weiler, prope Weissenburg (Müller).

Obs. — Le *R. SUBSERICEUS* Boul. et Gillot Assoc. rub. n° 597, de St-Emiland (Saône-et-Loire), château d'Epiry (Gillot), semble avoir une origine analogue.

R. UNINCINATUS × *CÆSIUS*; *R. PLATYANTHUS* Sud. in hb. Müller. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 707. — Subvirescens; *folia inæqualiter serrata; foliola ampla; aculei crebri, validi, inæqualissimi; inflorescentia armatissima; flores magni; sepala aculeata, patula.*

GERMANIA: Alsacia, Weissenburg (Müller); GALLIA: Vosges, St-Jean-du-Marché (Biau).

R. ERICETORUM × *CÆSIUS*; *R. DISSOLUTUS* Sud. in Bouvet Rub. Anjou (1903) p. 689, (1907) p. 87; *R. scabrosus* Gen. Mon. p. p., non P.-J. Müll. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 708. — Turione angulato, papulis crebris obsito; foliis 5-natis, minute serratis, rachide florifer hirsuto. *R. ericetorum* Lef. revocat; sed foliis subvirescentibus, foliolis cauli. terminali latiore, inflorescentia breviore, sepals patulis, petalis ovatis, albis vel dilute roseis diversus est.

GALLIA: Maine-et-Loire, Angers, à Beaucozé (Bureau); Valois, La Villeneuve (Questier); Eure, Bourth, Armentières-s.-Avres (Jourdes); Sarthe, Bazouges (Launay), Le Mans (Henry, Coilliot); Indre-et-Loire, forêt de Chinon (Tourlet); Loire-inf., Châteaubriant (Henry).

R. ASPERICAULIS × *CÆSIUS*; *R. ANCISTROPHORUS* M. et Lef. *Vers.* n° 213 (1859); *N. Boul. ap. R. et C. Fl. Fr.* VI p. 146. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 200. — *Validus, heteracanthissimus; turio angulatus, glabrescens, aculeis validis, crebris, inæqualissimis, subrectis armatus; folia argute et inæqualiter serrata, subtus pubescenti-cinerea; foliolum terminale suborbiculare vel obovato-orbiculare, basi rotundatum vel subemarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia armatissima; flores albi; sepala ± patula:*

GALLIA : *Oise*, Cuvergnon, bois de Lévignen (Lefèvre); *Marne*, Beaureux (Levent); *Ardennes*, Le Chesne (Callay).

R. ECHINATOIDES × *CÆSIUS*; *R. DIVERSIFOLIUS* Lindl. (*pr. sp.*) *Syn. Brit. Fl. ed. I*, 93 p. p. (1829), *non Tineo*; *R. dumetorum* var. *diversifolius* Rogers *Handb. Brit. Rub.* p. 93 (1900); *R. myriacanthus* Focke *Abh. N. V. Bremen* II, 467 (1877), *ex pte.* — *Turio parce pilosus, scaberrimus; aculei validissimi; folia grosse serrata; foliolum terminale obovatum, emarginatum; inflorescentia laxa, hirsuta, armatissima; flores albi; sepala reflexa.*

BRITANNIA : *Cheshire* (Wolley-Dod, M. Rogers determ.); *Somerset*.

R. OREUS × *CÆSIUS*; *R. OREIFORMIS* Sud. *Bat. eur.* p. 15 (1903) et *exsicc.* n° 47. — *Frons pallide viridis, flavescens ut in R. oreo, sed turio subpruinosus, minus scaber, stipulus late, foliola latiora. Folium terminale late ovato-suborbiculare; inflorescentia bracteis latis, aculeis tenuibus, glandulis brevibus munita; petala alba, orbiculata; sepala laxe reflexa. Sterilis et parum discolor.*

GALLIA : *Cantal*, Murat. St-Julien-de-Jordanne, Vic-sur-Cère, de Neussargues à Allanche, etc.

R. PAPULOSUS × *CÆSIUS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161*; *R. HORRIFACTUS* Müll. et Lef. *Vers.* n° 193 (1857). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 201, 399; *Sud. Bat. eur.* n° 709. — *Turio glaber, angulosus, aculeis validis, rectis armatus; folia 5-nata, inæqualiter serrata, subtus cinereo-tomentosa; foliolum terminale ovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; aculei rameales validi, recti; inflorescentia R. papulosis, aculeis rectis, robustis armata; petala alba, orbicularia; calyx patulus vel laxe reflexus.*

GALLIA : *Oise*, Cuvergnon, champs de Vauciennes (Lefèvre), Autheuil, St-Martin (Questier); *Seine-et-Marne*, Champigny (Feuilleaubois).

R. TIMENDUS var. *Blondeau* × *CÆSIUS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161*; *R. ASPERRIMUS* Rip. in *Gen. Mon.* p. 104 (1889). — *Turio obtusangulus, glaber, scaberrimus; folia 3-5-nata, supera subcinerascens; foliolum terminale ovatum, leviter emarginatum, abrupte acuminatum; inflorescentia parum pilosa, dense glandulosa; calyx erectus; petala ovata, germina pilosa.*

GALLIA : *Cher*, Rhin-du-Bois (Déséglié).

R. GENEVIERI × *CÆSIUS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 96 (1902); *R. HIRTICAUSTRIS* Lef. et M. *Vers.* n° 192 (1859); *R. decepcionis* Sud. l. c.; *R. rupestris* Genev. *Mon.*, p. p., *non P.-J. Müll.* — Exsicc. : *Sud. Bat. eur.* n° 710.

Turionibus angulatis, pilosis, heteracanthis; *foliis* 5-natis, discoloribus, acute et inæqualiter duplicato-serratis; *foliolis* terminalibus late ovato-rhombeis, vix emarginatis; *inflorescentia* elongata, usque apicem foliosa, breviter pilosa; *floribus* albis vel roseis, germinibus parce pilosis *R. Genevieri* revocat. *Petala* orbicularia; *sepala* patula vel reflexa.

GALLIA : *Oise*, Antilly, Thury-en-Valois (Lefèvre), St-Martin (Questier); *Maine-et-Loire* (Bouvet); *Vendée*, Pouzauges (Genevier); *Eure*, Grandvilliers (Jourdes); *Sarthe*, Traugé (Henry); *Mayenne*, Châteauneuf-s.-Sarthe (Henry); *Seine-et-Oise*, forêt de Rambouillet (M^{me} Bélèze); Montmorency (B. de Lesdain).

R. DISCRIPTUS × *CÆSIUS*; *R. DISCRIPTIFORMIS* Sud.; *R. adenoleucus* *Assoc. rub.* n° 128, *non Chaboiss.* — Exsicc. : *Sud. Bat. eur.* n° 711; *Assoc. rub.* n° 128.

Differt a *R. hirticaustris* L. et M. *foliis* grosse serratis, minus discoloribus, *inflorescentiae* glandulis longioribus. *Calyx* ± erectus.

GALLIA : *Seine-inf.*, Rouen (Malbranche); *Eure*, Nonancourt (Jourdes); *Indre-et-Loire*, forêt de Chinon (Tourlet); *Seine-et-Oise*, Cernay (M^{me} Bélèze), Montmorency (Biau); *Maine-et-Loire*, Candé (Henry).

R. APICULATUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIAPICULATUS* Sud.

Turio ± *angulosus*, *parce pilosus*, ± *glaucescens*, *aculeis* inæqualibus *munitus*; *folia* 5-nata, supera subtus cinerascentia pubescentiaque; *foliolum* terminale late ovatum vel obovato-orbiculare, basi ± emarginatum, cuspidatum; *inflorescentia* pilosa, glandulosa; *flores* albi; *sepala* patula vel reflexa.

β. MALACONEURUS (Sud). *in hb. Mus. Paris.*; *Diagn. p. 59 (1905)*; *R. apiculatus* v. *molliaversus* × *cæsius*. — *Folia subtus molliter pilosa.*

γ. CUSPIDATIFORMIS (Sud) *ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905)*; *R. apiculatus* var. *obscctifolius* × *cæsius*; *R. cuspidatus* N. Boul. *Ronc. vsg. n° 19, non P.-J. Müll.* — Exsicc. : *Sud. Rub. rar.* n° 149! — *Folia minule serrulata.*

GALLIA : *Ardèche*, roche de Gourdon (Revol); *Maine-et-Loire* (Bouvet); *BELGIA* : Husquet; *BRITANNIA* : Herefordshire (A. Ley). — *β. GALLIA* : forêt de Retz. — *γ. Vosges.*

R. MICANS × *CÆSIUS*; *R. SEMIMICANS* Sud.; *R. prasinus* F. Gérard f. *pseudopsis* (*non Grl.*) Ch. Magn. *Fl. sel.* n° 2176. — Exsicc. : *Sud. Bat. eur.* n° 712. — *Habitus R. micantis* God. sed *turio* subteres, fere glaber, parce glandulosus; *foliola* latiora; *petala* late ovata. *Sterilis.*

β. SCHISTOGENES; *R. schistogenes* P.-J. Müll. *in Wirtg. Hb. rub. rh. ed. I n° 112*; *ed. 2 n° 48*; *R. dumetorum* var. *schistosus* Wirtg. *prius*; *R. micans* var. *Hasskarlii* × *cæsius* Sud. — *Turio* *angulatus*, *pilosus*, *rachis* *hirsuta*, *armata*; *sepala* *glanduloso-aciculata*; *petala* *orbicularia*.

γ. DENISPINUS; *R. densispinus* Sud. *Rub. Pyr. p. 180 (1902)*; *R. micans* var. *schistophilus* × *cæsius*. — Exsicc. : *Sud. Rub. rar.* n° 190! — *Aculei* *crebri*, *serratura* *æqualis*, *sepala* ± *erecta*; *fertilis.*

GALLIA : *Vosges*, Granges, au Pré Genest (F. Gérard); Granvillers (Biau). — *β. GERMANIA* : *Prov. rhenana*, Lahn (Wirtgen) — *γ. GALLIA* : *Hauts-Pyrénées*, vallée d'Aure.

R. MICANTIFORMIS × *CÆSIUS*; *R. HORRIDIRAMUS* Sud. *Rub. tarn. p. 60 (1909)*. — A præcedente differt *turione* *glabro*, *glaucescenti*; *foliolis* *latioribus*, *terminali* *suborbiculari*.

GALLIA : *Tarn*, Valdériès, prope Bégous.

R. PULCHER × *CÆSIUS* Sud. *ap. Gandg. Nov. Conspp. p. 161 (1905)*; *R. FRUCTICETORUM* M. et Lef. *Vers.* n° 225 (1859). — Exsicc. : *Sud. Rub. rar.* n° 149. — *Turio* *parce pilosus*, *aculei* *erubescentes*. *folia* *subdiscolora*, *sepala* *erecta* *R. pulchrum* M. et L. *revocant*; *sed turioni* *minus angulosus*, *stipulis* *latis*, *petalis* *suborbicularibus*, *subalbis* *diversus est*. *Parum fertilis.*

GALLIA : *Aisne* et *Oise*, ravin d'Antilly (Lefèvre), taillis d'Ivors (Questier).

Obs. — Le *R. SUBSESSILIS* Hal. O. B. Z. (1891) p. 12; *Oest. bromb.* p. 282, pourrait peut-être prendre place ici; il m'est inconnu. — *Austria* : Wien (Halacsy).

b — × e Concoloribus

R. GRANULATUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIGRANULATUS* Sud. *Rub. Bav.* p. 34 (1912); *R. serpens* Godr. *pr. min. p.* — Exsicc. : *Wirtg. Hb. rub. rh. ed. 1 n° 67 (var.).*

Turio *subangulatus*, *glaber*, *epruinosus*, *heteracanthissimus*; *folia* *subtus* *viridia* *pubescentiaque*, *caul.* 3-5-nata; *foliolum* *terminale* *cordato-orbiculare*, *acutum*; *rachis* *laxe* *pilosa*, *aculeis* *validis*, *glandulis* *sparsis* *munita*; *sepala* *patula*; *petala* *alba*, *orbicularia*.

GALLIA : *Nord*, Expoëde (B. de Les Iain); *Haute-Saône*, Bougey (Madiot); *Seine-et-Oise*, Meudon (Grenier); *Mayenne*, Château-Gontier (Henry); *BELGIA* : *Saint-Denis* (Martinis); *GERMANIA* : *Prov. rhenana*, Ehrenbreitstein (Wirtgen); *Bavaria*, Amberg Kaufmann.

R. TIMBAL-LAGRAVEI × *CÆSIUS*.

R. RADULICAULIS × *CÆSIUS*; *R. ANGULIDENS* Sud. *Diagn.* p. 59 (1906). — Habitus *R. radulicaulis* sed turio subteres, aculei rameales recti, petala lata, alba. Parum fertiles.

GALLIA : Loire-Inférieure, Auverné (de l'Isle).

(T. CCX) — *R. FUSCUS* × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 161; *R. FUSCIBRACTEUS* Sud.; *R. dumetorum* var. *campostachys* F. Kretzer in Baenitz *Hb. eur.* (an. 1885) an G. Braun?; *R. semifuscus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910), 229, non *Rub. Eur.* p. 103. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 256; *Rub. gall.* n° 100 (s. n. *R. spinosissimi*).

Ad *R. fuscum* Wh. *turionibus* pilosis, scabris, aculeis validis; *foliis* (12) 5-natis, subtus viridibus pubescentibusque, grosse serratis; *inflorescentia* ± elongata, pilosa, glandulosa armataque (13) accedit; sed *turiones* minus angulosi, *foliola* terminalia latiora, cordata, infima subsessilia, *sepala* diverse patula, *petala* lata. *Flores* albi, substeriles.

GALLIA : Oise, Vosges, Sarthe, Eure, Maine-et-Loire, Seine-et-Oise, etc.; BELGIA; GERMANIA : Braunschweig (F. Kretzer), Lenterdorf (Bodewig).

R. RETRODENTATUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIRETRODENTATUS* Sud. *Diagn.* p. 60 (1906). — Habitus *R. retrodentati* sed turio subteres, glaucescens, glabrescens; *inflorescentia* latior, parum pilosa; *calyx* erectus.

GALLIA : Valois, enclave du Cuvret (Questier).

R. FOLIOSUS × *CÆSIUS*.

R. FLEXUOSUS × *CÆSIUS*; *R. FOLIOSIFORMIS* Sud. *Rub. Hb. Bor.* p. 97 (1902); *R. tuberculatus* Bab. *Fl. of Camb.* 306 (1860) et *Brit. Rub.* p. 280, ex pte; *R. dumetorum* var. *rotundifolius* (G. Braun) F. Kretzer ap. Baenitz *Hb. eur.* (an. 1888). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 797 (s. n. *R. fruticetorum*, non M. et L.); Sud. *Rub. rar.* n° 192. — *Folia* 3-5-nata, argute serrata, subtus viridia pubescentiaque; *foliolum* terminale ovatum, leviter emarginatum, acuminatum; *inflorescentia* foliosa, aculeis tenuibus, sparsis munita; *flores* albi, parum fertiles. A *R. flexuoso* differt turione subtereti, glabrescenti, inflorescentia brevirore, parum pilosa, sepala erectis, petalis latis.

GALLIA : Valois, Coyolles (Questier); Pas-de-Calais, Aix-sur-Gohelle (Boulay); Haute-Saône, Jussey (Madiot); GERMANIA : Guestphalia (Demandt), Hambourg (Erichsen); Prov. rhénane (Bodewig); BRITANNIA : Kent (Wolley-Dod), Thirsk (Baker), etc.; BELGIA : Petit Rechain, Watermael.

OBS. — Le *R. JENSENI* J. Lange *Fl. Dan.* f. 48 p. 7 (1871); Focke *Syn.* p. 392 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 637, appartient peut-être à ce groupe: *Turio* subteres, parce pilosus, aculeis debilibus munitus; *folia* grosse serrata, subtus viridia; *foliolum* terminale latum, cordatum; *inflorescentia* elongata, parum armata; *sepala* erecta, flores albi. — GERMANIA BOREALIS : Slesvig.

R. CORYMBOSUS × *CÆSIUS* Sud. ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 161 (1903); *R. ROTUNDIFOLIATUS* Sud.; *R. rotundifolius* P.-J. Müll. in *Flora* XLI (1858) p. 178, non Reinw. (1855). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 193! — *Folia* minute serrulata ut in *R. corymbosum*, sed *foliolum* caul. terminale suborbicularis, cuspidatum, calyx erectus.

GERMANIA : Alsatia, Weissenburg, lignes du Pigeonier, Heiligenbach (Müller); Badenia (Goetz); Bavaria, Wengen (Zinsmeister); BOHEMIA : Mohren (Spribille); GALLIA : Rhône, Lyon (Jordan); Vosges, Granges, Bruyères (Biau); HELVETIA : Regelstein (R. Keller).

R. CÆSIUS × *CORYMBOSUS*; *R. CÆSIFORMIS* Sud. *Bull. Assoc. Pyr.* n° 309 (1904). — Exsicc. : Sud. *Hb. rub. rar.* n° 23! — *R. cæsio* similis a quo differt foliolis minus latis, subæqualiter serratis, pedicellis glandulosioribus, sepalis patulis.

GERMANIA : Alsatia, Weissenburg (Müller).

R. INSERICATUS × *CÆSIUS*.

R. GRAVETII × *CÆSIUS*; *R. PSEUDO-GRAVETII* Sud. *Bull. Soc. Belg.* (1910) p. 229. — Habitus *R. Gravetii* sed turio glabrescens, foliola latiora, petala suborbicularia. Flores rosei, sepala reflexa.

BELGIA : de la chaussée Saint-Pierre à Bemel (du Pré).

R. ADORNATIFORMIS × *CÆSIUS*. — Des spécimens récoltés par de l'Isle dans la Loire-Inférieure paraissent avoir cette origine.

R. INFESTUS × *CÆSIUS*; *R. REISSII* Utsch, Baenitz *Hb. eur.* (1887); *R. Lindleyanus* × *cæsius* ej. l. c.

Turio angulatus, glabrescens, aculeis subæqualibus, minoribus sparsis, papuliformibus, majoribus subcompressis; *folia* 5-nata, subtus viridia et parce pilosa, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale cordato-ovatum, acuminatum, petio-lulo proprio triplo vel quadruplo longius; *ramus* glabrescens; *inflorescentia* laxe pilosa, glandulis inæqualibus, aculeis validis instructa; *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, aciculata, patula; *petala* ovata, alba vel dilute rosea; *stamina* stylique pallida; *germina* parce pilosa; *fructificatio* non tota.

GERMANIA : Guestphalia (J.-P. Reiss), Braunschweig, etc.

R. DREJERI × *CÆSIUS*; *R. PYRACANTHUS* Lange (pr. sp.) *Bot. Tidsskr.* XVI, 108 (1887); *R. diversifolius* C. pyracanthus Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 636. — Exsicc. : *Rub. Dan.* et *Slesv.* n° 21; Baenitz *Hb. eur.* (an. 1885 s. n. *dumetorum* var. *trachyadenes* F. Kretzer et *R. oreogeton* var. *germ.* et *anth.* *hirsutis* F. Kretzer).

Turio angulatus, parce pilosus, glandulosus, subscaber; *folia* pleraque 5-nata, argute serrata, subtus pubescentia; *foliolum* terminale breviter obovatum, cuspidatum; *sepala* patula, glandulosa; *antheræ* ± pilosa.

GERMANIA BOREALIS : Slesvig (Lange); Braunschweig (F. Kretzer).

R. THYRSIFLORUS × *CÆSIUS*; *R. SEMITHYRSIFLORUS* Sud.; *R. dumetorum* a *vulgaris* W. et N. *Rub. germ.* p. 99 (1825) t. XLV, p. p.; *R. oreogeton* (Focke) f. *debilis* Scheppig ap. Baenitz *Hb. eur. fasc.* LVII.

Turio angulatus, glabrescens, glanduloso-heteracanthus; *folia* caul. 3-5-nata, simpliciter serrata, subtus viridia pubescentiaque; *foliolum* terminale orbicularis, cordatum, abrupte acuminatum; *ramus* pilosus, aculeis debilibus; *inflorescentia* hirsuta, dense glandulosa, parum armata; *sepala* viridia, pilosa, glanduloso-aculeata, in fructu laxe erecta; *flores* albi.

GERMANIA : Guestphalia, Saxonia, Braunschweig, Pomerania.

R. PALLIDUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIPALLIDUS* Sud.; *R. mollis* Holuby *O. B. Z.* (1873) p. 377, non alior.; *R. Holubyanus* Sabrs. *O. B. Z.* (1887) n° 6, non Gandg. (1884).

Turio obtusangulus, pilosus, glandulosus, aculeis inæqualissimis; *folia* 3-5-nata, subtus viridia et parce pilosa, inæqualiter serrata; *foliolum* terminale late cordato-ovatum, acuminatum; *inflorescentia* pilosa, glandulosa, aculeis tenuibus; *sepala* ± erecta; *flores* albi.

HUNGARIA : Pressburg (Holuby); GERMANIA : Posen, Krostochin (Spribille); Pomerania, Stettin (Holzfuss).

R. DRYMOPHILUS × *CÆSIUS*; *R. DRYMOPHILOIDES* Sud. — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 795 (*R. fruticetorum* f. *amplifolia*), 901, ex pte (s. n. *R. Læhri*). — *Folia* ampla, foliolis latis ut in *R. drymophilo*, sed *inflorescentia* corymbosa, petala orbicularia.

BELGIA : Watermael, route de Boitsfort, Brabant-Beaulieu (Durand).

R. CHLOROCaulon var. *fusciformis* × *CÆSIUS*; *R. MACQUELINENSIS* Sud. *Diagn.* p. 59 (1906). — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 194! — Differt a *R. chloroc.* var. *fusciformi* foliolis latioribus, cordatis, *inflorescentia* brevi, petalis suborbicularibus.

GALLIA : Valois, bois de Macquelaines (Questier).

R. LOEHRI × *CÆSIUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910) p. 230; *R. AXILLARIFLORUS* Lef. et M. *Vers.* n° 228 (1859). — Exsicc. : *Assoc. rub.* n° 526, 794, 796, p. p. — Folia grosse serrata, inflorescentia elongata, foliosa ut in *R. Læhri* Wirtg., sed aculei recti, petala suborbicularia, fructus male evolutus.

β. *CHLORONEUROMORPHUS*; *R. Læhri* v. *chloroneurus* × *cæsius*. — Inflorescentia densa.

γ. *LUGIACUS* Kinscher, *Repert.* (1909) p. 344; *R. Læhri* v. *foliolatus* × *cæsius*. — Inflorescentia laxa, armata.

GALLIA : *Valois*, Crépy, Tillet (Lefèvre); *Nord*, Verlinghen, *Eure-et-Loir*; BELGIA : Watermael (Durand), val Saint-Lambert (Aigret). — *Valois*, route de Boursonne (Questier). — γ. SILESIA, Bankau (Kinscher).

R. OBSCURUS × *CÆSIUS*; *R. PILOSSIMUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909).

Turio dense pilosus, subteres, glandulosus, aculeis inaequalissimis; *folia* 3-5-nata, subtus viridia pilosaque; *foliolum* terminale suborbiculare, cordatum, breviter acuminatum; *ramus* pilosus; *rachis* pilosa, glandulosa, parum armata; *sepala* patula vel erecta; *petala* pallide rosea. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, Pont-de-Cirou.

R. ENTOMODONTUS × *CÆSIUS*; *R. ENTOMODONTOIDES* Sud. *hb.* — Habitus *R. entomodonti* sed *turio* glabrescens, *foliolum* caul. terminale orbiculare, petala latiora. Flores rosei, steriles.

GALLIA : *Valois*, Bourneville (Questier).

R. ERRATICUS × *CÆSIUS*; *R. FABRIMONTANUS* Spribille *Jahr. Schl. Ges.* (1905) p. 108; *R. Mikaniif* Baenitz *Hb. eur.* n° 9543; *R. oreogeton* (Focke) f. *ruber* Baenitz l. c., Erichsen. exsicc. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 713! — *Turio* obtusangulus, parce pilosus, aculeis inaequalissimis; *folia* 5-nata, subtus viridia, pilosa, argute et aequaliter serrata; *foliolum* caul. terminale orbiculare, cordatum, cuspidatum; *rachis* pilosa, dense glandulosa, aculeis mediocribus; *sepala* tomentosa, pilosa, glanduloso-aculeata, in fructu erecta; *petala* rosea, *antheræ* glabrae.

GERMANIA : Schleswig-Holstein, Braunschweig (F. Kretzer), Ahrensburg (Erichsen); *Silesia* (Baenitz, Spribille, Kinscher); *Saxonia*, Hohenstein (Missbach).

R. MENKEI × *CÆSIUS*; *R. STERILISATUS* Sud. *Diagn.* p. 60 (1906).

Ad *R. Menkei* Wh. *turionibus* subteretibus, pilosis, *foliis* 3-natis, subtus viridibus, *inflorescentia* pilosa, glandulosa, aculeis validis munita accedit; sed aculeis rectis, *foliolo* terminali emarginato, *inflorescentia* brevi, *petalis* latis diversus est. Flores albi, steriles.

GALLIA : Vienne, Le Rond (de Lacroix).

D. — × e Rudibus

R. OMALUS × *CÆSIUS*; *R. OMALOIDES* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909). — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 714.

Turio obtusangulus, glaber, glaucescens, scaber, aculeis compressis; *folia* ampla, 3-5-nata, subtus viridia et parce pilosa; *foliolum* caul. terminale basi cordatum; *ramus* angulatus, glabrescens; *rachis* epilosa, glandulosa; *petala* lata, alba vel pallide rosea; *sepala* patula vel reflexa. Sterilis.

GALLIA : *Tarn*, bois du Cayla, à Laboutarié; GERMANIA : *Saxonia*, Grossenhain (Hofmann).

R. SCHUMMELII × *CÆSIUS*; *R. SCHUMMELIFORMIS* Sud. et Kinsch. — Habitus *R. Schummelli* Wh. sed *turio* glaucescens, subteres, foliola latiora, petala orbicularia, sepala patula.

GERMANIA : *Saxonia*, Waldheim, p. Lindenholz (Kinscher).

R. MELANOXYLON × *CÆSIUS*; *R. DECORATUS* Sud. et Bouvet ap. Bouvet *Rub. Anj.* (1903) p. 689; (1907) p. 89; *R. ferox* Bor. *Fl. cent. éd. 3* p. 188, p. p. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 715!; *Assoc. rub.* n° 461 (s. n. *R. callianthi*).

Turio angulatus, glaber; *folia* 5-nata, grosse serrata, subtus viridia, *inflorescentia* parce pilosa, glanduloso-armatissima, Flores rosei *R. melanoxyilonem* revocant, sed *turionibus* ± glaucescentibus, *foliolis* latioribus, *stipulis* lanceolatis, *inflorescentia* brevi, laxa, *petalis* latis diversus est. *Calyx* patulus.

GALLIA : Maine-et-Loire, Montreuil-Belfroid (Bouvet); GERMANIA : Prov. *rhenana*, Schoeneberg, vallée de la Broel (Bodewig).

(T. CCXI). — *R. RUDIS* × *CÆSIUS*; *R. ADENOLEUCUS* Chaboiss. *Bull. Soc. Bot. Fr.* VII (1860), 267; *Et. sp. g. Rub.* p. 28 (1863), pr. sp.; *R. prasinus* Focke in *Abh. N. V. Bremen* I, 302 (1868); *Syn.* p. 394; *ap. Asch.* et Gr. *Syn.* VI p. 634; *R. fruticorum* Gen. *Mon.* p. 71, non M. et Lef.; *R. implexus* Lef. *Assoc. rub.* n° 186 (1875), 239; *R. horridus* J. Harmand *Rub. M.-et-Mos.* p. 37, pl. XV f. 6, 7 (1887), non alior.; *R. Friesii* Sbp. *venustus* Erichsen *Verh. N. V. Hamgb.* (1900), 3, non Favrat; *R. cæsius* × *geniculatus* Demandt exsicc.; *R. discerplus* × *cæsius* Sud. prius; *R. leptocaulon* f. *aspera* Progel; *R. ronensis* R. Kell. *Nat. G. Wint.* (1906) 33. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 149 (*R. implexus*!), 716 (*R. adenoleucus*!).

Turio *R. rудis* Wh.; *folia* 3-5-nata (1), inaequaliter serrata, subtus viridia; *foliolum* terminale ovato-rhombeum vel subobovatum, basi integrum vel leviter emarginatum, acuminatum; *ramus* glabrescens; *rachis* subepilosa, glandulosa ut in *R. rudi* (2); *sepala* tomentoso-viridia, glandulosa, parce aculeata, patula vel erecta; Flores albi vel dilute rosei; *stamina* stylos pallidos superantia.

β. *INTEGELLIFORMIS*; *R. rудis* var. *integellus* × *cæsius*; *R. INTEGELLIFORMIS* Sud. *Diagn.* p. 60 (1906). — Differt a *R. rudi* var. *integello* *turionibus* pruinosis, aculeis conicis, foliolo terminali emarginato.

GALLIA : Vienne, Pindray (Chaboisseau); Oise, Buisson de Waligny (Questier, Lefèvre); Meurthe-et-Mos., Atton (J. Harmand); Seine-et-Oise, Marly-le-Roi, Etang-la-Ville (Biau); HELVETIA; BELGIA; AUSTRIA; GERMANIA : Schleswig-Holstein, Guestphalia, Bavaria, etc. — β. GALLIA : *Valois*, de Billemont à Bourgfontaine (Questier).

R. CÆSIUS × *RUDIS*; *R. rectisetus* Sud. ap. Gandg. *Nov. Conspl.* p. 161 (1905); *R. scaber* × *cæsius* Sud. l. c. — Gracilis; *turio* pruinosis, glaber, aculeis debilibus, rectis; *folia* 3-4-nata, inaequaliter serrata; *foliolum* terminale late ovato-rhombeum, emarginatum; *inflorescentia* brevis, dense glandulosa, epilosa, aculeis crebris; *calyx* erectus.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg (Müller); BELGIA : Etterbeck, Woluwe-St-Pierre (du Pré).

E. — × e Hystricibus

R. FUSCO-A TER × *CÆSIUS* Sud.; *R. POMERELLICUS* Holzfuss in *hb.* Sud.

Turio aculeique *R. fusco-atri* Wh.; *foliolum* caul. terminale longe petiolatum, suborbicular, cordatum, breviter acuminatum; *folia* 5-nata, grosse serrata; *inflorescentia* laxe hirsuta; *petala* orbicularia, rosea; *sepala* ± erecta. Substerilis.

GERMANIA : Pomerania, prope Rützen (Holzfuss); Prov. *rhenana*, Lentendorf (Bodewig).

R. BILLOTII × *CÆSIUS* Sud.; *R. AMBLYSTACHYS* P.-J. Müll. in *Bonpl.* p. (1861) p. 307.

Turio subteres, pilosus, epruinosus, aculeis compressis; *folia* 5-nata, inaequaliter serrata, subtus viridia pilosaque; *foliolum* terminale late cordato-ovatum, breviter acuminatum; *rachis* hirsuta, glandulosa pallidis obsita; *sepala* hirsuta, dense glanduloso-aciculata, fructum amplectentia; *petala* rosea; *stamina* stylos pallidos æquantia.

GALLIA : Vosges, Gérardmer, route de Saint-Dié, entre le pont et les premières maisons (Müller).

R. OBTRUNCATUS × *CÆSIUS*.

R. HORRENS × *CÆSIUS* Sud. in hb. Mus. Paris.; *R. ERYTHRACANTHUS* M. et Lef. Vers. n° 191 (1859). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 195 ! — *Turio pilosus*, aculei validi, crebri, *folia discolora*, *flores rosei* *R. horrentem* revocant; sed foliolis latioribus, inflorescentia breviore, petalis orbicularibus, sepalis patulis diversus est. *Fructificatio* non tota.

GALLIA : Valois, Boursonne (Lefèvre, Questier).

R. LEJEUNEI (gr.) × *CÆSIUS*; *R. CORYMBIFLORUS* P.-J. Müll. (pr. sp.), Vers. n° 230 (1859).

Turio angulatus, laxe pilosus, aculeis inaequalissimis; *folia* 3-5-nata, grosse serrata, subtus viridia pubescentiaque; *foliolum terminale* orbiculare, cordatum, acuminatum; *inflorescentia* laxe pilosa, dense glandulosa; *sepala* tomentosa, pilosa, glanduloso-aciculata, in fructu patula vel erecta; *petala* staminaque rosea; *styli* pallidi.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg, prope Weiler (Müller).

R. EMARGINATUS var. *atrirubens* × *CÆSIUS*; *R. SEMIATRIRUBENS* Sud. Diagn. p. 60 (1906). — Exsicc. : Sud. Rub. rar. n° 196 !

Characteres *R. atrirubentis* sed foliola ampliora, inflorescentia brevior, petala latiora, sepala ± erecta. Heteracanthissimus et substerilis. GALLIA : Valois, route de Faverolles, Rond-des-Dames, forêt de Retz (Questier).

R. ROSACEUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIROSACEUS* Sud. Diagn. p. 60 (1906).

Turione glabrescenti, *foliis* (3) 5-natis, grosse serratis, subtus viridibus et glabrescentibus, *inflorescentia* parum pilosa, dense glandulosa (4), petalis (5) roseis *R. roseaceo* Wh. similis; sed foliola latiora, sese tegentia, *inflorescentia* brevior, *sepala* in fructu erecta. *Fructificatio* non tota.

GALLIA : Valois, Waligny (Questier).

R. HYSTRIX × *CÆSIUS* Sud.; *R. FEROX* Wh. in Boennigh. Prod. Fl. Mon. 153 (1824); *R. dumetorum* & *ferox* Wh. et N. Rub. germ. 100, t. 45 B; *R. polycarpus* G. Braun exsicc., non Holuby; *R. horridus* Focke Syn. p. 403, an F. Schultz Fl. Starg. suppl. 30 (1819); *R. diversifolius* D. ferus Focke ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 636.

Turiones ramique aculeis crebris, glandulis longis dense obsita, *flores rosei* *R. hystricem* Wh. revocant; sed *foliolum caulinum* terminale suborbiculare, emarginatum, abrupte acuminatum, *petala* orbicularia.

β. *SEMIVELATUS*; *R. hystrix* v. *velatus* × *cæsius*; *R. semivelatus* Sud. Diagn. p. 61 (1906). — A *R. hystrici* v. *velato* differt turione glabro, foliis 3-natis, inflorescentia brevi, aculeis rectis, petalis lati.

GERMANIA : Guestphalia, Mennighuffen (Weihe); GALLIA : Valois, forêt de Retz, laie d'Emeille (Questier). — β. Valois, forêt de Retz (Questier).

R. RUFESCENS var. *dasyphyllus* × *CÆSIUS*; *R. DASYPHYLLOIDES* Sud. Obs. Set of Brit. Rub. p. 15 (1904); *R. dumetorum* var. *ferox* Rogers Handb. Brit. Rub. p. 93, non W. et N.; *R. dumetorum* var. *rubriflorus* Purchas in Journ. Bot. (1894) 139, 197; Rogers l. c. p. 94. — Exsicc. : Set of Brit. Rub. n° 49, 131. — *Turio* glaucescens, heteracanthissimus, aculeis pallidis, compressis; *folia* 3-5-nata, subtus viridia pilosaque; *foliolum terminale* ovatum, emarginatum, acuminatum; *rachis* hirsuta, aculeis validis, pallidis, rectis, glandululis longis instructa; *sepala* patula; *flores* rosei, staminibus longis.

BRITANNIA : S. Hants, Bournemouth (Rogers); S. Derby, Shirley (W. R. Linton), etc.

(T. CCXI) — *R. KŒHLERI* × *CÆSIUS* Sud. Bull. Soc. Bot. Fr. (1905) p. 332; *R. OREOGETON* Focke (pr. sp.) Syn. p. 404 (1887) et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 636, p. p.; *R. nemorosus* b. *montanus* Wimm. Fl. Schl. 3, 631 (1857); *R. vestitus* X (1887) et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 636, p. p.; *R. fallens* R. Kell. Bull. Hb. Boiss. (1904) p. 424; *R. laticors* Kinscher (serpens × *Bellaridit*) Utsch. in Baenitz Hb. eur.; *R. montivivus* Kinscher Allg. Bot. Zeit. (1910). — Exsicc. : Baenitz l. c. n° 9582; Herb. dendr. n° 238 (*R. Kœhleri*); Sud. Bot. eur. n° 717, 718 (*R. laticors*), 719 (var.).

Turionibus angulatis, glabrescentibus, aculeis crebris, validis, inaequalissimis, *foliis* (6) caul. plerumque 5-natis, floribus albis *R. Kœhleri* Wh. revocant; sed *petala* (8) latiora, *stipulae* lanceolatae, *sepala* in fructu erecta (7). Substerilis.

GERMANIA : Silesia, Saxonia, etc.; BELGIA ; GALLIA : Vosges; HELVETIA.

OBS. — On applique fréquemment le nom de *R. oreogeton* à des formes d'origine bien différente.

[*R. KOEHLERI* × *CÆSIUS* (OREOGETON)] × *IDÆUS* Hofmann; *R. IDÆIFORMIS* Sud. et Hofmann! — Eglandulosus; *aculei* crebri, subconici; *folia* 3-5-7-nata, subtus ± cinereo-tomentosa; *rachis* aculeis crebris armata; *sepala* virescentia, albo-marginata; *stamina* stylis breviora; *germina* tomentosa. Sterilis.

GERMANIA : Saxonia, Grossenhain, prope Leckvitz (Hofmann).

R. ASPERIDENS × *CÆSIUS*; *R. SEMIASPERIDENS* Sud. Bull. Soc. Belg. (1910) p. 231. — Habitus *R. asperidentis* sed foliola latiora, marginibus sese tegentia, petala orbicularia, turio subteres.

BELGIA : Watermael, vers les Trois Tilleuls (du Pré); GALLIA : Seine-et-Oise, Gambais, forêt de Rambouillet (M^{me} Bélèze).

R. APRICUS × *CÆSIUS*; *R. SEMIAPRICUS* Sud. et Kinsch. — Habitus *R. aprici* Wimm. sed foliola latiora, petala late ovata, fructificatio non tota.

GERMANIA : Silesia, Münsterberg, Boehme (Kinscher).

F. — × e Glandulosis

R. CÆSIUS × *FURVUS* Sud. Rub. Pyr. p. 91 (1900); *R. BELLIDIPETALUS* Sud. l. c.

Differt a *R. cæsio* L. foliis caulinis 3-4-5-natis, floribus læte roseis. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Ascou.

R. FURVUS (grex) × *CÆSIUS*; *R. CHÉROPHYLLOMORPHUS* Kinscher (pr. sp.) Repert. VII (1909) 79. — *Turio* epruinosus; *folia* 3-4-nata; *foliolum terminale* breviter obovatum; *flores* rosei; *petala* ovata; *stamina* longa; *sepala* erecta.

GERMANIA : Saxonia, prope Ziegra (H. Kinscher).

R. AMPLIFRONS × *CÆSIUS*; *R. SEMIAMPLIFRONS*; *R. oreochares* Sabrs. in hb. Sud. an Focke ? ap. Asch. et Gr. Syn. VI. 632 (1902). — *Turio* glaber, aculei recti, petala lata, pulchrose.

AUSTRIA : Styria, Soeschau, Wasserscheide (Sabransky).

R. CÆSIUS × *PURPURA TUS* Sud. Rub. Pyr. p. 91 (1900); *R. IMPOTENS* Sud. l. c.

Differt a *R. cæsio* L. turionibus magis glanduloso-aciculatis, petalis roseis. Sterilis.

GALLIA : Ariège, Aulus.

R. SCABER × *CÆSIUS* Sud.; *R. PILOSUS* Wh., Lej. Rev. Spa p. 101, (1824) (nomen); *R. dumetorum* var. *pilosus* W. et N. Rub. germ. 99; *R. berolinensis* E. H. L. Krause (pr. sp.) Aoh. B. V. Brandg. XXV, 16 (1884); *R. subcæsius* Barber Fl. Oberl. III p. 150 (1911); *R. polycarpiformis* Spribille. — Exsicc. : Sud. Bat. eur. n° 721.

Habitus et characteres *R. scabri* Wh., sed turio glaber, aculei subrecti, fructus male evolutus. Sepala patula vel reflexa.

GERMANIA : Mennighüffen, Minden (Weihe); Jungfernhaide (Krause), Saxonia, Naundorf (Barber).

R. TERETICAULIS \times *CÆSIUS* Sud. ; *R. nodiflorus* Gremli *O. B. Z.* (1871), p. 95 (*nomen*) ; *R. monasterioli* R. Kell. p. p., *V. N. G. Zurich* (1909) ; *R. urbanosilvaticus* ej. *Mitt. N. G. Wint.* (1912) p. 41.

Turionibus teretibus, foliorum figura, aculeis raris, tenuibus, glandulis brevissimis *R. tereticaulem* revocat ; sed turiones glabri, glaucescentes, inflorescentia brevis, folia subtus glaucescentia.

HELVETIA : Lucerne (Gremli) ; Unterholz, Zurichberg (R. Keller) ; Fribourg ; **AUSTRIA** : Moravia, prope Mohren (Petrak) ; **GERMANIA** : Saxonie (Kinscher).

OBS. — Le n° 9066 de l'*Herb. europ.* de M. Baenitz (*R. prasinus*) semble avoir la même origine ; il a toutefois les glandes de l'inflorescence plus longues. Il n'est pas identique au *R. prasinus* de Brême. — **Badenia**, Waldkirch (Goetz).

R. FRAGARIIFLORUS \times *CÆSIUS* ; *R. abbreviatistamineus* Sud. in *hb. Müll. et ap. Gan Ig. Nov. Cons.* p. 162 (1905) ; *Diagn.* p. 61 (1906). — *R. fragariiflora* admodum similis a quo differt foliolis latioribus, inflorescentia brevi, lata, petalis orbicularibus. Stamina brevissima ; parum fertilis.

GERMANIA : Alsacia, Weissenburg, forêt de Steinseitz (Müller).

(T. CCXI) — *R. SCHLEICHERI* \times *CÆSIUS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 331 ; *R. ORTHACANTHUS* Wimmer *Fl. Schles.* 3, 626 (1857) ; Focke *Syn.* p. 390 ; *R. euorthacanthus* Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 633, p. p. ; *R. oreogeton* v. *Baenitzii* (Spribille) T. Schubé *Fl. v. Schles.* p. 174 (1903) (*nomen*) ; *R. Reichenbachii* Utsch, non Kœhl. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 9566 (s. n. *R. Reichenbachii*) ; Sud. *Bat. eur.* n° 722.

Ad *R. Schleicheri* Wh. turionibus teretibus, foliis (9) 3-natis, subtus viridibus, aculeis pallidis, compressis, crebris, inæquallimis accedit ; sed turiones glabri, aulei recti (18), stipulae foliaque latiora, inflorescentia brevis, obtusa, petala latiora. Substerilis.

GERMANIA : Saxonie, Thuringia, Bavaria, Silesia, Pomerania ; BOHEMIA ; BELGIA ; HUNGARIA ; HELVETIA.

R. CHLOROXYLON \times *CÆSIUS* Sud. *Rub. tarn.* p. 60 (1909) ; *R. INSIGNIOR* Sud. l. c. — Exsicc. : Sud. *Rub. rar.* n° 197 !

Turio pruinosis, glaber ; folia argute serrata ; foliolum terminale obovato-orbiculare, cuspidatum ; petala orbicularia ; calyx erectus. **GALLIA** : Tarn, Pierreségade, via Gijounet.

R. HUMIFUSUS \times *CÆSIUS* Sud. ; *R. Heimerlii* Hal. in *Verh. z-b. Ges. Wien* (1885) 668 ; *Oest. bromb.* p. 283, p. p. — *Turio* teres, pubescens ; folia 3-nata, argute serrata, subtus pubescentia ; foliolum terminale cordato-orbiculare, acutum ; rachis breviter pilosa, glandulis pallidis ; flores albi, staminibus longis ; germina glabra.

AUSTRIA : prope Schottwien (Heimerl, K. Richter) ; **HELVETIA** : Regelstein (R. Keller).

R. BELLARDII \times *CÆSIUS* Sud. ; *R. CAPITULATUS* Utsch in Baenitz *Hb. eur.* (1898) ; *R. Schleicheri* \times *Bellardii* ej. l. c. ; *R. krotoschinensis* Spribille *Zeit. Nat. Alt. Posen* (1902), 144, p. p. ; *R. chlorophyllus* var. *krotoschinensis* ej. *Verh. B. V. Brandg.* XL (1898) ; *Abh. Bot. Ver. Brandg.* (1900) p. 170, p. p. ; *R. orthacanthus* Focke, p. p. ; *R. corruptus* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 326 ; *R. montivitus* Kinscher, p. p. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 723 ; Baenitz *Hb. eur.* n° 9521 !

Folia 3-nata, minute serrata, subtus viridia, glaucescentia ; foliolum terminale late ellipticum, basi subintegrum, breviter acuminatum ; rachis laxe pilosa, dense glanduloso-aciculata. Foliorum figura, serratura, inflorescentia aciculata ut in *R. Bellardii* W. et N., a quo differt turionibus glabris, foliolis latioribus.

GERMANIA : Silesia, Posen ; **HELVETIA** : Fribourg, Villarimboud, chemin de Torny-le-Grand (Perroud).

R. RIVULARIS \times *CÆSIUS* ; *R. SEMIRIVULARIS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Belg.* (1910), p. 231 ; *R. monasterioli* R. Kell. *V. N. G. Zurich* (1909), p. p. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 724.

Habitus *R. rivularis* M. et W. sed aculei recti, foliola latiora, inflorescentia brevis, petala ovata vel suborbicularia. Inflorescentia aciculis flavescentibus densissime armata.

GALLIA : Haute-Savoie, St-Martin ; Vosges, Bruyères (Biau) ; **BELGIA** : Louette-St-Pierre (Gravet) ; **HELVETIA** ; **SILESIA** ; **BAVARIA** : Gleisenberg (Progel), Nürnberg, etc.

R. SETIGER \times *CÆSIUS* ; *R. setigeriformis* Sud. *Diagn.* p. 61 (1906). — Aculei pallidi, validi, crebri ; folia 5-nata, foliolum terminale suborbiculari, emarginatum, inflorescentia laxe hirsuta, stamna longa ut in *R. setiger* L. et M., a quo differt turionibus glaucescentibus, aculeis ramealibus rectis, petalis late ovatis. Fructus male evolutus.

GALLIA : Valois, forêt de Villers-Cotteret (Questier).

R. INCULTUS \times *CÆSIUS* ; *R. CORYMBULIEB* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1905) p. 334 ; *R. corymbosus* Pinkwart ap. Baenitz *Hb. eur.* n° 9941, non P.-J. Müll. — Folia grosse serrata, foliolorum figura, aculei validi ut in *R. inculto* Wirtg., sed turiones glaucescentes inflorescentia corymbosa, minus pilosa, flores substeriles. Petala angusta.

GERMANIA : Silesia, Prausnitz (Pinkwart) ; **BAVARIA**, Steinbrüche (Prechtelsbauer), Erlenstegen (Kaufmann).

R. RIVULARIS \times *MARTRINII* ; *R. OROGENES* Sud. — Aculei et glandulæ ut in *R. rivulari* ; stipulae dilatatae, folia discolora, petala orbicularia, alba.

GALLIA : Tarn, Valpairac près de la Bassine, dans les monts de Lacaune.

(T. COXI) — *R. SERPENS* \times *CÆSIUS* Sud. ; *R. SPINOSISSIMUS* P.-J. Müll. (pr. sp.) in *Flora* (1858) p. 177, n° 50 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 147 ; *R. chlorophyllus* Gremli *O. B. Z.* XXI (1871), 95 ; Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 634 ; *R. Sendtneri* Progel *Bot. Ver. Landsh.* (1882) p. 109, pr. max. p. ; *R. montivirus* Kinsch. p. p. ; *R. krotoschinensis* Spribille *Verh. B. V. Prov. Brandg.* XL (1898), 17 p. p. — Exsicc. : Baenitz *Hb. eur.* n° 8544, 10356.

Turio teres, glaucescens, parce pilosus, dense glanduloso-aciculatus ; folia 3-5-nata (11), argute serrata, subtus viridia, parce pilosa ; foliolum terminale suborbiculari, cordatum, abrupte et breviter acuminatum ; inflorescentia brevis, laxe hirsuta, glandulis longis, setis flavescentibus ± crebris obsita (12) ; sepala pilosa, glandulosa, ± aciculata, post anthesin erecta ; petala (13) magna, late ovata vel suborbicularia ; stamna styles pallidos superantia. Parum fertilis.

GERMANIA : Alsacia, Badenia, Saxonie, Bavaria, Silesia, etc. ; MORAVIA ; **HELVETIA** ; **GALLIA** : Vosges, Valois, etc.

R. LONGISEPALUS (gr.) \times *CÆSIUS* ; *R. PSEUDOPSIS* Gremli (pr. sp.) in Focke *Syn.* p. 394 (1877) et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 637 ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 149 ; *R. curvatus* G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 209 ; *R. serpens* God. ap. Gr. et G. *Fl. Fr.* I p. 538 ; J. Harmand *Rub. Meurt.-et-Mos.* p. 29, non Wh. ; *R. britannicus* Rogers *Journ. Bot.* (1894) p. 49 ; *Handb.* p. 93. — Exsicc. : F. Schultz *Hb. norm.* n° 782 ; Billot, n° 1248 ; *Rub. gall.* n° 95 ; *Set of Brit. Rub.* n° 105. — Differt a praecedenti foliis grosse serratis, caulin. 3-natis. Fructificatio non tota ; fructus epruinosus.

GALLIA : Meurthe-et-Moselle, Nancy, bois de Tromblaine (Godron) ; Valois, forêt de Retz ; **BRITANNIA** : Surrey.

R. ANGSTIFRONS \times *CÆSIUS* Sud. ; *R. SPINETORUM* M. et Lef. (pr. sp.) *Vers.* n° 229 (1859) ; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 148 ; *R. dumeto-hirtus* Questier in Billot *Annot. Fl. Fr. et All.* (1857) p. 107 et exsicc. n° 2060. — Exsicc. : Sud. *Bat. eur.* n° 725 ! — *Turio* glaucescens, subepruinosus ; folia pleraque 3-nata, subtus viridia, parce pilosa, acute et subæqualiter serrata ; foliolum terminale ellipticum, basi integrum vel vix emarginatum, acuminatum ; rachis hirsuta, setis glanduliferis longis obsita ; sepala pilosa, tenuiter glandulosa ; petala magna, ovata, alba ; stamna styles pallidos superantia. Parum fertilis.

GALLIA : Valois, bois de Thury, de Bourneville (Questier) ; **HELVETIA** : Fribourg, Chénens (Perroud).

R. LEPTADENES × *CÆSIUS* Sud.; *R. SEEBERGENSIS* Pfuhl *Abt. Nat. Ver. Posen* (1898), 82; *Scribille Verh. Bot. Ver. Brandg.* (1900) p. 171. — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 726. — Differt a *R. spinosissimo*: graciliore; foliolo caul. terminali basi angustiore, rachide epilosa.

GERMANIA: *Silesia*, Forst prope Neudorf; *Posen*, Kosten (Scribille); *Bavaria*, Schnaittach (Kaufmann).

(T. CCXI) — *R. HIRTUS* × *CÆSIUS*; *R. VILLARSIANUS* Focke (*pr. sp.*) ap. Gremli *Beitr. Fl. Schw.* 28 (1870); *Syn. p. 393*; ap. Asch. et Gr. *Syn. VI* p. 633; Schmid. *Cat. p. 212*; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 148; *R. spinosissimus* var. *commutatus* P.-J. Müll. in Boul. *Ronc. vosg.* p. 49; *R. hirtus* Merc. *Rub. gen. 271*; *R. Sendtneri* Progel, p. p.; *R. eriophyllum* R. Kell. *N. G. Zurich* (1909) (*non* Rip) et *R. apatetus* ej. l. c. (1909). — Exsicc.: *Assoc. rub.* n° 791, 792; Sud. *Bat. eur.* n° 45; N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 37.

Turio teres (14), pruinosis, parce pilosus, aculeis conicis, inæqualissimis, ± purpureis munitus; *folia* (15) pleraque 3-nata, subtus viridia pubescens; *foliolum* caul. terminale late ovatum vel suborbicularare, cordatum, breviter acuminatum; *inflorescentia* brevis, interrupta, foliosa, laxe hirsuta, glandulis longis, setis rubris dense obsita (16); *sepala* virescenti-tomentosa, glanduloso-aciculata, fructum amplectentia; *petala* obovata, alba; *stamina* alba stylos virescentes superantia. Fructificatio non tota. — Differt a *R. hirta* W. et K. stipulis latis, drupæolis maturis inflatis.

HELVETIA; GALLIA ORIENTALIS: *Haute-Savoie*, *Ain*, *Alpes-Maritimes*, *Haute-Saône*; BELGIA; GERMANIA: *Bavaria*.

OBS. — On rencontre des formes à étamines courtes qui dérivent du *R. Guentheri* W. et N. ou d'autres sous-espèces et qui ne peuvent guère être précisées que sur place; c'est le cas du *R. Guentheri* × *Villarsianus* Schmid.

[*R. HIRTUS* × *CÆSIUS* (*VILLARSIANUS*)] × *OMALUS* Sud. ap. *Gandg. Nov. Conspp.* p. 158 (1905); *R. DILATATIFRONS* Sud. l. c.; *R. pilocarpus* × *Villarsianus* Schmid. *Cat. p. 156*. — Differt a *R. Villarsianus* Focke: validiore, turione angulato, *foliis* 5-natis, calycibus laxè reflexis.

GALLIA: *Haute-Savoie*, *Chapelle-Rambaud*, M^e Voiron (Schmidely).

[*R. HIRTUS* × *CÆSIUS* (*VILLARSIANUS*)] × *TOIMENTOSUS* Sud.; *R. HOLOSERICEUS* Vest in *Stierm. Zeitschr.* III p. 163 (1821); *R. semitomentosus* Borb. p. p.; *R. Ebneri* Freyn *non* A. Kern.; *R. pachypeltitus* Sabrs. *prius* (*nomen*). — Exsicc.: *Bat. eur.* n° 727. — Differt a *R. Villarsianus* glandulis brevioribus, *foliis* latis, grosse serratis, subtus molliter cinereo-tomentosis, supra dense et appresse pilosis. — *Turio* obtusangulus, parce pilosus; *foliolum* terminale late ovatum; rachis parum armata, laxe pilosa, glan lulis purpureis, crebris munita; *sepala* patula vel reflexa; flores albi.

STYRIA MEDIA ORIENTALIS, in silvarum ad Sœchau frequens (Sabransky).

R. CÆSIUS × *HIRTUS*; *R. SUBTILLISSIMUS* Sud. *Rub. Pyr. p. 87* (1900); *R. oreades* F. Gérard *Pl. Vosges p. 75*, *non* M. et W.; *R. cæsius* × *Villarsianus* Favrat *Ess. mon.* (1881); *R. Mikanti* × *cæsius*, *cæsius* × *Mikanti*, *cæsius* × *serpens* × *macrophyllus* Utsch, ap. Baenitz *Hb. eur.*; *R. dollnensis* *Scribille Verh. B. V. Brandg.* (1900) p. 170 (*nomen*); *R. Jensenii?* var. *Scribillei* Pfuhl ap. *Scribille Zeit. N. V. Alt. Posen* (1902) p. 127 (47); *R. oreogeton* Sabrs. exsicc. — Exsicc.: Baenitz l. c. n° 9515, 9990, 10000, 10406; Sud. *Bat. eur.* n° 728 (*f. dollnensis*).

Differt a *R. Villarsianus* Focke: graciliore; aculeis brevioribus; glandulis minus densis; *foliolis* minoribus, minus latis; inflorescentia pauciflora. Substerilis.

GALLIA: *Pyrénées*, *Vosges*, *Alpes*, etc.; GERMANIA: *Posen*, *Silesia*, *Thuringia*, etc.; BOHEMIA; HUNGARIA, etc.

OBS. — Le *R. DOLLNENSIS* *Scrib.* semble dériver du *R. tenuidentatus* Sud.

Subg. II. — IDÆOBATUS — Focke

111 — (T. CCXIII) — **R. IDÆUS** L. *Sp. pl. p. I* p. 706 (1753); W. et N. *Rub. Germ. p. 107 t. 47*; Arrh. *Rub. Suec. p. 11 a. vulgatus* p. 12; Focke *Syn. p. 97 et ap. Asch. et Gr. Syn. VI p. 444*; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI* p. 33 et auct. plur.; *R. Idæus* v. *simplicior* Brenner *Bot. cent. 61* (1895).

Exsicc.: N. Boul. *Ronc. vosg.* n° 58; G. Braun *Hb. rub. germ.* n° 147, 186, 187; *Assoc. rub.* n° 139, 208, 259; *Set of Brit. Rub.* n° 51; Baenitz *Hb. eur.* n° 9534 (*inermis*), 9958, 9959 (*inermis*); Sud. *Bat. eur.* n° 150, 50 (*inermis*); *Soc. crenom.* n° 262 (*inermis*), 263.

Caudices horizontales, repentes, surculos emittentes; *turiones* (1, 2) erecti, teretes, pruinosi, glabri vel breviter pubescentes, aculeis vulgo crebris, debilibus, basi conicis, apice subulatis obtecti; *folia* 3-nata, 5-nato-pinnata (5) vel septenata, supra glabrescentia, subtus appresse niveo-tomentosa, inæqualiter et subsimpliciter mucronato-serrata; *foliolum* terminale ovatum, ovato-oblongum vel oblongum, breviter acuminatum, basi vulgo emarginatum, interdum lanceolatum [*f. angustifolius*] Schmid. *Bull. Soc. Bot. Gen.* (1888) 48, lateralia subsessilia; *stipulae* (1) filiformes, ciliatae; petiolus supra canaliculatus, ± pubescens, aculeis falcatis munitus; *folia ramealis* 3-nata; *inflorescentia* interrupta (4), foliosa, aculeis falcatis munita; *pedunculi* inferi, 1-2-flori, superi pluriflori, pedicellis tenuibus, ± nutantibus; *sepala* tomentosa, ovato-lanceolata, in flore patentia, in fructu patula vel reflexa (7); *petala* (5, 6) parva, oblonga vel lanceolata, erecta; *stamina* alba, in annulum simplicem disposita, æquilonga, stylis pallidis breviora; *germina* cinereo-tomentosa; *fructus* subglobosus, pubescens, sapidissimus, ruber, raro flavescens, stylis persistentibus; *receptaculum* conicum; *pollen* perfectum. — Variat ramis floriferis ramosissimis, ramulis elongatis, bracteis foliaceis numerosis dense onustis (8). [*R. Id. phyllanthus* Lange *Haandb. 4 Udg.* 768 (1888); *R. Id. f. strobilaceus* Focke in *Abh. Nat. Ver. Bremen XIII*, 470 (1893). — Exsicc.: Sud. *Bat. eur.* n° 729 (*). — Maius-julius, secundum altitudinem.

β. INERMIS Lej. et Court. *Comp. Fl. Belg. II*, 160 (1831); G. Braun, exsicc. — Turones, petioli pedicellique inermes (3).

γ. MARITIMUS Arrh. *Rub. Suec. p. 13* (1849); Focke ap. Asch. et Gr. l. c. p. 446. — Exsicc.: Ch. Magnier n° 1429. — Aculei crebri; folia ut in typo sed plicato-rugosa, superne obscure viridia; petiolus villosa-canescens; stamina in stylos incumbentia; drupæolæ canaliculatae.

δ. ANOMALUS Arrh. l. c. p. 14 (1840); Aresch. *Norges Rubi* 3 (Blytt *Norges Fl.* III); Focke *Syn. p. 100*; *R. Idæus* var. *simplicifolius* Blytt; *R. Idæus* var. *Leestii* Bab. *Syn. Brit. Rub. in Ann. Nat. Hist. XVII* (1846); *R. Leestii* Bab. *in Steele's Handb. p. 60* (1847); *R. Idæus* *sterilis* Kehler in Focke *Syn. p. 99* (1877); *R. Idæus* var. *obtusifolius* Focke *Zur Fl. v. Bremen*, 321; Rogers *Handb. Brit. Rub. p. 2* (1900); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 445*; N. Boul. ap. R. et C. *Fl. Fr. VI p. 34*; *R. obtusifolius* Willd. *Berl. Baumz.* 2 ed. 409 (1811) sec. Focke, *non* Genev. nec Ser. — Exsicc.: Baenitz *Hb. eur.* n° 9051; *Set of Brit. Rub.* n° 1. — Folia plerumque simplicia, cordato-rotundata vel reniformia (10), interdum 3-nata (9), foliolis imbricatis, grosse serratis vel lobatis; foliolum terminale brevissime petiolatum, orbiculare vel obovato-orbiculare, basi rotundatum. Sterilis subinermisque.

ε. DENUDATUS Schimp et Spenn. *Fl. Frib.* 743 (1829); Focke ap. Asch. et Gr. *Syn. VI p. 446*; *R. Idæus* var. *viridis* Döell *Rhein. Fl.* 766 (1843). — Exsicc.: Hofm. *Pl. crit. sax.* n° 311; Sud. *Bat. eur.* n° 730. — Glaber; folia subtus viridia; inermis vel ± aciculatus.

ζ. PURPUREUS Focke *Sp. Rub. p. 208* (1911). — Frons obscure purpurascens sicut in *Fagi silvatica* var. *purpurea*.

In locis lapidosis silvestribus, prosertim in regionibus montosis. — EUROPA tota. Præterea in ASIA et AMERICA borealis. — γ. SUECIA, in rupestribus maritimis. — δ. SUECIA, BRITANNIA, GERMANIA, HUNGARIA. — ε. GERMANIA: Altmark, Saxonia, Posen; STYRIA; GALLIA: Ain, vallée de la Valserine, Crêt de Chalame. — ζ. GERMANIA borealis: Lünebruger Heide (Focke).

(*) M. le Dr Chassagne a observé un cas tétratologique analogue pour le *R. ulmifolius* Ssp. *anisodon*, à Lezoux (Puy-de-Dôme): *R. ulmif. s. phyllantha* Chassagne in hb. Sud.

OBS. — Le *R. obtusifolius* Willd. a été diversement interprété. D'après Seringe (*in DC. Prodr.* II. p. 561) ce serait le *R. sanctus* Schreb., Genevier avait appelé de ce nom une forme dérivée du *R. tomentosus* Borkh. Pour ces raisons il me paraît préférable d'adopter le terme d'Arrhenius, dont l'auteur a donné une description très précise.

HYBRIDÆ

R. IDÆUS × PLICATUS Erikson exsicc. ; *R. ERIKSONII* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LVIII (1911) p. 36. — *Turio angulatus*, glaber, aculeis subæqualibus, parvis ; folia ut in *R. plicato* sed subtus cinereo-tomentosa ; flores ut in *R. Idæus* ; germina dense tomentosa ; Sterilis.

SUECIA MERIDIONALIS ; Karlshamn (J. Erikson).

R. IDÆUS × CÆSIUS Focke ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 446 ; *R. IDÆOIDES* Ruthe sec. Focke *Syn.* p. 411 ; Sud. *Bat. eur.* p. 16 et ap. Gandg. *Nov. Consp.* p. 162 ; *R. Idæo-cæsius* et *cæsio-Idæus* G. F. W. Mey *Fl. Han.* *excurs.* p. 172-173 (1849) ; *R. cæsius* var. *pseudo-cæsius* et *pseudo-Idæus* W. et N. Rub. *germ.* p. 106 t. XLVI ; *R. cæsio-Idæus* P.-J. Müll. *in Flora* (1858) p. 183 ; *R. Idæo-cæsius* Wirtg. *exsicc.* ; *R. cæsius* × *Idæus* Focke *Syn.* p. 411 ; *R. brevicauleatus* Lej. *hb.* — Exsicc. : Wirtg. *hb. rub. rh.* ed. I n° 116 ; ed. 2 n° 50 ; F. Schultz *hb. norm.* n° 465 ; G. Braun *hb. Rub. germ.* n° 100, 100^b, 183, 184 ; Assoc. *rub.* n° 988, 1052, 1128, 1129 ; Sud. *Bat. eur.* n° 49, 734, 732 ; Baenitz. *hb.* n° 9508, 9930 ; Favrat *rub. Helv.* n° 3^a.

Turio teres, aculeis subulatis ; *folia* 3-5-nata, raro 7-nata ; *inflorescentia* brevis, corymbosa. Sterilis.

BELGIA, GALLIA, HELVETIA, GERMANIA, AUSTRIA.

R. IDÆUS × PYRAMIDALIS E. L. Krause. — *Slesvig* : Vosbrock, prope Friederichsort. — Mihi novus est.

R. IDÆUS × BIFRONS ; *R. ALBINITENS* Sud. *Bull. Soc. Bot. Fr.* LVIII (1911) p. 37. — *Turio angulatus*, pruinosis, aculeis subæqualibus, compressis ; folia caul. 5-nata, subtus appresse albo-tomentosa ; foliolum terminale suborbiculare, cordatum, acuminatum, inflorescentia eglandulosa. *R. Idæum* revocat ; flores albi ; germina tomentosa. Sterilis.

GERMANIA : Stettin, prope Kückenmühle (E. Holzfuss).

Subg. III. — CYLACTIS Rafin.

Conspectus specierum

I. — Folia trifoliolata.

- A. — Pedunculi 2-10-flori ; filamenta staminorum apice sensim subulato-attenuata..... *R. saxatilis* L. 112.
- B. — Pedunculi 1-flori ; filamenta staminorum complanato-dilatata, apice abrupte subulata. *R. arcticus* L. 113.

- II. — Folia trilobata ; pedunculi uniflori ; filamenta staminorum complanato-dilatata, apice attenuata..... *R. humulifolius* C. A. Mey. 113 bis.

112 — (T. CCXIII) — ***R. SAXATILIS*** L. *Sp. pl. ed.* I, 494 (1753) ; W. et N. *Rub. germ.* p. 30 t. IX ; Arrhen. *Mon. Rub. Suec.* 52 ; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 42 ; Focke *Syn.* p. 95 et ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 443 ; Genev. *Mon.* p. 1 ; J. Harmand *Rub. M.-et-M.* p. 20 *pl.* I ; N. Boul. *ap.* R. et C. *Fl. Fr.* VI p. 32 ; Rogers *Handb.* p. 97 ; Sud. *ap.* Gandg. *Nov. Consp.* p. 162.

Exsicc. : Wirtg. *hb. rub. rh.* ed. I, n° 50, ed. 2 n° 91 ; G. Braun *hb. rub. germ.* n° 121 ; Billot n° 235 ; Favrat *rub. Helv.* n° 1 ; Assoc. *rub.* n° 138 ; Baenitz *hb. eur.* n° 9071 ; Sud. *Bat. eur.* n° 733.

Caulis annui ; steriles (1) subteretes, decumbentes, pilosi, aciculis parvis, rectis exasperati, apice sœpe radicantes ; fertiles (2) angulati, erecti, breves, pauciflori ; *folia* 3-nata, supra glabrescentia, subtus viridia, parce pilosa, grosse et inæqualiter dentata ; *foliolum* terminale ovato-rhombeum, basi cuneatum, apice obtusum vel acutum, breviter petiolatum ; *stipulae* caulinum sterilium lanceolatae, in caulinibus fertilibus ovatae ; *petiolus* hispidus, obsolete canaliculatus ; 3-8 flores parvi, fasciculati, in apice caulis fere in corymbum subumbellatum dispositi, interdum nonnulli axillares ; *sepala* virescentia, ovato-lanceolato-acuminata, in fructu patula vel subreflexa ; *petala* (3) parva, oblonga, erecta, alba ; *stamina* alba, erecta, stylis pallidos superantia, filamentis (4) apice subulato-attenuatis ; *germina* pilosa ; *fructus* (5) ruber, nitens, insipidus, e drupæolis paucis (2-6), rotundatis, discretis, inflatis, maximis compositus. *Pollen* purum ; *putanem* drupæolarum rotundato-ovatum, reticulatum. — Maius-junius.

In locis lapidosis et saxosis silvaticis per totam EUROPAM MEDIAM et BOREALEM. Præterea in ASIA BOREALI.

HYBRIDÆ

R. SAXATILIS × CÆSIUS ; *R. ARESCHOUGEN* A. Blytt (*pr. sp.*) *Bot. Notiser* (1875), p. 42 ; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 43. — Differt a *R. saxatili* L. *flagellis* glabris vel sparsim pilosis, aculeis conicis, inæqualibus munitis ; *stipulis* lanceolatis vel ovato-lanceolatis ; *serratura* minus grossa, *foliola* terminali sœpe subemarginato ; *sepalis* rotundato-ovatis vel ovato-lanceolatis, ± appendiculatis, post anthesin patulis vel erectis ; *petalis* latioribus ; filamentis subulatis. Sterilis.

SCANDINAVIA AUSTRALIS, ad Vik in Ringerike (Blytt), Haradstorp, etc. ; HUNGARIA ; BAVARIA, etc.

R. SAXATILIS × ARCTICUS ; *R. CASTOREUS* Laestadius (*pr. sp.*) *in Hn. Skand. Fl. ed.* 3 ; E. Fries *Nov. Fl. Suec. Mant. alt.* p. 37 (1839) ; *hb. norm.* III, n° 43 ; Arrhen. *Rub. Suec.* 54 ; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 39 ; *R. saxatilis* var. *b hybridus* Hartm. *Scand. Fl. ed.* 2 p. 438 ; Wahlgren *Fl. Suec.* n° 570. — Differt a *R. saxatili* L. : *flagellis* inermibus ; floribus longius pedunculatis, majoribus, vulgo dilute roseis, petalis calycine multo superantibus ; *filamentis* complanato-dilatatis, ± abrupte contractis. A *R. arcticus* L. dignoscitur : *caulinibus* vegetioribus ; *foliorum* inferorum *stipulis* minus dilatatis, minus obtusis ; *inflorescentia* 2-9-flora ; *petalis* angustioribus ; *drupæolis* paucis (5-6). *Fructus* ruber vel pallide violaceo-purpureus. *Pollen* imperfectum.

SCANDINAVIA, LAPONIA, FINLANDIA.

113 — (T. CCXIII) — ***R. ARCTICUS*** L. *Sp. pl. 708* (1753) ; *Fl. Suec.* ed. 2 n° 448 ; *Sp. p. ed. Wild.* 2 p. 1088 ; Wahl. *Fl. Lapp.* n° 260 ; Ser. *in DC. Prod.* II. p. 565 ; Hartm. *Scand. Fl. ed.* 3 p. 119 ; W. et N. *Rub. germ.* p. 111 t. XLVIII ; Arrhen. *Mon. Rub. Suec.* p. 55 ; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 38.

Radix repens, filiformis ; *caules* (6, 7) erecti, plerumque simplices, debiles, obtusissime tetragoni, inermes, leviter pubescentes ; *folia* 3-nata, subtus viridia glabrescentiaque, profunde et inæqualiter crenato-serrata ; *foliolum* terminale ovato-rhombeum, breviter petiolulatum, basi cuneatum ; *stipulae* foliorum inferorum orbiculares vel ovatae, obtusæ, foliorum superiorum angustiores, acutæ ; *pedunculus* vulgo uniflorus, terminalis, supremo folio suboppositus ; *calyx* virescens, lacinias (5-10) oblongo-lanceolatis, acutis, in fructu laxè reflexis ; *petala* (8) (5-10) purpurea, obovata, basi attenuata, apice integra, emarginata vel incisa, sepala longe superantia ; *stamina* numerosa, inæqualia, filamentis (9) purpureis, complanato-dilatatis, apice abrupte subulatis, antheris albis ; *germina* glabrescentia ; *fructus* e drupeolis numerosis, rotundatis, parum cohaerentibus, maturus nigro-purpureus, suaveolens, sapidissimus, gustu *Rubum Idæum* atque *Fragariam vescam* referens ; *putamen* drupæolarum oblongum, pollen purum. — Maius.

R. LEUCITICUS Fr. *hb. norm.* f. 12, n° 53 ; Aresch. *t. c. p. 39.* — Flores albi ; fructus pallide ruber.

In locis humidis sabulosis et glareosis. — SCANDINAVIA et ROSSIA BOREALIS. Præterea in AMERICA BOREALI.

113^{bis} — T. CCXIV — Le **R. humulifolius** C. A. Mey *Flor. prov. Wiatka, Beitr. Pfl. Russ. Reich.* p. 57 (1848). — Exsicc. : *Pl. Finl. exsicc. Mus. bot. Univ. Helsingf.* n° 262 — est une espèce de Sibérie qui se rencontre aussi dans les monts Ourals.

Caulis herbaceus, glaber, aculeis tenuibus, setaceis, rectis, inæqualibus obsitus; *stipulae* lineares, petiolares, interdum subnullæ; *folia* (2) trilobata, basi cordata, glabriuscula, subtus viridia, lobis ovatis, acutis, inæqualiter dentatis, lateralibus sœpe bilobatis; *petiolus* ± aculeatus, pedunculi axillares, uniflori; *sepala* lanceolato-acuminata, in fructu erecto-patentia; *petala* lanceolato-acuminata, calyce longiora; *filamenta* (2) staminorum dilatata; *fructus* acerbissimus e drupeolis paucis compositus.

Rossia ORIENTALIS : *Wiatka* (C. A. Meyer), *Karelia olonensis*, *Latva* (Lindroth et Cajander); in pascuis umbrosis et humidis ad fl. Issete, distr. Ekaterineburg, loco dicto Palkina (Clerc), etc.

Subg. IV. — CHAMÆMORUS Focke

114 — (T. CCXIV) — **R. CHAMÆMORUS** L. *Sp. pl. ed. I* 494 (1753); W. et N. *Rub. Germ.* p. 113 t. XLIX; Arren. *Mon. Rub. Suec.* p. 57; Focke *Syn.* p. 93; ap. Asch. et Gr. *Syn.* VI p. 442; Aresch. *Some Obs. g. Rub.* p. 37.

Exsicc. — Sud. *Bat. eur.* n° 734; Ch. Magnier n° 2706.

Dioicus. *Radix* repens; *caules* (3, 5) annui, erecti, inermes, plerumque simplices; *folia* (2, 3) simplicia, subreniformia, subquinquelobata, plicata, rugosa et undulata, lobis obtusis, inæqualiter serratis, subtus viridia, glabrescentia; *nodi* infimi aphylli, stipulis latis, ovatis, obtusis, sœpe glanduloso-ciliatis muniti; *flos* solitarius, terminalis, pedunculatus; *calyx* 5-partitus, lacinii ovatis, pubescentibus, glandulis subessilibus munitis, post anthesin patentibus; *petala* alba, magna, suborbicularia vel obovata, sepala longe superantia. *Flos masculus*: stamina alba, inæqualia, filamentis elongatis, anguste subulatis; *flos feminus*: stamina rudimenta; stylis elongati, apice divaricati; *fructus* (7) maximus, primum ruber, deinde læte flavus, e drupeolis sat numerosis, rotundato-angulatis, parum acidus sed grati saporis; *receptaculum* conicum, glabrum. — Maius-Junius.

In locis uliginosis turfosis. — EUROPA BOREALIS; præterea in ASIA et AMERICA subarctica.

