

Erable champêtre : *Acer campestre* L.

http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/*/nn/141

Arbre, à petites feuilles simples, opposées, à 5 lobes arrondis, et nervation palmée.
Floraison en avril – mai. Fleurs vert-jaune, fruits en double-samarès.

PORT	RAMEAU	ECORCE
 A photograph of a Acer campestre tree with a dense canopy of green leaves against a blue sky.	 A close-up photograph of a branch with green, palmately compound leaves and small yellow flowers.	 A schematic diagram of a cylindrical tree trunk showing vertical lenticels and horizontal lenticular scars from previous seasons.
FEUILLE	FLEURS	FRUITS
 A photograph of a single green leaf with five lobes and a serrated edge, set against a black background.	 A close-up photograph of small, yellowish-green flowers clustered together.	 A photograph of winged seeds (samaras) with red and orange wings attached to green stems.

Willow
CC BY-SA

Willow
CC BY-NC-SA

Pierre Bonnet
CC BY-SA

Les
CC BY-NC

Sten Porse
CC BY-SA

Wikimedia Commons
CC BY-NC

Érable de Montpellier: *Acer monspessulanum* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/182>

Arbre, à petites feuilles simples (3 à 6 cm), opposées, à 3 lobes arrondis et égaux. Floraison en avril. Fleurs vert-jaune, pendantes ; fruits en double-samarès, à ailes parallèles.

PORT 	RAMEAU 	ECORCE 
Fritz Geller-Grimm CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE 	FLEURS 	FRUITS 
Pierre Bonnet CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA	José María Escolano CC-BY-NC-SA

Marronnier : *Aesculus hippocastanum* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/1053>

Arbre, à feuilles grandes, opposées, composées, avec 5 à 7 folioles à marge dentée, caduques.

Floraison en avril – mai. Fleurs blanches teintées de rose.


PORT	RAMEAU	ECORCE
	 Biolimages CC BY-NC-SA	
FEUILLE  Bruce Marlin CC BY-NC	FLEURS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FLEUR  Daniel Mathieu CC BY-SA
FRUITS  Langå Egeskov CC BY-NC	FRUIT  Biolimages CC BY-NC-SA	

Arbousier : *Arbutus.unedo* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6055>

Arbuste, à feuilles simples alternes, persistantes, à marge dentée, limbe glabre et luisant.


Floraison de novembre à décembre. Fleurs blanches à corolle en forme de cloche.

PORT  Pavel Buršík CC BY-NC	RAMEAU  Daniel Barthélémy CC BY-SA	ECORCE  Daniel Barthélémy CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FLEUR  Daniel Barthélémy CC BY-SA
FRUITS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FRUIT  Daniel Barthélémy CC BY-SA	

Micocoulier de Provence : *Celtis australis* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/14954>


Arbre, à feuilles simples, alternes distiques, à marge dentée, caduques, atténues en longue pointe. Floraison en avril. Fleurs solitaires, verdâtres, longuement pédicellées.

PORt  Wikipedia CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEUR  Pierre Bonnet CC BY-SA
FRUITS  Mathieu Menand CC BY-SA	FRUIT  Jean-Pascal Milcent CC BY-SA	

Arbre de Judée : *Cercis siliquastrum* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75048>

Arbre, à feuilles simples, alternes, caduques, arrondies en cœur à la base.
Floraison de mars à mai. Fleurs roses en petits bouquets caulinaires.

PORT  Keith Edkins CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEUR  Pierre Bonnet CC BY-SA
FRUITS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FRUIT  Daniel Barthélémy CC BY-SA	

Noisetier : *Corylus avellana* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/19097>


Buisson, à grandes feuilles alternes, suborbiculaires, finement velues, à marge dentée. Floraison de janvier à mars. Fleurs mâles en chatons pendants jaunâtres, fleurs femelles discrètes.

PORTE	RAMEAU	ECORCE
	 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEURS	FRUITS
 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Erik Jørgensen CC BY-SA	 H. Zell CC BY-SA

Aubépine à un style : *Crataegus monogyna* Jacq.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/19472>


Arbuste épineux, à feuilles simples alternes, lobées avec des profonds sinus, à marge finement dentée. Floraison en mai, fleurs odorantes, blanches.

PORT  Wikimedia Commons CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
UILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Pierre Bonnet CC BY-SA	 H. Zell CC BY-SA
FRUITS  H. Zell CC BY-SA		

Frêne à feuilles étroites ou frêne du Midi : *Fraxinus Angustifolia*

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/28211>

Description ?

PORT 	RAMEAU  Hervé Goëau CC BY-NC-SA	ECORCE  Hervé Goëau CC BY-SA
FEUILLE  Hervé Goëau CC BY-SA	FLEURS  Hervé Goëau CC BY-SA	FLEUR 
FRUITS 	FRUIT 	

Houx : *Ilex aquifolium* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/35676>

Arbuste, à feuilles simples, alternes, coriaces, épineuses ou non, persistantes et luisantes.

Floraison de mai à juin. Fleurs en bouquet à l'aisselle des feuilles.

PORt 	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Frank Vincentz CC BY-SA	FLEUR  Frank Vincentz CC BY-SA
FRUITS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FRUIT  Daniel Barthélémy CC BY-SA	

Cytisse faux-ébénier : *Laburnum anagyroides* Medik.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/6055>

écorce lisse, brune et à rameaux duveteux pouvant mesurer jusqu'à 8 m de haut comme de large. Feuilles caduques de 4 à 8 cm de long à 3 folioles ovales et court pétiole.

Fleurs en grappes pendantes de 10 à 20 cm de long, de couleur jaune vif avec des ponctuations rouges. Les fruits sont des gousses noirâtres à maturité.

PORt  Hervé Goëau CC BY-SA	RAMEAU  Hervé Goëau CC BY-SA	ECORCE  Hervé Goëau CC BY-SA
FEUILLE  Hervé Goëau CC BY-SA	FLEURS  Hervé Goëau CC BY-SA	FLEUR  Hervé Goëau CC BY-SA
FRUITS  Hervé Goëau CC BY-SA	FRUIT 	

Laurier sauce : *Laurus nobilis* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/38070>

Arbre, à feuilles simples, alternes, coriaces et persistantes, ondulées sur le bord.

Floraison de mars à mai. Fleurs pédicellées, blanc jaunâtre en ombelle.

PORT 	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  José María Escolano CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FLEUR  Michel POURCHET CC BY-SA
FRUITS  © Victor M. Vicente Selvas	FRUIT  Pierre Bonnet CC BY-SA	

Magnolia grandiflora L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/40664>


Arbre, à feuilles simples alternes, persistantes et coriaces, à marge lisse, luisante dessus et à fore pubescence brunâtre dessous. Floraison de juin à octobre. Fleurs grosses et blanches.

PORT	RAMEAU	ECORCE
		
Steven Baskauf CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEUR	FRUIT
		
Pierre Bonnet CC BY-SA	Julien Barbe CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA

Lilas des Indes : *Melia azedarach* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/41665>

Arbre, à feuilles alternes, composées, 30- 80 cm de long, caduques, nombreuses folioles lancéolées dentées. Floraison en mai. Fleurs lilas, très odorantes.

PORT  Pavel Buršík CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Kurt Stüber CC BY-SA	FLEUR  Pierre Bonnet CC BY-SA
FRUITS  Pierre Bonnet CC BY-SA	FRUIT  Pierre Bonnet CC BY-SA	

Laurier-rose : *Nerium oleander* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75257>

Arbuste, à feuilles simples, opposées, coriaces et persistantes, à marge lisse.
Floraison de juin à septembre. Fleurs roses ou blanches, en corymbes terminaux.

PORT  Pierre Bonnet CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEUR  Pierre Bonnet CC BY-SA
	FRUIT  Pierre Bonnet CC BY-SA	

Olivier : *Olea europaea* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/44593>


Arbuste, à feuilles simples, opposées, persistantes, coriaces, à marge lisse.
Floraison d'avril à juin. Fleurs blanchâtres.

PORT  Pierre Bonnet CC BY-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Günter König CC BY-SA	FLEUR  Günter König CC BY-SA
FRUITS  Stanislav Krejčík CC BY-SA	FRUIT  Stanislav Krejčík CC BY-SA	

Pistachier lentisque : *Pistacia lentiscus* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49751>

Arbuste, à feuilles composées, alternes, persistantes, rachis ailé, folioles à marge lisse, à forte odeur une fois froissées. Floraison d'avril à juin. Fleurs petites, verdâtres.

PORT 	RAMEAU  Daniel Barthélémy CC BY-SA	ECORCE  Daniel Barthélémy CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FLEUR  Jean-Luc TASSET CC BY-SA
FRUITS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FRUIT  Pierre Bonnet CC BY-SA	

Pistachier térebinthe : *Pistacia terebinthus* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/75291>

Arbuste, à feuilles composées, opposées, caduques, folioles ovales à lancéolées.
Floraison d'avril à mai. Fleurs brunâtres, en grappes composées.

PORT	RAMEAU	ECORCE
		
Pavel Buršík CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA	Pierre Bonnet CC BY-SA
		
Pierre Bonnet CC BY-SA	Michael Kesi CC BY-SA	Julien Barataud CC BY-SA

Pittosporum de Chine : *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T.Aiton

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/49807>

Arbuste, à feuilles simples, persistantes, luisantes, elliptiques à obovales, regroupées à l'extrémité des branches. Fleurs blanches, regroupées à l'extrémité des rameaux.

PORT 	RAMEAU  Daniel Barthélémy CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE 	FLEURS  Daniel Barthélémy CC BY-SA	FLEUR  Daniel Barthélémy CC BY-SA
FRUITS 	FRUIT  Pierre Bonnet CC BY-SA	
 Pierre Bonnet CC BY-SA		

Platane : *Platanus x hispanica* Mill. ex Münchh.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/50147>


Arbre, à grandes feuilles alternes, longuement pétioées, à 5 lobes pointus.
Floraison de mai à juin. Fleurs regroupées en petits chatons globuleux.

PORt	RAMEAU	ECORCE
	 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEURS	FRUITS
 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Daniel Barthélémy CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA

Grenadier : *Punica granatum* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54104>

Arbuste, à feuilles simples, opposées, elliptiques à oblongues.
Floraison de juin à juillet. Fleur rouge, à calice charnu et lobes coriaces.

PORT 	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEUR  Stan Shebs CC BY-SA	FRUIT  Shiva shankar CC BY-SA

Chêne kermès : *Quercus coccifera* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54390>

Arbuste, à feuilles simples, alternes, petites, coriaces, persistantes, à marge dentée épineuse, luisantes sur les 2 faces. Floraison d'avril à mai. Fleurs regroupées en chatons.

PORT	RAMEAU	ECORCE
		 Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEURS	FRUITS
	 Mathieu Menand CC BY-SA	 Daniel Mathieu CC BY-SA
	FRUIT	
	 Giancarlo Dessì CC BY-SA	

Chêne vert : *Quercus ilex* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54442>



Arbre, à tronc court et souvent tortueux. Feuilles simples, alternes, coriaces, gris verdâtre dessus, et blanchâtre dessous, à marge lisse ou dentée. Floraison d'avril à mai. Fleurs mâles en chatons.

PORT	RAMEAU	ECORCE
 Archenzo Madonie's park CC BY-SA	 Mathieu Menand CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEURS	FRUITS
 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Daniel Mathieu CC BY-SA	 Lucarelli CC BY-SA
FRUIT	 Giancarlo Dessì CC BY-SA	

Chêne pubescent : *Quercus pubescens* Willd.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/54438>


Arbre, à feuilles simples, alternes, glabres dessus, pubescentes dessous, avec des lobes de forme et profondeur variable. Floraison en avril. Fleurs mâles en chatons pendants, lâches.

PORT  © Jan Ševčík CC BY-NC-SA	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	FLEURS  Pierre Bonnet CC BY-SA	FRUITS  Pierre Bonnet CC BY-SA
	FRUIT  Hermann Falkner CC BY-NC	

Viorne-tin : *Viburnum tinus* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/71463>



Arbuste, à feuilles simples, opposées, coriaces, persistantes, ovales.
Floraison de février à juin. Fleurs d'abord rosées puis blanches, en corymbe dense.

PORT	RAMEAU	ECORCE
 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE	FLEURS	FLEUR
 Pierre Bonnet	 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA
FRUITS	FRUIT	
 Pierre Bonnet CC BY-SA	 Pierre Bonnet CC BY-SA	

Arbre au poivre : *Vitex agnus-castus* L.

<http://www.tela-botanica.org/eflore/BDNFF/4.02/nn/72745>

Arbuste, à feuilles opposées, composées de 3 à 7 folioles lancéolées.
Floraison de juin à juillet. Fleurs bleuâtres, en verticilles formant de longues grappes.

PORT 	RAMEAU  Pierre Bonnet CC BY-SA	ECORCE  Pierre Bonnet CC BY-SA
FEUILLE  Pierre Bonnet CC BY-SA	INFLORESCENCE  Mathieu Menand CC BY-SA	FLEUR  Pierre Bonnet CC BY-SA
FRUITS  Pierre Bonnet CC BY-SA		