

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1550 Seseli libanotis
Synonymes LIBANOTIS MONTANA All.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle de 30 cm à 1 mètre, glabre ou pubescente, à souche en fuseau, garnie de fibres émettant 1 seule tige robuste, très anguleuse, pleine, rameuse - feuilles oblongues dans leur pourtour, 1-3 fois pennatiséquées, à segments opposés, oblongs ou linéaires - fleurs blanches, en ombelles grandes, à 20-40 rayons - involucre et involucrelle à folioles nombreuses, pubescentes, linéaires, réfléchies, persistantes - calice à dents allongées, en alène, caduques - styles réfléchis, bien plus longs que le stylopode - fruit pubescent, ovoïde, à côtes obtuses. Plante polymorphe.
Écologie Côteaux secs, surtout montagneux, dans une grande partie de la France ; nul dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe ; Asie occidentale; Maroc. - Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à septembre	sexualité : androdioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Écologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **15 juin 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Libanotis pyrenaica (L.) O.Schwarz [1949, Mitt. Thüring. Bot. Ges., 1 (1) : 108]Basionyme : *Crithmum pyrenaicum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 246]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.