

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Australie)	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

arbre exotique, originaire du littoral sud est de l'Australie. initialement introduit au Portugal et..., pour fixer les dunes et comme arbre ornemental. Il est devenu très invasif sur le littoral. Sa floraison s'y fait en février, mars. Sa distribution est littorale. je l'ai observé partout sur le littoral atlantique sud -ouest européen, au Portugal, au delà de la répartition dite par flora-on.pt: sur littoral centre portugais, en fourré côtier, notamment dunaire; en Estermadura littoral ex Ericeira, Azenha do mar; Costa de Caparica, au sud du Tage jusque sur la côte vicentine où il est présent dans les boisements littoraux de chêne suber et pinèdes. (val de Alzejur)

Identification

les feuilles sont des racèmes, simples, non pennées, allongées, entre 5 et 15cm, souple, mince, la plus grande largeur au milieu. fleurs jaunes.

a rechercher ce qui le différencie de acacia retinodes . Ils n'ont pas le même habitat et la même densité (flora-on .pt)

yveline Le moal, écologiste universitaire UBO Brest, retraitée.e-mail: yvelemoal@gmail.com

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Mimosa à longues feuilles	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mimosa-chenille	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Acàcia blanca			
ita	Acacia longifolia			
deu	Sidney Goldgeflecht			
eng	Sydney golden wattle			
deu	Weidenakazie			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **9 avril 2011**
par **Marie Portas**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]CORNU Maxime - **Deux Champignons développés sur des arbres australiens.** - 1881, p. 307- 307 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 28 - Fascicule 1

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Acacia longifolia (Andrews) Willd. [1806, Sp. Pl., 4 (2) : 1052]

Basionyme : *Mimosa longifolia* Andrews [1802, Collect. Bot., 5 : 61]

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Acacia	85067
Espèce	<i>Acacia longifolia</i>	103
Variété	<i>Acacia longifolia</i> var. <i>longifolia</i>	118698
Variété	<i>Acacia longifolia</i> var. <i>sophorae</i>	118699

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Acacia longifolia* et code **4136**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Acacia longifolia* et code **2237** en tant que bis nom apparaissant dans la clé sous -A-2°b
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Acacia longifolia* et code **0709** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 42596