

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>468 Lychnis viscaria</b>
Synonymes VISCARIA VULGARIS Trev. ; V. PURPUREA Wimm
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace, glabre, à souche dure</li> <li>- tiges de 20-60 cm, simples, rougeâtres et très visqueuses dans le haut</li> <li>- feuilles oblongues-lancéolées, glabres, ciliées à la base, les supérieures linéaires-aiguës</li> <li>- fleurs rouges, brièvement pédonculées, en panicule étroite, longue et interrompue</li> <li>- calice oblong en massue, ombiliqué, glabre, rougeâtre, à 10 nervures peu marquées, à dents triangulaires-aiguës</li> <li>- pétales tronqués, à peine émarginés, à onglet auriculé</li> <li>- capsule ovoïde, égalant le carpophore glabre, à 5 loges à la base, à 5 dents</li> <li>- graines canaliculées sur le dos.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et montueux, dans l'Est et le Centre, de l'Alsace aux Alpes-Maritimes, à l'Aveyron, à la Corrèze et au Loir-et-Cher ; rare dans le Nord.
Répartition Europe, surtout centrale et septentrionale ; Sibérie et Caucase.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Silène gluant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène viscaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Silène visqueux	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Croix de Jérusalem	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Oeillet des jansénistes	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Crotonella Viscaria			
deu	Gemeine Pechnelke			
deu	Gewöhnliche Pechnelke			
ndl	Rode Pekarjer			
eng	Sticky Catchfly			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
-------------------	-----------------	-------



		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 juin 2014**  
par **Dominique Duveau**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUJFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Viscaria vulgaris subsp. vulgaris**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Caryophyllaceae	100911
Genre	Viscaria	100767
Espèce	Viscaria vulgaris	72716
Sous-Espèce	Viscaria vulgaris subsp. vulgaris	103280

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Viscaria vulgaris subsp. vulgaris* et code **0664** en tant que nom retenu