

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1583 Bupleurum aristatum
Synonymes B. OPACUM Lange
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 5-25 cm, glauque, trapue, à rameaux raides, dichotomes, très étalés - feuilles demi-embrassantes, linéaires-lancéolées, aiguës, à 5-7 nervures dont 2 marginales - ombelles denses, terminales, à 2-5 rayons courts et inégaux - involucre à folioles ovales-lancéolées, cuspidées, dépassant longuement les rayons de l'ombelle - involucre à folioles glumacées, membraneuses, ovales-lancéolées, aristées, à 3-5 fortes nervures ramifiées, dressées-appliquées et cachant les fleurs et les fruits - fruit ovoïde, lisse, à côtes fines.
Écologie Lieux secs et arides, dans une grande partie de la France, surtout dans le Midi et l'Ouest ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale
Floraison Juin-août.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Buplèvre du mont Baldo	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Buplèvre opaque	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Percefeuille du mont Baldo	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Bupleuro odontite			
deu	Monte-Baldo-Hasenohr			
eng	Small Hare's-ear			
cat	Unflabou opac			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	1	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Bupleurum baldense var. baldense

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 09/11/2012

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Bupleurum	86046
Espèce	Bupleurum baldense	75003
Variété	Bupleurum baldense var. baldense	11514

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.