

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4066 Avena versicolor</b>
Synonymes A. SCHEUCHZERI All.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 15-40 cm, glabre, à souche gazonnante</li> <li>- feuilles vertes, courtes, planes, obtuses, lisses sur les faces, à bord blanc et scabre</li> <li>- ligule longue, lancéolée</li> <li>- panicule courte (3-6 cm), ovoïde-oblongue, dense, panachée de vert, de violet et de jaune</li> <li>- épillets dressés, longs d'environ 15 mm à 5 fleurs articulées et aristées</li> <li>- axe à poils courts dépassant peu la base de la glumelle inférieure</li> <li>- glumes inégales, plus courtes que les fleurs, trinervées</li> <li>- glumelles inégales, l'inférieure d'un quart plus longue, nervée, terminées par 2 lobes aristés, à longue arête dorsale.</li> </ul>
Écologie Pâturages et rochers des hautes montagnes : Alpes ; Auvergne ; Pyrénées.
Répartition Europe centrale ; Caucase ; Amérique boréale.
Floraison Juillet-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu, jaune Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Avoine bigarrée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Avoine panachée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Avena bronzea			
ita	Avena policroma			
cat	Avènula bigarrada			
deu	Bunt Hafer			
deu	Bunter Wiesenhafer			
deu	Bunthafer			
eng	Coloured Oat-grass			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **21 août 2014**  
par **Jean-Luc Gorremans**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Helictochloa versicolor subsp. versicolor**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

### Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Helictochloa	119459
Espèce	Helictochloa versicolor	119458
Sous-Espèce	Helictochloa versicolor subsp. versicolor	119460

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
  - le nom de *Helictochloa versicolor subsp. versicolor* et code **0250** en tant que nom retenu