

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4070 Avena bromoides</b>
Synonymes incl. A. AUSTRALIS Pari.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à souche gazonnante</li> <li>- feuilles glauques, étroites, pliées ou tordues-enroulées, lisses sur les faces, rudes aux bords</li> <li>- ligule lancéolée</li> <li>- panicule longue de 6-15 cm, dressée, étroite, à rameaux réunis par 1-3, d'un blanc jaunâtre, rarement violacé</li> <li>- épillets dressés, longs de 15-20 mm plus larges au sommet, à 4-8 fleurs articulées à arêtes étalées-divariquées</li> <li>- axe à poils très courts atteignant à peine la base de la fleur</li> <li>- glumes inégales, plus courtes que les fleurs, trinervées</li> <li>- glumelles inégales, l'inférieure nervée, tronquée-bidentée, munie un peu au dessus du milieu d'une longue arête genouillée.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides du Midi, jusque dans les Hautes-Alpes, l'Isère, l'Aveyron.
Répartition Région méditerranéenne occidentale.
Floraison Mai-juillet.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Avoine faux brome	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Avoine brome	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Avena bromoide			
cat	Avènula bromoide			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

### **Helictochloa bromoides subsp. bromoides**

Basionyme : *Avena bromoides* Gouan [1762, Hort. Reg. Monsp, 52]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Helictochloa	119459
Espèce	Helictochloa bromoides	119463
Sous-Espèce	Helictochloa bromoides subsp. bromoides	119464

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Avenula bromoides subsp. bromoides* et code **0250** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Helictochloa bromoides subsp. bromoides* et code **0250** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 8579