

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3092 *Chenopodium rubrum* L.

- Plante annuelle de 10-80 cm, souvent rougeâtre, à tige dressée ou couchée, anguleuse, ordinairement rameuse dès la base
- feuilles épaisses, luisantes, hastées-lancéolées ou triangulaires-rhomboidales, à dents profondes, surtout les 2 inférieures
- glomérules ordinairement rougeâtres, en grappes ou en panicule feuillées
- 5 étamines dans la fleur terminale de chaque glomérule, 2-3 dans les autres
- styles très courts
- périanthe cachant incomplètement le fruit
- graines de 34 mm, la plupart verticales, luisantes, à bord épais.

Écologie Décombres, lieux sablonneux ou humides, dans une grande partie de la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale, centrale et boréale ; Açores.

Floraison Juillet-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : épi de cymes triflores
Fruit : akène
Couleur de la fleur : rose
Floraison : de juillet à octobre


sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protogyne
Pollinisation : anémogame
Dissémination : barochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ansérine rouge	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode rouge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Cenizo rojo			
ita	Chenopodio rosso			
ita	Farinello rosso			
eng	Pigweed			
eng	Red Goosefoot			
ndl	Rode Ganzevoet			
deu	Roter Gänsefuß			
eng	Sowbane			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence douteuse
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **5 septembre 2006**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Oxybasis rubra (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [2012, Willdenowia, 42 (1) : 15]

Basionyme : *Chenopodium rubrum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 218]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Oxybasis	99996
Espèce	Oxybasis rubra	119632
Variété	Oxybasis rubra var. rubra	119633
Variété	Oxybasis rubra var. intermedia	119634

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum* et code **0317** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Oxybasis rubra* et code **0317** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum* et code **0298**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum* et code **3092**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum* et code **0306**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum* et code **1150**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chenopodium rubrum var. humile* et page **0160** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 16884