

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2531 Convolvulus sepium <i>Grande Vrillée</i>
Synonymes CALYSTEGIA SEPIUM R. Br.
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 1 à 5 mètres, verte et glabre, à souche très longue - tiges fortement volubiles-grimpantes, anguleuses - feuilles grandes, sagittées ou hastées, aiguës, longuement pétiolées, à oreillettes tronquées, entières ou sinuées-lobées - fleurs blanches, très rarement rosées, très grandes (4-6 cm), solitaires sur des pédoncules axillaires plus courts ou plus longs que la feuille - bractées 2, foliacées, ovales-lancéolées, en coeur à la base, recouvrant le calice - celui-ci glabre, à lobes ovales-lancéolés - corolle glabre - capsule subglobuleuse, glabre.
Écologie Haies, buissons, lieux frais, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique et Amérique septentrionales.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères (lianes) , Géophytes (>= 1m) à rhizome (lianes)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : cosmopolite	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grand Liseron	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Liseron des haies	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Évenille		Secondaire ou régional	
fra	Grand Lignot	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grande Vrillée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Liset		Secondaire ou régional	
fra	Manchette de Notre-Dame	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Bearbind			
eng	Bellbine			
ita	Campanelle			
spa	Corredera			
spa	Correguela mayor			
spa	Correhuela mayor			
cat	Corretjola gran			
cat	Corretjola grossa			
deu	Gemeine Zaunwinde			
deu	Gewöhnliche Zaunwinde			
eng	Greater Bindweed			
deu	Große Winde			
ndl	Haagwinde			
deu	Heckenwinde			
eng	Hedge Binweed			
eng	Hedge-bell			
eng	Hooded Bindweed			
spa	Suspiro			
deu	Ufer Zaunwinde			
ita	Vilucchio bianco			
ita	Vilucchione			
eng	Wild Morning-glory			
eng	With-wind			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **14 septembre 2015**
par **Alain Bigou**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Convolvulus sepium var. sepium

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 05/04/2018

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Solanales	102758
Famille	Convolvulaceae	100908
Genre	Convolvulus	85311
Espèce	Convolvulus sepium	18805
Variété	Convolvulus sepium var. sepium	120074

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.