

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2355 Campanula glomerata
Synonymes C. AGGREGATA Nocca
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 10-50 cm, velue ou glabrescente, à racine grêle et dure - tiges assez grêles, pleines, feuillées - feuilles inférieures ovales, oblongues ou lancéolées, arrondies ou en coeur à la base, pétiolées, crénelées, pubescentes - fleurs bleues, sessiles en têtes terminales et latérales entourées de larges bractées foliacées - calice poilu, à lobes lancéolés-aigus, égalant le milieu de la corolle - celle-ci de 2 cm et plus, velue, divisée jusqu'au tiers - style inclus - capsule dressée.
Écologie Bois, côteaux, prairies, surtout calcaires, dans presque toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale, Japon.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : glomérules Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Campanule à fleurs agglomérées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule agglomérée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Büschel Glockenblume			
deu	Büschel-Glockenblume			
ita	Campanula agglomerata			
eng	Clustered Bellflower			
eng	Dane's-blood Bellflower			
ndl	Kluwenklokje			
deu	Knäuel-Glockenblume			
deu	Knäuelblütige Glockenblume			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Campanula glomerata L. [1753, Sp. Pl., 1 : 166]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Campanula	85754
Espèce	Campanula glomerata	12462
Sous-Espèce	Campanula glomerata subsp. farinosa	12468
Sous-Espèce	Campanula glomerata subsp. glomerata	12469
Sous-Espèce	Campanula glomerata subsp. serotina	81647

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Campanula glomerata* et code **2355**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Campanula glomerata* et code **3713**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Campanula glomerata* et page **0654** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Campanula glomerata* et code **0606** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.