

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3901 Carex binervis Smith.

- Plante vivace de 30-80 cm, glabre, à souche gazonnante
- tige trigone, lisse
- feuilles glaucescentes, larges de 3-6 mm rudes, à ligule oblongue opposée au limbe
- épi mâle solitaire, long, cylindracé, brun foncé
- 2-4 épis femelles tous écartés, oblongs-cylindriques (2-3 cm), denses, dressés, pédoncules
- bractées engainantes, foliacées, plus courtes que la tige
- écailles brun noirâtre, ovales-mucronulées
- 3 stigmates
- utricules bruns tachés de rouge, ovoïdes-subtrigones (4 mm), à 1 forte nervure verte sur chaque face latérale, à bec scabre cilié bifide, dépassant l'écaille
- akène à bec droit.

Écologie Landes et marais de l'Ouest, des Pyrénées au Pas-de-Calais.

Répartition Europe occidentale, du Portugal à la Norvège.

Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) cespiteux

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : atlantique

Inflorescence : racème d'épis
Fruit : akène
Couleur de la fleur : marron
Floraison : de mai à juin

sexualité : monoïque
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : anémogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Plante d'une trentaine de cm de haut, verte. Tige lisse, non scabre.

Feuilles présentant une double ligule membraneuse : arrondie entre le limbe et la tige, allongée sur la face opposée au limbe.

Épis unisexués, 1 seul épi mâle au sommet, ?-3 épis femelles répartis tout au long de la tige (assez espacées les uns des autres : 6 à 10 cm d'écart), bractées largement engainantes, surpassant l'épi qu'elle axile mais ne surpassant pas l'épi directement au dessus.

Utricules à 3 stigmates, vertes, scarieuses (caractères observé avec difficulté, à la loupe, à contre-jour), bec bifide légèrement allongé (l'utricule dans son ensemble prend une forme assez "élançée"). Écaille bicolor : brune avec la nervure verte, celle-ci terminant l'écaille par un mucron. Écaille ne surpassant pas l'utricule en longueur.

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laïche à deux nervures	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à deux nervures	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
eng	Green-ribbed Sedge			
ndl	Tweenervige Zegge			
deu	Zweinervige Segge			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal


Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Carex binervis Sm. [1800, Trans. Linn. Soc. London, 5 : 268]

Basionyme : Carex binervis Sm. [1800, Trans. Linn. Soc. London, 5 : 268]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex binervis	13509

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex binervis* et code **2578**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Carex binervis* et code **3901**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Carex binervis* et code **0547**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Carex binervis* et page **0855** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Carex binervis* et code **0119** en tant que nom retenu
 - le nom de *Carex distans subsp. binervis* et code **0119** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 13509