

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3853 Carex serrulata
Synonymes C. ACUMINATA Willd.
- Voisin du précédent. Plante vivace de 20-60 cm, glauque, à souche stolonifère - tige grêle et lisse - feuilles scabres, larges de 2-5 mm - 1-3 épis mâles linéaires-oblongs - 2-3 épis femelles cylindriques-allongés, dressés, brièvement pédoncules, brunâtres - bractée inférieure à gaine très courte - écailles femelles verdâtres sur le dos, ovales-acuminées, à pointe verte plus ou moins denticulée - utricules elliptiques-lancéolés, plus courts que l'écaille.
Écologie Lieux humides de la région méridionale : Roussillon, Languedoc, Provence ; Corse.
Répartition Région méditerranéenne.
Floraison Avril-juin.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème d'épis Fruit : akène Couleur de la fleur : marron Floraison : de avril à juin	sexualité : monoïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : hydrochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laiche à épis rougeâtres	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Laïche à épis rougeâtres	Féminin singulier	Recommandé ou typique	"Laïche" est l'orthographe traditionnelle.
deu	Grannenspelzige Segge			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **17 avril 2017**
par **Christian Widmann**

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter [1967, in Greuter & Rech.f. ; Boissiera, 13 : 167]

Basionyme : Carex serrulata Biv. [1818, Stirp. Rar. Sicil. Manip., 4 : 9]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter [1967, in Greuter & Rech.f. ; Boissiera, 13 : 167]

Carex serrulata Biv. [1818, Stirp. Rar. Sicil. Manip., 4 : 9]

Carex flacca subsp. serrulata (Biv.) Greuter [1967, in Greuter & Rech.f. ; Boissiera, 13 : 167]

Carex serrulata Biv. [1818, Stirp. Rar. Sicil. Manip., 4 : 9]

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Carex	80000
Espèce	Carex flacca	13756
Sous-Espèce	Carex flacca subsp. serrulata	13761

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Carex acuminata* et code **3853** en tant que synonyme
 - le nom de *Carex serrulata* et code **3853**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Carex flacca subsp. serrulata* et code **0117** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Carex glauca var. cuspidata* et code **0552** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Carex glauca var. erythrostachys* et code **0552** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Carex glauca var. serrulata* et code **0552** en tant que taxon 'c' inclus dans un autre taxon

Autres

- Numéro du type : 14376