

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1755 Cephalaria transylvanica Schrad.

- Plante annuelle de 30-80 cm, à racine pivotante, à tige grêle, raide, striée, plus ou moins hérissée-scabre feuilles hispides, les caulinaires lyrées ou pennatiséquées, à segments lancéolés-linéaires, le terminal plus grand
- fleurs d'un bleu pâle, en têtes ovoïdes, petites (1 cm de diam.), dressées folioles de l'involucre et paillettes du réceptacle scarieuses, ciliées, ovales-acuminées, à arête plus courte que leur limbe et que les fleurs
- calicule à 8 dents égales, courtes, n'atteignant pas la base du limbe velu du calice corolle à lobes extérieurs plus grands, rayonnants
- anthères saillantes, purpurines

Écologie Champs et terres incultes du Midi : Var, Alpes-Maritimes, Tarn.

Répartition Europe méridionale et orientale ; Asie Mineure, Caucase.

Floraison Août-septembre.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux Formation végétale : thérophytaie Chorologie: européen méridional Inflorescence: cyme capituliforme sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu Pollinisation: entomogame Floraison : de août à septembre Dissémination : anémochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



caractéristiques du sol





Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Céphalaire de Transylvanie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Siebenbürger Schuppenkopf			
ita	Vedovina maggiore			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
	педа аррицата	()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu observée le 20 juillet 2004 par Clara R.

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Maille : comportant plusieurs sources de données distinctes

BazNat - Flore : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.

Flora data : données issues des

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR: données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).

IFN : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigie Flore : données issues du programme Vigie-Flore PhotoFlora : données issues de

PhotoFlora: données issues de la <u>Base de données de photos de</u> plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN,

Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Cephalaria transylvanica (L.) Schrad. ex Roem. & Schult. [1818, Syst. Veg., éd. 15, 3 : 45]

Basionyme: Scabiosa transylvanica L. [1753, Sp. Pl., 1:98]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Léaende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Cephalaria	86126
Espèce	Cephalaria transylvanica	15715

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :
- le nom de Cephalaria transylvanica et code 1017
 Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 le nom de Cephalaria transylvanica et code 1755
 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :

- o le nom de *Cephalaria transylvanica* et code **3660** Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
- le nom de Cephalaria transylvanica et code 0617 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.