

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2685 Linaria organifolia
Synonymes CHÆNORRHINUM ORIGANIFOLIUM Willk. et Lge
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle ou vivace de 8-25 cm, pubescente-glanduleuse, à tiges nombreuses, diffuses-ascendantes - feuilles inférieurs rapprochées, opposées, atténuées en pétiole, obovales, un peu charnues - fleurs bleuâtres à gorge ouverte, axillaires, écartées, en grappes lâches feuillées - pédoncules dressés, souvent plus longs que les feuilles et que les fleurs - calice poilu-glanduleux, à lobes linéaires obtus - corolle de 8-15 mm, dépassant longuement le calice, à éperon conique, obtus, 2-4 fois plus court que le - capsule ovoïde-oblique, plus courte que le calice - graines ovoïdes, à côtes presque lisses.
Écologie Rochers et vieux murs des montagnes calcaires du Midi : Alpes méridionales ; Cévennes ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Espagne et Portugal, Baléares.
Floraison Avril-octobre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de avril à octobre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Linaire à feuilles d'origan	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Linajola piemontese			
cat	Linària origanifòlia			
eng	Malling Tøadflax			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **4 mai 2014**
par **Annie Garcin**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]MATEU Isabel, FIGUERES Sonia - **Breeding system of three taxa of Chaenorhinum (D.C.) Rchb. (Scrophulariaceae) of the Iberian Peninsula : C. organifolium (L.) Fourr. subsp. Cadevallii (Bolos & Vigo) Lainz, C. organifolium (L.) Fourr. subsp. Crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja and C - 1998, p. 69- 79 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 145 - Fascicule 1**

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Chaenorhinum organifolium subsp. organifolium

Basionyme : *Antirrhinum organifolium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 615]

Dernière date de modification du nom : 8/10/2018

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Plantaginaceae	101080
Genre	Chaenorhinum	86143
Espèce	Chaenorhinum organifolium	16286
Sous-Espèce	Chaenorhinum organifolium subsp. organifolium	16292

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chaenorhinum organifolium subsp. organifolium* et code **1330**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Chaenorhinum organifolium subsp. organifolium* et code **0885** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 5490