

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4009 Agrostis vulgaris With.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-60 cm, glabre, à souche émettant de courts stolons - tige dressée ou ascendante - feuilles toutes planes, larges de 2-4 mm - ligule courte, tronquée - panicule longue de 6-15 cm, ovale, lâche, étalée après la floraison, violacée, rarement verte, à axe et rameaux nus presque lisses - épillets de 2 mm - glumes presque égales, ouvertes, aigüés - glumelles inégales, l'inférieure un peu plus courte que les glumes, mutique ou parfois aristée au sommet - la supérieure 2 fois plus courte. Varie à plante naine de 3-10 cm, épillets rapprochés et attaqués par une Urédinée (<i>A. pumila</i> L.).
Écologie Pâturages et bois, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Amérique boréale.
Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, rose Floraison : de juin à septembre	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Agrostide capillaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrostide commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrostis capillaire	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrostis commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrostis ténu	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Agrostide ténue	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Trainasse	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Agrostide vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Agrostide vulgaire" est un latinisme.
cat	Agrostis tènue			
eng	Brown Top			
ita	Cappellini dei prati			
ita	Cappellini delle praterie			
eng	Colonial Bentgrass			
eng	Common Bent			
deu	Gemeines Straußgras			
ndl	Gewoon Struisgras			
deu	Rotes Straußgras			
deu	Schmalere Windhalm			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **28 juin 2015**
par **ann2005**

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Agrostis capillaris var. capillaris

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Agrostis	83197
Espèce	Agrostis capillaris	1634
Variété	Agrostis capillaris var. capillaris	1636
Forme	Agrostis capillaris f. capillaris	81996
Forme	Agrostis capillaris f. aristata	81997
Forme	Agrostis capillaris f. pumila	101653

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Agrostis capillaris var. capillaris* et code **0202** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.