

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 3095 <i>Chenopodium hybridum</i> |
| Synonymes C. ANGULOSUM Lamk |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 30-80 cm, verte, à odeur désagréable - tige dressée, cannelée, simple ou rameuse - feuilles vertes sur les 2 faces, longuement pétiolées, minces, larges, ovales-triangulaires, tronquées en coeur à la base, terminées en longue pointe lancéolée, bordées de chaque côté de 2-4 grosses dents triangulaires aiguës - glomérules verdâtres, en panicule terminale non feuillée, à rameaux étalés - périanthe laissant voir le fruit au sommet, à lobes carénés - graine de 2 mm, horizontale, terne, ponctuée-rugueuse, à bord subaigu. |
| Écologie Cultures et décombres, dans presque toute la France ; nul dans la plaine méditerranéenne. |
| Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales. |
| Floraison Juillet-septembre. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : circumboréal | |
| Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de juillet à septembre | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protogyne Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra | Ansérine hybride | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Chénopode à feuilles de stramoine | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Chénopode hybride | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| ndl | Bastaardganzevoet | | | |
| deu | Bastard-Gänsefuß | | | |
| cat | Blet angulós | | | |
| deu | Breitblättriger Gänsefuß | | | |
| spa | Cenizo híbrido | | | |
| ndl | Esdoornganzevoet | | | |
| ita | Farinello ibrido | | | |
| eng | Maple-leaved Goosefoot | | | |
| deu | Stechapfel-Gänsefuß | | | |
| deu | Unechter Gänsefuß | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Présence | Présent | Présent | Présence accidentelle |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 août 1869**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Chenopodiastrum hybridum (L.) S.Fuentes, Uotila & Borsch [2012: Willdenowia, 42 (1) : 14]

Basionyme : *Chenopodium hybridum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 219]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Amaranthaceae | 100947 |
| Genre | Chenopodiastrum | 119626 |
| Espèce | Chenopodiastrum hybridum | 119627 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium angulosum* et code **3095** en tant que synonyme
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **3095**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **0300**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **0294**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **1151**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et page **0160** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Chenopodium hybridum* et code **0314** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Chenopodiastrum hybridum* et code **0314** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.