

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 3088 *Chenopodium botrys* L.

- Plante annuelle de 20-50 cm, pubescente-visqueuse, à odeur pénétrante et peu agréable
- tige dressée, anguleuse, rameuse souvent dès la base, à rameaux dressés-étalés et effilés
- feuilles inférieures longuement pétiolées, ovales ou oblongues, pennatilobées à lobes obtus
- glomérules d'un vert jaunâtre, en longues panicules spiciformes presque nues
- périanthe pubescent-glanduleux, cachant le fruit, à lobes non carénés
- graine horizontale, subglobuleuse, lisse, à bord obtus et un peu caréné.

Écologie Lieux sablonneux, dans tout le Midi et çà et là dans le Centre, ailleurs introduit.

Répartition Europe méridionale ; Asie ; Afrique ; Amérique du Nord.

Floraison Juillet septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : circumboréal méridional

Inflorescence : épi de cymes triflores  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : vert  
Floraison : de juillet à septembre


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : anémogame  
Dissémination : barochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ansérine à épis	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode à grappes	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode botryde	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe à printemps	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Bodris			
deu	Drüsiger Gänsefuß			
ita	Farinello botri			
spa	Hierba hormigera			
eng	Jerusalem Oak			
eng	Jerusalem Oak-goosefoot			
deu	Klebriger Gänsefuß			
eng	Sticky Goosefoot			


## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Dysphania botrys (L.) Mosyakin & Clemants [2002, Ukrayins'k. Bot. Zhurn., 59 (4) : 383]**

Basionyme : *Chenopodium botrys* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 219]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Dysphania	86347
Espèce	Dysphania botrys	101176

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et code **0292**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et code **3088**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et code **0295**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et code **1139**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et page **0159** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Chenopodium botrys* et code **0316** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Dysphania botrys* et code **0316** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 16781