

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1257 Cotoneaster vulgaris</b>
Synonymes COTONEASTER INTEGERRIMA Medik
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arbrisseau de 30 cm à 1 mètre, tortueux, sans épines, à jeunes rameaux velus à l'extrémité seulement, feuilles ovales, assez petites, entières, vertes et glabres en dessus, grisâtres-tomenteuses en dessous, caduques</li> <li>- fleurs rosées, 1-4 en petits corymbes penchés après la floraison, pédoncules glabrescents ou pubérulents</li> <li>- calice glabre</li> <li>- 2-3 styles</li> <li>- fruit réfléchi, du volume d'un gros pois, à 2-3 noyaux, glabre, luisant, rouge violacé à la maturité.</li> </ul>
Écologie Rochers et rocailles des montagnes : Ardennes, Hautes-Vosges, Jura, Bourgogne ; Alpes ; Cévennes ; Auvergne ; Pyrénées.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale jusqu'au Thibet.
Floraison avril-juin Fructification août-septembre

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) (caducifoliées)	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : corymbe Fruit : drupe Couleur de la fleur : rose Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cotonéaster à feuilles entières	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cotonéaster commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cotonéaster sauvage	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Amélanchier velu	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cotonéastre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cotonnier à feuilles entières	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Néflier cotonneux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Néflier de Gesner	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Cotonéaster à feuilles très entières	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
fra	Cotonéaster vulgaire	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	
deu	Bergmispel			
cat	Comera vulgar			
ita	Cotognastro a foglie intere			
ita	Cotognastro minore			
eng	European Cotoneaster			
deu	Gemeine Zwergmispel			
deu	Gewöhnliche Steigmispel			
deu	Gewöhnliche Zwergmispel			
ndl	Wilde Dwergmispel			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence douteuse
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **inconnu**  
par **Thierry Pernot**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

### Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Cotoneaster integerrimus Medik. [1793, Geschic. Bot., 85]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

Nom sélectionné

### Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Cotoneaster	83493
Espèce	Cotoneaster integerrimus	19202

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cotoneaster integerrimus* et code **1257** en tant que synonyme
  - le nom de *Cotoneaster vulgaris* et code **1257**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Cotoneaster integerrimus* et code **1057**
  - le nom de *Cotoneaster vulgaris* et code **1057** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Cotoneaster integerrimus* et code **2201**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Cotoneaster integerrimus* et page **0367** en tant que nom retenu
  - le nom de *Cotoneaster vulgaris* et page **0367** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Cotoneaster integerrimus* et code **0980** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.