

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3756 *Cyperus longus* L. *Souchet odorant*

- . Plante vivace de 40 cm à 1 mètre, verte et glabre, à souche traçante aromatique
- tiges raides, triquêtes
- feuilles très longues, larges de 4-10 m., carénées, scabres
- inflorescence en ombelle à nombreux rayons grêles longs inégaux, dépassée par 3 longues feuilles
- épillets brun rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm sur 1 12, rapprochés en éventail en fascicules courts
- axe ailé
- écailles densément imbriquées, obtuses, plurinervées, pâles aux bords
- 3 étamines et stigmates
- akène trigone, trois fois plus court que l'écaille. Varie, dans le Midi, à ombelle compacte à rameaux courts, épillets plus grands en fascicules denses (*C. badius* Desf. et *C. preslii* Pari.).

Écologie Marais et rivières, dans une grande partie de la France et en Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : subtropical(paléo)

Inflorescence : cyme d'épis

Fruit : akène

Couleur de la fleur : marron

Floraison : de juin à septembre

sexualité : monoïque

Pollinisation : anémogame

Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Souchet allongé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet long	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Souchet odorant	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trianglé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	English Galingale			
eng	Galingale			
deu	Hohes Zypergras			
cat	Jonça de cordellar			
spa	Juncia olorosa			
deu	Langästiges Cypergras			
deu	Langes Zypergras			
ita	Quadrelli			
cat	Serrana de fulla llarga			
eng	Sweet Cyperus			
ita	Zigolo comune			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Utilisé autrefois sur la côte ouest du Cotentin pour confectionner des pâtures pour entraver les moutons, ou en lien pour lier les bottes de carottes

yann mouchel
garde du littoral symel

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre


Utilisé autrefois sur la côte ouest du Cotentin pour confectionner des pâtures pour entraver les moutons, ou en lien pour lier les bottes de carottes (appelé le ran)

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Cyperus longus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Basionyme : *Cyperus longus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Cyperaceae	100906
Genre	Cyperus	84884
Espèce	Cyperus longus	20785

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **2491**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **3756**
 - le nom de *Cyperus preslii* et code **3756** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **2467**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cyperus longus subsp. longus* et page **0828** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **0125** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Cyperus longus subsp. longus* et code **0603**
 - le nom de *Cyperus longus var. preslii* et code **0603** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 20785