

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3756 *Cyperus longus* L. *Souchet odorant*

- . Plante vivace de 40 cm à 1 mètre, verte et glabre, à souche traçante aromatique
- tiges raides, triquètres
- feuilles très longues, larges de 4-10 m., carénées, scabres
- inflorescence en ombelle à nombreux rayons grêles longs inégaux, dépassée par 3 longues feuilles
- épillets brun rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm sur 1 12, rapprochés en éventail en fascicules courts
- axe ailé
- écailles densément imbriquées, obtuses, plurinervées, pâles aux bords
- 3 étamines et stigmates
- akène trigone, trois fois plus court que l'écaille. Varie, dans le Midi, à ombelle compacte à rameaux courts, épillets plus grands en fascicules denses (C. badius Desf. et C. preslii Pari.).

Écologie Marais et rivières, dans une grande partie de la France et en Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Juin-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : subtropical(paléo)

Inflorescence : cyme d'épis
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : marron
 Floraison : de juin à septembre

sexualité : monoïque
 Pollinisation : anémogame
 Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Souchet allongé | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Souchet long | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Souchet odorant | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Trianglé | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | English Galingale | | | |
| eng | Galingale | | | |
| deu | Hohes Zypergras | | | |
| cat | Jonça de cordellar | | | |
| spa | Juncia olorosa | | | |
| deu | Langästiges Cypergras | | | |
| deu | Langes Zypergras | | | |
| ita | Quadrelli | | | |
| cat | Serrana de fulla llarga | | | |
| eng | Sweet Cyperus | | | |
| ita | Zigolo comune | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Utilisé autrefois sur la côte ouest du Cotentin pour confectionner des pâtures pour entraver les moutons, ou en lien pour lier les bottes de carottes

yann mouchel
garde du littoral symel

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Utilisé autrefois sur la côte ouest du Cotentin pour confectionner des pâtures pour entraver les moutons, ou en lien pour lier les bottes de carottes (appelé le ran)

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juillet 1879**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique]TIMBAL-LAGRAVE Edouard - **Note sur le *Cyperus longus* de la flore de Toulouse.** - 1856, p. 330- 333 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 3 - Fascicule 6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore de [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIQUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Cyperus longus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Basionyme : *Cyperus longus* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 45]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:55

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|-----------------------|--------------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Monocotyledones | 101139 |
| Cladus | Commelinidees | 100969 |
| Ordre | Poales | 100977 |
| Famille | Cyperaceae | 100906 |
| Genre | Cyperus | 84884 |
| Espèce | Cyperus longus | 20785 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **2491**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **3756**
 - le nom de *Cyperus preslii* et code **3756** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **2467**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Cyperus longus subsp. longus* et page **0828** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Cyperus longus* et code **0125** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Cyperus longus subsp. longus* et code **603**
 - le nom de *Cyperus longus var. preslii* et code **0603** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 20785