

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 1753 <i>Dipsacus silvestris</i> Mill. Cardère sauvage |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante bisannuelle dépassant souvent 1 mètre, à tige robuste, sillonnée, aiguillonnée - feuilles glabres, garnies d'aiguillons sur la nervure dorsale et sur les bords, oblongues ou lancéolées, entières, dentées ou un peu sinuées, les supérieures simplement connées - fleurs d'un rose lilas, en têtes ovales de 5-8 cm de long sur 4 de large - folioles de l'involucre arquées-ascendantes, linéaires en alène, épineuses, longues de 4-15 cm, dépassant la tête florale - paillettes du réceptacle dressées ou étalées, aristées, plus longues que les fleurs. |
| Écologie Lieux incultes, dans toute la France et en Corse. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Juillet-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) bisannuels | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : européen méridional | |
| Inflorescence : cyme capituliforme Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juillet à septembre | sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore |

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------|--|
| fra | Cabaret-des-oiseaux | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Cardère sauvage | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bain de Notre-Dame | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Lavoir-de-Vénus | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Peigne-à-loup | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Cardère à foulon | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | Nom à appliquer à <i>Dipsacus sativus</i> (L.) Honck., <i>Dipsacus fullonum</i> L. n'ayant pas été utilisé pour carder la laine. |
| fra | Fontaine-aux-oiseaux | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | |
| eng | Barber's-brush | | | |
| spa | Cardencha | | | |
| cat | Cardó bord | | | |
| spa | Cardo de cardadores | | | |
| eng | Common Teasel | | | |
| eng | Common Teazle | | | |
| cat | Escardot | | | |
| ndl | Grote Kaardebol | | | |
| spa | Peine | | | |
| ita | Scardaccione selvatico | | | |
| eng | Teasel | | | |
| eng | Wild Teasel | | | |
| deu | Wilde Karde | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |


Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)


Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
 observée le **1 janvier 1854**
 par **Herbier Pontarlier-marichal**

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Dipsacus fullonum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 97]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Dipsacales | 102766 |
| Famille | Caprifoliaceae | 101054 |
| Genre | Dipsacus | 86323 |
| Espèce | Dipsacus fullonum | 22678 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **1022**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **1990**
 - le nom de *Dipsacus sylvestris* et code **1990** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **3662**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et page **0678** en tant que nom retenu
 - le nom de *Dipsacus sylvestris* et page **0678** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Dipsacus fullonum* et code **0617** en tant que nom retenu
 - le nom de *Dipsacus sylvestris* et code **0617** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Dipsacus sylvestris* et code **1753**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.