

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4037 *Aira tenorii* Guss.

- Plante annuelle de 10-40 cm, glabre, à racine fibreuse
- tiges grêles, dressées, souvent fasciculées
- feuilles courtes, sétacées, à gaines scabres
- ligule lancéolée
- panicule ample, étalée-divariquée, très lâche, à longs rameaux capillaires lisses ou rudes
- pédicelles 5-8 fois plus longs que l'épillet, dilatés obliquement au sommet
- épillets très petites (1-2 mm), ovoïdes-subglobuleux, écartés
- fleurs glabres à la base, mutiques
- glumes ovales-obtuses, érodées, lisses ou peu scabres
- glumelle inférieure égalant les 2/3 des glumes, subobtus et infléchie en dedans, sans arête. Varie à épillets de 2 mm ovoïdes, glumelle de la fleur supérieure brièvement bifide et aristée (*A. intermedia* Guss.).

Écologie Lieux sablonneux de la région méditerranéenne : Var, Alpes-Maritimes ; Corse.

Répartition Espagne, Baléares, Sardaigne, Sicile, Italie, Grèce ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen


Inflorescence : panicule d'épillets
 Fruit : caryopse
 Couleur de la fleur : vert
 Floraison : de avril à juillet

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : anémogame
 Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Canche de Ténore	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Canche intermédiaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Aïra de Ténore	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Nebbia di Ténore			
cat	Nebulosa pulcra			
deu	Ténores Schmielenhafer			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011




Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Aira tenorei Guss. [1827, Fl. Sicula Prodr., 1 : 62]

Basionyme : *Aira tenorei* Guss. [1827, Fl. Sicula Prodr., 1 : 62]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:26

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Aira	85828
Espèce	<i>Aira tenorei</i>	2315
Variété	<i>Aira tenorei</i> var. <i>intermedia</i>	2320
Variété	<i>Aira tenorei</i> var. <i>tenorei</i>	74730

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Aira pulchella* et code **0243** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Aira tenorei* et code **2287**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Aira tenorei* et code **4037**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Aira tenorei* et code **0204** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 2315