

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2581 <i>Echium vulgare</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante bisannuelle de 30-80 cm, verte, hérissée de poils raides, étalés, espacés, faiblement tuberculeux - tige dressée, ordinairement très rameuse - feuilles hispides, oblongues-lancéolées, les inférieures pétiolées, à 1 nervure, les autres sessiles, aiguës - fleurs bleues ou violacées, assez grandes, en grappes formant une panicule oblongue généralement étroite - calice hispide, à lobes linéaires, dressés - corolle de 12-18 mm, à tube inclus dans le calice, à limbe élargi et irrégulier, 1-2 fois aussi longue que le calice - étamines saillantes, à filets glabres - carpelles de 2 mm, brièvement tuberculeux. Varie à étamines incluses, fleurs petites (<i>E. wierzbickii</i> Hab.).
Écologie Lieux secs et pierreux, dans toute la France.
Répartition Europe ; Asie occidentale ; Algérie ;
Floraison Mai-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioïdes Fruit : akène Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vipérine commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vipérine vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Vipérine vulgaire" est un latinisme.
eng	Blueweed			
ita	Borragine selvatica			
eng	Common Viper's-bugloss			
ita	Echio			
ita	Erba serpentina			
deu	Gemeiner Natternkopf			
deu	Gewöhnlicher Natterkopf			
ita	Lingua di bove			
cat	Llengua de bou vulgar			
ndl	Slangekruid			
deu	Stolzer Heinrich			
spa	Viborera			
eng	Viper's-bugloss			
ita	Viperina azzurra			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Usage médicinal : pour calmer la toux, propriétés dépuratives, pectorales et diurétiques sous forme d'infusions

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
 observée le **1 janvier 1851**
 par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]D'ARBAUMONT Jules - **Une tige anormale de Vipérine.** - 1903, p. 263- 267 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 50 - Fascicule 3
- [Botanique]ACCARD H. - **Sur une nouvelle variété d'Echium (E. vulgare var. valesiacum), longtemps confondue avec l' E. italicum.** - 1894, p. 0- 0 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 41 - Fascicule session

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GARBOLINO](#) et [E. GRANDIOUAN](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Echium vulgare L. [1753, Sp. Pl., 1 : 139]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Boraginales	124889
Famille	Boraginaceae	100904
Genre	Echium	83422
Espèce	Echium vulgare	23559
Variété	Echium vulgare var. vulgare	23564
Variété	Echium vulgare var. pustulatum	83605

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Echium vulgare* et code **2581**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Echium vulgare* et code **1573**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Echium vulgare* et code **3109**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Echium vulgare* et page **0551** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Echium vulgare* et code **0548** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.