

Fagus sylvatica L.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3268 Fagus silvatica L.

- Arbre élevé, à écorce lisse et blanchâtre feuilles ovales, entières ou un peu sinuées-dentées, pubescentes-soyeuses aux bords et sur les nervures
- fleurs mâles en chatons globuleux, longuement pédoncules, pendants périanthe très velu, en cloche, à 5-6 lobes
- · 8-12 étamines, à filets allongés. Fleurs femelles renfermées 2-3 dans un involucre à 4 divisions
- périanthe velu, lacinié
- 3 styles filiformes
- ovaire à 3 loges biovulées. Involucre fructifère pédoncule, ovale, ligneux, velu, hérissé d'épines molles, s'ouvrant en 4 valves, renfermant 2-3 fruits (faînes) trigones, d'un brun luisant, à péricarpe coriace, velu en dedans,

Écologie Bois humides, dans toute la France, excepté la plaine méditerranéenne ; Corse.

Répartition Europe tempérée ; Asie Mineure, Caucase, Perse

Floraison avril-mai Fructification Août-septembre

Usages Le bois, très employé dans le charronnage, sert surtout de combustible. La faîne est recherchée par les animaux : elle contient une huile grasse comestible et très propre à l'éclairage.

Description Baseflor

Julya Ph. 2021 ff - Raseflor Index hotanique écologique et chorologique de la flore de France Version : 27 avril 2021, https://www.tela.hotanica.org/projets/phytosociologic

Julve, Ph., 2021 ft Basenor. Index botanique, ecologique et chorologique de la nore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie		
Type Biologique : ()		
Formation végétale : magnophanérophytaie		
Chorologie : européen		
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : vert Floraison : de avril à mai sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : dyszoochore		

Description collaborative

Générale

[Source : M. REILLE]
- Le hêtre est un arbre à feuillage caduc et dans ses forêts son tronc est droit et élancé, sans branches

- latérales sur plusieurs mètres. À l''état isolé le tronc est court et le port en boule. Les **bourgeons**, allongés et pointus (fusiformes) sont insérés obliquement par rapport au rameau.
- Les **feuilles** apparaissent fin avril. Elles sont alternes, pétiolées, à limbe coriace, entier, à bord ondulé et finement velu à l'état jeune, parcourues de 5 à 9 paires de nervures simples. La face supérieure, velue au début de la feuillaison ne présente plus, sur les feuilles adultes, que des touffes de poils à la base des nervures. À leur naissance, les feuilles sont pourvues de 2 longues stipules brunes le plus souvent rapidement caduques. Il n'est cependant pas rare que les stipules persistent, au contraire longtemps. Elles pendent alors à la face inférieure du rameau feuillé.

- Fleurs: Le hêtre ne fleurit pas avant l'âge de 40 ans. Fleurs mâles et femelles portées à l'extrémité du même rameau (monoécie) sont discrètes et passent souvent inaperçues. Elles apparaissent en même temps que les feuilles. Les fleurs mâles sont groupées en glomérules pendants à l'extrémité de longs pédoncules. Les fleurs femelles situées au-dessus des chatons mâles sont réunies par deux au milieu d'un bouquet d'appendices velus et dressés qui constituent un involucre touffu. C''est cet involucre de bractées accrescentes et concrescentes qui constituera la cupule entourant les
- Fruit : cupule à paroi épaisse, pourvue d''épines molles, est l''homologue exact de la boque des châtaignes, Les cupules, cadugues s'ouvrent par quatre valves et libèrent un ou deux fruits secs, les faînes, en forme de pyramide à trois faces au sommet desquelles se reconnaissent encore les restes du stigmate de la fleur. Les faînes, comestibles pour l'homme à dose modérée, sont appréciées de tous les animaux de la forêt. On en tirait jadis, par pression, une huile de qualité. La fructification du hêtre ne se produit pas

chaque année. La germination des faînes, au printemps, donne une plantule facilement reconnaissable avec deux feuilles réniformes opposées (les cotylédons) charnues et velues en-dessous - L''écorce du hêtre, d''aspect marbré, gris-claire, demeure lisse même sur les troncs âgés.

Identification


Pour différencier le hêtre et le charme (souvent confondus) on peut utiliser ce moyen mnémotechnique :

"Le charme d'Adam c'est d'être à poil" : Le charme a des feuilles dentées et le hêtre a des feuilles poilues sur le bord.
" : Le charme a des feuilles dentées et le hêtre a des feuilles poilues sur le bord.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Hêtre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Hêtre commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Fayard	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Fouteau		Secondaire ou régional	
eng	Beech			
deu	Buchbaum			
deu	Buche			
eng	Buck			
eng	Common Beech			
eng	European Beech			
ita	Faggio comune			
cat	Faig			
spa	Faya			
ndl	Gewone Beuk			
ndl	Groene Beuk			
spa	Haya			
deu	Rot-Buche			
deu	Rotbuche			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Menuiserie

Le bois du hêtre est lourd (densité 0,6 à 0,9) et homogène. Il est peu flexible et cassant ce qui le rend impropre à la charpente. Néanmoins, il reste un bois de grande valeur en menuiserie pour tous les petits meubles, en particulier les chaises et tous les objets de tournerie. Il peut être déroulé et donner un contreplaqué de grande qualité. C'est aussi un excellent bois de feu. [Source: M. REILLE]

Toponymie

Une forêt de hêtres est une hêtraie.

Le hêtre, Fagus, est à l'origine de nombreux toponymes lozériens ; La Fage, Les Faux, La Fagette, La Fageolle, Grossefage, Daufage, Falgas. [Source : M. REILLE]

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 25 juin 20 par Françoise Carle

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations



	Maille: comportant plusieurs
ш	sources de données distinctes
	BazNat - Flore : données issues
	des prospections flore de la base
	de données naturaliste du
	réseau BazNat.
	Flore date of descriptions de-

Flora data : données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.

Prospection Flore du CEN-LR
: données issues des
prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-

SOPHY, banque de données botaniques et écologiques : données issues de <u>SOPHY</u>, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique

(A.I.A.B.). IFN : données issues des

irn': autilitées issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National Vigle Flore : données issues du programme Vigle-Flore PhotoFlora : données issues de

PhotoFlora: données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Fagus sylvatica L. [1753, Sp. Pl., 2:998]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Fagaceae	100924
Genre	Fagus	86423
Espèce	Fagus sylvatica	75130
Variété	Fagus sylvatica var. laciniata	26455
Variété	Fagus sylvatica var. sylvatica	75661

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
- o le nom de Fagus sylvatica subsp. sylvatica et code **1010** Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
- ce taxon est note dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustree France (3 vol.). sous :

 o le nom de Fagus sylvatica et code 3268

 Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).

 Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.). sous :

 o le nom de Fagus sylvatica et code 0171

 Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.

 Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :

- o le nom de Fagus sylvatica et code **0245** Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
- le nom de Fagus sylvatica et page 0109 en tant que nom retenu
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
 le nom de Fagus sylvatica et code 0767 en tant que nom retenu