

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>3327 Juniperus communis L. Genévrier</b>  |
| - . Arbrisseau diffus ou arbuste dressé de 1-6 mètres, à bourgeons écaillés, à ramules triangulaires<br>- feuilles étalées, verticillées par 3 et disposées sur 6 rangs, toutes linéaires en alêne, insensiblement atténuées en pointe fine et piquante, articulées, non décurrentes, marquées d'un seul sillon blanchâtre en dessus, obtusément carénées et sillonnées en dessous<br>- fleurs dioïques<br>- fruits noirs-bleuâtres et glauques à la maturité, globuleux, assez petits (5-7 mm), longuement dépassés par les feuilles. |
| Écologie Côteaux, landes et bois, dans toute la France et en Corse.  |
| Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Afrique et Amérique septentrionales.  |
| Floraison avril-mai Fructification automne de la 2e année  |
| Usages Les fruits, toniques et diurétiques, servent à préparer une confiture et une liqueur usitée dans le Nord.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Microphanérophytes (8m) (sempervirentes)  |  |
| Formation végétale : microphanérophytaie  |  |
| Chorologie : circumboréal   |  |
| Inflorescence : cône<br>Fruit : baie<br>Couleur de la fleur : jaune, vert<br>Floraison : de avril à mai | sexualité : dioïque<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : endozoochore |

### Description collaborative

#### Générale

Description de **Maurice Reille**  
(issue de l'ouvrage "IMAGES  
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES  
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,  
Connaissance et reconnaissances")

#### Le genévrier commun

*Juniperus communis* L.  
Gymnosperme, Famille des Cupressacées

Le genévrier commun est la plus cosmopolite de toutes les Gymnospermes. Son aire couvre toute l'Eurasie, le nord de l'Amérique du Nord et de l'Afrique. Indifférent aux substrats et supportant des conditions climatiques très variées, il est présent partout en Lozère, abondant aussi bien sur les causses que sur les crêtes ventées de Margeride, du Mont Lozère ou de l'Aubrac. C'est un arbuste au port variable, parfois élevé en pinceau (port fastigié), d'autres fois étalé, en boule, ou aux branches pendantes (1,2). Son feuillage est sempervirent. Les feuilles, par verticilles de 3, sont presque perpendiculaires au rameau qui les porte. Ce sont des aiguilles aplaties à extrémité très aiguë, raides et piquantes. Leur face supérieure présente une seule raie glauque. Il n'y a qu'une nervure qui fait un peu saillie à la face inférieure. La floraison a lieu en avril-mai. Il y a diœcie. Les pieds mâles portent à la face inférieure des rameaux des petits cônes globuleux jaunâtres dont les étamines libèrent un abondant pollen (3). Sur les pieds femelles, les jeunes cônes à 3 écailles seulement dont chacune porte un seul ovule, passent presque inaperçus (4). Ils commencent à se remarquer lorsque les écailles devenant charnues se soudent en un organe globuleux verdâtre, de la taille d'un pois. Leur maturation se fait en 2 ans. A la fin de leur seconde année ils sont devenus bleu-noirâtre et la soudure des écailles à leur sommet se voit bien (5). Ils ressemblent à des baies (on dit souvent « baies de genévrier »). On les désigne sous le nom de galbules pour les distinguer des baies authentiques qui n'existent que chez les Angiospermes. Ces galbules consommées et dispersées par les animaux ne contiennent que 2 ou 3 graines.


L'écorce grisâtre s'exfolie naturellement en lanières longitudinales. Le bois est dur et homogène jaunâtre à brunâtre, d'odeur agréable. Il prend un beau poli et a servi à l'ébénisterie fine et la marqueterie. Les « baies de genévrier » ont une valeur condimentaire. Chacun connaît leur rôle dans la préparation de la choucroute. On en tire aussi des liqueurs et des eaux de vie, tel le gin.

#### Identification


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                    | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi       | Notes |
|--------|------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra    | Genévrier commun       | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Genièvre               | Masculin singulier | Recommandé ou typique  |       |
| fra    | Peteron                |                    | Secondaire ou régional |       |
| fra    | Petrot                 |                    | Secondaire ou régional |       |
| eng    | Common Juniper         |                    |                        |       |
| spa    | Enebro común           |                    |                        |       |
| spa    | Enebro real            |                    |                        |       |
| deu    | Feuerbaum              |                    |                        |       |
| deu    | Gemeiner Wacholder     |                    |                        |       |
| deu    | Gewöhnlicher Wacholder |                    |                        |       |
| ndl    | Gewone Jeneverbes      |                    |                        |       |
| cat    | Ginebre                |                    |                        |       |
| cat    | Ginebró                |                    |                        |       |
| ita    | Ginepro comune         |                    |                        |       |
| eng    | Juniper                |                    |                        |       |
| deu    | Krametsbeerbaum        |                    |                        |       |
| deu    | Kraunbaum              |                    |                        |       |
| spa    | Xinebro                |                    |                        |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |


## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **inconnue**  
par **Thierry Pernot**

## Références bibliographiques

- [Botanique]CAMUS Fernand - **A propos du Juniperus communis.** - 1910, p. 225- 231 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 4
- [Botanique]CAMUS Fernand - **A propos du Juniperus communis (suite).** - 1910, p. 261- 266 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 4
- [Botanique]FY F. (Abbé) - **Observations sur le Juniperus communis L.** - 1910, p. 534- 538 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 7
- [Botanique]GUFFROY Charles - **A propos du Juniperus communis.** - 1910, p. 178- 179 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 3
- [Botanique]RUSSELL William - **Remarques sur une station du Juniperus communis dans les Vosges granitiques.** - 1910, p. 35- 36 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 57 - Fascicule 1

## Répartition

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu


Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

**Juniperus communis L. [1753: Sp. Pl., 2 : 1040]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

## Légende

 Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                        | Num Nom      |
|-------------|---|--------------|
| Cladus      | Plantae                                 | 101140       |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                       | 102735       |
| Cladus      | Embryophytes                            | 102762       |
| Cladus      | Stomatophytes                           | 102768       |
| Cladus      | Hemitracheophytes                       | 101137       |
| Cladus      | Tracheophytes                           | 87491        |
| Cladus      | Euphyllophytes                          | 87521        |
| Cladus      | Spermatophytes                          | 102795       |
| Cladus      | Gymnospermes                            | 101132       |
| Cladus      | Pinophytes                              | 102770       |
| Ordre       | Pinales                                 | 102778       |
| Famille     | Cupressaceae                            | 101005       |
| Genre       | Juniperus                               | 86626        |
| Espèce      | <b>Juniperus communis</b>               | <b>36777</b> |
| Sous-Espèce | Juniperus communis subsp. communis      | 36779        |
| Sous-Espèce | Juniperus communis subsp. intermedia    | 36781        |
| Sous-Espèce | Juniperus communis subsp. nana          | 36783        |
| Sous-Espèce | Juniperus communis subsp. hemisphaerica | 73957        |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Juniperus communis* et code **0139**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Juniperus communis* et code **3327**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Juniperus communis* et page **0050** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Juniperus communis* et code **0032** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.