

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2178 <i>Lactuca ramosissima</i>
Synonymes L. GRENIERI Loret
<ul style="list-style-type: none"> - Très voisin du précédent - plante bisannuelle ayant l'aspect d'un petit buisson contracté, très rameux de 2-3 dm à rameaux courts et rapprochés - feuilles radicales pennatifides à lobes linéaires, entiers ou presque entiers, les supérieures linéaires entières, décurrentes à décurrence large et épaisse, longue de 5-8 mm - capitule offrant 5 ligules d'un jaune vif, bec égalant environ la longueur de l'akène - espèce plus méridionale.
Écologie Côteaux secs, rocailles, murs : Aveyron, Tarn, Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes ; Corse.
Répartition Espagne, Ligurie, Grèce, Perse.
Floraison Juillet-septembre.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Laitue très ramifiée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **14 juillet 2006**
par **Mathieu Menand**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]COSTE Hippolyte - **Note sur les Lactuca ramosissima Gren. Et Godr. et viminea Link.** - 1903, p. 627- 631 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 50 - Fascicule 6
- [Botanique]COSTE Hippolyte - **A propos des Lactuca ramosissima et viminea.** - 1904, p. 104- 105 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 51 - Fascicule 2

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) et [E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Lactuca ramosissima (All.) Boreau [1846, Bull. Soc. Industr. Angers, 17 : 19]

Basionyme : *Prenanthes ramosissima* All. [1785, Fl. Pedem., 1 : 226]

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Lactuca	86651
Espèce	Lactuca ramosissima	122686

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lactuca grenieri* et code **2178** en tant que synonyme
 - le nom de *Lactuca ramosissima* et code **2178**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Lactuca viminea subsp. ramosissima* et code **0465** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Lactuca ramosissima* et code **0465** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lactuca viminea subsp. ramosissima* et code **4151** en tant que -A-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 53100