

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1659 <i>Lonicera nigra</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Sous arbrisseau de 1 à 2 mètres, dressé, à rameaux bruns, glabres - feuilles brièvement pétiolées, oblongues-elliptiques, glabres ou glabrescentes, à nervures opaques - pédoncules axillaires, glabres, 3-4 fois plus longs que les fleurs - fleurs géminées, d'un blanc rosé - bractées ovales, plus courtes que l'ovaire - corolle glabrescente, à 2 lèvres, à tube bossu à la base, plus court que le limbe - filets des étamines et style velus à la base - baies géminées, à peine soudées à la base, subglobuleuses, noires.
Écologie Bois et rocailles des montagnes : Vosges ; Jura ; Beaujolais et Bugey ; Alpes ; Forez, Auvergne, Cévennes ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Europe centrale, d'Espagne en Russie ; Asie boréale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : orophyte eurasiatique	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Camérisier noir	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chèvrefeuille à fruits noirs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chèvrefeuille noir	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Blackberried Honeysuckle			
ita	Caprifoglio nero			
deu	Schwarze Heckenkirsche			
deu	Schwarzes Geißblatt			
cat	Xuclamel negra			
ndl	Zwarte Kamperfoelie			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

Lonicera nigra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]

Basionyme : Lonicera nigra L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:53

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Lonicera	86731
Espèce	Lonicera nigra	39899

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et code **972**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et code **1659**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et code **1982**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et code **3625**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et page **0668** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Lonicera nigra* et code **0621** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 39899