

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 1655 <i>Lonicera periclymenum</i> L. Chèvrefeuille des bois |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Sous-arbrisseau de 1-3 mètres et plus, volubile, à jeunes rameaux pubescents au sommet - feuilles caduques, souvent molles et minces, ovales-lancéolées, aiguës, sans bordure transparente, glabres ou pubescentes, les supérieures sessiles, non connées - fleurs d'un blanc jaunâtre ou rougeâtre, odorantes, sessiles, verticillées en têtes terminales longuement pédonculées - calice à dents lancéolées-aiguës - corolle pubescente-glanduleuse, à tube plus long que le limbe - style glabre - baies ovoïdes, rouges. |
| Écologie Haies et bois, surtout des terrains siliceux, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne. |
| Répartition Europe, surtout centrale, jusqu'à la Suède ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Juin-septembre. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|--|---|
| Type Biologique : Microphanérophytes (8m) (lianes, caducifoliées) | |
| Formation végétale : parvophanérophytaie | |
| Chorologie : européen méridional | |
| Inflorescence : cyme multipare Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à septembre | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : endozoochore |

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|---|
| fra | Chèvrefeuille des bois | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Cranquillier | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Chèvrefeuille périclymène | Masculin singulier | Peu usité et à éviter | "Chèvrefeuille périclymène" est le décalque du nom latin. |
| deu | Baumwürger | | | |
| ndl | Boskamperfoelle | | | |
| ita | Caprifoglio atlantico | | | |
| ita | Caprifoglio dei boschi | | | |
| eng | Common Honeysuckle | | | |
| deu | Deutsches Geißblatt | | | |
| eng | English wild Honeysuckle | | | |
| eng | European Honeysuckle | | | |
| deu | Georgenrose | | | |
| eng | Honeysuckle | | | |
| cat | Lligabosc atlàntic | | | |
| ita | Madreselva | | | |
| spa | Madreselva | | | |
| spa | Parra silvestre | | | |
| deu | Wald-Geißblatt | | | |
| deu | Waldgeißblatt | | | |
| ndl | Wilde Kamperfoelle | | | |
| deu | Windendes Geißblatt | | | |
| eng | Woodbine | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.










à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale

| | |
|---|----------------------|
|  | non renseignée |
|  | présence |
|  | présence à confirmer |
|  | douteux |
|  | disparu |
|  | erreur |
|  | erreur à confirmer |

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Lonicera periclymenum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]

Basionyme : *Lonicera periclymenum* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 173]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Dipsacales | 102766 |
| Famille | Caprifoliaceae | 101054 |
| Genre | Lonicera | 86731 |
| Espèce | <i>Lonicera periclymenum</i> | 39905 |
| Sous-Espèce | <i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>periclymenum</i> | 75227 |
| Sous-Espèce | <i>Lonicera periclymenum</i> subsp. <i>hispanicum</i> | 119243 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **0971**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **1655**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **1977**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* var. *parviflora* et page **0670** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* et code **0620** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Lonicera periclymenum* var. *quercina* et code **3627** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 39905