

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 525 Alsine villarsii Mert. et Koch. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace, glabre ou pubescente, à souche un peu ligneuse - tiges de 10-20 cm, nombreuses, étalées-ascendantes - feuilles linéaires, planes, à 3 nervures - fleurs 3-6 au sommet des tiges - pédicelles 2-4 fois plus longs que le calice - sépales scarieux aux bords, lancéolés-aigus, à 3 nervures - pétales oblongs en coin, obtus, 1 fois plus longs que les sépales - capsule ovoïde, égalant à peu près le calice - graines tuberculeuses. |
| Écologie Rochers des hautes montagnes, surtout calcaires : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence jusque dans le Var et les Bouches-du-Rhône ; Mont Ventoux. |
| Répartition Europe méridionale, de l'Espagne au Caucase et à l'Oural ; Sibérie. |
| Floraison Juillet-août. |

Description Baseflor


Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : orophyte méridional | |
| Inflorescence : cyme bipare Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juillet à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTEX par Jean-François LÉGER - 2007.


| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra | Minuartie de Villars | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Sabline de Villars | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Alsine de Villars | | Secondaire ou régional | |
| ita | Minuartia di Villars | | | |
| deu | Villars' Miere | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Minuartia villarii* (Balb.) Wilczek & Chenevard [1912, *Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève*, 15 : 256]**

Basionyme : *Arenaria villarii* Balb. [1804, *Misc. Bot.*, 1 : 21]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Ordre | Caryophyllales | 101040 |
| Famille | Caryophyllaceae | 100911 |
| Genre | Minuartia | 84862 |
| Espèce | Minuartia villarii | 42689 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Alsine villarii* et code **0525**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Minuartia flaccida* et code **0417** en tant que synonyme
 - le nom de *Minuartia villarii* et code **0417**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Minuartia villarii* et code **1420**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Minuartia villarii* et code **0646** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 6341