

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1631 Myrrhis odorata Scop. Cerfeuil musqué</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 50 cm à 1 mètre, velue, à odeur d'anis</li> <li>- tige robuste, creuse, cannelée</li> <li>- feuilles grandes, molles, bi-tripennatiséquées, à segments lancéolés, incisés-pennatifides</li> <li>- fleurs blanches, en ombelles à 6-15 rayons pubescents, dressés à la maturité</li> <li>- involucre nul</li> <li>- involucrelle à 5-8 folioles lancéolées, membraneuses, ciliées, réfléchies</li> <li>- calice à limbe nul</li> <li>- pétales obovales, émarginés, à pointe courbée</li> <li>- styles courts, réfléchis</li> <li>- fruit grand, oblong, long de 20 à 30 mm, comprimé par le côté, acuminé, d'un noir luisant à la maturité</li> <li>- méricarpes à 5 côtes égales, fortement carénées, tranchantes, creuses en dedans, séparées par des vallécules profondes, sans bandelettes.</li> </ul>
Écologie Prairies et bois des montagnes ; Vosges ; Jura ; Alpes ; Forez, Auvergne et Plateau central ; Corbières et Pyrénées.
Répartition Europe centrale et méridionale.
Floraison Juin-août. .
Usages Souvent cultivé et subsponané autour des habitations.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : orophyte méridional	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : androdioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil anisé	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil d'Espagne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil musqué	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Myrrhe	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Myrrhis odorant		Peu usité et à éviter	
deu	Anis-Kerbel			
eng	Cow Chervil			
eng	Great Chervil			
deu	Körbelkraut			
ita	Mirride delle Alpi			
cat	Mirris			
deu	Myrrhen-Kerbel			
deu	Myrrhenkerbel			
spa	Perifollo oloroso			
ndl	Roomse Kervel			
eng	Smooth Cicely			
deu	Süßdölde			
eng	Sweet Bracken			
eng	Sweet Chervil			
eng	Sweet Cicely			
deu	Wohlriechender Körbel			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **7 juin 2008**  
par **Mathieu Menand**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Le myrrhis odorant ou cerfeuil musqué, Myrrhis odorata (L.) Scop.** - 2002.01, p. 8- 20 - Départ./Région : *Savoie*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°331
- [Botanique]GUILLAND Lucienne - **Herborisation dans le vallon d'Arclusaz. Compte rendu de la sortie du 19 mai 2007** - 2008, p. 13- 14 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Lanquedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRABOLINO](#) et [E. GRABOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Myrrhis odorata (L.) Scop. [1771, Fl. Carniol., éd. 2, 1 : 207]**

Basionyme : *Scandix odorata* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 256]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Myrrhis	86838
Espèce	Myrrhis odorata	43424

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et code **0754**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et code **1631**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et code **1417**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et code **2780**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et page **0494** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Myrrhis odorata* et code **0355** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 61289