

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2397 Pinguicula alpina L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 5-12 cm, à hampes grêles, glabres ou pubescentes-glanduleuses - feuilles elliptiques, un peu contournées - fleurs blanchâtres, marquées à la gorge de deux taches jaunes - calice subglanduleux, à lobes ovales - corolle petite (8-10 mm de long), aussi large que longue, à lèvres inégales, la supérieure à lobes très courts, arrondis, l'inférieure à lobe moyen plus large et émarginé - éperon recourbé, gros et court de 2-3 mm, conique, aussi large ou plus large que long à la base, égalant le quart de la corolle - capsule ovoïde.
Écologie Rochers humides des hautes montagnes : Haut-Jura ; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence ; Pyrénées.
Répartition Europe centrale et boréale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés (carnivores)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : fleur solitaire terminale Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Macule : jaune Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Herbe pérenne, avec de longues racines, qui passe l'hiver sous forme d'hibernacles mais qui garde ses racines.

Feuilles: de 5 à 8 horizontales, appliquées sur le substrat (prostrées), sessiles avec bords enroulés, oblongues-elliptiques ou oblongues lancéolées, vert jaunâtre ([RHS:130A-140B-145A \(interwiki inconnu\)](#)) parfois grenat ([RHS: 70A](#)), de 25 à 45 mm de long pour 8 à 14 mm de large

Hampe florale (pédicelle): 1 à 8 glabre ou glanduleuse, non ramifiée de 50 à 110 mm de haut

Calice (sépal): glabrescent ([RHS:140B \(interwiki inconnu\)](#))

lobes supérieurs: triangulaire ovales obtus à subobtus rarement divergent

lobes inférieurs: divisés au 1/3 de la longueur

Fleur: assez petite 10 à 16 mm de long

Corolle: aussi longue que large avec des lobes nettement inégaux, blanches avec des taches jaunes à la gorge ([RHS:12C-14A \(interwiki inconnu\)](#)) leurs dessins peuvent prendre diverses formes

est ce que le dessin dans une même population est homogène? Est ce qu'à chaque dessin correspond une station bien distincte?

2 lobes supérieures: plus courts obtus

3 lobes inférieurs qui ne se recouvrent pas latéralement (ouvert), celui du milieu est beaucoup plus grand que les latéraux avec le bout obtus ou tronqué voir émarginé (échancré)

tube (gorge) court légèrement en entonnoir glabrescent à l'extérieur poilu à l'intérieur

Éperon: court 2 à 3 cm conique ou cylindrique obtus courbé vert jaunâtre

Capsule de graine: piriforme, aigu, longueur plus de 2 fois celle du calice


2n=32

Floraison: avril à juin (août)
 FOUGERE Jean François
 pinguicula@free.fr


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grassette des Alpes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Alpen-Fettblatt			
deu	Alpen-Fettkraut			
ndl	Alpenvetblad			
eng	Alpine Butterwort			
ita	Erba-unta bianca			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **3 juillet 1999**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]GAVE (Abbé) - **Trois plantes informations botaniques ; annonces pour la flore de France.** - 1905, p. 634- 637 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 52 - Fascicule 8

Répartition

Chorologie départementale



■	non renseignée
■	présence
■	présence à confirmer
■	douteux
■	disparu
■	erreur
■	erreur à confirmer

Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Pinguicula alpina L. [1753, Sp. Pl., 1 : 17]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

Linnaeus Fl Lapp ed 1 (1737) ; Oeder Fl Dan 3 (1769) ; Reichenbach pl crit 1 (1823) ; Sowerby et Sm engl bot suppl 2 (1834) ; Hegi Ill Fl mittel eur VI (1915) ; Lagerberg Vilda vaxter i norden 3 (1939) ; Blanca Ruiz Rejon et Reg Zamora dans folia geobot 34 :352 (1999)

Syn :

P.alba : Kuch in hoppe bot taschenb (1800)

P.albiflora b villosa : Cariot et STlager etude fl (1864)

P.alpestris : Persoon syn pl 1 (1805)

P.alpina sp alpina :

a) typica Perrier de la bathe cat rais pl vasc savoie 2 (1928)

b) bimaculata Beauverd dans bull soc genevre ser 2 XI (1911)

c) lendneri Perrier de la barthe cat rais pl vasc savoie 2 (1928)

d) lendneri Beauverd dans bull soc bot genevre ser 2 XI (1911)

e) villosa Beauverd dans bull soc bot genevre ser 2 XI (1911)

P.alpina :

a) typica Rouy fl France XI (1909)

b) bimaculata Wahlenberg fl lapp (1812)

P. alpina var bimaculata : Chiovenda in nuov g bot it 30 (1923)

P.alpina :

a) flavescens :Steudel et Hochstetter enum pl germ hlv (1826)

P.brachyloba : Ledebour dans Schultes mant syst veg I (1822)

P.flavescens : Floerke ap Hoppe bot taschenb (1800)

P.gelida : Schur enum pl transs (1866)

P.hyperborea : Gandoger nov consp fl eur (1910)

P.pallida : Turczaninov cat pl baikal dah (1849)

P.purpurea : Willdenow in ces naturf fr n schr 2 (1799)

il semblerait d'après le rectificatif du découvreur , l'abbé GAVE, que la sous espèce gavei et la variété lemaniana ne soit en fait qu'une erreur de détermination et de retranscription de ses notes.

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	Pinguicula alpina	49538

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Pinguicula alpina* et code **1469**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Pinguicula alpina* et code **2397**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Pinguicula alpina* et code **1877**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Pinguicula alpina* et code **3334**
 - le nom de *Pinguicula alpina var. gavei* et code **3334** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Pinguicula alpina* et code **0820** en tant que nom retenu
 - le nom de *Pinguicula alpina var. lemaniana* et code **0820** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.