

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2399 <i>Pinguicula vulgaris</i> L. Langue d'oie
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante vivace de 5-15 cm, à hampes grêles, glabres ou pubescentes - feuilles ovales-oblongues - fleurs violettes - calice glanduleux, à lobes oblongs - corolle moyenne (10-15 mm de long), allongée, plus longue que large, à lèvres très inégales, à lobes profonds, bien plus longs que larges, dirigés en avant, non contigus - éperon droit, grêle, égalant le tiers ou la moitié de la corolle - capsule en poire, élargie à la base. Varie à fleurs et feuilles plus grandes, capsule ovoïde-conique (var. <i>macrantha</i> Lamot., <i>V. alpestris</i> Genty).
Écologie Prairies marécageuses et rochers humides, dans presque toute la France ; nul dans la région méditerranéenne ; Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et boréale ; Amérique boréale.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : fleur solitaire terminale Fruit : capsule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Herbe pérenne qui passe l'hiver sous forme d'hibernacle sans racines

Feuilles :de 5 à 9 horizontales appliquées sur le substrat (prostrées)avec des bords enroulés , oblongue-elliptiques ou oblongue-ovales vert jaunâtre (RHS :130A-140B) parfois orange ([RHS:24A \(interwiki inconnu\)](#)) de 10 à 20 mm de large pour 20 à 45 mm de long

Hampe florale (pédicelle):1 à 5 glanduleuse ,non ramifiée de 60 à180 mm pourpre ([RHS:61A-70A \(interwiki inconnu\)](#)) parfois verte(RHS130A-140B-140C)

Calice(sépales) :glanduleux pourpre ,lobes égaux ([RHS:61A-70A \(interwiki inconnu\)](#)) ou vert (RHS130A-140B-140C)

lobes supérieurs étroitement elliptique oblongs ou ovales obtus ou subaigus

lobes inférieurs divisés au 1/3 ou 2/3 de la longueur, non divergent.

Fleur :petite 15 à 22 mm de long

Corolle: plus longue que large ,de violet pales ([RHS:91C \(interwiki inconnu\)](#)- 92C) à violet (RHS: 78B ou approchant)

2 lobes supérieurs oblongs obovales obtus arrondis au sommet de longueur égale

3 lobes inférieurs de 5 à 7 mm ,plus long que large ,oblongs ou oblong obovales divergent qui ne se recouvrent pas latéralement ,obtus tronqués ,celui du milieu légèrement plus long.,parfois ces lobes présentent des macules blanches plus ou moins importantes ornées sur certain écotype par une petite macule violette très prononcée(pouvant donner lieu à un nom infraspecific de variété ou de forme)

Tube(gorge)habituellement blanc et court en forme d'entonnoir glanduleux à l'extérieur pilosité importante à l'intérieur parfois légèrement colorée en jaune orange rouge .

Éperon : 2. à 6 mm cylindrique droit ou incliné parfois fortement arqué égalant la moitié de la corolle, de couleur blanc verdâtre à violet (RHS58C-59D)

Capsule de graine : ovoïde

2n=64


Floraison :mai-juin (août)

FOUGERE jean François
 pinguicula@free.fr


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Grassette commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Langue-d'oe	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Grassette vulgaire	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	
eng	Common Butterwort			
ita	Erba-unta comune			
deu	Gemeines Fettblatt			
deu	Gewöhnliches Fettkraut			
eng	Marsh Violet			
ndl	Vetblad			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **19 juillet 20**
par **Jimmy V.**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Pinguicula vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 17]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Icon :

L sp pl led 17 (1753) ;Sowerbey et Sm engl bot 1tab 70 (1790) ; Rchb icon fl germ helv 20 tab (1819) ; Folch veg paisos catalans 391 (1981) ; Blanca Ruiz Rejon et Reg Zamora folia goebot 34 :342 (1999) ;Oeder fl dan (1763)

Syn :

P.alpina : Weber spicileg fl goetting 1 (1778) ;Peter fl sud hannover (1901)

P.artica : Eastwood coult bot gaz 33 :293 (1902)

P.borealis : Salisb prodr 90 (1796)

P.davurica : Pall ex Link jahrb gew 1:54 (1820)

P.dostalii : Barta veda prir (praha) 23:5 (1944)

P.fonquieriana : Romo Peris et Stuebing ann bot fennici 33:31 (1996)

P.longicornis : Gay ex Babington phytologist 1 :310(1843)

P.grandiflora : Pollinius fl veron (1822) ;Schleicher ex rchb pl crit 1:70 (1823)

P.vulgaris var gaveana : Beauv bull soc bot geneve 11:324 (1911)

P.vulgaris var genuina : Schink et Keller fl schweiz 2:201 (1905)

P.vulgaris var grandiflora : Cosson et germain de st pierre fl paris ed 304 (1845) ; Hartmann handb skand flora (1870)

P.vulgaris grandiflora : Fries Summa veget scand (1846)

P.vulgaris var leptoceras : Sampaio fl portugesa ed 495 (1946)

P.vulgaris subvar major : Cosson et germain de st pierre fl paris ed II (1861)

P. vulgaris var macrantha : Lamotte prodr fl pl centre France 510 (1881)

P.vulgaris micrantha : Fries Summa veget scand (1846)

P.vulgaris var longifolia : Rapin guide bot cant vaud 2 ed 481 (1862)

P.vulgaris var alpestris : Marçais rev bot 8 :565 (1890) ; Genty Morot j bot (1891)

P.vulgaris var alpicola : Chenevard bull herb boiss III (1908); Koch synops fl germ helv ed I (1887) ; Perrier de la bathe cat rais pl vasc savoie (1928)

P.vulgaris race alpicola : Rouy fl frane 11:202 (1909)

P. vulgaris subsp alpicola : Rouy consp fl France 205 (1927)

P.leptoceras : Schur enum pl trans 547 (1866)

P.vulgaris var minor : Mayer fl hannover (1849) ; Koch taschenb dt schweiz fl (1818)

P.vulgaris var obtusata : Nordstedt bot not (1863)

P.vulgaris var obtusa : Sommerfelt suppl lapponicae (1826)

P.vulgaris var pratensis : Kock taschenb dt schweiz fl 417 (1848);

P.vulgaris var tenuior : Wahlenb fl lappon 10 (1812);Fries Summa verg scand (1846)

P.vulgaris var uliginosa : Genty morot j bot 5 :237 (1891)

P.vulgaris var pallida : Lange meddel groenl 3 :261 (1887)

P.vulgaris fr ecalcarata : Wirzen prodr 10 (1837?)

P.vulgaris fr semiflava : Neumann sv fl 119 (1901)

FOUGERE jean françois
pinguicula@free.fr

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Pinguicula	87007
Espèce	Pinguicula vulgaris	49587
Variété	Pinguicula vulgaris var. alpicola	49593
Variété	Pinguicula vulgaris var. vulgaris	119944

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et code **1473**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et code **2399**
 - le nom de *Pinguicula vulgaris var. alpestris* et code **2399** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Pinguicula vulgaris var. macrantha* et code **2399** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et code **1878**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et code **3338**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et page **0649** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Pinguicula vulgaris* et code **0822** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.