

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1126 Potentilla anserina L. Argentine
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 20-40 cm, à tiges rampantes-stolonifères, grêles, axillaires - feuilles imparipennées, à 15-25 folioles oblongues, vertes en dessus ou soyeuses-argentées sur les 2 faces, munies tout autour de dents linéaires-aiguës - stipules caulinaires multifides - fleurs d'un jaune doré, grandes (2 cm de diam.), solitaires à l'aisselle des feuilles, longuement pédonculées - calice à lobes égalant le calice - pétales obovales, non émarginés, 2 fois plus longs que le calice - carpelles lisses.
Écologie Fossés, prés, lieux humides, dans presque toute la France ; rare dans la région méditerranéenne.
Répartition Europe, surtout centrale et boréale ; Asie occidentale ; Amérique septentrionale et Groenland.
Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : circumboréal	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune	sexualité : gynodioïque Ordre de maturation : protandre, protogyne Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : myrmécochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ansérine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille ansérine	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Potentille des oies	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Argentine	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux oies	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Anserina			
ita	Argentina			
spa	Argentina			
ita	Cinquefoglia pié-d'oca			
deu	Gänse-Fingerkraut			
deu	Gänserich			
eng	Goose Grey			
eng	Silverweed			
ndl	Zilverschoon			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **3 juin 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Argentina anserina (L.) Rydb. [1899, Mem. Columb. Univ., 2 : 159]

Basionyme : *Potentilla anserina* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 495]

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 21:12:28

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidaees	101053
Cladus	Fabidaees	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	Argentina	98372
Espèce	Argentina anserina	6382
Sous-Espèce	Argentina anserina subsp. anserina	118908

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Argentina anserina* et code **0977** en tant que nom retenu
 - le nom de *Potentilla anserina* et code **0977** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Potentilla anserina* et code **1126**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Potentilla anserina* et code **947**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Potentilla anserina* var. *tenella* et page **0344** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.