

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-
---

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mars à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

### Description collaborative

Ceci est une **salade sauvage**. Pour plus d'informations, regardez [ici](#).

### Générale

Plante herbacée, annuelle à vivace, de 10 à 30 cm de haut.

Feuilles alternes, toutes en rosettes, lobées, velues (parfois glabres ?).

Tige nulle, remplacée par une ou plusieurs hampes florales, poilue, ramifiées, portant 1-2 (3 ?) capitules en corymbe. Fleurs toutes liguliflores, jaunes.

Fruits de deux types : ceux du pourtour sont appliqués contre les bractées de l'involucre, plus gros que les autres, bordés de 2 ailes membraneuses ; ceux du centre sont étroits et presque cylindriques (seulement un peu rétrécis à la base de l'aigrette). Les poils de l'aigrette sont très finement denticulés. Le réceptacle porte, entre les fleurs, des paillettes en forme de longs poils blanchâtres.

Bractées de l'involucre ornées d'une ligne médiane de poils noirs.

### Identification

*Crepis sancta* possède une ligne de poils noirs sur les bractées de l'involucre. Ce critère caractéristique a été noté par plusieurs personnes sur la liste de discussion [determination\\_plantes@tela-botanica.org](mailto:determination_plantes@tela-botanica.org) (discussion initiée le 4 avril 2013, commentaire de [G.B.](#) et confirmé par [J.C.B.](#)).


On observe également des mucrons noirs (ou pourpre noir) qui terminent les dents des feuilles, sur les jeunes feuilles. C'est bien visible (commentaire de [J.C.B.](#)).

Les poils des bractées, translucides, peuvent être (rarement) sans noir, plus souvent tachés de noir (chaque article du poil étant taché de noir... ou pas !)


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Noms Populaires Français: "Herbe rousse", "Salade de lièvre", "Pata de galina"  
 Nom Allemand: Belgischer Pippau

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Fréquemment récoltée en Languedoc comme salade sauvage de l'automne au printemps. Son goût est doux et agréable.

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **14 mars 2002**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

### Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.



## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Crepis	86242
Espèce	Crepis sancta	19754
Sous-Espèce	Crepis sancta subsp. nemausensis	19756
Sous-Espèce	Crepis sancta subsp. sancta	19757

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Crepis sancta* et code **0432** en tant que nom retenu
  - le nom de *Pterotheca sancta* et code **0432** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Hieracium sanctum* et code **2199** en tant que syn1
  - le nom de *Pterotheca sancta* et code **2199**