

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>4095 Glyceria borrieri</b>  |
| Synonymes G. CONFERTA Fries ; ATROPIS BORRERI Richter  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-50 cm glabre, à souche fibreuse gazonnante</li> <li>- tiges raides, étalées ou redressées, feuillées</li> <li>- feuilles glauques, planes, larges de 2-4 mm</li> <li>- ligule courte, tronquée</li> <li>- panicule de 4-8 cm, oblongue, assez lâche, presque égale, raide, verdâtre, à rameaux plus ou moins écartés, tous entièrement garnis d'épillets ou les plus longs un peu nus à la base</li> <li>- épillets d'environ 3 mm rapprochés, subsessiles, à 3-5 fleurs de 2 à 2.12 mm</li> <li>- glumes très inégales, l'inférieure de moitié plus courte</li> <li>- glumelle inférieure obtuse et souvent mucronulée, à 5 nervures faibles.</li> </ul> |
| Écologie Vases salées et pâturages du voisinage de l'Océan et de la Manche.  |
| Répartition Europe occidentale.  |
| Floraison Juin-août.   |

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|   |   |
|---|---|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux   |   |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |   |
| Chorologie : méditerranéen-atlantique   |   |
| Inflorescence : panicule d'épillets<br>Fruit : caryopse<br>Couleur de la fleur : vert<br>Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : anémogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                        | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|----------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Glycérie de Borrer         | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Glycérie fasciculée        | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Atropis fasciculé          |                   | Peu usité et à éviter |       |
| ndl    | Blauw Kweldergras          |                   |                       |       |
| eng    | Borrer's Saltmarsh-grass   |                   |                       |       |
| deu    | Büschel-Salzschwaden       |                   |                       |       |
| deu    | Büscheliger Salzschwaden   |                   |                       |       |
| ita    | Gramignone delle bonifiche |                   |                       |       |
| eng    | Saltmarsh Alkaligrass      |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Puccinellia fasciculata subsp. fasciculata**

Basionyme : *Poa fasciculata* Torr. [1824, Fl. N. Midth U.S., 1 : 107]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique   | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus      | Plantae  | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes  | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes   | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes  | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes  | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes  | 87491   |
| Cladus      | Euphyllophytes   | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes   | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes   | 101135  |
| Cladus      | Monocotyledones  | 101139  |
| Cladus      | Commelinidees  | 100969  |
| Ordre       | Poales   | 100977  |
| Famille     | Poaceae  | 100898  |
| Genre       | Puccinellia  | 87084   |
| Espèce      | <i>Puccinellia fasciculata</i>                           | 53914   |
| Sous-Espèce | <i>Puccinellia fasciculata</i> subsp. <i>fasciculata</i> | 53915   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Puccinellia fasciculata* subsp. *fasciculata* et code **0276** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 50479