

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3276 Quercus pubescens</b> <i>Chêne blanc</i>
Synonymes Q. LANUGINOSA Thuill.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Arbre peu élevé, souvent tortueux, à bois brûlant facilement</li> <li>- jeunes rameaux assez flexibles, pubescents</li> <li>- feuilles pétiolées, fermes, caduques, obovales, sinuées-lobées ou pennatifides, d'abord tomenteuses, à la fin pubescentes en dessous</li> <li>- chatons mâles lâches</li> <li>- fruits sessiles ou à pédoncule ne dépassant pas le pétiole</li> <li>- cupule grise-tomentuse, à écailles appliquées, les supérieures à pointe libre et saillante</li> <li>- glands ovoïdes. Varie à fruits agglomérés sur un pédoncule plus long que le pétiole (Q. apennina Lamk).</li> </ul>
Écologie Bois et côteaux secs, surtout calcaires, dans tout le Midi, et çà et là dans le reste de la France.
Répartition Europe méridionale et centrale ; Asie occidentale.
Floraison avril-mai Fructification septembre de la même année

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : ( )	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : épi de cymes triflores Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de avril à mai	sexualité : monoïque Pollinisation : anémogame Dissémination : barochore, dyszoochore

### Description collaborative

#### Générale

Description de **Maurice Reille**  
 (issue de l'ouvrage "IMAGES  
 DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES  
 COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,  
 Connaissance et reconnaissances")

#### Le chêne pubescent

Chêne blanc, chêne noir  
*Quercus pubescens* Willd. (= *Q. lanuginosa* Thuill.)  
 Famille des Fagacées

Ce Chêne est un arbre des régions chaudes et calcaires où il voisine avec l'alisier blanc, l'érable champêtre, le cornouiller mâle, le nerprun purgatif. C'est un arbre à tronc court et tortueux à cime arrondie (1). On n'en connaît guère de beaux individus en Lozère où les plus grands dépassent rarement 15 m. Le chêne pubescent peut croître jusqu'à 1 500 m dans le sud de son aire européenne. En Lozère il est présent jusque sur les causses.

Les feuilles, simples à contour lobé sont de formes et des découpures très variables (2). Elles sont glabres en-dessus et poilues, au moins le long des nervures en-dessous (3). Les jeunes rameaux et les feuilles juvéniles sont tomenteux (4) d'où le nom de chêne blanc, en Provence.

Les fleurs apparaissent en mai, en même temps, ou peu après les feuilles (5, 6). Les chatons mâles, pendants, en grappes, portent des paquets discontinus de fleurs. Les fleurs femelles sont solitaires ou groupées en bouquets presque sessiles à l'extrémité des pousses de l'année (7).

Les glands sont eux aussi très variables, parfois presque sphériques (8) d'autre fois plus allongés (9), enchâssés dans une cupule tomenteuse aux écailles appliquées, brièvement pédonculée.

L'écorce du chêne pubescent est craquelée, noirâtre (10) d'où le nom de chêne noir en Périgord. Le bois est le moins recherché de celui des chênes, sauf pour le feu. Localement on donne souvent de nom de blache ou blachère à un boisement de chênes pubescents.

Les galles causées par différents insectes sont nombreuses sur le chêne pubescent. Les plus communes (11, 12) sont causées par des Hyménoptère du genre Cynips.

#### Ecologie


Le chêne pubescent est un complexe taxinomique qui comprend beaucoup d'écotypes. Certains vont même jusqu'à inclure le chêne sessile dans la variabilité du chêne pubescent. Il faut comprendre que cette espèce est originaire des zones sub-supraméditerranéennes et occupe donc originellement une position géographique intermédiaire entre la zone des feuillus caducifoliés (tempérée modale) et la zone des feuillus sempervirents sclérophylles (tempérée chaude = méditerranéenne). C'est la même situation pour *Quercus faginea* et *Quercus canariensis* qui sont des sortes de pubescents à feuilles persistantes. Dans la zone tempérée modale les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, car en hiver le gel et la baisse de température, les journées plus courtes, rendent l'entretien d'une feuille molle de bonne taille trop coûteux. Et la période estivale est suffisante pour boucler le bilan énergétique annuel de l'arbre. Pour les jeunes arbres c'est par contre souvent un peu court car ils ont peu de feuilles, donc ils gardent leurs feuilles vertes plus longtemps et elles deviennent parfois marcescentes, comme une marque génétique vers la sempervirence. Pour les arbres méditerranéens (les vrais), la photosynthèse peut fonctionner toute l'année, car les basses températures sont rares. Il n'y a donc pas lieu de devenir caducifolié. Là, par contre, la saison délicate est l'été très sec, d'où la taille plus petite des feuilles, leur cuticule épaisse pour limiter la transpiration, la pilosité (tiens tiens çà rappelle le pubescent?) et la scléification globale de l'arbre (petite taille, écorce épaisse résistante au feu, système souterrain particulier, etc.).

Philippe Julve


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chêne pubescent	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chêne blanc	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne blanc de Provence	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne truffier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne noir	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Nom attribué également à d'autres espèces du genre.
ndl	Behaarde Eik			
ndl	Donzige Eik			
eng	Downy Oak			
eng	Durnest			
deu	Echte Flaum-Eiche			
deu	Flaumeiche			
cat	Glaner			
deu	Krummeiche			
eng	Pubescent Oak			
ita	Quercia pubescente			
spa	Roble albar			
spa	Roble pubescente			
cat	Roure martinenc			
ita	Roverella			
eng	Truffle-oak			
deu	Weichhaarige Eiche			
ndl	Zachte Eik			


## Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Quercus pubescens Willd. [1805, Sp. Pl., 4 (1) : 450], non Willd. [1796, Baumzucht : 279]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:50

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Fagaceae	100924
Genre	Quercus	83654
Espèce	Quercus pubescens	54438
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. pubescens	54535
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. virgiliana	54537
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. lanuginosa	76121
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. dalechampii	118688
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. subpyrenaica	118689
Sous-Espèce	Quercus pubescens subsp. budensis	118690

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Quercus pubescens* et code **180**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Quercus pubescens* et code **3276**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Quercus pubescens* et code **248**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Quercus pubescens* et page **0112** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Quercus pubescens* et code **0769** en tant que nom retenu
  - le nom de *Quercus humilis* et code **0769** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Quercus lanuginosa* et code **1014**