Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3277 Quercus sessiliflora *Chêne rouvre*
Synonymes Q. ROBUR L. part.
- . Arbre élevé, élancé, à bois brûlant difficilement - jeunes rameaux fragiles, glabrescents - feuilles nettement pétiolées, caduques, obovales, sinuées-lobées, non auriculées, glabres ou un peu pubescentes en dessous sur les nervures, d'un vert foncé en dessus - fleurs femelles sessiles, agglomérées - style très court, à stigmates triangulaires étalés dès la base - fruits subsessiles ou à pédoncule égalant à peu près le pétiole - cupule glabrescente, à écailles nombreuses, serrées, toutes appliquées - glands généralement ovoïdes.
Écologie Haies et bois frais, dans presque toute la France, mais rare dans le Midi ; Corse.
Répartition Europe, surtout centrale ; Asie occidentale.
Floraison avril-mai Fructification septembre-octobre de la même année

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
Connaissance et reconnaissances")

Le chêne rouvre

Chêne sessile
Quercus sessiliflora Salisb. (= Q. petrea Liebl.)
Famille des Fagacées

Comme pour le chêne pédonculé (dont les feuilles sont presque sessiles) c'est aux fleurs femelles que s'adresse le qualificatif de « sessiles ». Le chêne rouvre qui est lui aussi un grand arbre (1) se distingue donc facilement de son congénère par ses feuilles toujours longuement pétiolées (2) à limbe sans oreillette, le plus souvent rétrécies en coin à la base (2, 3) et ses glands sessiles réunis en bouquets à l'extrémité des rameaux de l'année (4).
La floraison a lieu en mai, peu après l'apparition des feuilles. Chatons mâles et fleurs femelles sont portés par des rameaux de l'année en cours (5). Les glands, mûrs et caducs en automne sont de même taille que ceux du chêne pédonculé (6). L'écorce des deux espèces n'est pas distincte.
Le rouvre est bien moins exigeant que le chêne pédonculé en humidité et sur la qualité des sols. Il s'accommode de sols pauvres, légers, des substrats granitiques et schisteux et s'élève en altitude jusqu'à 1 600 m. C'est la raison pour laquelle il est fréquent en Lozère, en mélange avec le hêtre et le pin sylvestre. En futaie, il a un tronc élevé bien droit et un houppier en forme de cône renversé. En plaine il est souvent en mélange au chêne pédonculé dans la « chênaie mixte ».

Identification

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chêne rouvre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chêne sessile	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chêne à trochets	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne des pierriers	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne mâle	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chêne noir	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	Nom attribué également à d'autres espèces du genre.
deu	Bergeiche			
eng	Chestnut Oak			
eng	Durmast Oak			
deu	Durreiche			
deu	Harzeiche			
ita	Ischia			
ita	Quercia rovere			
spa	Roble albar			
cat	Roure de fulla gran			
ita	Rovere			
eng	Sessile Oak			
deu	Steineiche			
deu	Trauben-Eiche			
deu	Traubeneiche			
ndl	Winter Eik			
deu	Winter-Eiche			
deu	Wintereiche			
ndl	Wintereik			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **15 août 1882**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Quercus petraea subsp. petraea

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fagales	102740
Famille	Fagaceae	100924
Genre	Quercus	83654
Espèce	Quercus petraea	54524
Sous-Espèce	Quercus petraea subsp. petraea	54527

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Quercus mas* et code **0179**
  - le nom de *Quercus sessiliflora* et code **0181** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Quercus mas* et code **0769** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
  - le nom de *Quercus petraea subsp. petraea* et code **0769** en tant que nom retenu
  - le nom de *Quercus sessilis* et code **0769** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Quercus sessiliflora* et code **3277**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Quercus sessiliflora* et code **0250** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Quercus sessiliflora* et code **1013**
  - le nom de *Quercus sessilis* et code **1013** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Quercus sessilis* et page **0112** en tant que synonyme