

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

724 <i>Rhus coriaria</i> L. <i>Sumac des corroyeurs, Vinaigrier</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 1 à 3 mètres, velu-hérissé dans le haut, à suc laiteux - feuilles imparipennées, à 7-15 folioles ovales-lancéolées, dentées, épaisses, velues - fleurs blanchâtres, en thyrses compacts, étroits, allongés, dressés - pédicelles courts, munis sous chaque fleur de 3 bractéoles linéaires - la plupart fructifères, glabres, ne s'allongeant pas après la floraison - drupe subglobuleuse, comprimée, hérissée-laineuse, d'un brun pourpre à la maturité.
Écologie Lieux arides, surtout calcaires, du Midi : Provence, Languedoc ; Ardèche, Aveyron, Tarn, Haute-Garonne, Lot, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gironde.
Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Algérie.
Floraison juin-août Fructification octobre-novembre
Usages Le suc de ce Sumac est acre et vénéneux. L'écorce et les feuilles fournissent un tan très estimé que l'on emploie à la préparation des maroquins. Les fruits se mangent en Orient comme les câpres.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : drupe Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : endozoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.


Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Sumac des corroyeurs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vinaigrier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Corroyère	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sumac des voyageurs	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
eng	Common Sumach			
eng	Elm-leaved Sumac			
eng	Elm-leaved Sumach			
deu	Gerber-Sumach			
deu	Gerbersumach			
eng	Sicilian Sumac			
deu	Sizilianischer Sumach			
ita	Sommaco siciliano			
cat	Sumac			
eng	Tanner's Sumach			
spa	Tano			
spa	Zumaque			
spa	Zumaque de Sicilia			
spa	Zumaque de Tenerías			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Rhus coriaria L. [1753, Sp. Pl., 1 : 265]

Basionyme : Rhus coriaria L. [1753, Sp. Pl., 1 : 265]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Anacardiaceae	101035
Genre	Rhus	87118
Espèce	Rhus coriaria	56068

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rhus coriaria* et code **0710**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Rhus coriaria* et code **0724**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Rhus coriaria* et code **2726**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Rhus coriaria* et code **0320** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 56068