

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2111 Staezelina dubia L. Sous-arbrisseau
- de 2-4 dm très rameux et très feuille à rameaux tomenteux - : feuilles blanches-tomenteuses en dessous, verdâtres ou cendrées en dessus, linéaires à bords entiers, ondulés ou dentés un peu réfléchis par les bords - capitules solitaires ou rapprochés en fascicules et brièvement pédoncules - involucre oblong-cylindrique nuancé de pourpre, à folioles tomenteuses sur le dos, lancéolées, les intérieures étroites, acuminées - akènes longs de 4 12 à 5 mm à aigrette blanche 4 à 5 fois plus longue - fleurs purpurines.
Écologie Côteaux secs, pierreux du Midi, des Alpes-Maritimes à la Haute-Garonne, remonte jusqu'au Lot, à l'Aveyron, Ardèche, Drame, Hautes-Alpes.
Répartition Portugal, Espagne, Italie, Algérie.
Floraison Juin-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale


Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Stéhéline	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Stéhéline douteuse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Hierba pincel			
spa	Mata pincel			
ita	Pennellini			
cat	Pinzell			
deu	Zweifelhafte Strauchscharte			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

La Stéhéline douteuse était utilisée en Espagne, dans la province d'Albacete, jusque dans les années 1940, pour produire le feu. D'après Alain Renaux, ethnobotaniste au C.E.F.E., il semblerait que la Stéhéline douteuse était utilisée comme initiateur aux XVIème et XVIIème siècles dans le sud de la France.

Roussel B. ; Isenmann M et P ; Flores A. et Boutié P. (2003).- Un usage espagnol original de la Stéhéline douteuse, Staehelina dubia L. : La production du feu. Annales de la société d'Horticulture de d'Histoire naturelle de l'Hérault, vol. 143, fasc. 1, pp. 19-26.

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **13 juin 1997**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Staehelina dubia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 840]

Basionyme : Staehelina dubia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 840]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Staehelina	87259
Espèce	Staehelina dubia	65982

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Staehelina dubia* et code **2111**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Staehelina dubia* et code **3987**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Staehelina dubia* et code **0425** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.