

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1097 Spiraea hypericifolia</b>
Synonymes S. OBOVATA W. et Kit.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sous-arbrisseau touffu de 40 cm à 1 mètre, à souche traçante</li> <li>- feuilles petites (2-3 cm de long), obovales-oblongues, obtuses, atténuées en court pétiole, crénelées-dentées ou échancrées au sommet, rarement entières</li> <li>- stipules nulles</li> <li>- fleurs blanches, petites, longuement pédonculées, 4-8 en fascicules latéraux, feuilles à la base, rapprochés en panicule longue et étroite</li> <li>- étamines égalant presque les pétales obovales</li> <li>- 3-5 carpelles dressés, non contournés, glabres.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et pierreux des terrains calcaires : Causse des Cévennes ; Lot, Corrèze, Charente, Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne, Indre, Cher.
Répartition Carniole, Hongrie, Russie ; Sibérie et Daourie ; Amérique du Nord.
Floraison Mai-juin. .
Usages Souvent cultivé et çà et là subspontané.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème de racèmes Fruit : follicule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore





## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **7 mai 2007**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* (Waldst. & Kit. ex Willd.) H. Huber [1964, in Hegi ; Ill. Fl. Mitt.-Eur., éd. 2, 4 (2a) : 252]**

Basionyme : *Spiraea obovata* Waldst. & Kit. ex Willd. [1809, Enum. Pl. Hort. Berol., 541]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Rosales	102741
Famille	Rosaceae	101130
Genre	<i>Spiraea</i>	87254
Espèce	<i>Spiraea hypericifolia</i>	77523
Sous-Espèce	<i>Spiraea hypericifolia</i> subsp. <i>obovata</i>	65760

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Spiraea hispanica* et page **0322** en tant que synonyme
  - le nom de *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* et page **0322** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Spiraea hypericifolia* et code **1097**
  - le nom de *Spiraea obovata* et code **1097** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. *Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
  - le nom de *Spiraea hypericifolia* subsp. *obovata* et code **1016** en tant que nom retenu
  - le nom de *Spiraea obovata* et code **1016** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Spiraea obovata* et code **2092**