

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1903 Tanacetum vulgare L. <i>Tanaisie vulgaire</i>
- . Plante vivace à tige de 8-12 dm droite, simple, glabre - feuilles ovales ou ovales-oblongues, glabres, ponctuées, largement découpées, pennatiséquées, à rachis ailé-denté au moins dans sa moitié supérieure - segments allongés, oblongs, pennatifides ou pennatipartites à lobes assez larges, aigus, souvent dentés sur le bord externe, les caulinaires sessiles, demi-embrassantes, auriculées - involucre à folioles coriaces, obtuses - capitules jaunes, pédoncules, serrés en corymbe - plante très odorante.
Écologie Lieux incultes, bords des chemins, des rivières dans toute la France.
Répartition Europe, Sibérie, manque dans une partie de la région méditerranéenne.
Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : eurasiatique	
Inflorescence : corymbe de capitules Fruit : akène Couleur de la fleur : jaune Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Tānaisie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Tānaisie commune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Barbotine		Secondaire ou régional	
fra	Herbe amère	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe aux vers	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Herbe de saint Marc	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Sent-bon		Secondaire ou régional	
fra	Tānacée	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ndl	Boerenwormkruid			
spa	Charamasca			
eng	Common Tānsy			
ita	Daneda			
ita	Erba del Muschio			
ita	Erba-amara selvatica			
deu	Gemeiner Rainfarn			
spa	Hierba lombriguera			
cat	Tānacet			
ita	Tānaceto			
spa	Tānaceto			
cat	Tānarida			
ita	Tāneda			
eng	Tānsy			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à inconnu
observée le **1 septembre 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Tanacetum vulgare L. [1753, Sp. Pl., 2 : 844]
Basionyme : Tanacetum vulgare L. [1753, Sp. Pl., 2 : 844]
Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Asteraceae	100897
Genre	Tanacetum	87289
Espèce	Tanacetum vulgare	66761

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore Fournier 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
 - le nom de Chrysanthemum tanacetum et code 3894
- Ce taxon est noté dans la flore Lauber & Wagner 2000 Flore illustrée de Suisse sous :
 - le nom de Chrysanthemum vulgare et code 2129 en tant que synonyme
 - le nom de Tanacetum vulgare et code 2129
- Ce taxon est noté dans la flore Lambinon & Delvosalle & Duvigneaud 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :
 - le nom de Chrysanthemum vulgare et page 0719 en tant que synonyme
 - le nom de Tanacetum vulgare f. crispum et page 0719 en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore Guinochet & Vilmorin 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore Coste 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous :
 - le nom de Tanacetum vulgare et code 1903
- Ce taxon est noté dans la flore Tison & de Foucault 2014. Flora gallica sous :
 - le nom de Tanacetum vulgare et code 0394 en tant que nom retenu
 - le nom de Chrysanthemum tanacetum et code 0394 en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore Bonnier & Layens 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.
- Ce taxon est noté dans la flore Tutin & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore Kerguelen 1993. Liste synonymique de la flore de France.