

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2089 *Centaurea diffusa* Lamk.

- Plante bisannuelle verte, glabrescente, très rameuse
- feuilles caulinaires pennati ou bipennatifidées, à segments linéaires-lancéolés
- capitules en vaste panicule très divariquée
- involucre franchement et étroitement oblong, atténué à la base, large de 4 mm environ, à folioles pâles, étroitement lancéolées
- appendice à cils peu nombreux, raides, très longuement dépassés par la pointe terminale épineuse, étalée en dehors, atteignant 3 mm de longueur, égalant ou dépassant la longueur de la foliole
- akènes longs de 2 mm, dépourvus d'aigrette
- fleurs non rayonnantes, ordinairement blanches, très rarement purpurines.

Écologie Naturalisé dans les Bouches-du-Rhône et l'Hérault.

Répartition Russie méridionale, Turquie, Italie.

Floraison Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)

Inflorescence : cyme de capitules

Fruit : akène

Couleur de la fleur : blanc

Floraison : de juin à juillet

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame, autogame


Dissémination : barochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                   | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Centaurée diffuse     | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Bushy Knapweed        |                   |                       |       |
| eng    | Diffuse Knapweed      |                   |                       |       |
| ita    | Fiordaliso diffuso    |                   |                       |       |
| deu    | Sparrige Flockenblume |                   |                       |       |
| eng    | Tumble Knapweed       |                   |                       |       |
| eng    | White Knapweed        |                   |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

|                       | France    | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-----------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent   | Présent             | Absent         |
| Statut d'introduction | Introduit |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
 observée le **26 juin 2008**  
 par **bertrand.bui@...**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

***Centaurea diffusa* Lam. [1785, Encycl. Méth. Bot., 1 : 675]**

Basionyme : *Centaurea diffusa* Lam. [1785, Encycl. Méth. Bot., 1 : 675]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Asteridees                       | 102752  |
| Cladus  | Campanulidees                    | 102761  |
| Ordre   | Asterales                        | 102760  |
| Famille | Asteraceae                       | 100897  |
| Genre   | Centaurea                        | 83417   |
| Espèce  | Centaurea diffusa                | 15154   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Centaurea parviflora* et page **0742** en tant que synonyme
  - le nom de *Centaurea diffusa* et page **0742** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Centaurea diffusa* et code **2089**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Centaurea diffusa* et code **2245**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Centaurea diffusa* et code **4052**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Centaurea diffusa* et code **0415** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 15154